Plantas da Floresta Atlântica

– *Editores* –

João Renato Stehmann, Rafaela Campostrini Forzza,

Alexandre Salino, Marcos Sobral,

Denise Pinheiro da Costa e Luciana H. Yoshino Kamino

Rio de Janeiro – 2009

Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro
Rua Jardim Botânico 1008 - Jardim Botânico - Rio de Janeiro - RJ - CEP 22460-180
@ JBRJ
ISBN 978-85-60035-05-2

Presidência da República
LUIS INÁCIO LULA DA SILVA – *Presidente*

Ministério do Meio Ambiente
CARLOS MINC BAUMFELD – *Ministro*
IZABELLA MÔNICA VEIRA TEIXEIRA – *Secretária Executiva*

Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro
LISZT VIEIRA – *Presidente*
MARLI PIRES MORIM – *Diretora de Pesquisa Científica*
KAREN L. G. DE TONI – *Editoria Científica*

Projeto Gráfico
Carla Molinari
Simone Bittencourt

Editoração
Carla Molinari
Simone Bittencourt

Tratamento de Imagens
Simone Bittencourt

Revisão
Carla Molinari

Capa
Simone Bittencourt,
sobre ilustrações de Maria Alice Rezende

P713 Plantas da Floresta Atlântica / Editores João Renato Stehmann ... [et al.]. – Rio de Janeiro: Jardim Botânico do Rio de Janeiro, 2009.
516 p.
Inclui bibliografia.
ISBN 978-85-60035-05-2

1. Mata Atlântica. 2. Flora. 3. Brasil. I. Stehmann, João Renato, ed.

CDD 577.35

Apresentação

As iniciativas de documentação da diversidade vegetal no Brasil têm sido realizadas através de ações isoladas, o que dificulta a obtenção e a respectiva compilação das informações sobre a nossa flora. Esse panorama começou a mudar nos últimos anos através de projetos de listagem de espécies, de informatização das coleções e dos herbários virtuais. Nesse contexto, os pesquisadores João Renato Stehmann e Rafaela Campostrini Forzza assumiram o desafio de coordenar um projeto que contou com cerca de 200 taxonomistas para que fosse viável publicar a lista das plantas do Domínio Atlântico, agregando o conhecimento existente para disponibilizar os dados existentes para toda a comunidade.

Os editores iniciam o livro com um histórico do projeto, metodologia para elaboração da lista e, por fim, apresentam uma análise da diversidade total registrada no Domínio Atlântico. Nos capítulos seguintes, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, cada autor fornece uma breve caracterização do respectivo grupo vegetal e discute sua riqueza, endemicidade e conservação.

A lista é a parte mais aguardada deste livro, onde as famílias, gêneros e espécies são apresentados, sendo que para as espécies são fornecidos dados sobre a formação vegetal onde cada uma ocorre, indicação de endemismo e a categoria de ameaça nas diferentes listas vermelhas publicadas. Esta obra representa uma ferramenta multiplicadora para o estudo das plantas localizadas na Floresta Atlântica, fornecendo informações sobre diversidade, endemismo e conservação dos táxons.

Assim, é com muito prazer que apresento esta obra dos editores Drs. João Renato Stehmann, Alexandre Salino e Luciana H. Yoshino Kamino (Universidade Federal de Minas Gerais), Dr. Marcos Sobral (Universidade Federal de São João del-Rey), Dras. Rafaela Campostrini Forzza e Denise Pinheiro da Costa (Jardim Botânico do Rio de Janeiro), não somente pela mesma preencher uma lacuna no conhecimento da flora do Brasil, como também porque registra o concreto resultado do intercâmbio científico entre as instituições brasileiras.

Plantas da Floresta Atlântica é uma obra importante para a comunidade científica brasileira, pois demonstra como viabilizar parcerias profícuas, bem como representa a perseverança na nossa missão de estudo e difusão do conhecimento da flora brasileira.

Liszt Vieira
Presidente do Jardim Botânico do Rio de Janeiro

Os resultados de estudos, pesquisas e levantamentos técnico-científicos realizados sobre a Mata Atlântica, especialmente nas últimas duas décadas, confirmam a notável diversidade de espécies desse Domínio. As estratégias de conservação na região sempre foram subsidiadas por essas informações, mas com ênfase na fauna, principalmente dos primatas considerados como "espécies-bandeira". Entretanto, a complexidade e a exuberância da Mata Atlântica exige um novo olhar, capaz de desvendar outros segredos e verdadeiras jóias desse patrimônio biológico, ou seja, a sua flora.

Esta publicação é uma avaliação inédita e valiosa sobre as plantas da Mata Atlântica. As informações aqui apresentadas são fruto da participação e da colaboração de dezenas de pesquisadores, evidenciando a grande capacidade institucional e a rede de parcerias atuante na região. Os resultados confirmam a posição de destaque da Mata Atlântica entre os *hotspots* mundiais de biodiversidade, assim como ressalta a necessidade de mais investimentos em ciência e tecnologia, devido ao número significativo de espécies novas revelado nesse bioma anualmente e as lacunas de conhecimento ainda existentes para alguns grupos biológicos.

É importante enfatizar ainda que esta publicação torna acessível as informações sobre a flora do Domínio Atlântico. Trata-se, portanto, de uma obra para todos envolvidos com pesquisa, conservação e desenvolvimento sustentável. São dados essenciais para fornecer a ligação entre a análise científica e a tomada de decisões, tão necessárias para expandir os esforços de conservação e a sustentabilidade desse que é um dos maiores repositórios de biodiversidade do planeta.

Luiz Paulo de Souza Pinto
Diretor do Programa Mata Atlântica
Conservação Internacional

Agradecimentos

Esta publicação é resultado do empenho de muitos pesquisadores de instituições nacionais e internacionais que dedicaram uma parte do seu tempo para elaborar a primeira lista das espécies da flora do Domínio Atlântico. A eles, que acreditaram na importância desta obra, agradecemos e dedicamos este trabalho.

Agradecemos também à Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), ao Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ) e ao Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT), por apoiarem o projeto nas suas diferentes fases.

Por fim, gostaríamos de agradecer à Conservação Internacional (CI) e ao Fundo e Parceria para Ecossistemas Críticos (Critical Ecosystem Partnership Fund - CEPF), que apoiaram nossos projetos na Floresta Atlântica e possibilitaram a organização de uma base de dados, o embrião da publicação que aqui apresentamos.

Sumário

Parte I. Floresta Atlântica: riqueza, endemismo e conservação

Diversidade taxonômica na Floresta Atlântica 3
Briófitas 13
Pteridófitas 19
Gimnospermas e Angiospermas 27

Parte II. Listas das espécies

Lista das Briófitas 41
Lista das Pteridófitas 81
Lista das Gimnospermas e Angiospermas 113

Lista de Autores 501

PARTE I

Floresta Atlântica: riqueza, endemismo e conservação



Diversidade taxonômica na Floresta Atlântica

João Renato Stehmann, Rafaela Campostrini Forzza, Alexandre Salino, Marcos Sobral, Denise Pinheiro da Costa & Luciana H. Yoshino Kamino

Introdução

O Domínio da Floresta Atlântica é um complexo de ecossistemas de grande importância, pois abriga uma parcela significativa da diversidade biológica do Brasil e do mundo. Os altos níveis de riqueza e endemismo, associados à destruição sofrida no passado, incluíram a Floresta Atlântica definitivamente no cenário mundial como um dos 34 *hotspots* de biodiversidade (Mittermeier *et al.* 2004). Desde a época da colonização européia, as interferências dos sucessivos ciclos de exploração econômica e das expansões urbana e agroindustrial fizeram com que a vegetação natural da Floresta Atlântica fosse reduzida a valores alarmantes.[1] Calcula-se que a área original cobria entre 1.300.000 a 1.500.000 km², estendendo-se por mais de 3.300 km ao longo da costa leste do Brasil (Morellato & Haddad 2000, Câmara 2005). Os números do que resta da cobertura vegetal variam de acordo com a fonte e a metodologia utilizada (*vide* Galindo-Leal & Câmara 2005, Fundação SOS Mata Atlântica & INPE 2008), porém, dados mais atuais indicam que restam cerca de 11% da vegetação original (Ribeiro *et al.* 2009), distribuída em fragmentos florestais de tamanho reduzido (<100 ha), biologicamente empobrecidos e cuja restauração poderia levar centenas de anos (Liebsch *et al.* 2008).

Aproximadamente 95% da Floresta Atlântica encontra-se em território brasileiro e o restante na Argentina e no Paraguai (Conservation International *et al.* 2000). A região nuclear do Domínio corresponde a uma série de ecossistemas quase contínuos ao longo da costa brasileira, ocorrendo desde o Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Hoje, áreas florestais mais continentais e outras disjuntas inseridas como encraves no Cerrado, Pantanal, Caatinga e Pampa também são consideradas como pertencentes à Floresta Atlântica. Como exemplos podemos citar os brejos de altitude localizados na região da Caatinga, as florestas decíduas ao longo do médio rio São Francisco e ao sul do Piauí, e as florestas decíduas e semidecíduas isoladas ao longo da Serra da Bodoquena no Mato Grosso do Sul (IBGE 2008).

Diferentemente da maioria das florestas tropicais, a Floresta Atlântica possui um conjunto de variáveis geográficas e climáticas que a tornam singular, tais como: 1) amplitude latitudinal de

[1]Recomendamos a leitura de Dean (1996) para o conhecimento da história da devastação da Floresta Atlântica.

27 graus, desde os 3ºS aos 30ºS; 2) uma variação longitudinal máxima de aproximadamente 17º; 3) variação altitudinal desde o nível do mar até 2.890 m nas serras do Complexo da Mantiqueira, e 4) diferenças na pluviosidade, que varia de locais sub-úmidos, com estações secas no nordeste brasileiro, até áreas hiper-úmidas, acima dos 3.600 mm anuais, na Serra do Mar (Rizzini 1979, Thomas *et al.* 1998, Oliveira-Filho & Fontes 2000, Câmara 2005, Silva & Casteleti 2005, Leme & Siqueira-Filho 2006). A heterogeneidade ambiental não foi ainda suficientemente detalhada e seu entendimento é fundamental para que se possa analisar os padrões de distribuição geográfica das espécies, bem como as barreiras que limitam a distribuição dos táxons.

A Floresta Atlântica encontra-se isolada dos grandes blocos florestais sul-americanos (Florestas Amazônica e Andina). Essas formações já foram de alguma forma interligadas no passado (Morley 2000), mas atualmente encontram-se separadas por um corredor mais seco na região que engloba parte das formações da Caatinga, Cerrado e Chaco (Bigarella *et al.* 1975, Ab'Saber 1990, Prado & Gibbs 1993). Assim, a Floresta Atlântica reúne elementos antigos do Terciário, bem como outros que se diferenciaram ou colonizaram a formação durante o Quaternário, resultando em uma flora extremamente rica, formada por uma gama de elementos atlânticos e amazônicos na sua porção tropical (Andrade-Lima 1982, Silva & Casteleti 2005, Santos *et al.* 2007). A evidência dessa ligação pretérita é corroborada pelos elementos compartilhados entre a Floresta Amazônica e as Florestas de Tabuleiros no sul da Bahia e Espírito Santo (Andrade-Lima 1966, Mori *et al.* 1981, 1983, Martini *et al.* 2007, Amorim *et al.* 2008, 2009). Em sua porção sul/sudeste, nas regiões subtropical ou tropical de altitude, encontramos elementos característicos de clima temperado (andinos e austral-antárticos) que se distribuem especialmente na Floresta Ombrófila Mista, Floresta Ombrófila Densa Altomontana e nas formações campestres de altitude (Rambo 1951, Safford 2007). Alguns desses elementos estendem sua distribuição geográfica em latitudes mais baixas, até o sul da Bahia, como os gêneros *Drimys* e *Fuchsia* (Amorim *et al.* 2009). Uma síntese dos estudos fitogeográficos brasileiros pode ser encontrada em Fiaschi & Pirani (2009) e para entender melhor as relações biogeográficas e florísticas da Floresta Atlântica sugerimos a leitura de Rizzini (1979), Por (1992), bem como Oliveira-Filho & Fontes (2000), Tabarelli & Cavalcanti (2004), Oliveira-Filho *et al.* (2006) e Leme & Siqueira-Filho (2006). Na última década, análises filogenéticas e filogeográficas com grupos diversificados na Floresta Atlântica, associadas às reconstituições da paisagem do passado através de dados polínicos e/ou modelagem, reaqueceram a discussão sobre a história evolutiva do Domínio, fornecendo informações sobre a dinâmica vegetacional e climática no quaternário (Behling & Lichte 1997, Behling & Negrelle 2001, Behling *et al.* 2002, Perret *et al.* 2006, Carnaval & Moritz 2008).

A riqueza da Floresta Atlântica foi estimada por Myers *et al.* (2000) em 20 mil espécies de plantas vasculares, sendo oito mil (40%) endêmicas. Esses números constituíram o marco referencial da diversidade vegetal encontrada nessa floresta, pois permitiram a comparação da riqueza e endemismo em uma escala planetária. Apesar do substantivo aumento do conhecimento acerca da flora da Floresta Atlântica, podemos considerá-la ainda insuficientemente conhecida, visto que em menos de duas décadas, mais de 1.000 novas espécies de angiospermas foram descobertas, o que representa 42% do total descrito para o Brasil neste período (Sobral & Stehmann 2009).

As iniciativas de documentação da diversidade vegetal no Brasil têm sido realizadas através de ações isoladas em diferentes instituições de pesquisa. A consequência disso é a dificuldade na obtenção de informações da nossa flora, um gargalo para a realização de projetos científicos que demandam a identificação correta dos táxons, bem como da utilização sustentada e conservação dos nossos recursos naturais. Esse panorama começou a mudar nos últimos anos, tanto no âmbito nacional como regional, através de projetos de listagens de espécies, elaboração das floras estaduais, informatização das coleções e sua disponibilização em herbários virtuais, bem como da elaboração da Lista da Flora do Brasil, prevista para ser concluída em 2010.

Nesse contexto, aceitamos o desafio de coordenar a publicação da lista das plantas ocorrentes no Domínio Atlântico, acreditando que ao agregar a colaboração dos taxonomistas e juntar o conhecimento existente podemos documentar e disponibilizar dados sobre a sua diversidade vegetal.

Metodologia para elaboração da lista

Em 2005 teve início o projeto *Endemismo de Plantas Vasculares no Bioma Mata Atlântica* com apoio do Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF), chamado no Brasil de Fundo e Parceria para Ecossistemas Críticos. O objetivo do CEPF foi consolidar estratégias de conservação integrada da biodiversidade dos *hotspots*, sendo fruto de uma aliança entre a Conservação Internacional, o Fundo Mundial para o Meio Ambiente, o Banco Mundial, a Fundação MacArthur e o Governo do Japão. Durante dois anos, foi montado um banco de dados contendo informações de ocorrência de espécies endêmicas da Floresta Atlântica, obtidas de bases disponíveis e registros de herbários.

Para avaliar os resultados obtidos nessa etapa, foi realizado entre 13 e 15 de agosto de 2007, em Belo Horizonte, um *workshop* que contou com a participação de pesquisadores e representantes de organizações não-governamentais que atuam nas áreas de taxonomia, ecologia e conservação (Figura 1.1). Nesse evento, decidiu-se pela organização de uma publicação contendo a listagem de todas as espécies de plantas conhecidas do Domínio Atlântico, com a indicação de endemismo e tipos vegetacionais onde ocorrem.

A partir dos resultados obtidos pelo projeto *Endemismo de Plantas Vasculares no Bioma Mata Atlântica* foram elaboradas planilhas parciais por família contendo as seguintes infomações para cada espécie: hábito, distribuição geográfica, estado de conservação e a indicação de endemismo para o Domínio. Posteriormente, essas planilha foram enviadas aos especialistas para correção e complementação dos dados. O resultado deste trabalho é a lista apresentada na Parte II deste livro.

Para a elaboração da lista foi considerado o conceito amplo (*sensu lato*) da Floresta Atlântica, ou seja, um Domínio composto por uma série de tipologias ou unidades fitogeográficas, constituindo um mosaico vegetacional, em concordância com a Lei n° 11.428/2006: "... consideram-se integrantes do Bioma Mata Atlântica as seguintes formações florestais nativas e os ecossistemas associados, com as respectivas delimitações estabelecidas em Mapa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE, conforme regulamento: Floresta Ombrófila Densa; Floresta Ombrófila Mista; também denominada de Mata de Araucárias; Floresta Ombrófila Aberta; Floresta Estacional Semidecidual;



Figura 1.1

Participantes do Workshop Endemismos de Plantas Vasculares no Bioma Mata Atlântica. Em pé, da esquerda para a direita: Alexandre Salino, Vinicius C. Souza, Claudio N. Fraga, Adriano P. Paglia, André M. A. Amorim, Luciana C. N. Melo, Rafael C. Spósito, Fábio de Barros, Rubens C. Mota, Leonardo D. Meireles, José A. Siqueira Filho, Gustavo Martinelli, Gustavo Heringer, Renato Goldenberg, Vinícius A. O. Dittrich, Diego Lara, Gabriel Machado, João A. Jarenkow, Rafaela C. Forzza, Márcio S. Werneck, Rafaella C. Ribeiro, Caetano T. Oliveira, Marina W. F. Faria. Em baixo, da esquerda para a direita: Aristônio M. Teles, Ariane L. Peixoto, Thaís E. Almeida, Elena C. Landau, Ademir Reis, Mônica T. Fonseca, Ivana R. Lamas, Luciana H. Y. Kamino, Haroldo C. Lima, João R. Stehmann e Marcos Sobral.

Floresta Estacional Decidual; bem como os manguezais, as vegetações de restingas; campos de altitude; brejos interioranos e encraves florestais do Nordeste". A Floresta Atlântica estende-se por quase todo território da província de Missiones, na Argentina, e, no Paraguai, está localizada na região oriental do país, delimitada pelo rio Paraná e cordilheiras de Amambay (a leste e sul), rio Paraguai (a oeste) e rio Apa (ao norte) (Fragano & Clay 2005, Giraudo *et al*. 2005).

A lista é apresentada por grandes grupos, a saber: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Nas briófitas, as famílias encontram-se agrupadas em três distintas divisões: Anthocerotophyta (antóceros), Marchantiophyta (hepáticas) e Bryophyta (musgos). Dentro de cada grupo, as famílias estão organizadas em ordem alfabética, assim como os gêneros e as espécies. Para as briófitas a lista segue a classificação de Stotler & Crandall-Stotler (2005) para Anthocerotophyta, He-Nygrén *et al*. (2006) para Marchantiophyta e Buck & Goffinet (2000) para Bryophyta; com relação às pteridófitas, a lista segue a classificação de Kramer & Tryon (1990) para as licófitas e Smith *et al*. (2006) para as samambaias, com a aceitação do gênero *Cnemidaria* em Cyatheaceae; para as angiospermas, seguiu-se APG II (2003), com pequenas modificações. Para as gimnospermas não há ainda uma classificação consensual. Assim

as famílias seguiram os nomes classicamente encontrados na literatura. Categorias taxonômicas infraespecíficas não foram consideradas, assim como híbridos.

Na frente do nome da família e do gênero é apresentado o número de espécies ocorrentes no Domínio Atlântico seguido pelo número total de táxons aceitos para o mundo. O símbolo (*) após o epíteto específico ou genérico indica que a planta é endêmica do Domínio. Também são informadas para cada táxon os tipos vegetacionais onde os mesmos ocorrem, a saber: Floresta Ombrófila Densa/Aberta (FOD); Floresta Ombrófila Mista (FOM); Floresta Estacional Semidecidual (FES); Floresta Estacional Decidual (FED); Formações Campestres (FCA); Afloramentos Rochosos (AFL); Restinga (RST); e Manguezal (MAN). Para possibilitar o reconhecimento da flora adventícia, incluímos a indicação para espécies ruderais e subespontâneas (RUD). A presença em listas de espécies ameaçadas de extinção também foi indicada, bem como a categoria de ameaça. Utilizamos como referências a lista oficial brasileira (MMA 2008), a lista elaborada pela comunidade científica coordenada pela Fundação Biodiversitas (2009) e a lista da IUCN (2009).

Todas as informações apresentadas neste livro acrescidas de hábito, países de ocorrência, material testemunho e referências bibliográficas das espécies estão disponibilizadas no sítio: <http://www.icb.ufmg.br/bot/mataatlantica/basededados.php>.

É importante ressaltar que as indicações de distribuição geográfica, endemicidade e formações de ocorrência foram de responsabilidade dos autores das listas. Coube aos editores apenas padronizar as informações incluídas e orientar sobre os conceitos e delimitações a serem utilizados. Assim, é possível que não haja uma homogeneidade nessas indicações.

Diversidade

No levantamento aqui apresentado são reconhecidas para o Domínio Atlântico 15.782 espécies, distribuídas em 2.257 gêneros e 348 famílias, o que corresponde cerca de 5% da flora mundial, estimada atualmente em 300.000 espécies de plantas (Judd *et al.* 2009). Do total de gêneros e espécies, 132 (6%) e 7.155 (45%) são endêmicos, respectivamente. As briófitas estão representadas por 1.230 espécies, as pteridófitas por 840, as gimnospermas por quatro e as angiospermas por 13.708.

As plantas vasculares somam 14.552, das quais 6.933 são endêmicas. Essa riqueza é menor do que aquela estimada por Myers *et al.* (2000) para a Floresta Atlântica, porém a taxa de endemicidade de 48% é maior do que a predita por esses autores (Tabela 1.1). Isso significa que quase metade de toda a diversidade de plantas vasculares encontradas nessa formação é exclusiva e representa quase 2% das espécies de plantas do planeta. Esses números confirmam ser a Floresta Atlântica o quinto *hotspot* mais rico em endemismo, ficando atrás dos Andes (15.000 espécies), Sunda (15.000), Bacia do Mediterrâneo (11.700) e Madagascar e Ilhas do Oceano Índico (11.600) (Myers *et al.* 2000, Mittermeier *et al.* 2004).

As angiospermas apresentam as maiores taxas de endemismo (6.663 espécies – 49%) e também concentram todos os gêneros endêmicos de plantas vasculares. Das quatro espécies de gimnospermas, apenas o pinheiro-do-paraná, *Araucaria angustifolia,* é endêmica. As pteridófitas apresentaram 269 espécies endêmicas, o que corresponde a cerca de 32% dos táxons. As briófitas apresentam a menor proporção de endemismo, com 222 espécies, o que representa 18% da riqueza (Tabela 1.1).

A análise da distribuição das espécies nas diferentes formações do Domínio Atlântico evidenciou que mais da metade da riqueza (60%) e a maior parte dos endemismos (80%) são encontrados na Floresta Ombrófila Densa. A maior concentração de espécies (9.661) ocorre nas Florestas Ombrófilas Densa/Aberta, seguidas pela Floresta Estacional Semidecidual (3.841), pelas Formações Campestres (3.740), Floresta Ombrófila Mista (2.776), Restinga (1.808), Floresta Estacional Decidual (1.113), Afloramentos Rochosos (1.004), Formações Aquáticas (178) e o Manguezal (65) (Tabela 1.1). Secundariamente, a Floresta Ombrófila Mista teve destaque para as gimnospermas e para as briófitas, enquanto a Floresta Estacional Semidecidual e as Formações Campestres tiveram maior importâncias para as pteridófitas.

A ordem de importância em número de espécies endêmicas por formação foi a seguinte: Floresta Ombrófila Densa (5.164), Floresta Estacional Semidecidual (1.081), Formações Campestres (962), Floresta Ombrófila Mista (946), Restinga (742), Afloramentos Rochosos (420), Floresta Estacional Decidual (165), Manguezal (15) e Formações Aquáticas (14) (Tabela 1.1). Uma discussão detalhada da contribuição da riqueza e endemismo nas diferentes formações vegetais em cada grupo taxonômico é apresentada nos capítulos que se seguem.

Tabela 1.1

Distribuição da riqueza e dos endemismos de plantas nos tipos vegetacionais ocorrentes no Domínio Atlântico (área baseada MMA 2000). FOD/FOA: Floresta Ombrófila Densa/Floresta Ombrófila Aberta; FOM: Floresta Ombrófila Mista; FES/FED: Floresta Estacional Semidecidual/ Floresta Estacional Decidual; FCA: Formações Campestres; AFL: Afloramentos Rochosos; RST: Restinga; MAN: Manguezal.

Grupo taxonômico		Total	FOD/FOA	FOM	FES/FED	FCA	AFL	RST	MAN	FAQ
	Área (km²)		237.530	168.916	635.552			264.423		
	(%)		(18,18%)	(12,93%)	(48,65%)			(20,24%)		
Briófitas	Espécies	1.230	1.166	600	293/391	6	0	88	14	0
	(%)	(100%)	(95%)	(48%)	(24%/32%)	(0,4%)	(0%)	(7%)	(1%)	(0%)
	Endemismos	222	200	103	10/69	3	0	1	0	0
	(%)	(18%)	(90%)	(46%)	(4%/31%)	(1%)	(0%)	(0,4%)	(0%)	(0%)
Pteridófitas	Espécies	840	631	57	406/38	142	9	14	1	15
	(%)	(100%)	(75%)	(7%)	(48%/4%)	(17%)	(1%)	(2%)	(0,1%)	(2%)
	Endemismos	269	219	15	89/1	41	4	1	0	1
	(%)	(32%)	(81%)	(5,5%)	(33%/0,3%)	(15%)	(1,4%)	(0,3%)	(0%)	(0,3%)
Gimnospermas	Espécies	4	2	2	1/0	0	0	1	0	0
	(%)	(100%)	(50%)	(50%)	(25%/0%)	(0%)	(0%)	(25%)	(0%)	(0%)
	Endemismos	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	(%)	(25%)	(0%)	(100%)	(0%)	(0%)	(0%)	(0%)	(0%)	(0%)
Angiospermas	Espécies	13.708	7.862	2.117	3.141/684	3.592	995	1.705	50	163
	(%)	(100%)	(57%)	(15%)	(23%/5%)	(26%)	(7%)	(12%)	(0,4%)	(1,2%)
	Endemismos	6.663	4.745	827	982/95	918	416	740	15	13
	(%)	(49%)	(71%)	(12%)	(15%/1%)	(14%)	(6%)	(11%)	(0,2%)	(0,2%)

A vasta perda de habitats e a extrema fragmentação deste Domínio deixaram poucos ecossistemas extensos e intactos, o que pode gerar sérias consequências na manutenção das espécies em longo prazo (Galindo-Leal & Câmara 2005, Ribeiro *et al*. 2009). Em termos de conservação, vale destacar a endemicidade encontrada na Restinga (41%), que cobre a planície quaternária da costa brasileira. Esse é um dos ecossistemas mais ameaçados do Domínio Atlântico, tanto pela exploração imobiliária como pelas perspectivas do aquecimento global, com o aumento da temperatura e do nível dos oceanos (Magrin *et al*. 2007). Um esforço para avaliar o estágio de conservação das espécies endêmicas dessa formação se faz urgente.

O número de espécies ameaçadas de extinção na Floresta Atlântica não é consensual (Tabela 1.2). A lista oficial da flora ameaçada de extinção do Brasil (MMA 2008) inclui 238 espécies, enquanto que aquela referendada pela comunidade científica (Fundação Biodiversitas 2009) cita 719 ameaçadas e oito extintas e a da IUCN (2009) refere 160 ameaçadas e quatro extintas. As duas primeiras listas basearam-se em dados obtidos em 2005. Entretanto, um montante de 300 novas espécies (Stehmann *com. pess.*), a maioria restrita ao Domínio, foi descrito nos últimos três anos, o que deixa ambas as listas defasadas. A falta de uma base de dados dinâmica, consistente e atualizada impede o monitoramento e avaliações que nos permitam ter indicadores de mudança do estado de ameaça das espécies, como já vem sendo feito para uma pequena parcela da fauna brasileira (Paglia & Fonseca 2009).

Apesar da publicação desta lista representar um avanço no conhecimento da flora da Floresta Atlântica, enfatizamos que ela deve ser interpretada apenas como a primeira etapa de uma estratégia para conservação. Consideramos importante manter atualizada uma base de dados com informações detalhadas e confiáveis sobre a diversidade, endemicidade e estado de conservação das espécies ocorrentes no Domínio. Para conservação, no entanto, será fundamental localizar com precisão e numa escala geográfica mais detalhada, os centros de riqueza e

Tabela 1.2

Número de espécies de plantas ameaçadas de extinção ocorrentes no Domínio Atlântico segundo IUCN (2009), Fundação Biodiversitas (2009) e MMA (2008).

Grupo taxonômico	IUCN					Biodiversitas					MMA
	CR	EN	VU	EX	EW	CR	EN	VU	EX	EW	AMEAÇADAS
Briófitas	0	1	1	0	0	4	3	8	0	0	15
Pteridófitas	1	0	0	0	0	25	30	10	1	0	17
Gimnospermas	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
Angiospermas	17	54	86	3	1	110	151	376	3	4	204
Sub-total	18	55	87	3	1	139	185	395	4	4	-
TOTAL	164					727					238

Categoria de Ameaça: CR – Criticamente em Perigo; EN – Em Perigo; VU – Vulnerável; EX – Extinta; EW – Extinta na Natureza.

endemismo, aumentar o número de áreas protegidas, bem como compreender os processos históricos e evolutivos que contribuíram para tamanha diversificação. Somente assim poderemos garantir para as futuras gerações a utilização sustentada dos recursos naturais e a gestão do patrimônio genético encontrado em uma das mais exuberantes florestas tropicais do planeta.

Referências Citadas

Ab' Sáber, A. N. 1990. Paleoclimas quartenários e pré-história da América tropical - II. Revista Brasileira de Biologia 50: 821-831.

Andrade-Lima, D. 1966. Vegetação. *In*: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Atlas Nacional do Brasil. Conselho Nacional de Geografia, Rio de Janeiro, 9p.

Andrade-Lima, D. 1982. Present day forest refuges in Northeastern Brazil. *In*: Prance, G. T. (ed.). Biological diversification in the tropics. Columbia University Press, New York. Pp. 245-254.

Amorim, A. M.; Thomas, W. W.; Carvalho, A. M. V. & Jardim, J. G. 2008. Floristic of the Una Biological Reserve, Bahia, Brazil. *In*: Thomas, W. W. (ed.). The Atlantic coastal forests of Northeastern Brazil. Memoirs of the New York Botanical Garden 100: 67-146.

Amorim, A. M.; Jardim, J. G.; Lopes, M. M. M.; Fiaschi, P.; Borges, R. A. X.; Perdiz, R. O. & Thomas, W. W. 2009. Angiospermas em remanescentes de floresta montana no sul da Bahia, Brasil. Biota Neotropica 9: 313-348.

APG - The Angiosperm Phylogeny Group. 2003. An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG II. Botanical Journal of the Linnean Society 141: 399–436.

Behling, H. & Lichte, M. 1997. Evidence of dry and cold climatic conditions at glacial times in tropical SE Brazil. Quaternary Research 48: 348–358.

Behling, H. & Negrelle, R. R. B. 2001. Tropical Rain Forest and climate dynamics of the Atlantic lowland, Southern Brazil, during the Late Quaternary. Quaternary Research 56: 383–389.

Behling, H.; Arz, H. W.; Patzold, J. & Wefer, G. 2002. Late Quaternary vegetational and climate dynamics in southeastern Brazil, inferences from marine cores GeoB 3229-2 and GeoB 3202-1. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 179: 227-243.

Bigarella, J. J.; Andrade-Lima, D. & Riehs, P. J. 1975. Considerações a respeito das mudanças paleoambientais na distribuição de algumas espécies vegetais e animais no Brasil. Anais da Academia Brasileira de Ciências 47: 411– 464.

Buck, W. R. & Goffinet, B. 2000. Morphology and classification of mosses. *In*: Shaw, A.J. & Goffinet, B. (eds.). Bryophyte biology. Cambridge University Press, New York, 476p.

Câmara, I. G. 2005. Breve história da conservação da Mata Atlântica. *In*: Galindo-Leal, C. & Câmara, I.G. (eds.). Mata Atlântica: biodiversidade, ameaças e perspectivas. Fundação SOS Mata Atlântica/Conservação Internacional, São Paulo/Belo Horizonte. Pp. 31-42.

Carnaval, A. & Moritz, C. 2008. Historical climate modelling predicts patterns of current biodiversity in the Brazilian Atlantic forest. Journal of Biogeography 35: 1187-1201.

Conservation International, Fundação SOS Mata Atlântica, Fundação Biodiversitas, Instituto de Pesquisas Ecológicas, Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo & Instituto de Florestas-MG. 2000. Avaliação e ações prioritárias para a conservação da biodiversidade da Floresta Atlântica e Campos Sulinos. MMA/SBF, Brasília, 41p.

Dean, W. 1996. A ferro e fogo: a história e a devastação da Mata Atlântica brasileira. Cia. Letras, São Paulo, 484p.

Fiaschi, P. & Pirani, J. R. 2009. Review of plant biogeographic studies in Brazil. Journal of Systematics and Evolution 47: 477-496.

Fragano, F. & Clay, R. 2005. *Status* da biodiversidade da Mata Atlântica de interior do Paraguai. *In*: Galindo-Leal, C. & Câmara, I. G. (eds.). Mata Atlântica: biodiversidade, ameaças e perspectivas. Fundação SOS Mata Atlântica/Conservação Internacional, São Paulo/Belo Horizonte. Pp. 288-307.

Fundação Biodiversitas. 2009. Lista da flora brasileira ameçada de extinção. Disponível em <http://www.biodiversitas.org.br/floraBr/>. Acessado em 15 junho 2009.

Fundação SOS Mata Atlântica & INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. 2008. Atlas dos remanescentes florestais da Mata Atlântica período 2005 – 2008. Relatório Parcial. Fundação SOS Mata Atlântica / Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, São Paulo, 156p.

Galindo-Leal, C. & Câmara, I.G. 2005. *Status* do *hotspot* Mata Atlântica: uma síntese. *In*: Galindo-Leal, C. & Câmara, I. G. (eds.). Mata Atlântica: biodiversidade, ameaças e perspectivas. Fundação SOS Mata Atlântica/Conservação Internacional, São Paulo / Belo Horizonte. Pp. 3-11.

Giraudo, A.; Povedano, H.; Belgrano, M. J.; Krauczuk, E.; Pardiñas, U.; Miquelarena, A.; Ligier, D.; Baldo, D. & Castelino, M. 2005. *Status* da biodiversidade da Mata Atlântica de interior da Argentina. *In*: Galindo-Leal, C. & Câmara, I. G. (eds.). Mata Atlântica: biodiversidade, ameaças e perspectivas. Fundação SOS Mata Atlântica/Conservação Internacional, São Paulo/Belo Horizonte. Pp. 160-180.

He-Nygrén, X.; Juslén, A.; Gelnny, D. & Piippo, S. 2006. Illuminating the evolutionary history of liverworts (Marchantiophyta) – towards a natural classification. Cladistics 22: 1-31.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 2008. Mapa da área de aplicação da Lei nº 11.428 de 2006.

IUCN. 2009. IUCN redlist of threatened species. Disponível em <http://www.iucnredlist.org>. Acessado em 15 setembro 2009.

Judd, W. S.; Campbell, C. S.; Kellogg, E. A.; Stevens, P. F. & Donoghue, M. J. 2009. Sistemática vegetal: um enfoque filogenético. 3 ed. Artmed, Porto Alegre, 632p.

Kramer, K. U. & Tryon, R. M. 1990. Introduction to the treatment of pterodophytes. *In*: Kramer, K. U. & Green, P. S. The families and genera of vascular plants. Spreinger-Verlag, New York. Pp. 12-13.

Leme, E. M. C. & Siqueira-Filho, J. A. 2006. A Mata Atlântica - aspectos gerais. *In*: Siqueira-Filho, J. A. & Leme, E. M. C. (eds.). Fragmentos de Mata Atlântica do Nordeste - Biodiversidade, conservação e suas bromélias. Andréa Jakobsson Estúdio, Rio de Janeiro. Pp. 47-79.

Liebsch, D.; Marques, M. C. M. & Goldenberg, R. 2008. How long does the Atlantic Rain Forest take to recover after a disturbance? Changes in species composition and ecological features during secondary succession. Biological Conservation 141: 1717–1725.

Magrin, G.; Gay García, C.; Cruz Choque, D.; Giménez, J. C.; Moreno, A. R.; Nagy, G. J.; Nobre, C. & Villamizar, A. 2007. Latin America. Climate change 2007: Impacts, adaptation and vulnerability. *In*: Parry, M. L.; Canziani, O. F.; Palutikof, J.P.; van der Linden, P. J. & Hanson, C. E. (eds.). Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge. Pp. 581-615.

Martini, A. M. Z.; Fiaschi P.; Amorim, A. M. & Paixão, J. L. 2007. A hot-point within a hot-spot: a high diversity site in Brazil's Atlantic Forest. Biodiversity and Conservation 16: 3111-3128.

Mittermeier, R. A.; Gil, P. R.; Hoffmann, M.; Pilgrim, J.; Brooks, T.; Mittermeier, C. G.; Lamourex, J. & Fonseca, G. A. B. 2004. Hotspots revisited. CEMEX, Mexico City, 392p.

MMA - Ministério do Meio Ambiente. 2000. Programa piloto para a proteção das florestas tropicais brasileiras: subprograma Mata Atlântica (PPG7). Versão 1.1. setembro/2000. MMA, Brasília.

MMA - Ministério do Meio Ambiente. 2008. Instrução Normativa nº 6, 23 de setembro de 2008.

Morellato, L. P. C. & Haddad, C. F. B. 2000. Introduction: The Brazilian Atlantic Forest. Biotropica 32: 786-792.

Mori, S. A.; Boom, B. M. & Prance, G. T. 1981. Distribution patterns and conservation of eastern Brazilian coastal forest tree species. Brittonia 33: 233-245.

Mori, S. A.; Boom, B. M.; Carvalho, A. M. & Santos, T. S. 1983. Southern Bahian moist forests. The Botanical Review 49:155-232.

Morley, R. J. 2000. Origin and evolution of tropical rain forests. John Wiley & Sons, Chichester 362p.

Myers, N.; Mittermeier, R. A.; Mittermeier, C. G.; Fonseca, G. A. B. & Kent, J. 2000. Biodiversity hotspots for conservation priorities. Nature 403: 853-858.

Oliveira-Filho, A. T. & Fontes, M. A. L. 2000. Patterns of floristic differentiation among Atlantic forests in Southeastern Brazil and the influence of climate. Biotropica 32: 793–810.

Oliveira-Filho, A. T.; Jarenkow, J. A. & Rodal, M. J. N. 2006. Floristic relationships of seasonally dry forest of eastern South America based on tree species distribution patterns. *In*: Pennington, R. T. & Rater, J. A. (eds.). Neotropical Savannas and Seasonally Dry Forests: Plant diversity, biogeography, and conservation. CRC Press, Boca Raton. Pp. 151-184.

Paglia, A. P. & Fonseca, G. A. B. 2009. Assessing changes in the conservation status of threatened Brazilian vertebrates. Biodiversity and Conservation 13: 3563-3577.

Perret, M.; Chautems, A. & Spichiger, R. 2006. Dispersal-vicariance analyses in the tribe Sinningieae (Gesneriaceae): A clue to understanding biogeographical history of the Brazilian Atlantic forest. Annals of Missouri Botanical Garden 93: 340–358.

Por, F. D. 1992. Sooretama: the Atlantic Forest of Brazil. SPB Academic Publishing, New York, 130p.

Prado, D. E. & Gibbs, P. E. 1993. Patterns of species distributions in the dry seasonal forests of South America. Annals of the Missouri Botanical Garden 80: 902-927.

Rambo, B. 1951. O elemento andino no Pinhal Riograndense. Anais Botânicos do Herbário Barbosa Rodrigues 3: 3-39.

Ribeiro, M. C.; Metzger, J. P.; Martensen, A. C.; Ponzoni, F. J. & Hirota, M. M. 2009. The Brazilian Atlantic Forest: How much is left, and how is the remaining forest distributed? Implications for conservation. Biological Conservation 142: 1144-1156.

Rizzini, C. T. 1979. Tratado de fitogeografia do Brasil. v.2. Aspectos ecológicos. Hucitec/Edusp, São Paulo, 374p.

Safford, H. D. 2007. Brazilian Páramos IV. Phytogeography of the campos de altitude. Journal of Biogeography 34: 1701-1722.

Santos, A. M. M.; Cavalcanti, D. R.; Silva J. M. C. & Tabarelli, M. 2007. Biogeographical relationships among tropical forests in North-Eastern Brazil. Journal of Biogeography 34: 437– 446.

Silva, J. M. C. & Casteleti, C. H. M. 2005. Estado da biodiversidade da Mata Atlântica brasileira. *In*: Galindo-Leal, C. & Câmara, I. G. (eds.). Mata Atlântica: biodiversidade, ameaças e perspectivas. Fundação SOS Mata Atlântica/ Conservação Internacional, São Paulo/Belo Horizonte. Pp. 43-59.

Smith, A. R.; Pryer, K. M.; Schuettpelz, E.; Korall, P.; Schneider, H. & Wolf, P. G. 2006. A classification for extant ferns. Taxon 55: 705-731.

Sobral, M. & Stehmann, J. R. 2009. An analysis of new angiosperm species discoveries in Brazil (1990 - 2006). Taxon 58: 227-232.

Stotler, R. E. & Crandall-Stotler, B. 2005. A revised classification of the Anthocerotophyta and a checklist of the hornworts of North America, North of México. Bryologist 108: 16-26.

Tabarelli, M. & Cavalcanti, D. R. 2004. Distribuição das plantas amazônico-nordestinas no centro de endemismo Pernambuco: brejos de altitude vs. florestas de terras baixas. *In*: Pôrto, K. C.; Cabral, J. J. P. & Tabarelli, M. (eds.). Brejos de Altitude: história natural, ecologia e conservação. Ministério do Meio Ambiente, Brasilia. Pp. 279-290.

Thomas, W. W.; Carvalho, A. M. V.; Amorim, A. M.; Garisson, J. & Arbeláez, A. L. 1998. Plant endemism in two forests in southern Bahia, Brazil. Biodiversity and Conservation 7: 311-322.



Briófitas

Denise Pinheiro da Costa

As briófitas são plantas pequenas representadas por três diferentes grupos vegetais, os antóceros, as hepáticas e os musgos, que pertencem, respectivamente, às divisões ou filos Anthocerotophyta (Stotler & Crandall-Stotler 2005), Marchantiophyta (He-Nygrén *et al.* 2006) e Bryophyta (Buck & Goffinet 2000). Fazem parte do sub-reino Embryophyta, caracterizado por plantas que apresentam embrião formado a partir do zigoto, produto da união das células sexuais. Estão incluídas no grupo das criptógamas, ou seja, das plantas sem flores e avasculares. Apresentam um ciclo de vida com alternância de gerações, onde a geração gametofítica haplóide (n) é dominante, enquanto a geração esporofítica diplóide (2n) é dependente da primeira e efêmera. Possuem clorofilas A e B, carotenos, xantofilas, amido, gorduras, celulose e hemicelulose, como os demais membros do reino Plantae (Vanderpoorten & Goffinet 2009).

Podem viver sobre troncos e ramos de árvores (corticícolas), folhas (epifilas), troncos em decomposição (epíxilas), solo (terrícolas) ou rochas (rupícolas), ocorrendo geralmente em locais úmidos, já que necessitam de água para possibilitar a mobilidade dos gametas masculinos flagelados (anterozóides) durante o processo de fecundação. Podem tolerar condições ambientais extremas e por isso estão amplamente distribuídas no mundo, ocorrendo assim nos mais variados ecossistemas e numa grande quantidade de habitats. São encontradas desde o Ártico até as florestas tropicais, desde o deserto até ambientes submersos, mas nunca no ambiente marinho (Delgadillo & Cárdenas 1990). São plantas pioneiras na colonização de ambientes alterados e atuam no combate à erosão do solo e na manutenção da umidade dos ecossistemas pois acumulam a água da chuva (Pócs 1982, Schofield 2001). Segundo Gradstein *et al.* (2001), já existiam no Paleozóico há 300 milhões de anos, pertencendo às mais antigas linhagens de plantas terrestres, com formas próximas às atuais. Permaneceram praticamente sem mudanças morfológicas e com taxas de evolução baixas, sendo por isso consideradas um grupo de plantas "conservativas".

Gradstein *et al.* (2001) e Shaw & Goffinet (2000) afirmam que são o segundo maior grupo de plantas terrestres, com cerca de 18.000 espécies, sendo cerca de 100 espécies de antóceros, 5.000 de hepáticas e 13.000 de musgos. A maior diversidade encontra-se na região neotropical, com cerca de 4.000 espécies. No Brasil, estima-se que a brioflora apresente cerca de 1.660 espécies, o que representa 41% dos táxons reconhecidos para o neotrópico e 9% para o mundo. Deste total, 11 são de antóceros, 750 de hepáticas e 900 de musgos (Gradstein & Costa 2003, Costa *com. pess.*).

Riqueza e endemismo

No Brasil, a primeira lista de briófitas para a Floresta Atlântica foi elaborada por Pôrto & Germano (2003) para Pernambuco, onde os autores citam 315 espécies, sendo cinco de antóceros, 143 de hepáticas e 167 de musgos. Posteriormente, Costa *et al.* (2005) publicaram um diagnóstico enfatizando a diversidade e importância das briófitas para a conservação dos ecossistemas do estado do Rio de Janeiro, onde apresentam uma lista com 1.039 táxons, sendo cinco de antóceros, 333 de hepáticas e 701 de musgos.

No levantamento apresentado neste livro são reconhecidas para o Domínio Atlântico 1.230 espécies de briófitas, distribuídas em 357 gêneros e 104 famílias. Assim sendo, a Floresta Atlântica é a mais rica região do Brasil em termos de diversidade de briófitas, com 71% dos táxons reconhecidos para o país, 30% para o neotrópico e 6% para o mundo. Do total de 1.230 espécies, 10 são de antóceros (3 famílias e 6 gêneros), 464 são de hepáticas (34 famílias e 110 gêneros) e 756 são de musgos (67 famílias e 241 gêneros).

Entre as 104 famílias de briófitas registradas para a Floresta Atlântica, dez se destacam pela riqueza específica: Lejeuneaceae (194), Sphagnaceae (81), Fissidentaceae (53), Pottiaceae (49), Dicranaceae (49), Bryaceae (49), Sematophyllaceae (48), Orthotrichaceae (44), Pilotrichaceae (43) e Lepidoziaceae (31) (Figura 2.1). Essas famílias também estão entre aquelas de maior representatividade na região tropical (Gradstein & Pócs 1989).

As briófitas ocorrem em todas as formações vegetacionais do Domínio Atlântico, sobretudo na Floresta Ombrófila Densa que conta com 1.166 espécies (95%), seguida da Floresta Ombrófila Mista, com 600 (48%), Floresta Estacional Decidual, com 391 (32%), Floresta Estacional Semidecidual, com 293 (24%), Restinga, com 88 (7%), Manguezal, com 14 (1%) e Formações Campestres/Afloramentos Rochosos, com seis (0,4%) (Tabela 1.1).

Em relação ao endemismo, no total existem 222 espécies endêmicas do Domínio Atlântico (Tabela 2.1), sendo duas de antóceros, 51 de hepáticas e 169 de musgos, o que corresponde a 13% da brioflora conhecida para o país. O número de espécies endêmicas é considerado alto, sendo a maior concentração de táxons encontrada na Serra da Mantiqueira, principalmente no Parque Nacional do Itatiaia. Esse número é mais alto do que aquele citado para outras áreas neotropicais, isso devido provavelmente à extensão territorial e diversidade ecológica do Domínio Atlântico. Dez famílias, especialmente Sphagnaceae, Lejeuneaceae e Sematophyllaceae, se destacam pelo número de táxons endêmicos (Figura 2.1).

Segundo Gradstein *et al.* (2001), os gêneros *Pluvianthus* (hepática), *Cladastomum*, *Crumuscus*, *Itatiella*, *Paranapiacabae* e *Pylasiadelpha* (musgos) são endêmicos do Domínio Atlântico. Além disso, seis outros gêneros com distribuição ampla no mundo são encontrados no neotrópico somente na Floresta Atlântica: *Balantiopsis*, *Saccogynidium, Southbya* e *Sphaerocarpus* (hepáticas) e *Sclerodontium* e *Sphaerothecium* (musgos).




Figura 2.1

Distribuição da riqueza e endemismo, em número de espécies, nas dez famílias mais importantes de briófitas ocorrentes no Domínio Atlântico.

Conservação

Para promover o conhecimento e a conservação das briófitas na Floresta Atlântica, consideramos importante a realização de inventários florísticos em áreas reconhecidas como lacunas no conhecimento, como os estados da Bahia, do Paraná e de Santa Catarina e o estudo das coleções de briófitas depositadas nos herbários desses estados, bem como naqueles das Regiões Nordeste e Sudeste.

Também é fundamental a elaboração de diferentes ferramentas visando ampliar o conhecimento do grupo, como por exemplo: revisões taxonômicas em famílias ou gêneros pouco conhecidos do ponto de vista taxonômico (*Anthoceros*, *Callicostella, Cheilolejeunea, Cyclodictyon, Entodon, Frullania p.p., Hyophila, Isopterygium, Lejeunea, Lepidopilidium, Macromitrium, Mitthenothamnium, Papillaria, Physcomitrium, Plagiochila p.p., Radula, Riccardia, Rhynchostegium, Schlotheimia, Sematophyllum, Taxilejeunea* e *Weissia*), floras e listas de espécies para os estados que apresentam diferentes formações do Domínio (principalmente BA, MG, SC e SP) e manuais para estimular o conhecimento e estudo desse grupo.

Para a conservação, é essencial promover a proteção de habitats considerados importantes pela sua diversidade e endemismo; incentivar estudos de biologia das espécies ameaçadas, endêmicas ou raras; avaliar periodicamente o estado de conservação das espécies de briófitas neste Domínio, e, finalmente, propor a criação e/ou ampliação de Unidades de Conservação, principalmente nas Regiões Nordeste e Sul.

Em relação ao estado de conservação dos táxons de briófitas ocorrentes na Floresta Atlântica, dentre as 17 espécies incluídas no Anexo I da Lista Oficial Brasileira (MMA 2008), um total de 15 táxons ocorrem no Domínio Atlântico, sendo nove de hepáticas e seis de musgos.

Tabela 2.1

Distribuição da riqueza e endemismo de espécies nos gêneros mais diversos de briófitas no Domínio Atlântico.

Gênero	Total de espécies no mundo N	Total de espécies no Domínio Atlântico N (%)*	Total de espécies endêmicas do Domínio Atlântico N (%)*
Sphagnum	290	81 (27,9)	53 (18,3)
Fissidens	444	53 (11,9)	4 (0,9)
Campylopus	161	30 (18,6)	7 (4,3)
Frullania	596	29 (4,9)	4 (0,7)
Lejeunea	319	28 (8,8)	7 (2,2)
Metzgeria	94	25 (26,6)	5 (5,3)
Plagiochila	623	24 (3,9)	1 (0,2)
Radula	223	22 (10)	2 (0,9)
Sematophyllum	170	17 (10)	6 (3,5)
Bazzania	251	15 (6)	1 (0,4)
Drepanolejeunea	116	14 (12,1)	2 (1,7)
Macromitrium	368	14 (3,8)	2 (0,5)
Aphanolejeunea	26	13 (50)	1 (3,8)
Chiloscyphus	253	13 (5,1)	1 (0,4)
Schlotheimia	121	13 (10,7)	6 (4,9)
Syrrhopodon	101	13 (12,9)	2 (2)
Bryum	448	12 (2,7)	0
Cheilolejeunea	147	12 (8,2)	0
Philonotis	170	12 (7,1)	1 (0,6)
Riccardia	277	12 (4,3)	1 (0,4)
Outros gêneros	10.272	779 (7,6)	119 (0,8)
Total		**1.230**	**222**

**Porcentagem relativa ao total de espécies aceitas no gênero.*

Segundo dados da Fundação Biodiersitas (2009), quatro desses táxons estão Criticamente em Perigo (*Erythrophyllastrum andinum, Myriocoleopsis fluviatilis*, *Plagiochila boryana* e *Southbya organensis*), três Em Perigo (*Blepharolejeunea securifolia, Drepanolejeunea aculeata* e *Jungermannia decolor*) e oito Vulneráveis (*Atractylocarpus brasiliensis, Atractylocarpus longisetus, Bromeliophila natans, Campylopus densicoma, Leptoscyphus gibbosus, Leptodontium wallisii, Paracromastigum dusenii* e *Pringleella subulata*). É fundamental que haja uma avaliação periódica do estado de conservação das espécies ameaçadas, bem como de espécies com distribuição restrita ao Domínio Atlântico.

Referências Citadas

Buck, W. R. & Goffinet, B. 2000. Morphology and classification of mosses. *In*: Shaw, A. J. & Goffinet, B. Bryophyte biology. Cambridge University Press, Cambridge, 476p.

Costa, D. P.; Imbassahy, C. A. A. & Silva, V. P. A. V. 2005. Diversidade e importância das espécies de briófitas na conservação dos ecossistemas do estado do Rio de Janeiro. Rodriguésia 56: 13-49.

Delgadillo M. C. & Cárdenas S. A. 1990. Manual de briofitas. 2 ed. Instituto de Biología da Universidad Nacional Autonoma de Mexico, México, 135p.

Fundação Biodiversitas. 2009. Lista da flora brasileira ameçada de extinção. Disponível em <http://www.biodiversitas.org.br/floraBr/>. Acessado em 15 junho 2009.

Gradstein, S. R.; Churchill, S. P. & Salazar-Allen, N. 2001. Guide to the bryophytes of tropical America. Memoirs of the New York Botanical Garden 86: 1-577.

Gradstein, S. R. & Costa, D. P. 2003. The Hepaticae and Anthocerotae of Brazil. Memoirs of the New York Botanical Garden 87: 1-336.

Gradstein, S. R. & Pócs, T. 1989. Bryophytes. *In:* Lieth, H. & Werger, M. J. A. (eds.). Tropical Rain Forest ecosystems. Elsevier, Amsterdan. Pp. 311-325.

He-Nygrén, X.; Juslén, A.; Gelnny, D. & Piippo, S. 2006. Illuminating the evolutionary history of liverworts (Marchantiophyta) – towards a natural classification. Cladistics 22: 1-31.

MMA - Ministério do Meio Ambiente. 2008. Instrução Normativa nº 6, 23 de setembro de 2008.

Pócs, T. 1982. Tropical forest bryophytes. *In:* Smith, A. J. E. (ed.). Bryophyte ecology. Chapman and Hall, New York. Pp. 59-103.


Pôrto, K. C. & Germano, S. R. 2003. Biodiversidade e importância das briófitas na conservação dos ecossistemas naturais de Pernambuco. *In*: Tabarelli, M. & Silva, J. M. C. Diagnóstico da biodiversidade de Pernambuco. Massangana, Recife. Pp. 125-152.

Schofield, W. B. 2001. Introdution to bryology. 2 ed. The Blackburn Press, New Jersey, 431p.

Shaw, A. J. & Goffinet, B. 2000. Bryophyte biology. Cambridge University Press, Cambridge, 476p.

Stotler, R. E. & Crandall-Stotler, B. 2005. A revised classification of the Anthocerotophyta and a checklist of the hornworts of North America, North of Mexico. Bryologist 108: 16-26.

Vanderpoorten, A. & Goffinet, B. 2009. Introduction to bryophytes. Cambridge University Press, Cambridge, 303p.



Pteridófitas

Alexandre Salino & Thaís Elias Almeida

As pteridófitas são plantas vasculares sem sementes, que apresentam ciclo de vida com alternância de gerações, onde a gametofítica é inconspícua e efêmera, e a esporofítica possui maior porte, complexidade anatômica e período de vida mais longo. Essas plantas estão hoje incluídas em duas linhagens monofiléticas distintas: licófitas e monilófitas (Pryer *et al.* 2004). As licófitas possuem 1.350 espécies, que se distinguem pela presença de micrófilo, e incluem as Lycopodiaceae, Selaginellaceae e Isoetaceae (Moran & Riba 1995). Já a linhagem das monilófitas inclui aproximadamente 11.500 espécies, que possuem megáfilos e uma vascularização distinta com o protoxilema confinado a lobos do cordão do xilema (Pryer *et al.* 2004). Os táxons desta linhagem estão agrupados nas classes Psilotopsida (Ophioglossaceae e Psilotaceae), Equisetopsida (Equisetaceae), Marattiopsida (Marattiaceae) e Polypodiopsida (Smith *et al.* 2006). Este último é o grupo das pteridófitas leptosporangiadas, o maior dentre as monilófitas atuais, com cerca de 11.000 espécies distribuídas em várias famílias e que compreende a maioria das plantas que são vulgarmente chamadas de samambaias ou fetos (Smith *et al.* 2006).

A maior parte das espécies de pteridófitas (ca. 80%) está distribuída nas regiões tropicais do Novo e do Velho Mundo, sendo que aproximadamente 75% dessa riqueza está restrita a duas grandes áreas: o sudeste da Ásia e a Australásia, com cerca de 4.500 espécies, e a região que abrange as Grandes Antilhas, o sudeste do México, a América Central e os Andes (do oeste da Venezuela ao sul da Bolívia), com cerca de 2.250 espécies (Tryon & Tryon 1982).

Para as Américas, estima-se a ocorrência de 3.250 espécies, estando 3.000 distribuídas na região tropical, sendo 40% consideradas endêmicas (Tryon & Tryon 1982). Nesta região, quatro centros de diversidade são reconhecidos: 1) Grandes Antilhas, com cerca de 900 espécies; 2) sul do México e América Central, também com cerca de 900; 3) Andes, com cerca de 1.500; 4) sudeste e sul do Brasil, com cerca de 600 (Tryon & Tryon 1982). Essas regiões de alta diversidade e endemismo coincidem com as áreas montanhosas do neotrópico.

O número de pteridófitas estimado para o Brasil varia de 1.150 (Windisch 1996) a 1.200-1.300 (Prado 1998). Para a Amazônia brasileira é relatada a ocorrência de cerca de 300 (Windisch 1996) a 550 espécies (Prado 2003); para a Região Nordeste, Planalto Central e para a área que vai do sul da Bahia até o norte do Rio Grande do Sul, Prado (2003) estimou a riqueza em cerca de

400, 300 e 800 espécies, respectivamente; para a Região Sul, Windisch (1996) citou 493 espécies. Para as Regiões Sudeste e Sul existem algumas estimativas de riqueza de espécies por estado: São Paulo 500-600 (Prado 1998); Minas Gerais, 687 (Salino & Almeida 2009); Espírito Santo, 420 (Salino *et al.* dados não publicados); Rio de Janeiro, 587 (Sylvestre 2009); Paraná, 390-420 (Salino *et al.* 2005); Santa Catarina, cerca de 420 (Windisch 1996) e Rio Grande do Sul, 270 (Dutra 1938).

Riqueza e endemismo

Foram registradas para a Floresta Atlântica 840 espécies, distribuídas em 116 gêneros e 33 famílias, o que representa 6,4% da diversidade mundial, estimada em 13.000 espécies (Moran 2008). As famílias mais representativas em número de espécies foram Pteridaceae (133), Dryopteridaceae (126), Polypodiaceae (112), Thelypteridaceae (78), Aspleniaceae (58), Hymenophyllaceae (50), Lycopodiaceae (41), Anemiaceae (39), Blechnaceae (27) e Cyatheaceae (25) (Figura 3.1). Já os gêneros mais ricos foram *Thelypteris* (78), *Elaphoglossum* (62), *Asplenium* (55), *Adiantum* (41), *Anemia* (39), *Huperzia* (29), *Blechnum* e *Doryopteris* (26 cada), *Selaginella* (22) e *Hymenophyllum* (21). Dentre os gêneros, merecem destaque ainda *Doryopteris*, *Lellingeria*, *Pecluma*, *Anemia* e *Megalastrum* por possuírem no Domínio grande parte das espécies descritas para o mundo (Tabela 3.1).

É importante ressaltar que algumas espécies paleotropicais subespontâneas no Brasil e ocorrentes na Floresta Atlântica não foram incluídas na listagem, como *Nephrolepis hirsutula* (G. Forst.) C. Presl, *Pteris longifolia* L., *Pteris multifida* Poir., *Pteris vittata* L., *Macrothelypteris torresiana* (Gaudich.) Ching, *Thelypteris dentata* (Forssk.) E.P. St. John e *Deparia petersenii* (Kunze) M. Kato.

A riqueza encontrada na Floresta Atlântica corresponde a 70% das espécies ocorrentes no Brasil, tomando por base a estimativa de 1.200 espécies apresentada por Prado (1998). A distribuição desta riqueza, no entanto, não é homogênea ao longo do Domínio. Do total de espécies não há nenhuma que ocorra exclusivamente ao norte do rio São Francisco e apenas 47 (5,6%) são restritas à Região Sul do Brasil. Isto significa que 94,3% das espécies da Floresta Atlântica podem ser encontradas entre a Bahia e o Rio Grande do Sul. A maior proporção de espécies ocorre em áreas montanhosas com predominância de formações florestais ombrófilas e semidecíduas. Das 840 espécies, 631 (75%) ocorrem em Floresta Ombrófila e 406 (48%) em Floresta Estacional Semidecidual. Nas formações florestais semideciduais de áreas baixas (como a Floresta de Tabuleiro), florestas deciduais, campos de altitude e formações pioneiras, a riqueza e a taxa de endemismo podem ser consideradas baixas. Apesar disso, foram registradas 142 espécies (17%) em Formações Campestres, muitas delas endêmicas (Tabela 1.1).

Vale destacar dois novos registros para o Brasil: *Alsophila salvinii*, anteriormente conhecida do sul do México até Nicarágua e Peru (Moran 2008) e *Huperzia aqualupiana*, conhecida apenas das Antilhas Ocidentais, Venezuela e Colômbia (Øllgaard 1992). Ambas foram coletadas recentemente em Minas Gerais.

Do total de 840 espécies ocorrentes na Floresta Atlântica, 269 (32%) são consideradas endêmicas do Domínio e estão distribuídas em 16 das 33 famílias registradas na área. Destaca-se

que, dentre as cinco famílias com maior número de espécies endêmicas, apenas Dryopteridaceae apresentou proporção de endemismo acima de 50%, enquanto famílias com baixo número de espécies na Floresta Atlântica apresentaram uma alta proporção de endemismo, como Isoetaceae e Cyatheaceae, com 81,8% e 50%, respectivamente.

Dos 116 gêneros, 44 (38%) possuem espécies endêmicas no Domínio. Dentre os gêneros com mais de 20 espécies na Floresta Atlântica a porcentagem de endemicidade variou de 12% (*Adiantum*) a 59% (*Huperzia*). Já alguns gêneros com baixo número de espécies apresentaram alta proporção de espécies endêmicas, atingindo os 100%, como *Stigmatopteris* (Dryopteridaceae), *Eupodium* e *Marattia* (Marattiaceae), *Pellaea* (Pteridaceae), *Sphaeropteris* (Cyatheaceae) e *Zygophlebia* (Polypodiaceae). Também se destacaram *Megalastrum* (Dryopteridaceae), *Isoetes* (Isoetaceae) e *Ceradenia* (Polypodiaceae), todos com taxa alta de endemicidade (> 80%).

A identificação dos espécimes registrados é um possível viés na análise de riqueza dos gêneros, uma vez que erros dessa natureza podem subestimar ou superestimar a mesma. Na maior parte dos gêneros e famílias, a identificação é pouco problemática, existindo boas revisões taxonômicas ou materiais identificados por especialistas para comparação. Existem grupos, entretanto, que podem causar alguma distorção nessa análise. O gênero *Anemia*, bem diverso na Floresta Atlântica, apresenta grandes problemas em sua taxonomia e está atualmente em revisão pelo especialista John T. Mickel (The New York Botanical Garden).

Os nomes aceitos e circunscrições dos táxons utilizados neste trabalho seguem esta autoridade. Já *Elaphoglossum* é um grupo extremamente diverso e algumas espécies possuem

Figura 3.1

Distribuição da riqueza e endemismo em número de espécies nas dez famílias mais importantes de pteridófitas ocorrentes no Domínio Atlântico.




Tabela 3.1

Distribuição da riqueza e endemismo de espécies nos gêneros mais diversos de pteridófitas ocorrentes no Domínio Atlântico.

Gênero	Total de espécies no mundo N	Total de espécies no Domínio Atlântico N (%)*	Total de espécies endêmicas do Domínio Atlântico N (%)*
Thelypteris	900	78 (8,6)	36 (4)
Elaphoglossum	600	62 (10,3)	24 (4)
Asplenium	650	55 (8,5)	21 (3,2)
Adiantum	200	42 (21)	5 (2,5)
Anemia	100	39 (39)	12 (12)
Huperzia	300	29 (9,7)	17 (5,6)
Blechnum	200	26 (13)	4 (2)
Doryopteris	30	26 (86,7)	13 (43,3)
Selaginella	700	22 (3,1)	8 (1,14)
Hymenophyllum	250	21 (8,4)	6 (2,4)
Cyathea	120	19 (15,8)	10 (8,3)
Megalastrum	55	18 (32,7)	15 (27,7)
Diplazium	375	17 (4,5)	6 (1,6)
Pteris	250	17 (6,8)	6 (2,4)
Pecluma	35	16 (45,7)	5 (14,2)
Ctenitis	150	15 (10)	10 (6,6)
Pleopeltis	80	14 (17,5)	5 (6,25)
Lellingeria	60	13 (21,7)	8 (13,3)
Lindsaea	150	13 (8,7)	4 (2,7)
Trichomanes	60	13 (21,7)	0
Outros gêneros	7835	286 (3,6)	54 (0,7%)
Total		**840**	**269**

**Porcentagem relativa ao total de espécies aceitas no gênero.*

populações polimórficas. Estima-se que uma grande parte dos nomes atualmente existentes e aceitos nesse gênero sejam sinônimos. Por isso, a identificação e a determinação dos nomes aceitos foram feitas por comparação com tipos depositados em diversos herbários nacionais e internacionais. Além disso, muito material existente nas coleções brasileiras encontra-se indeterminado.

Em alguns gêneros, adotou-se a revisão taxonômica existente, embora acreditemos que hajam mais espécies na Floresta Atlântica do que o aceito nessas obras. Enquadram-se nessa situação os gêneros *Sticherus* e *Campyloneurum*. Nos gêneros *Adiantum, Hypolepis* e *Isoetes*, que estão em estudo ou são pouco conhecidos, pode haver erros de identificação ou na

circunscrição de espécies e subestimativas de riqueza. É importante ressaltar que as identificações duvidosas foram descartadas da listagem, como forma de evitar uma superestimativa da riqueza.

Das 269 espécies endêmicas, 219 (81%) ocorrem em Floresta Ombrófila Densa, 89 (33%) em Floresta Estacional Semidecidual e 41 (15%) em Formações Campestres (Tabela 1.1). A maior proporção de espécies endêmicas na Floresta Ombrófila pode estar associada à maior riqueza nesta fitofisionomia e ao fato desta formação ocorrer nas regiões mais montanhosas da Floresta Atlântica. As regiões montanhosas conhecidamente influenciam a distribuição e diversidade das pteridófitas, impedindo a migração e promovendo níveis elevados de endemismo (Moran 1995).

Tryon (1972) considerava o sudeste e sul do Brasil um dos grandes centros de endemismo de pteridófitas. Baseado nas informações disponíveis em algumas revisões taxonômicas, ele estimou que cerca de 40% das espécies ocorrentes nessa área seriam endêmicas. Embora o autor não considerasse apenas o Domínio Atlântico, os dados aqui encontrados são similares (cerca de 32% de endemismo).

Conservação

A distribuição das coletas na Floresta Atlântica está longe de ser uniforme. As áreas mais bem coletadas no Domínio correspondem àquelas próximas aos centros de pesquisa, principalmente na Região Sudeste, e às áreas no entorno das grandes cidades. Observa-se também que onde há Unidades de Conservação (UC), principalmente as mais antigas, o esforço de coleta é maior do que onde estas não existem. Há um direcionamento de coletas nas florestas ombrófilas, principalmente ao longo do litoral, e consequentemente um menor esforço amostral nas florestas estacionais semideciduais continentais. Além disso, há lacunas nas regiões de transição com outros Domínios. Vale mencionar também a falta de coletas em grupos específicos que apresentam peculiaridades que influenciam na amostragem, como: a) grupos com folhas dimorfas, nos quais as folhas férteis são produzidas em apenas uma parte do ano (ex.: *Elaphoglossum, Polybotrya, Lomariopsis* e *Lomagramma*); b) grupos em que as folhas aparecem apenas em um período do ano (Ophioglossaceae e *Athyrium*) e c) espécies com esporófitos muito pequenos que passam despercebidos (ex.: Hymenophyllaceae e algumas Polypodiaceae).

De acordo com MMA (2008), 17 das espécies de pteridófitas registradas no Domínio Atlântico estão ameaçadas de extinção: *Asplenium beckeri, A. bradeanum*, *A. castaneum*, *A. schwackei* (Aspleniaceae), *Blechnum andinum*, *B. squamipes* (citado como *B. machaenum* var. *squamipes*), *B. sprucei* (Blechnaceae), *Dicksonia sellowiana* (Dicksoniaceae), *Isoetes bradei* (Isoetaceae), *Huperzia aqualupiana* (Lycopodiaceae), *Cerademia warmingii*, *Terpsichore semihirsuta* (Polypodiaceae), *Adiantum diphyllum*, *Cheilanthes incisa*, *Eriosorus flexuosus*, *E. rufescens* (Pteridaceae) e *Thelypteris novaena* (Thelypteridaceae).

A lista apresentada pela Fundação Biodiversitas (2009), que teve a participação de todos os taxonomistas de pteridófitas do Brasil, incluiu 65 espécies ameaçadas que ocorrem no Dominío Atlântico, sendo 25 na categoria Criticamente em Perigo (CR), 30 Em Perigo (EN) e 10 Vulnerável (VU),

além de *Asplenium beckeri* Brade indicada como Extinta (EX) (Tabela 1.2). Considerando a lista da Fundação Biodiversitas (2009), constata-se que 7,7% da flora de pteridófitas da Floresta Atlântica está ameaçada. Nesta mesma lista, 36 espécies do Domínio foram consideradas Deficientes em Dados (DD), pois o conhecimento disponível sobre elas não é suficiente para uma classificação do seu estado de conservação. Entretanto, a falta de informação sobre esses táxons não significa que muitos deles não estejam sob ameaça de extinção. A situação desses táxons é merecedora de preocupação, uma vez que não há nenhum mecanismo legal para protegê-las.

Comparando-se as duas listas, observa-se que 48 espécies de pteridófitas consideradas ameaçadas na lista da Fundação Biodiversitas (2009) não foram aceitas como ameaçadas na lista do MMA (2008). Essas espécies foram enquadradas no Anexo II da Instrução Normativa nº 06/2008 que é a lista de espécies da flora brasileira com deficiência de dados. Um reavalição do estado de conservação dessas espécies faz-se atualmente necessária.

Agradecimentos

Agradecemos aos pteridologistas Alan R. Smith (UC), James Hickey (UM) e John Mickel (NY) pelas identificações e esclarecimentos. Aos curadores dos herbários B, BHCB, BM, CEPEC, CESJ, CVRD, ESAL, FI, FLOR, GH, HAS, HB, HBR, HRCB, HUFU, ICN, K, MBML, MO, NY, OUPR, P, PACA, PEUFR, R, RB, SI, SJRP, SP, SPF, UFP, US, VIC e VIES. pela recepção durante as visitas.

Referências Citadas

Dutra, J. 1938. A flora pteridófita do estado do Rio Grande do Sul. *In*: 1ª Reunião Sul-Americana de Botânica. Anais da Reunião Sul-Americana de Botânica II, Rio de Janeiro. Pp. 19-68

Fundação Biodiversitas. 2009. Lista da flora brasileira ameçada de extinção. Disponível em <http://www.biodiversitas.org.br/floraBr/>. Acessado em 15 junho 2009.

MMA - Ministério do Meio Ambiente. 2008. Instrução Normativa nº 6, 23 de setembro de 2008.

Moran, R. C. 1995. The importance of montains to pteridophytes, with emphasis on neotropical montane forests. *In*: Churchill, S. P.; Balslev, H.; Forero, E. & Luteyn, J. L. (eds.). Biodiversity and conservation of neotropical montane forests. The New York Botanical Garden, New York. Pp. 359-363.

Moran, R. C. 2008. Divesity, biogeography, and floristics. *In*: Ranker, T. A. & Haufler, C. H. (eds.). Biology and evolution of ferns and lycophytes. Cambridge University Press, New York. Pp. 367-394.

Moran, R. C & Riba, R. (eds.). 1995. Lycopodiopsida. *In*: Davidse, G.; Souza, M. & Knapp, S. (eds.). Flora Mesoamericana. Vol. 1. Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad del México. Pp. 5.

Øllgaard, B. 1992. Neotropical Lycopodiaceae – An overview. Annals of the Missouri Botanical Garden 79: 687-717.

Prado, J. 1998. Pteridófitas do estado de São Paulo. *In*: Bicudo, C. E. M. & Shepherd, G. J. (eds.). Biodiversidade do estado de São Paulo: síntese do conhecimento ao final do século XX – Fungos macroscópicos e plantas. FAPESP, São Paulo. Pp. 49-61.

Prado, J. 2003. Taxonomia das pteridófitas no Brasil - Revisões e monografias como base para análise da diversidade, o quanto conhecemos sobre a nossa flora. *In*: 54º Congresso Nacional de Botânica. Belém- PA. Desafios da Botânica

Brasileira no Novo Milênio: Inventário, Sistematização e Conservação da Diversidade Vegetal. Vol. 1. Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém. Pp. 278-279.

Pryer, K. M.; Schuettpelz, E.; Wolf, P. G.; Schneider, H.; Smith, A. R. & Cranfill, R. 2004. Phylogeny and evolution of ferns (Monilophytes) with a focus on the early leptosporangiate divergences. American Journal of Botany 91: 1582- 1598.

Salino, A. & Almeida, T. E. 2009. Diagnóstico do conhecimento da diversidade botânica: pteridófitas. *In*: Drummond, G. M.; Martins, C. S.; Greco, M. B. & Vieira, F. (org.). Biota Minas: diagnóstico do conhecimento sobre a biodiversidade no estado de Minas Gerais – subsídio ao Programa Biota Minas. Fundação Biodiversitas, Belo Horizonte. Pp. 331-352.

Salino, A.; Silva, S. M.; Dittrich, V. A. O. & Britez, R. M. 2005. Flora pteridofítica. *In*: Marques, M. C. M. & Britez, R. M. (eds.). Historia natural e conservação da Ilha do Mel. Editora UFPR, Curitiba. Pp. 85-101.

Smith, A. R.; Pryer, K. M.; Schuettpelz, E.; Korall, P.; Schneider, H. & Wolf, P. G. 2006. A classification for extant ferns. Taxon 55: 705-731.


Sylvestre, L. Pteridófitas. *In*: Coelho, M. A. N. (org.). Checklist da flora do Rio de Janeiro. Disponível em <http://www.jbrj.gov.br/pesquisa/div_tax/acessobd.php>. Acessado em 13 novembro 2009.

Tryon, R. M. 1972. Endemic areas and speciation in tropical American ferns. Biotropica 4: 76-84.

Tryon, R. M. & Tryon, A. F. 1982. Ferns and allied plants with special reference to Tropical America. Springer-Verlag, New York, 857p.

Zuloaga, F. O.; Morrone, O. & Beltrano, M. J. (eds.) 2008. Catálogo de las plantas vasculares del Cono Sur. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 1-984.

Windisch, P. G. 1996. Towards assaying biodiversity in Brazilian pteridophytes. *In*: Bicudo, C. E. M. & Menezes, N. A. (eds.). Biodiversity in Brazil. Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), São Paulo. Pp. 109-117.



Gimnospermas e Angiospermas

João Renato Stehmann, Rafaela Campostrini Forzza,
Marcos Sobral & Luciana H. Yoshino Kamino

Gimnospermas

As gimnospermas compreendem plantas lenhosas caracterizadas por possuírem óvulos expostos, isto é, sem que estejam protegidos em carpelos. O grupo surgiu há mais de 300 milhões de anos, tendo se diversificado no Mesozóico, mas declinou com a expansão das angiospermas, a partir do Cretáceo. Restam hoje pouco mais de 800 espécies, distribuídas em 15 famílias e cerca de 80 gêneros, que habitam principalmente as regiões temperadas do planeta (Soltis *et al*. 2005). Pertencem ao grupo os pinheiros, os ciprestes e as sequóias, bem como as maiores e mais longevas plantas conhecidas. A sistemática das gimnospermas é ainda bastante controversa, não havendo uma classificação consensual. Há pouco mais de uma década, elas eram reconhecidas como um grupo parafilético, mas estudos utilizando dados moleculares sugeriram a monofilia do grupo (Soltis *et al*. 2005). As dificuldades encontradas na análise evolutiva do grupo devem-se à pequena diversidade encontrada, visto serem os táxons atuais muitos divergentes e distantes geneticamente. Dependendo da classificação utilizada, são reconhecidas três ou quatro linhagens distintas, que compreendem as ordens Coniferales, Gnetales, Cycadales e Ginkgoales (Judd *et al.* 2009), às vezes interpretadas como subclasses (Chase & Reveal 2009).

No Brasil ocorrem 20 espécies pertencentes a seis gêneros: *Araucaria (*Araucariaceae)*, Ephedra* (Ephedraceae), *Gnetum* (Gnetaceae), *Podocarpus* e *Retrophyllum* (Podocarpaceae) e *Zamia* (Zamiaceae) (Souza & Lorenzi 2005).

Riqueza e endemismo

No Domínio da Floresta Atlântica são encontradas apenas quatro espécies e os gêneros *Araucaria*, *Podocarpus* e *Ephedra*. *Araucaria*, um elemento austral-antártico na flora brasileira, aparece na Floresta Atlântica unicamente representado por *A. angustifolia*, o pinheiro-do-paraná, espécie endêmica da Floresta Atlântica e certamente a de maior destaque, tanto como elemento na paisagem, como também pela sua importância econômica. A espécie, pela sua arquitetura e abundância, caracteriza fisionomicamente a Floresta Ombrófila Mista, conhecida como a região dos pinhais no sul do Brasil (Veloso *et al.* 1991), uma formação que originalmente cobria 200.000 km^2

(Auler *et al.* 2002). Estudos paleoecológicos, utilizando dados palinológicos, mostraram que a expansão da *Araucaria* sobre os campos no planalto sul-brasileiro ocorreu efetivamente no Holoceno Médio e Superior (em torno de 4.320 – 1.000 anos antes do presente), formando uma rede de florestas de galeria ao longo dos rios em meio à vegetação campestre dominante, quando o clima tornou-se mais úmido (Behling 2002). Na região tropical, populações disjuntas de *Araucaria* estão confinadas às áreas de maior altitude (geralmente acima de 1.000 m), especialmente na Serra da Mantiqueira, entre os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A distribuição geográfica da *Araucaria* também se estende para o interior, atingindo a região nordeste da província de Misiones, na Argentina (Hueck 1953).

A semente da *Araucaria*, conhecida como pinhão, é bastante utilizada na alimentação regional, especialmente nos meses de abril a junho, quando é colhida. Em termos ecológicos, o pinheiro pode ser considerado uma espécie pioneira e suas sementes, abundantes em determinadas épocas do ano, são muito apreciadas pela fauna. Em termos econômicos, o aproveitamento madeireiro do pinho movimentou a economia de parte do sul do Brasil nas décadas de 1960 e 1970, sendo posteriormente as áreas dos pinhais desmatadas para fins agrícolas, especialmente para o plantio de soja e trigo, e mais recentemente utilizadas para o reflorestamento com *Pinus* (Behling & Pillar 2007). A consequência foi a drástica redução em cerca de 90% de sua área original em pouco mais de 40 anos e o empobrecimento genético das populações da espécie, hoje considerada ameaçada de extinção (Ribeiro *et al.* 2009).

Duas espécies de *Podocarpus* são encontradas na Floresta Atlântica, *P. lambertii* e *P. sellowii*, conhecidas popularmente como pinheiros-bravos. A primeira acompanha a *Araucaria*, na Floresta Ombrófila Mista, mas sua distribuição geográfica se estende também para a região Pampeana até o Uruguai; a segunda, distribui-se ao longo da Floresta Atlântica desde o Rio Grande do Sul até as pequenas serras e brejos de altitude no Nordeste, especialmente junto às Florestas Ombrófilas Densa e Estacional Semidecidual, além das florestas de galerias serranas no Domínio do Cerrado.

Na região limítrofe entre a Floresta Atlântica e o Pampa, no Rio Grande do Sul, ocorre *Ephedra tweediana*, um arbusto apoiante que habita a borda dos capões de mata, em solos arenosos, próximos do lago Guaíba, na cidade de Porto Alegre. Sua distribuição estende-se para o sul, na Lagoa dos Patos, e também é encontrada no Uruguai e na Argentina. Embora não possa ser caracterizada como um elemento típico da Floresta Atlântica, sua ocorrência na zona de contato das formações e as poucas populações conhecidas merecem ser destacadas.

Conservação

A conservação das gimnospermas na Floresta Atlântica envolve não somente aspectos biológicos, mas também um olhar biogeográfico, uma vez que as espécies do grupo possuem uma distribuição predominante temperada, e a distribuição tropical de alguns elementos junto às áreas montanhosas é considerada relictual. Dentre as quatro espécies de gimnospermas ocorrentes na Floresta Atlântica, duas são ameaçadas de extinção. *Araucaria angustifolia* está incluída na categoria

Em Perigo (EN) (Fundação Biodiversitas 2009) devido à exploração comercial, redução drástica das populações, da área de ocupação, da extensão de ocorrência, bem como da qualidade do habitat. É importante considerar que a espécie vem sendo explorada – muitas vezes de forma ilegal – com maior ou menor intensidade ao longo de toda sua área de ocorrência. Adicionalmente, faltam ainda iniciativas de reflorestamento e/ou estabelecimento de conectividade entre os remanescentes de forma a garantir a variabilidade genética da espécie (Behling & Safford 2009). Já *Ephedra tweediana* é considerada Vulnerável (VU) (Fundação Biodiversitas 2009) pelo número reduzido de populações conhecidas. Na Floresta Atlântica, sua distribuição é marginal, e parece estar restrita à restinga próxima da região metropolitana de Porto Alegre e áreas junto à Lagoa dos Patos. Apesar de existirem populações na Reserva Biológica do Lami José Lutzenberger, um raro caso de Unidade de Conservação criada originalmente para preservar uma espécie de planta, esforços para se mapear a área de ocupação desta espécie e localizar novas populações se fazem necessários.

Angiospermas

As angiospermas (Magnoliophyta) compreendem as plantas que produzem flores e frutos. É o grupo de plantas mais diversificado, com cerca de 13.500 gêneros e 250.000 espécies, distribuídos em todas as regiões do planeta (Thorne 1992, 2001). O sucesso evolutivo das angiospermas deve-se às inúmeras aquisições, como a presença de elementos de vaso no sistema vascular, dupla fecundação com formação de endosperma secundário, responsável pela nutrição do embrião, um ciclo reprodutivo relativamente curto e polinização e dispersão extremamente diversificadas e especializadas. Essas e outras estratégias permitiram ao grupo ocupar e se difundir nos diferentes ambientes, mesmo aqueles com condições climáticas e edáficas extremas (Soltis & Soltis 2004, De Bodt *et al.* 2005).

Por muito tempo as dicotiledôneas e as monocotiledôneas constituíram duas classes das angiospermas, as Magnoliopsida e as Liliopsida, respectivamente (Cronquist 1988, Taktajan 1997). Essa divisão, no entanto, tem sido refutada pelos estudos filogenéticos (APG 1998, APG II 2003, APG III 2009) que, utilizando principalmente dados moleculares, sustentam um novo arranjo, reconhecendo as linhagens evolutivas basais com ordens inclusas no grado ANITA e no clado das magnolídeas (originalmente incluídas nas dicotiledôneas), as monocotiledôneas, com sua antiga circunscrição, e as eudicotiledôneas, incluindo a maioria das dicotiledôneas.

As monocotiledôneas são morfologicamente caracterizadas pelo sistema radicular adventício, folhas com nervuras paralelas, flores trímeras e pólen com uma única abertura; já as eudicotiledôneas são sustentadas pelo pólen com três aberturas (ou derivados desse tipo). A nova classificação das angiospermas reconheceu esses grupos supraordinais informais e um total de 45 ordens e 457 famílias (APG II 2003). Recentemente, atualizações foram realizadas nesta classificação (APG III 2009), onde as angiospermas foram reconhecidas como uma subclasse, e os grupos informais, em sua maioria, aceitos como superordens (Chase & Reveal 2009). As eudicotiledôneas são

mais diversificadas, englobando cerca de dois terços da riqueza total, seguidas das monocotiledôneas, com um quarto da riqueza, e dos grupos ANITA e magnoliídeas, com um número menor de representantes.

Riqueza e endemismo

A riqueza de plantas vasculares na Floresta Atlântica foi estimada por Myers *et al*. (2000) em 20.000 espécies, sendo 8.000 endêmicas (40%). Essas estimativas, juntamente com o da vegetação remanescente, foram utilizadas para nortear estratégias de conservação a nível global, como a delimitação de *hotspots* (Myers *et al*. 2000; Mittermeyer *et al*. 2004). Como as angiospermas representam 95% das plantas vasculares, a riqueza e a endemicidade para a Floresta Atlântica pode ser projetada para 19.000 e 7.600 espécies, respectivamente.

O inventário realizado por cerca de 180 taxonomistas (ver Listagem das Angiospermas) listou 13.708 espécies e 1.782 gêneros agrupados em 208 famílias de angiospermas. Não há famílias exclusivas, mas 126 gêneros (7%) e 6.663 espécies (49%) são endêmicos da Floresta Atlântica (Tabela 1.1). Esses números indicam que a riqueza total estava superestimada, possivelmente resultado do excesso de táxons descritos para a região, ou seja, a existência de mais nomes do que espécies (inflação taxonômica). Vale ressaltar que boa parte da diversidade foi descrita a partir de amostras coletadas pelos naturalistas viajantes no século XIX e concentradas numa faixa estreita da Floresta Atlântica do sudeste do Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Para essa região há ainda um número considerável de táxons com identidade obscura, necessitando de revisão. Com relação à proporção de endemismos, os valores obtidos confirmam a elevada riqueza de grupos exclusivos, que perfazem mais de 50% da flora de angiospermas. Para as espécies arbóreas, Mori *et al.* (1981), ao estudar as florestas costeiras do sul da Bahia, haviam registrado taxas semelhantes de endemismo (53%). Esses dados indicam que a Floresta Atlântica teve uma história evolutiva bastante distinta daquela dos outros blocos florestais neotropicais, tendo sido palco no passado de processos de radiação de linhagens evolutivas próprias (gêneros), assim como de intensa diversificação (espécies).

As famílias mais diversas são Orchidaceae (1.257), Fabaceae (945), Asteraceae (910), Bromeliaceae (816), Poaceae (782), Myrtaceae (636), Melastomataceae (571), Euphorbiaceae (473), Rubiaceae (463) e Apocynaceae (323) (Figura 4.1). Essas 10 famílias, em conjunto, somam mais da metade do total de espécies de angiospermas da Floresta Atlântica. Orchidaceae e Bromeliaceae se destacaram tanto em termos de riqueza absoluta, como em endemismos, e são ricas em espécies epifíticas, especialmente nas florestas ombrófilas que recobrem a encosta litorânea.

Orchidaceae destacou-se tanto pela extraordinária riqueza de gêneros (176) quanto pela de espécies (1.257), sendo a família melhor representada no Domínio Atlântico (8% do total de espécies). São dignos de nota os gêneros *Acianthera*, *Habenaria*, *Epidendrum*, *Octomeria* e *Anathallis*, que possuem mais de 50 espécies cada. Com relação à endemicidade, 18 gêneros (10%) e 791 espécies (63%) são elementos exclusivos do Domínio. Os gêneros mais ricos acima citados, juntamente




Figura 4.1

Distribuição da riqueza e endemismo, em número de espécies, nas dez famílias mais importantes das angiospermas ocorrentes no Domínio Atlântico.

com *Specklinia* e *Pleurothallis*, possuem também o maior número de espécies endêmicas (mais de 30 cada). É sabido que a maior diversidade de Orchidaceae é encontrada na região neotropical, especialmente junto aos Andes, e que o leste do Brasil é considerado a segunda região mais rica (Pridgeon 1995). Orchidaceae é mais abundante e diversa em hábitats com pluviosidade anual alta sem meses efetivamente secos, como nas florestas pluviais montanas ou nebulares (Dressler 1981). Isso explica a grande riqueza em gêneros e espécies encontrados na Floresta Atlântica, especialmente junto à Serra do Mar (Brieger 1969). É importante ressaltar que filogenias moleculares têm alterado substantivamente a circunscrição de grupos de Orchidaceae, dividindo gêneros como *Pleurothallis* (Pridgeon & Chase 2001) e *Maxillaria* (Whitten *et al.* 2007) ou unindo outros, como *Cattleya* e *Sophronitis* (van den Berg 2008). Enquanto não houver uma estabilidade na classificação, os números relativos à endemicidade genérica podem se alterar, uma vez que 57 gêneros ocorrentes no Domínio são monotípicos (32%), muitos deles endêmicos, de ocorrência restrita e nunca avaliados em estudos filogenéticos com dados moleculares.

Fabaceae, a terceira maior família das angiospermas, é a segunda mais rica no Domínio Atlântico, onde ocorrem 133 gêneros e 945 espécies. *Mimosa*, com 105 espécies, representa mais de 10% de toda a diversidade encontrada na família. Este é um dos maiores gêneros de Fabaceae e possui distribuição predominantemente neotropical, com centros de diversidade no México, sul da Amazônia e adjacências do Paraguai, Argentina e Uruguai (Barneby 1991, Lewis *et al.* 2005). No Brasil, *Mimosa* é bem representado em diferentes formações, como a Caatinga (Queiroz 2009) e o Cerrado *s.l.* (Simon & Proença 2000) e foi considerado um grupo indicador de regiões de endemismos altitudinais nesta última região, o que poderia explicar a alta riqueza do gênero associada às formações campestres da Floresta Atlântica. Outros gêneros com expressiva riqueza foram *Inga* (47), *Machaerium* (39), *Senna* (33) e *Chamaecrista* (33). As análises florísticas do componente arbóreo na Floresta Atlântica

realizadas por Oliveira-Filho & Fontes (2000) evidenciaram que de maneira geral a importância da família é maior nas terras baixas, tanto junto das florestas ombrófilas como das estacionais, e que os gêneros mais importantes nestas formações seriam *Inga* e *Machaerium*. Com relação à endemicidade, foram registrados sete gêneros e 391 espécies endêmicas, o que representa respectivamente 5% e 42% do total, um valor menor que a média das outras nove famílias mais diversas no Domínio. É possível que a menor endemicidade relativa registrada esteja associada à preferência de grande parte das Fabaceae a áreas mais secas e quentes, encontradas apenas em parte do Domínio Atlântico. Uma altíssima taxa de endemicidade foi registrada nos gêneros *Machaerium* e *Swartzia,* 83 e 79%, respectivamente.

Embora mais diversificada nos ambientes campestres, Asteraceae figurou como a terceira família mais rica no Domínio Atlântico. Foram registrados 140 gêneros e 910 espécies, com especial destaque para *Mikania* e *Baccharis*, que estão representados por 122 e 113 espécies, respectivamente, o que representa 26% do total da riqueza da família. O primeiro gênero, predominantemente escandente e de ambiente florestal, possui aproximadamente 400 espécies, das quais cerca de 170 ocorrem no Brasil (King & Robinson 1987). O segundo, geralmente arbustivo, é encontrado preferencialmente nas formações campestres, possui maior riqueza e endemicidade associada a regiões mais altas, como os campos de altitude (Barroso 1976). No Brasil, a Região Sudeste concentra a maior parte da riqueza de ambos os gêneros (Barroso 1958, Müller 2006). Com relação à presença de endemismos, há sete gêneros e cerca de 250 espécies endêmicas do Domínio, a maioria pertencente aos dois gêneros mais ricos supracitados. À exceção de uns poucos gêneros, como *Senecio* e *Piptocarpha*, que são bem representados por espécies endêmicas, a grande maioria dos gêneros de Asteraceae contabiliza um número pequeno de espécies com distribuição restrita, o que parece estar relacionado ao habitat preferencial campestre, menos representado no Domínio.

Bromeliaceae, apesar de não figurar entre as mais diversas famílias de angiospermas, aparece como a quarta mais rica em número de espécies no Domínio Atlântico. Das quase 3.100 espécies aceitas, 816 foram registradas neste levantamento (cerca de 25% do total da família) e 651 destas são endêmicas (80% do total). Esses números evidenciam a costa leste do Brasil como um grande centro de diversidade e de endemismo da família, como já referido por diversos autores (ver Smith 1955 e Martinelli *et al.* 2008). Dos 31 gêneros registrados, dez são endêmicos (*Canistropsis*, *Canistrum*, *Edmundoa*, *Eduandrea, Fernseea*, *Lymania*, *Nidularium*, *Portea*, *Quesnelia* e *Wittrockia*) e abrigam 118 espécies. *Vriesea*, *Aechmea* e *Neoregelia* são os mais diversos e juntos somam quase metade das espécies de Bromeliaceae da Floresta Atlântica. Também merecem destaque *Alcantarea*, *Cryptanthus* e *Orthophytum* que não são exclusivos da Floresta Atlântica, mas apresentam neste Domínio seus centros de diversidade.

Os gêneros mais diversos na Floresta Atlântica são *Eugenia*, *Begonia*, *Croton, Solanum*, *Vriesea*, *Leandra*, *Aechmea*, *Piper*, *Myrcia* e *Peperomia* (Tabela 4.1). Alguns deles, como *Eugenia, Solanum, Croton, Piper* e *Begonia* são amplamente distribuídos nas regiões tropicais (Frodin 2004), mas outros como *Miconia, Leandra, Vriesea* e *Aechmea* são tipicamente neotropicais. Os vinte maiores gêneros, juntos, são responsáveis por cerca de 19% da riqueza total de espécies, bem como por 11,3% do

Tabela 4.1

Distribuição da riqueza e endemismo de espécies nos gêneros mais diversos de angiospermas ocorrentes no Domínio Atlântico.

Gênero	Total de espécies no mundo N	Total de espécies no Domínio Atlântico N (%)*	Total de espécies endêmicas do Domínio Atlântico N (%)*
Eugenia	600	241 (40)	202 (34)
Begonia	ca. 1400	179 (13)	133 (10)
Croton	750	172 (23)	37 (5)
Solanum	1500	171 (11)	112 (8)
Vriesea	250	165 (66)	144 (58)
Leandra	250	149 (60)	132 (53)
Aechmea	254	136 (54)	120 (47)
Piper	1000	135 (14)	57 (6)
Myrcia	350	132 (38)	101 (29)
Peperomia	1000	125 (13)	48 (5)
Mikania	400	122 (31)	36 (9)
Miconia	1050	115 (11)	75 (7)
Baccharis	ca. 360	113 (31)	50 (14)
Paspalum	ca. 400	116 (27)	7 (2)
Mimosa	ca. 500	105 (21)	58 (12)
Tibouchina	240	104 (43)	85 (35)
Neoregelia	112	97 (87)	87 (78)
Paepalanthus	ca. 500	91 (18)	64 (13)
Hyptis	280	85 (30)	16 (6)
Acianthera	140	78 (56)	59 (42)
Total		**2631**	**1622**

**Porcentagem relativa ao total de espécies aceitas no gênero.*

endemismo encontrado na Floresta Atlântica (Tabela 4.1). Estudos centrados no entendimento das relações evolutivas desses táxons, na datação dos eventos de radiação e dos padrões de distribuição geográfica das espécies poderão fornecer evidências acerca da evolução florística ocorrida no Domínio.

Analisando a distribuição da riqueza e dos endemismos nas tipologias vegetacionais encontradas no Domínio da Floresta Atlântica (Tabela 1.1), observa-se que grande parte da riqueza está associada à Floresta Ombrófila Densa. Essa formação, que representa pouco mais de 18% da área de cobertura total, concentra aproximadamente 57% da riqueza e 71% das espécies endêmicas. Vale destacar também a importância da Floresta Estacional Semidecidual e Decidual, bem como das formações campestres, que juntas contém cerca de 50% da diversidade. Outra formação que merece destaque é a Restinga, que compreende uma estreita faixa arenosa litorânea formada por depósitos

quaternários, para a qual foram registradas 1.706 espécies, quase metade delas endêmicas do Domínio. É importante ressaltar que esses números incluem espécies que ocorrem em mais de uma formação vegetal.

Conservação

Atualmente, a principal estratégia para conservação da natureza é o estabelecimento e a manutenção de áreas protegidas, que contemplam a inclusão de espécies endêmicas e ameaçadas de extinção (Heywood & Iriondo 2003, Young 2007). Com relação ao Domínio Atlântico, a comunidade científica reconhece 637 espécies de angiospermas ameaçadas de extinção, sendo que 110 estão inseridas na categoria Criticamente em Perigo, 151 Em Perigo e 376 Vunerável (Fundação Biodiversitas 2009). Dentre essas, 204 espécies constam no Anexo I da lista oficial do governo brasileiro (MMA 2008) e 157 espécies na lista mundial da IUCN (2009) (Tabela 1.2). Ressalta-se que do total das angiospermas ameaçadas indicadas pela comunidade científica, 83% (529) são endêmicas da Floresta Atlântica, especialmente junto às famílias Bromeliaceae, Myrtaceae, Malpighiaceae, Rubiaceae, Asteraceae, Melastomataceae e Orchidaceae.

Diferentemente das gimnospermas, a distribuição das angiospermas ameaçadas está dispersa em todas as fitofisionomias vegetacionais. As Florestas Ombrófilas Densas concentram o maior número de espécies ameaçadas (356), seguidas das Formações Campestres (108), Restingas (96), Afloramentos Rochosos (91), Florestas Estacionais Semideciduais (86), Florestas Ombrófilas Mistas (51), Florestas Deciduais (21), Manguezais e Formações Aquáticas, essas com duas espécies.

Os motivos pelos quais as espécies da Floresta Atlântica estão ameaçadas já são bem conhecidos, sendo as causas diretas perda do hábitat, fragmentação, introdução de espécies exóticas e exploração de espécies com valor comercial, que estão associados a fatores sociais, culturais, políticos e econômicos.[2] Muitas espécies abundantes no passado hoje são raras na natureza, com populações em declínio, restritas a áreas de difícil acesso ou extintas localmente. Inúmeros são os exemplos que ilustram as consequências causadas pelas atividades humanas. Espécies arbóreas como o pau-brasil (*Caesalpinia echinata*), jacarandá-da-bahia (*Dalbergia nigra*), a braúna (*Melanoxylon brauna*) e a imbuia (*Ocotea porosa*), apreciadas pela qualidade e pelo alto valor comercial de sua madeira, foram extraídas exaustivamente, levando também à destruição de milhares de hectares de matas nativas (Gonzaga 2006).

Além da madeira, outros recursos biológicos são alvos da exploração, como por exemplo, o extrativismo exacerbado do palmito (*Euterpe edulis*), que é muito utilizado na culinária brasileira. O extrativismo ocorreu ao longo de séculos, contribuindo para diminuição de populações e levando a inclusão da palmeira nas listas nacionais e estaduais das espécies ameaçadas de extinção (Pivari & Forzza 2004). Outro tipo de extrativismo é a coleta predatória visando o comércio ilegal de espécies com potencial ornamental como bromélias, orquídeas e cactos.

[2]Para maiores detalhes recomendamos a leitura de Dean (1996), Galindo Leal *et al.* (2005) e Siqueira-Filho & Leme (2006).

Exemplos acima ilustram casos isolados de exploração de angiospermas, mas que no somatório vêm modificando áreas contínuas em inúmeros fragmentos isolados, de tamanhos diferentes, promovendo a simplificação biológica nos remanescentes naturais (Tabarelli & Gascon 2005).

A presença das angiospermas ameaçadas de extinção em Unidades de Conservação nunca foi efetivamente avaliada. Dessa forma, não sabemos quais e quantas espécies encontram-se protegidas nos sistemas de Unidades de Conservação, que hoje totaliza apenas 2% da área total do Domínio. É emblemático o caso de *Anomochloa marantoidea,* o táxon mais basal da família Poaceae, conhecido apenas por três populações no sul da Bahia, e que não se encontra protegido (Filgueiras & Gonçalves 2004). Como este caso, dezenas de outros podem ser enumerados.

O conhecimento taxonômico das angiospermas brasileiras avançou muito nos últimos anos, especialmente nas regiões próximas aos grandes centros de pesquisa das Regiões Sul, Sudeste e Nordeste. Para algumas áreas da Floresta Atlântica certamente ele é ainda insuficiente, o que é atestado pelas espécies conhecidas apenas de coletas antigas ou mesmo só pelo seu tipo nomenclatural (Martinelli *et al.* 2008) e as outras tantas recentemente descritas ou desconhecidas para a ciência, que possivelmente já se encontram ameaçadas (Sobral & Stehmann 2009). Esperamos, por fim, que a listagem de angiospermas aqui apresentada, especialmente aquela de endemismos, seja foco de especial atenção nas futuras avaliações sobre o estado de conservação da flora brasileira, contribuindo assim para a preservação deste inestimável patrimônio biológico que representa cerca de 5% da diversidade mundial do grupo.

Referências Citadas

APG - The Angiosperm Phylogeny Group. 1998. An ordinal classification for the families of flowering plants. Annals of the Missouri Botanical Garden 85: 531-553.

APG - The Angiosperm Phylogeny Group. 2003. An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants - APG II. Botanical Journal of the Linnean Society 141: 399-436.

APG - The Angiosperm Phylogeny Group. 2009. An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG III. Botanical Journal of the Linnean Society 161: 105-121.

Auler, N. M. F.; Reis, M. S.; Guerra, M. P. & Nodari, R. O. 2002. The genetics and conservation of *Araucaria angustifolia:* Genetic structure and diversity of natural populations by means of non-adaptive variation in the state of Santa Catarina, Brazil. Genetics and Molecular Biology 25: 329-338.

Barneby, R. C. 1991. Sensitivae censitae, a description of the genus *Mimosa* L. (Mimosaceae) in the New World. Memoirs of the New York Botanical Garden 65: 1-835.

Barroso, G. M. 1958. Mikaniae do Brasil. Arquivos do Jardim Botânico do Rio de Janeiro 16: 239-333.

Barroso, G. M. 1976. Compositae - subtribo Baccharidinae Hoffmann. Estudo das espécies ocorrentes no Brasil. Rodriguésia 28: 1-272.

Behling, H. & Pillar, V. P. 2007. Late quaternary vegetation, biodiversity and fire dynamics on the southern Brazilian highland and their implication for conservation and management of modern Araucaria forest and grassland ecosystems. Philosophical Transactions of the Royal Society, Botany 362: 243–251.

Behling, H. 2002. South and Southeast Brazilian grasslands during late quaternary times: A sythesis. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 177: 19–27.

Behling, H. & Safford, H. D. 2009. Late glacial and holocene vegetation climate and fire dynamics in the Serra dos Orgãos, Rio de Janeiro State, Southeastern Brazil. Global Change Biology DOI 10.1111/j.1365/2486.2009.02029.x.

Brieger, F. G. 1969. Patterns of evolutionary and geographic distribution in Neotropical orchids. Biological Journal of Linnean Society 1: 197-217.

Chase, M. W. & Reveal, J. L. 2009. A phylogenetic classification of the land plants to accompany APG III. Botanical Journal Linnean Society 161: 122-127.

Cronquist, A. 1988. The evolution and classification of flowering plants. 2 ed. The New York Botanical Garden, New York, 555p.

De Bodt, S.; Maere, S. & Van de Peer, Y. 2005. Genome duplication and the origin of angiosperms. Trends in Ecology and Evolution 20: 591-597.

Dean, W. 1996. A ferro e fogo: a história e a devastação da Mata Atlântica brasileira. Cia. Letras, São Paulo, 484p.

Dressler, R. L. 1981. The orchids: Natural history and classification. Harvard University Press, Cambridge, 286p.

Filgueiras, T. & Gonçalves, A. P. S. 2004. A checklist of the basal grasses and bamboos in Brazil (Poaceae). Bamboo Science and Culture: The Journal of the American Bamboo Society 18: 7-18.

Frodin, V. G. 2004. History and concepts of big plant genera. Taxon 53: 753-776.

Fundação Biodiversitas. 2009. Lista da flora brasileira ameçada de extinção. Disponível em <http://www.biodiversitas.org.br/floraBr/>. Acessado em 15 junho 2009.

Galindo-Leal, C.; Jacobsen, T. R.; Langhammer, P. F. & Olivieri, S. 2005. Estado dos *hotspots*: a dinâmica da perda de biodiversidade. *In*: Galindo-Leal, C. & Câmara, I. G. Mata Atlântica: biodiversidade, ameaças e persperctivas. Fundação SOS Mata Atlântica/Conservação Internacional, São Paulo/Belo Horizonte. Pp. 12-23.

Gonzaga, A. L. 2006. Madeira: uso e conservação. IPHAN, Brasília, 244p.

Heywood, V. H. & Iriondo, J. M. 2003. Plant conservation: old problems, new perspectives. Biological Conservation 113: 321-335.

Hueck, K. 1953. Distribuição e habitat natural do pinheiro do Paraná (*Araucaria angustifolia*). Boletim da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, Botânica, 10: 1-24.

IUCN. 2009. IUCN redlist of threatened species. Disponível em <http://www.iucnredlist.org>. Acessado em 15 setembro 2009.

Judd, W. S.; Campbell, C. S.; Kellogg, E. A.; Stevens, P. F. & Donoghue, M. J. 2009. Sistemática vegetal: um enfoque filogenético. 3 ed. Artmed, Porto Alegre, 632p.

King, R. M. & Robinson, H. 1987. The genera of the Eupatorieae (Asteraceae). Allen Press, Lawrence, 581p.

Lewis, G. P.; Schrire, B.; Mackinder, B. & Lock, M. 2005. Legumes of the world. Royal Botanic Gardens, Kew. 577p.

Martinelli, G.; Vieira, C.M.; Gonzalez, M.; Leitman, P.; Piratininga, A.; Costa, A.F.C. & Forzza, R.C. 2008. Bromeliaceae da Mata Atlântica brasileira: lista de espécies, distribuição e conservação. Rodriguésia 59: 209-258.

Mittermeier, R. A.; Gil, P. R.; Hoffmann, M.; Pilgrim, J.; Brooks, T.; Mittermeier, C. G.; Lamourex, J. & Fonseca, G. A. B. 2004. Hotspots revisited. CEMEX, Mexico City, 392p.

MMA - Ministério do Meio Ambiente. 2008. Instrução Normativa nº 6, 23 de setembro de 2008.

Mori, S. A.; Boom, B. M. & Prance, G. T. 1981. Distribution patterns and conservation of Eastern Brazilian coastal forest tree species. Brittonia 32: 233-245.

Müller, J. 2006. Systematic of *Baccharis* (Compositae-Astereae) in Bolivia, including a overview of the genus. Systematic Botany Monographs 76: 1-341.

Myers, N.; Mittermeier, R. A.; Mittermeier, C. G.; Fonseca, G. A. B. & Kent, J. 2000. Biodiversity hotspots for conservation priorities. Nature 403: 853-858.

Oliveira-Filho, A. T. & Fontes, M. A. L. 2000. Patterns of floristic differentiation among Atlantic forests in Southeastern Brazil and the influence of Climate. Biotropica 32: 793-810.

Pivari, M. O. & Forzza, R. C. 2004. A família Palmae na Reserva Biológica da Represa do Grama - Descoberto, Minas Gerais, Brasil. Rodriguésia 55:115-124.

Pridgeon, A. 1995. The illustrated encyclopaedia of orchids. Timber Press, Portland, 83p.

Pridgeon, A. M. & Chase, M. W. 2001. A phylogenetic reclassification of Pleurothallidinae (Orchidaceae). Lindleyana 16: 235-271.

Queiroz, L. P. 2009. Leguminosas da Caatinga. Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana. 467p.

Ribeiro, M. C.; Metzger, J. P.; Martensen, A. C.; Ponzoni, F.J. & Hirota, M. M. 2009. The Brazilian Atlantic Forest: how much is left, and how is the remaining forest distributed? Implications for conservation. Biological Conservation 142: 1144-1156.

Sobral, M. & Stehmann, J. R. 2009. An analysis of new angiosperm species discoveries in Brazil (1990-2006). Taxon 58: 227-232.

Siqueira-Filho, J. A. & Leme, E. M. C. 2006. Fragmentos de Mata Atlântica do Nordeste. Biodiversidade, conservação e suas bromélias. Andrea Jakobsson Estúdio, Rio de Janeiro, 415p.

Simon, M. F. & Proença, C. 2000. Phytogeographic patterns of *Mimosa* (Mimosoideae, Leguminosae) in the Cerrado biome of Brazil: an indicator genus of high-altitude center of endemism? Biological Conservation 96: 279-296.

Soltis, D. E.; Soltis, P. S.; Endress, P. K. & Chase, M.W. 2005. Phylogeny and evolution of angiosperms. Sinauer Associates, Sunderland. 370p.

Soltis, P. S. & Soltis, D. E. 2004. The origin and diversification of angiosperms. American Journal of Botany 91: 1614-1626.

Souza, V. C. & Lorenzi, H. 2005. Botânica sistemática: guia ilustrado para a identificação das famílias de angiospermas da flora brasileira, baseado em APG II. Instituto Plantarum, Nova Odessa, 640p.

Smith, L. B. 1955. The Bromeliaceae of Brazil. Smithsonian Miscellaneous Collections 126: 1-290.

Tabarelli, M. & Gascon, C. 2005. Lessons from fragmentation research: improving management and policy guidelines for biodiversity conservation. Conservation Biology 19: 734-739.

Takhtajan, A. 1997. Diversity and classification of flowering plants. Columbia University Press, New York, 620p.

Thorne, R. F. 1992. Classification and geography of the flowering plants. Botanical Review 58: 225-348.

Thorne, R. F. 2001. Classification and geography of the flowering plants: Dicotyledons of the class Angiospermae. Botanical Review 66: 441-647.

van den Berg, C. 2008. New combinations in the genus *Cattleya* Lindl. (Orchidaceae). Neodiversity 3: 3-12.

Veloso, H. P.; Rangel Filho, A. L. R. & Lima, J. C. A. 1991. Classificacão da vegetação brasileira, adaptada a um sistema universal. IBGE, Rio de Janeiro, 123p.

Whitten, W. M.; Blanco, M. A.; Williams, N. H.; Koehler, S.; Carnevali, G.; Singer, R. B.; Endara, L. & Neubig, K. M. 2007. Molecular phylogenetics of *Maxillaria* and related genera (Orchidaceae: Cymbidieae) based upon combined molecular data sets. American Journal of Botany 94: 1860-1889.

Young, B. E. 2007. Endemic species distributions on the east slope of the Andes in Peru and Bolivia. NatureServe, Arlington, 91p.

PARTE II

Lista de Espécies



Lista de Briófitas

Briófitas – Antóceros

Denise Pinheiro da Costa, Nivea Dias dos Santos, Caio Amitrano
Alencar Imbassahy & Douglas Junqueira Lopes

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
ANTHOCEROTACEAE – 3/80				
Anthoceros – 2/61				
A. lamellatus Steph.*	FOD	-	-	-
A. punctatus L.	FOD, FOM, FED	-	-	-
Folioceros – 1/17				
F. apiahyanus (Steph.) Hässel*	FOD	-	-	-
DENDROCEROTACEAE – 2/77				
Dendroceros – 1/43				
D. crispus (Sw.) Nees	FOD	-	-	-
Megaceros – 1/21				
M. vicentianus (Lehm. & Lindenb.) Campb.	FOD, FES	-	-	-
NOTOTHYLADACEAE – 5/65				
Phaeoceros – 2/42				
P. bulbiculosus (Broth.) Prosk.	FOD	-	-	-
P. laevis (L.) Prosk.	FES, FOM, FOD	-	-	-
Notothylas – 3/20				
N. breutelii (Gottsche) Gottsche	FES	-	-	-
N. orbicularis (Schwein.) Sull.	FES	-	-	-
N. vitalii Udar & Singh	FES	-	-	-

Briófitas – Hepáticas

Denise Pinheiro da Costa, Nivea Dias dos Santos, Caio Amitrano
Alencar Imbassahy & Douglas Junqueira Lopes

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
ACROBOLBACEAE – 2/50				
Lethocolea – 1/8				
L. glossophylla (Spruce) Grolle	FOD	-	-	-
Tylimanthus – 1/12				
T. laxus (Lehm. & Lindenb.) Spruce	FOD, FOM	-	-	-
ADELANTHACEAE – 2/19				
Adelanthus – 2/15				
A. carabayensis (Mont.) Grolle	FOD	-	-	-
A. decipiens (Hook.) Mitt.	FOD	-	-	-

(*) Caráter endêmico do grupo taxonômico: gênero e espécie.
Os números que estão à frente de cada gênero e família representam o número de espécies ocorrentes na Floresta Atlântica e número total de espécies ocorrentes no mundo, repectivamente.
Vegetação: FOD – Floresta Ombrófila Densa/Aberta; FOM – Floresta Ombrófila Mista; FES – Floresta Estacional Semidecidual; FED – Floresta Estacional Decidual; FCA – Formações Campestres; AFL – Afloramentos Rochosos; RST – Restinga; MAN – Manguezal; RUD – Ruderal.
Categoria de Ameaça: CR – Criticamente em Perigo; EN – Em Perigo; VU – Vulnerável; EX – Extinta; EW – Extinta na Natureza; ANEXO I – Ameaçada e ANEXO II – Dados Deficientes.

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
ANEURACEAE – 14/326				
Aneura – 2/43				
A. pinguis (L.) Dumort.	FOD	-	-	-
A. pseudopinguis (Herzog) Pócs	FOM, FOD	-	-	-
Riccardia – 12/277				
R. amazonica (Spruce) S.W. Arnell.	FOD, FES	-	-	-
R. cataractarum (Spruce) Schiffn.	FOD, RST, FOM	-	-	-
R. chamedryfolia (With.) Grolle	FOD	-	-	-
R. digitiloba (Spruce *ex* Steph.) Pagán	FOD, FES	-	-	-
R. emarginata (Steph.) Hell*	FOD	-	-	-
R. fucoidea (Sw.) Schiffn.	FOD	-	-	-
R. glaziovii (Spruce) Meenks	FOD, FOM, FED	-	-	-
R. metzgeriiformis (Steph.) R.M. Schust.	FOD	-	-	-
R. multifida (L.) S.F.Gray	FOD	-	-	-
R. regnellii (Ångstr.) Hell	FOD, FES, FOM, FES	-	-	-
R. schwaneckei (Steph.) Pagán	FOD, FED	-	-	-
R. tenuicula (Spruce) Meenks	FOD	-	-	-
ARNELLIACEAE – 3/24				
Gongylanthus – 1/13				
G. liebmanianus (Lindenb. & Gottsche) Steph.	FOD	-	-	-
Southbya – 1/4				
S. organensis Herzog*	FOD	-	CR	ANEXO I
Stephaniella – 1/5				
S. paraphyllina J.B.Jack	FOD	-	-	-
AYTONIACEAE – 2/93				
Asterella – 1/57				
A. venosa (Lehm. & Lindenb.) A. Evans	FOM, FOD, FED	-	-	-
Plagiochasma – 1/18				
P. rupestre (Forster) Steph.	FOM, FES, FOD, FED	-	-	-
BALANTIOPSIDACEAE – 9/60				
Balantiopsis – 1/17				
B. brasiliensis Steph.*	FOD, FED	-	-	-
Isotachis – 4/31				
I. aubertii (Schwägr.) Mitt.	FOD, FOM, FED	-	-	-
I. inflata Steph.	FOD	-	-	-
I. multiceps (Lindenb. & Gottsche) Gottsche	FOD, FED	-	-	-
I. serrulata (Sw.) Gottsche	FOD	-	-	-
Neesioscyphus – 4/5				
N. argillaceus (Nees) Grolle	FOD	-	-	-
N. bicuspidatus (Steph.) Grolle*	FOD	-	-	-
N. carneus (Nees) Grolle*	FOD, FOM	-	-	-
N. homophyllus (Nees) Grolle*	FOD	-	-	-
CALYPOGEIACEAE – 9/70				
Calypogeia – 6/51				
C. grandistipula (Steph.) Steph.*	FOD	-	-	-
C. laxa Gottsche & Lindenb.	FOD, FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
C. lechleri (Steph.) Steph.	FOD, FED	-	-	-
C. miquelii Mont.	FOD, FES	-	-	-
C. peruviana Nees & Mont.	FOD, FED, FOM	-	-	-
C. uncinulatula Herzog	FOD	-	-	-
Mnioloma – 3/15				
M. cellulosa (Spreng.) R.M. Schust.	FOD, FOM	-	-	-
M. cyclostipa (Spruce) R.M. Schust.	FOD	-	-	-
M. parallelogramma (Spruce) R.M. Schust.	FOD	-	-	-
CEPHALOZIACEAE – 7/107				
Anomoclada – 1/1				
A. portoricensis (Hampe & Gottsche) Váña	FOD	-	-	-
Cephalozia – 2/42				
C. crassifolia (Lindenb. & Gottsche) Fulford.	FOD	-	-	-
C. crossii Spruce	FOD, FOM	-	-	-
Odontoschisma – 4/20				
O. brasiliense Steph.	FOD	-	-	-
O. denudatum (Nees) Dumort.	FOD, FOM	-	-	-
O. falcifolium Steph.	FOD	-	-	-
O. longiflorum (J. Taylor) Steph.	FOD, FOM	-	-	-
CEPHALOZIELLACEAE – 8/128				
Cephaloziella – 3/93				
C. divaricata (Sm.) Schiffn.	RST, FOD	-	-	-
C. granatensis (J.B. Jack) Fulford.	FOD	-	-	-
C. stellulifera (Tayl.) Schiffn.	FOD	-	-	-
Cephaloziopsis – 1/3				
C. intertexta (Gottsche) R.M. Schust.	FOD	-	-	-
Cylindrocolea – 3/15				
C. brasiliensis Costa, Santos & Váña*	FOD	-	-	-
C. planifolia (Steph.) R.M. Schust.	FOD, FOM	-	-	-
C. rhizantha (Mont.) R.M. Schust.	RST, FOD, FES	-	-	-
Kymatocalyx – 1/4				
K. dominicensis (Spruce) Váña	FOD, FOM	-	-	-
CHONECOLEACEAE – 1/6				
Chonecolea – 1/6				
C. doellingeri (Nees) Grolle	RST, FOD, FOM, FED	-	-	-
DUMORTIERACEAE – 1/1				
Dumortiera – 1/1				
D. hirsuta (Sw.) Nees	FOD, FED, FES, FOM	-	-	-
FOSSOMBRONIACEAE – 1/91				
Fossombronia – 1/88				
F. porphyrorhiza (Nees) Prosk.	FOD, FES	-	-	-
FRULLANIACEAE – 29/596				
Frullania – 29/596				
F. apiculata (Reinw. *et al.*) Nees	FOD, FES	-	-	-
F. arecae (Spreng.) Gottsche	FOM, FOD, FED, FES	-	-	-
F. atrata (Sw.) Nees	FOM, FOD, FED, FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
F. beyrichiana (Lehm. & Lindenb.) Lehm. & Lindenb.	FOM, FOD, FED, FES	-	-	-
F. brasiliensis Raddi	MAN, FOM, FOD, FES, FED	-	-	-
F. caulisequa (Nees) Nees	MAN, RST, FOM, FOD, FED, FES	-	-	-
F. cuensensis Taylor	FOD	-	-	-
F. dusenii Steph.	MAN, RST, FOD, FES, FOM, FED	-	-	-
F. ecklonii (Spreng.) Gottsche *et al.*	FOD	-	-	-
F. ericoides (Nees) Mont.	MAN, RST, FOM, FOD, FED, FES	-	-	-
F. flexicaulis Spruce	FOD, FOM	-	-	-
F. gaudichaudii (Nees & Mont.) Nees & Mont.	FOD	-	-	-
F. gibbosa Nees	MAN, RST, FOD, FES, FOM, FED	-	-	-
F. glomerata (Lehm. & Lindenb.) Mont.	MAN, FOD, FOM	-	-	-
F. griffithsiana Gottsche*	FOM, FED	-	-	-
F. guadalupensis Gottche *ex* Steph.	FOD, FED	-	-	-
F. intumescens (Lehm. & Lindenb.) Lehm. & Lindenb.	FOD	-	-	-
F. kunzei (Lehm. & Lindenb.) Lehm. & Lindenb.	MAN, RST, FOM, FOD, FES, FED	-	-	-
F. lindenbergii Lehm. & Lindenb.	FOM, FOD	-	-	-
F. lindmannii Steph.*	FOM, FOD	-	-	-
F. montagnei Gottsche	FOD, FED	-	-	-
F. mucronata (Lehm. & Lindenb.) Lehm. & Lindenb.	FOD	-	-	-
F. nodulosa (Reiw. *et al.*) Gottsche *et al.*	FES	-	-	-
F. platycalyx Herzog*	RST, FOM, FED	-	-	-
F. riojaneirensis (Raddi) Ångstr.	MAN, FOD, FES, FED	-	-	-
F. schaefer-verwimpii Yuzawa & Hatt.*	MAN, FOD	-	-	-
F. setigera Steph.	FOM, FOD, FED	-	-	-
F. supradecomposita (Lehm. & Lindenb.) Lehm. & Lindenb.	FOD, FED	-	-	-
F. vitalii Yuzawa & Hatt.	MAN, RST, FOD	-	-	-
GEOCALYCACEAE – 1/19				
Saccogynidium – 1/9				
S. caldense (Ångstr.) Grolle*	FOD, FOM	-	-	-
GYMNOMITRIACEAE – 1/70				
Marsupella – 1/33				
M. microphylla R.M. Schust.	FOD	-	-	-
HERBERTACEAE – 4/50				
Herbertus – 3/45				
H. grossispinus (Steph.) Fulford	FOD	-	-	-
H. juniperoideus (Sw.) Grolle	FOD	-	-	-
H. oblongifolius (Steph.) Gradst. & Cleef	FOD	-	-	-
Triandrophyllum – 1/5				
T. subtrifidum (Hook. & J. Taylor) Fulford & Hatch.	FOD	-	-	-
JAMESONIELLACEAE – 7/56				
Cryptochila – 1/6				
C. grandiflora (Lindenb. & Gottsche) Grolle	FOD	-	-	-
Jamesoniella – 1/14				
J. rubricaulis (Nees) Grolle	FOD, FOM	-	-	-
Syzygiella – 5/20				
S. anomala (Lindenb. & Gottsche) Steph.	FOD, FOM	-	-	-
S. integerrima Steph.	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
S. liberata Inoue	FOD, FOM	-	-	-
S. perfoliata (Sw.) Spruce	FOD, FOM	-	-	-
S. uleana Steph.*	FOD	-	-	-
JUNGERMANNIACEAE – 4/46				
Jungermannia – 4/30				
J. amoena Lindenb. & Gottsche	FOD, FOM	-	-	-
J. decolor Schiffn.	FOD	-	EN	ANEXO I
J. hyalina Lyell	FOD	-	-	-
J. sphaerocarpa Hook.	FOD	-	-	-
LEJEUNEACEAE – 194/1858				
Acanthocoleus – 2/8				
A. aberrans (Lindenb. & Gottsche) Kruijt	FOD, FOM, FED	-	-	-
A. trigonus (Nees & Mont.) Gradst.	FOM	-	-	-
Acrolejeunea – 2/15				
A. emergens (Mitt.) Steph.	RST, FOD	-	-	-
A. torulosa (Lehm. & Lindenb.) Schiffn.	RST, FOD, FES, FOM	-	-	-
Anoplolejeunea – 1/1				
A. conferta (Meissn.) A. Evans	FOM, FOD, FES, FED	-	-	-
Aphanolejeunea – 13/26				
A. asperrima Steph.	FOD, FOM	-	-	-
A. camillii (Lehm.) R.M. Schust.	RST, FOD	-	-	-
A. cingens Herzog	FOD	-	-	-
A. clavatopapillata (Steph.) E. Reiner	FOD	-	-	-
A. gracilis Jovet-Ast	FOD	-	-	-
A. kunertiana Steph.	FOD, FED	-	-	-
A. longifolia Jovet-Ast	FOM	-	-	-
A. microscopica (Pócs) Pócs & Bernecker	FOD	-	-	-
A. paucifolia (Spruce) E. Reiner*	RST, FOD	-	-	-
A. sicaefolia (Gottsche *ex* Steph.) A. Evans	FES, FOD	-	-	-
A. sintenisii (Steph.) Steph.	FOD	-	-	-
A. truncatifolia Horik	RST, FOD, FES, FOM, FED	-	-	-
A. verrucosa Jovet-Ast	FOD	-	-	-
Archilejeunea – 3/35				
A. auberiana (Mont.) A. Evans	FOD, FED	-	-	-
A. fuscescens (Hampe *ex* Lehm.) Fulford	FOD, FES	-	-	-
A. parviflora (Nees) Schiffn.	RST, FOD, FES	-	-	-
Aureolejeunea – 1/6				
A. fulva R.M. Schust.	FOD	-	-	-
Blepharolejeunea – 2/5				
B. incongrua (Lindenb. & Gottsche) Van Slageren & Kruijt	FOD	-	-	-
B. securifolia (Steph.) R.M. Schust.	FOD	-	EN	ANEXO I
Brachiolejeunea – 3/6				
B. laxifolia (J. Taylor) Schiffn.	RST, FOD, FOM, FED	-	-	-
B. leiboldiana (Gottsche & Lindenb.) Schiffn	FOD	-	-	-
B. phyllorhiza (Nees) Kruijt & Gradst.	FOD	-	-	-
Bromeliophila – 1/2				
B. natans (Steph.) R.M. Schust.*	RST, FOD	-	VU	ANEXO I

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Bryopteris – 2/5				
B. diffusa (Sw.) Nees	FOM, FOD, FES, FED	-	-	-
B. filicina (Sw.) Nees	FOM, FOD, FES, FED	-	-	-
Caudalejeunea – 1/13				
C. lehmanniana (Gottsche) A. Evans	FOM, FOD, FES, FED	-	-	-
Ceratolejeunea – 8/44				
C. ceratantha (Nees & Mont.) Steph.	FOD	-	-	-
C. coarina (Gottsche) Steph.	FOD, FOM	-	-	-
C. cornuta (Lindenb.) Schiffn.	FOD, FOM, FES	-	-	-
C. cubensis (Mont.) Schiffn.	FOD, FES	-	-	-
C. fallax (Lehm. & Lindenb.) Bonner	FOD, FES	-	-	-
C. filaria (Tayl. *ex* Lehm.) Steph.	FOD, FES	-	-	-
C. laetefusca (Austin) R.M. Schust.	RST, FOD, FES	-	-	-
C. rubiginosa Gottsche	FOD	-	-	-
Cheilolejeunea – 12/147				
C. acutangula (Nees) Grolle	FOD, FES, FOM	-	-	-
C. adnata (kunze) Grolle	FOD, FES, FOM	-	-	-
C. clausa (Nees & Mont.) R.M. Schust.	RST, FOD, FES, FOM	-	-	-
C. comans (Spruce) R.M. Schust.	FOD	-	-	-
C. discoidea (Lehm. & Lindenb.) Kachr. & R. N. Schust.	RST, FOD	-	-	-
C. holostipa (Spruce) R.-L. Zhu & Grolle	FOD, FES, FOM	-	-	-
C. inflexa (Hampe *ex* Lehm.) Grolle	FOD	-	-	-
C. insecta Grolle & Gradst.	FOD	-	-	-
C. oncophylla (Ångstr.) Grolle & E. Reiner	FOD, FOM	-	-	-
C. revoluta (Herzog) Gradst. & Grolle	FOD	-	-	-
C. rigidula (Mont.) R.M. Schust.	RST, FOD, FES, FOM, FED	-	-	-
C. trifaria (Reinw. *et al.*) Mizut	FOD, FES, FOM	-	-	-
Cololejeunea – 11/381				
C. cardiocarpa (Mont.) A. Evans	RST, FOD, FOM, FES	-	-	-
C. falcata (Horik.) Benedix	FOD	-	-	-
C. hildebrandtii (Aust.) Steph.	FOD	-	-	-
C. katiae Tixier*	FES	-	-	-
C. minutiloba Herzog	FOD, FOM	-	-	-
C. minutissima (Sm.) Schiffn	RST, FOD, FES, FOM	-	-	-
C. obliqua (Nees & Mont.) Schiffn.	RST, FOD, FOM	-	-	-
C. platyneura (Spruce) S.W. Arnell.	FOD	-	-	-
C. subcardiocarpa Tixier	FOD, FES, FOM	-	-	-
C. vervimpii Tixier	FOD, FOM, FED	-	-	-
C. vitalana Tixier	FOD	-	-	-
Colura – 6/79				
C. calyptrifolia (Hook.) Dumort.	FOD	-	-	-
C. greig-smithii Jovet-Ast	FOD	-	-	-
C. itatyana Steph.*	FOD	-	-	-
C. tenuicornis (A. Evans) Steph.	FOD, FES, FED	-	-	-
C. tortifolia (Nees & Mont.) Steph.	FOD	-	-	-
C. ulei Jovet-Ast	FOD, FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Cyclolejeunea – 4/12				
C. accedens (Gottsche) A. Evans	FOD	-	-	-
C. convexistipa (Lehm. & Lindenb.) A. Evans	FOD	-	-	-
C. luteola (Spruce) Grolle	FOD	-	-	-
C. peruviana (Lehm. & Lindenb.) A. Evans	FOD	-	-	-
Cystolejeunea – 1/1				
C. lineata (Lehm. & Lindenb.) A. Evans	FOD	-	-	-
Dicranolejeunea – 1/2				
D. axilaris (Nees & Mont.) Schiff.	FOD	-	-	-
Diplasiolejeunea – 9/72				
D. alata Jovet-Ast	FOD, FOM	-	-	-
D. brunnea Steph.	FOD, FOM, FES	-	-	-
D. cavifolia Steph.	FOD, FOM, FES	-	-	-
D. latipuensis Tixier	FOD	-	-	-
D. pauckertii (Nees) Steph.	FOD	-	-	-
D. pellucida (Meissn.) Schiffn.	FOD, FES, FOM	-	-	-
D. replicata (Spruce) Steph.	FOD, FOM	-	-	-
D. rudolphiana Steph.	FOD, FOM, FES	-	-	-
D. unidentata (Lehm. & Lindenb.) Schiffn.	FOD, FOM, FES	-	-	-
Drepanolejeunea – 14/116				
D. aculeata Bischl.*	FOD	EN	EN	ANEXO I
D. anoplantha (Spruce) Steph.	FOD	-	-	-
D. araucariae Steph.*	FOD, FOM, FED	-	-	-
D. bidens (Steph.) A. Evans	FOD, FES	-	-	-
D. biocellata A. Evans	FOD	-	-	-
D. campanulata (Spruce) Steph.	FOD, FOM	-	-	-
D. crassiretis A. Evans	FOD	-	-	-
D. fragilis Bischl.	FOD, FES	-	-	-
D. granatensis (J.B. Jack & Steph.) Bischl.	FOD	-	-	-
D. inchoata (Meissn.) Schiffn.	FOD	-	-	-
D. lichenicola (Spruce) Steph.	FOD, FOM	-	-	-
D. mosenii (Steph.) Bischl.	FOD, FES, FOM, FED	-	-	-
D. orthophylla (Nees & Mont.) Bischl.	FOD, FOM	-	-	-
D. palmifolia (Nees) Steph.	FOD, FES	-	-	-
Echinocolea – 1/1				
E. dilatata (A. Evans) R.M. Schust.	FOD	-	-	-
Frullanoides – 4/8				
F. corticalis (Lehm. & Lindenb.) van Slageren	RST, FOD	-	-	-
F. densifolia Raddi	FOM, FOD, FED	-	-	-
F. liebmanniana (Lindenb. & Gottsche) van Slageren	FES, FOD, FOM	-	-	-
F. tristis (Steph.) van Slageren	RST, FOD, FES	-	-	-
Haplolejeunea – 1/3				
H. cucullata (Steph.) Grolle	FOD	-	-	-
Harpalejeunea – 5/27				
H. oxyphylla (Nees & Mont.) Steph.	FOD, FES	-	-	-
H. schiffneri S.W. Arnell	FOD, FOM	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
H. stricta (Lindenb. & Gottsche) Steph.	FOD	-	-	-
H. subacuta A. Evans	FOD	-	-	-
H. tridens (Besch. & Spruce) Steph.	FOD	-	-	-
Lejeunea – 28/319				
L. anomala Lindenb. & Gottsche	FOD	-	-	-
L. bermudiana (A.Evans) R.M. Schust.	FOD	-	-	-
L. caespitosa Lindenb.	RST, FES, FOD	-	-	-
L. cancellata Nees & Mont.	FOD, FOM, FED	-	-	-
L. capensis Gottsche	FOD	-	-	-
L. caulicalyx (Steph.) E. Reiner & Goda	RST, FOD	-	-	-
L. cerina (Lehm. & Lindenb.) Gottsche	FOD	-	-	-
L. controversa Gottsche	FOD	-	-	-
L. cristulaeflora (Gottsche *ex* Steph.) E. Reiner & Goda*	FOD	-	-	-
L. cristulata (Steph.) E. Reiner & Goda*	RST, FOD, FES, FOM	-	-	-
L. flava (Sw.) Nees	RST, FOM, FOD, FES, FED	-	-	-
L. grossiretis (Steph.) E. Reiner & Goda*	FOD	-	-	-
L. grossitexta (Steph.) E. Reiner & Goda*	FOD, FOM	-	-	-
L. immersa Spruce	FOD	-	-	-
L. inflexiloba J.B. Jack & Steph.	FOD	-	-	-
L. laeta (Lehm. & Lindenb.) Gottsche	FOD	-	-	-
L. laetevirens Nees & Mont.	RST, FOD, FES	-	-	-
L. lepida Lindenb. & Gottsche	FOD, FOM	-	-	-
L. magnoliae Lindenb. & Gottsche	FOD	-	-	-
L. monimiae (Steph.) Steph.*	FOD, FES, FOM	-	-	-
L. oligoclada Spruce*	FOD	-	-	-
L. phyllobola Nees & Mont.	RST, FOD, FOM, FED	-	-	-
L. puiggariana Steph.*	FOD	-	-	-
L. raddiana Lindenb.	FOD, FED	-	-	-
L. reflexistipula (Lehm. & Lindenb.) Gottsche, Lindenb. & Nees	FOD	-	-	-
L. setiloba Spruce	FOD	-	-	-
L. tapajosensis Spruce	FOD	-	-	-
L. trinitensis Lindenb.	RST, FOD, FOM	-	-	-
Lepidolejeunea – 2/13				
L. eluta (Nees) R.M. Schust.	FOD, FOM	-	-	-
L. involuta (Gottsche) Grolle	FOD, FES, FOM	-	-	-
Leptolejeunea – 6/46				
L. brasiliensis Bischl.	FOD, FOM, FED	-	-	-
L. diversilobulata Bischl.	FOD, FOM, FED	-	-	-
L. elliptica (Lehm. & Lindenb.) Schiffn.	FOD, FES, FOM	-	-	-
L. exocellata (Spruce) A. Evans.	FOD, FOM	-	-	-
L. maculata (Mitt.) Schiffn.	FOD	-	-	-
L. moniliata Steph.	FOD	-	-	-
Leucolejeunea – 4/13				
L. caducifolia Gradst. & Schäfer-Verw.*	FOD, FOM	-	-	-
L. conchifolia (A. Evans) A. Evans	RST, FOD	-	-	-
L. unciloba (Lindenb.) A. Evans	RST, FOD, FES, FOM, FED	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
L. xanthocarpa (Lehm. & Lindenb.) A. Evans	RST, FOM, FOD	-	-	-
Lopholejeunea – 2/45				
L. nigricans (Lindenb.) Schiffn.	FOD, FOM	-	-	-
L. subfusca (Nees) Schiffn.	RST, FOD, FES, FOM	-	-	-
Marchesinia – 1/11				
M. brachiata (Sw.) Schiffn.	FOD, FOM	-	-	-
Mastigolejeunea – 2/24				
M. auriculata (Wilson) Schiffn.	RST, FOD, FOM	-	-	-
M. plicatiflora (Spruce) Steph.	FOD	-	-	-
Metalejeunea – 1/2				
M. cucullata (Reinw. *et al.*) Grolle	FOD	-	-	-
Microlejeunea – 8/43				
M. aphanella (Spruce) Steph.	FOD	-	-	-
M. bullata (J. Taylor) Steph.	RST, FOD, FES, FOM	-	-	-
M. capillaris (Gottsche) Steph.	FOD, FOM, FED	-	-	-
M. cystifera Herzog	FOD	-	-	-
M. epiphylla Bischl.	RST, FOD, FES	-	-	-
M. globosa (Spruce) Steph.	FOD, FOM	-	-	-
M. stricta (Gottsche *et al.*) Stepha.	FOD	-	-	-
M. subulistipa Steph.*	FOD, FOM	-	-	-
Myriocoleopsis – 2/2				
M. fluviatilis (Steph.) E. Reiner & Gradst.*	FOD, FOM	VU	CR	ANEXO I
M. gymnocolea (Spruce) E. Reiner & Gradst.	FOD, FOM	-	-	-
Neurolejeunea – 1/4				
N. breutelii (Gottsche) A. Evans	FOD, FES, FOM, FED	-	-	-
Odontolejeunea – 3/3				
O. decemdentata (Spruce) Steph.	FOD	-	-	-
O. lunulata (Weber) Schiffn.	FOD, FES, FOM, FED	-	-	-
O. rhomalea (Spruce) Steph.	FOD	-	-	-
Omphalanthus – 1/7				
O. filiformis (Sw.) Nees	FOD, FES	-	-	-
Oryzolejeunea – 1/3				
O. saccatiloba (Steph.) Gradst. & Cleef	RST, FOD	-	-	-
*Pluvianthus** – 1/1				
P. squarrosus (Steph.) R.M. Schust. & Schäf.-Verw.*	FOD, FOM	-	-	-
Prionolejeunea – 5/22				
P. aemula (Gottsche) A. Evans	FOD, FES	-	-	-
P. denticulata (Weber) Schiffn.	FOD, FES	-	-	-
P. galliotii Steph.	FOD	-	-	-
P. limpida Herzog	FOD, FES, FOM	-	-	-
P. scaberula (Spruce) Steph.	FOD	-	-	-
Pycnolejeunea – 4/13				
P. contigua (Nees) Grolle	RST, FES, FOD, FOM, FED	-	-	-
P. densistipula (Lehm. & Lindenb.) Steph.	FOD, FOM	-	-	-
P. macroloba (Nees & Mont.) Schiffn.	FES, FOD	-	-	-
P. porrectiloba *	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Rectolejeunea – 2/31				
R. berteroana (Gottsche *ex* Steph.) A. Evans	RST, FOD, FOM	-	-	-
R. emarginuliflora (Gottsche) A. Evans	FOD	-	-	-
Schiffneriolejeunea – 1/14				
S. polycarpa (Nees) Gradst.	RST, FOD, FES, FOM, FED	-	-	-
Stictolejeunea – 1/3				
S. squamata (Willd. *ex* Weber) Schiffn.	RST, FOD, FES, FED	-	-	-
Symbiezidium – 2/4				
S. barbiflorum (Lindenb. & Gottsche) A. Evans	RST, FOD, FES, FOM	-	-	-
S. transversale (Sw.) Trevis.	FOD, FOM	-	-	-
Taxilejeunea – 5/87				
T. asthenica (Spruce) Stpeh.	FOD	-	-	-
T. isocalycina (Ness) Steph.	FOD, FOM	-	-	-
T. lusoria (Lindenb. & Gottsche) Steph.	FOD, FOM	-	-	-
T. obtusangula (Spruce) A. Evans.	FOD, FOM	-	-	-
T. pterigonia (Lehm. & Lindenb.) Schiffn.	FOD, FOM	-	-	-
Trachylejeunea – 1/11				
T. aneogyna (Spruce) Grolle	FOD	-	-	-
Vitalianthus – 1/2				
V. bischlerianus (Pôrto & Grolle) R.M. Schust. & Giancotti.*	FOD, FES, FOM	-	-	-
Xylolejeunea – 1/4				
X. crenata (Nees & Mont.) X.-L. He & Grolle.	FOD, FES	-	-	-
LEPIDOZIACEAE – 31/665				
Bazzania – 15/251				
B. aurescens Spruce	FOD	-	-	-
B. cuneistipula (Gottsche & Lindenb.) Trevis.	FOD	-	-	-
B. denticulata (Lindenb. & Gottsche) Trevis.	FOD	-	-	-
B. falcata (Lindenb.) Trevis.	FOD, FOM	-	-	-
B. gracilis (Hampe & Gottsche) Steph.	FOD	-	-	-
B. heterostipa (Steph.) Fulford.*	FOD, FES, FOM, FED	-	-	-
B. hookeri (Lindenb.) Trevis.	FOD, FOM, FED	-	-	-
B. jamaicensis (Lehm. & Lindenb.) Trevis.	FOD, FOM	-	-	-
B. longistipula (Lindenb.) Trevis.	FOD, FOM	-	-	-
B. nitida (Weber) Grolle	FOD, FOM	-	-	-
B. pallide-virens (Steph.) Fulford	FOD	-	-	-
B. phyllobola Spruce	FOD, FOM	-	-	-
B. schlimiana (Gottsche) Fulford	FOD	-	-	-
B. stolonifera (Sw.) Trevis.	FOD	-	-	-
B. taleana (Gottsche) Fulford	FOD, FOM	-	-	-
Kurzia – 3/39				
K. brasiliensis (Steph.) Grolle	FOD, FED, FES, FOM	-	-	-
K. capillaris (Sw.) Grolle	FOD, FED, FES, FOM	-	-	-
K. flagellifera (Steph.) Grolle	FOD	-	-	-
Lepidozia – 4/136				
L. coilophylla J. Taylor	FOD, FOM	-	-	-
L. cupressina (Sw.) Lindenb.	FOD	-	-	-
L. inaequalis (Lehm. & Lindenb.) Lehm. & Lindenb.	FOD, FOM	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
L. incurvata Lindenb.	FOM	-	-	-
Micropterygium – 2/23				
M. campanense Spruce *ex* Reimers	FOD	-	-	-
M. pterygophyllum (Nees) Trevis.	FOD	-	-	-
Monodactyliopsis – 1/6				
M. monodactyla (Spruce) R.M. Schust.	RST, FED	-	-	-
Mytilopsis – 1/1				
M. albifrons Spruce	FOD	-	-	-
Paracromastigum – 2/15				
P. dusenii (Steph.) R.M. Schust.	FOD	-	VU	ANEXO I
P. pachyrhizum (Nees) Fulford	FOD	-	-	-
Telaranea – 2/101				
T. diacantha (Mont.) Howe	RST, FOD, FES, FOM, FED	-	-	-
T. nematodes (Gottsche *ex* Austin) M.A. Howe	RST, FOD, FOM	-	-	-
Zoopsidella – 1/6				
Z. integrifolia (Spruce) R.M. Schust.	FOD	-	-	-
LOPHOCOLEACEAE – 22/412				
Chiloscyphus – 13/253				
C. connatus (Sw.) J.J. Engel & R.M. Schust.	FOD	-	-	-
C. glaziovii (Steph.) J.J. Engel & R.M. Schust.*	FOD, FED	-	-	-
C. latifolius (Steph.) J.J. Engel & R.M. Schust.	FOD	-	-	-
C. leptanthus (Hook. f. & Tayl.) J.J. Engel & R.M. Schust.	FOD, FED	-	-	-
C. liebmannianus (Gottsche) J.J. Engel & R.M. Schust.	FES, FOD	-	-	-
C. lindmannii (Steph.) J.J. Engel & R.M. Schust.	FOD, FOM	-	-	-
C. martianus (Nees) J.J. Engel & R.M. Schust.	FOM, FOD, FES, FED, FOM	-	-	-
C. muricatus (Lehm.) J.J. Engel & R.M. Schust.	FED, FOD	-	-	-
C. perissodontus (Spruce) J.J. Engel & R.M. Schust.	FOD, FOM	-	-	-
C. platensis (C. Massal.) J.J. Engel & R.M. Schust.	FOD, FOM, FED	-	-	-
C. profundus (Nees) J.J. Engel & R.M. Schust.	FOD, FES	-	-	-
C. quadridentatus (Spruce) J.J. Engel & R.M. Schust.	FOD	-	-	-
C. trapezoides Sande Lac	FOD	-	-	-
Clasmatocolea – 2/23				
C. humilis (Hook. F. & Tayl.) Grolle	FOM	-	-	-
C. vermicularis (Lehm.) Grolle	FOD, FED, FOM	-	-	-
Heteroscyphus – 2/89				
H. combinatus (Nees) Schiffn.	FOD	-	-	-
H. marginatus (Steph.) Fulford	FOD, FOM	-	-	-
Leptoscyphus – 5/31				
L. amphibolius (Nees) Grolle	FOD	-	-	-
L. cuneifolius (Hook.) Mitt.	FOD	-	-	-
L. gibbosus (J. Taylor) Mitt.	FOD	-	VU	ANEXO I
L. porphyrius (Nees) Grolle	FOD, FES	-	-	-
L. spectabilis (Steph.) Grolle*	FOD, FOM	-	-	-
LUNULARIACEAE – 1/1				
Lunularia – 1/1				
L. cruciata (L.) Dumort.	FOD, FED	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
MARCHANTIACEAE – 6/49				
Marchantia – 6/47				
M. berteroana Lehm. & Lindenb.	FOD, FED	-	-	-
M. breviloba A. Evans	FOD	-	-	-
M. chenopoda L.	FOD, FED, FES, FOM	-	-	-
M. paleacea Bert.	FOD	-	-	-
M. papillata Raddi	FOD, FOM, FED	-	-	-
M. polymorpha L.	FOD, FOM	-	-	-
METZGERIACEAE – 25/100				
Metzgeria – 25/94				
M. acuminata Steph.	FOD, FED	-	-	-
M. adscendens Steph.	FOD, FED	-	-	-
M. agnewiae Kuwah.	FOD	-	-	-
M. albinea Spruce	FOM, FOD, FES, FED	-	-	-
M. aurantiaca Steph.	FOM, FOD, FES, FED	-	-	-
M. bahiensis Schiffn.*	FOD, FED	-	-	-
M. brasiliensis Schiffn.*	FOD, FOM, FED	-	-	-
M. ciliata Raddi	FOD, FES, FOM, FED	-	-	-
M. conjugata Lindb.	FOD, FOM, FED	-	-	-
M. consaguinea Schiffn.	FOD	-	-	-
M. convoluta Steph.*	FOD, FES, FOM, FED	-	-	-
M. cratoneura Schiffn.*	FOD, FOM, FED	-	-	-
M. dichotoma (Sw.) Nees	FOM, FOD, FED	-	-	-
M. fruticola Spruce	FOD, FED	-	-	-
M. furcata (L.) Dumort.	FOM, FOD, FES, FED	-	-	-
M. herminieri Schiffn.	FOD, FED	-	-	-
M. lechleri Steph.	FOD, FED, FOM, FES	-	-	-
M. leptoneura Spruce	FOD, FED, FOM, FES	-	-	-
M. liebmanniana Lindenb. & Gottsche	FOD, FED, FES	-	-	-
M. myriopoda Lindb.	FOD, FED, FES, FOM	-	-	-
M. psilocraspeda Schiffn.*	FOD, FOM, FED	-	-	-
M. rufula Spruce	FOD, FOM	-	-	-
M. scyphigera A. Evans	FOD, FOM	-	-	-
M. subaneura Schiffn.	FOD, FOM, FED	-	-	-
M. uncigera A. Evans	FES, FOD	-	-	-
MONOCLEACEAE – 1/2				
Monoclea – 1/2				
M. gottschei Gradst. & Mues	FOD, FES, FED	-	-	-
PALLAVICINIACEAE – 8/71				
Jensenia – 2/7				
J. difformis (Nees) Grolle	FOD	-	-	-
J. spinosa (Gottsche) Grolle	FOD	-	-	-
Pallavicinia – 1/13				
P. lyellii (Hook.) S.F. Gray	FOD, FOM, FED	-	-	-
Symphyogyna – 5/44				
S. aspera Steph.	FOD, FES, FOM, FED	-	-	-
S. brasiliensis (Nees) Nees & Mont.	FOD, FES, FED	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
S. brongniartii Mont.	FOD	-	-	-
S. leptothelia Tayl.	FOD, FOM, FED	-	-	-
S. podophylla (Thunb.) Mont. & Nees.	FOD	-	-	-
PELLIACEAE – 1/6				
Noteroclada – 1/2				
N. confluens J. Taylor *ex* Hook. & Wilson	FOD	-	-	-
PLAGIOCHILACEAE – 24/648				
Plagiochila – 24/623				
P. adiantoides (Sw.) Lindenb.*	FOD	-	-	-
P. bifaria (Sw.) Lindenb.	FOD	-	-	-
P. boryana Gottsche *ex* Steph.	FOD	-	CR	ANEXO I
P. bryopterioides Spruce	FOD	-	-	-
P. corrugata (Nees) Nees & Mont.	RST, FOM, FOD, FES, FED	-	-	-
P. cristata (Sw.) Lindenb.	FOD	-	-	-
P. disticha (Lehm. & Lindenb.) Lindenb.	RST, FOM, FOD, FES, FED	-	-	-
P. distinctifolia Lindenb.	FOD, FES	-	-	-
P. diversifolia Lindenb. & Gottsche	FOD	-	-	-
P. exigua (J. Taylor) J. Taylor	FOD	-	-	-
P. flaccida Lindenb.	FOD	-	-	-
P. gymnocalycina (Lehm. & Lindenb.) Lindenb.	FOD, FES, FOM	-	-	-
P. lingua Steph.	FOD	-	-	-
P. macrostachya Lindenb.	FOD	-	-	-
P. martiana (Nees) Lindenb.	RST, FOM, FOD, FES, FED	-	-	-
P. micropteryx Gottsche	FED, FOD	-	-	-
P. montagnei Nees	FOD, FES, FOM	-	-	-
P. patentissima Lindenb.	FOD, FES, FOM, FED	-	-	-
P. patula (Sw.) Lindenb.	FOD	-	-	-
P. raddiana Lindenb.	FOD, FES, FOM	-	-	-
P. rutilans Lindenb.	FOM, FOD, FES	-	-	-
P. simplex (Sw.) Lindenb.	FOD, FES, FOM, FED	-	-	-
P. stricta Lindenb.	FOD	-	-	-
P. subplana Lindenb.	FOD, FOM	-	-	-
PORELLACEAE – 3/77				
Porella – 3/76				
P. brasiliensis (Raddi) Schiffn.*	FOM, FOD	-	-	-
P. reflexa (Lehm. & Lindenb.) Trevis.*	FOM, FOD	-	-	-
P. swartziana (Weber) Trevis.	FOM, FES	-	-	-
RADULACEAE – 22/223				
Radula – 22/223				
R. angulata Steph.	FOD, FES	-	-	-
R. brasilica K. Yamada*	FOD	-	-	-
R. decora Gottsche *ex* Steph.	FOD	-	-	-
R. fendleri Gottsche *ex* Steph.	FOD	-	-	-
R. gottscheana J. Taylor	FOD	-	-	-
R. javanica Gottsche	FOM, FOD, FES	-	-	-
R. kegelii Gottsche *ex* Steph.	FOM, FOD	-	-	-
R. ligula Steph.*	FOD, FOM	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
R. mammosa Spruce	FOD	-	-	-
R. mexicana Lindenb. & Gottsche	FOD, FES	-	-	-
R. nudicaulis Steph.	FOD	-	-	-
R. obovata Castle	FOD	-	-	-
R. pocsii K. Yamada.	FOD	-	-	-
R. quadrata Gottsche	FOD, FES	-	-	-
R. recubans J. Taylor	FOD	-	-	-
R. schaefer-verwimpii K. Yamada	FOD	-	-	-
R. sinuata Gottsche *ex* Steph.	FOM, FOD, FES	-	-	-
R. stenocalyx Mont.	FOD	-	-	-
R. tectiloba Steph.	FOM, FOD, FES	-	-	-
R. tenera Mitt. *ex* Steph.	FOD, FES	-	-	-
R. varilobula Castle.	FOD	-	-	-
R. voluta J. Taylor *ex* Gottsche *et al.*	FOM, FOD, FES	-	-	-
RICCIACEAE – 10/236				
Riccia – 9/235				
R. albopunctata Jovet-Ast	FES, FOM	-	-	-
R. brasiliensis Schiffn.*	FES	-	-	-
R. curtisii (James *ex* Austin) Austin	FES	-	-	-
R. grandis Nees*	FOD, FES	-	-	-
R. horrida Jovet-Ast*	FES	-	-	-
R. membranacea Gottsche & Lindenb.	FES, FOD	-	-	-
R. plano-biconvexa Steph.	FOD, FES	-	-	-
R. stenophylla Spruce	FOD, FES, FOM	-	-	-
R. wainionis Steph.	FOD, FES	-	-	-
Ricciocarpus – 1/1				
R. natans (L.) Corda	RST, FES, FOM	-	-	-
SCAPANIACEAE – 6/306				
Anastrophyllum – 3/42				
A. auritum (Lehm.) Steph.	FOD	-	-	-
A. piligerum (Nees) Steph.	FOD	-	-	-
A. tubulosum (Nees) Grolle	FOD, FOM	-	-	-
Lophozia – 2/54				
L. bicrenata (Schmid. *ex* Hoffm.) Dumort	FOD	-	-	-
L. patagonica Herzog & Grolle*	FOM	-	-	-
Scapania – 1/101				
S. portoricensis Hampe & Gottsche	FOD	-	-	-
TARGIONIACEAE – 1/7				
Cyathodium – 1/7				
C. cavernarum Kunze	FES	-	-	-
TRICHOCOLEACEAE – 4/38				
Trichocolea – 4/36				
T. argentea Herzog*	FOD	-	-	-
T. brevifissa Steph.	FOD, FOM	-	-	-
T. flaccida (Spruce) J.B. Jack & Steph.	FOD	-	-	-
T. tomentosa (Sw.) Gottsche	FOM, FOD	-	-	-

Briófitas – Musgos

Denise Pinheiro da Costa, Kátia Cavalcanti Porto, Andréa Pereira Luizi-Ponzo, Anna Luiza Ilkiu-Borges, Cid José Passos Bastos, Paulo Eduardo Aguiar Saraiva Câmara, Silvana Vilas Bôas-Bastos, Thais de Freitas Vaz-Imbassahy, Caio Amitrano Alencar Imbassahy & Douglas Junqueira Lopes

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
ADELOTHECIACEAE – 1/2				
Adelothecium – 1/1				
A. bogotense (Hampe) Mitt.	FOD, FOM, FED	-	-	-
AMBLYSTEGIACEAE – 3/56				
Amblystegium – 1/18				
A. varium (Hedw.) Lindb.	FOD, FOM, FED	-	-	-
Leptodictyium – 1/8				
L. riparium (Hedw.) Warnst.	FOD, FOM, FED	-	-	-
Vittia – 1/1				
V. pachyloma (Mont.) Ochyra	FOD, FOM, FED	-	-	-
ANDREAEACEAE – 2/95				
Andreaea – 2/95				
A. rupestris Hedw.	FOD	-	-	-
A. subulata Harv.	FOD	-	-	-
ANOMODONTACEAE – 1/27				
Herpertineuron – 1/1				
H. toccoae (Sull. & Lesq.) Cardot	FOD, FOM	-	-	-
ARCHIDIACEAE – 7/34				
Archidium – 7/34				
A. amplexicaule Müll. Hal.	FOD, FOM, FED	-	-	-
A. clavatum I.G. Stone	FOD, FOM, FED	-		
A. donnellii Austin	FOD, FOM, FED	-	-	-
A. hallii Austin	FOD, FOM, FED	-	-	-
A. julicaule Müll. Hal.	FOD, FES	-	-	-
A. microthecium Dixon & P. de La Varde	FOD	-	-	-
A. ohioense Schimp. *ex* Müll. Hal.	FOD, FED, FES, RST	-	-	-
BARTRAMIACEAE– 22/385				
Bartramia – 2/71				
B. longifolia Hook.	FOD	-	-	-
B. matthewsiis Fransén*	FOD	-	-	-
Breutelia – 6/94				
B. grandis (Hampe) Paris *	FOD, FOM	-	-	-
B. microdonta (Mitt.) Broth.*	FOD, FOM	-	-	-
B. subdisticha (Hampe) A. Jaeger	FOD, FOM, FED	-	-	-
B. subtomentosa (Hampe) A. Jaeger	FOD, FOM	-	-	-
B. tomentosa (Brid.) A. Jaeg.	FOD, FOM	-	-	-
B. wainioi Broth.*	FOD, FED	-	-	-
Leiomela – 2/13				
L. bartramioides (Hook.) Paris	FOD	-	-	-
L. piligera (Hampe) Broth.*	FOD, FOM, FED	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Philonotis – 12/170				
P. ampliretis Broth.*	FOD, FOM, FED	-	-	-
P. cernua (Wilson) D.G. Griffin & W.R. Buck	FOD, FOM, FED	-	-	-
P. curvata (Hampe) A. Jaeger	FOD, FOM, FED	-	-	-
P. elongata (Dum.) H.A. Crum & Steere	FOD, FOM	-	-	-
P. gardneri (Müll. Hal.) A. Jaeger	FOD, FOM, FED	-	-	-
P. glaziovii (Hampe) D.G. Griffin & W.R. Buck	FOD, FOM	-	-	-
P. gracilenta (Hampe) A. Jaeger	FOM	-	-	-
P. hastata (Duby) Wijk & Margad.	FOD	-	-	-
P. longiseta (Michx.) Britt.	FOD	-	-	-
P. rufiflora (Hornsch.) Reichardt	FOD, FOM	-	-	-
P. sphaericarpa (Hedw.) Brid.	FOD	-	-	-
P. uncinata (Schwägr.) Brid.	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
BRACHYTHECIACEAE – 18/567				
Aerolindigia – 1/1				
A. capillacea (Hornsch.) M. Menzel	FOD, FED	-	-	-
Brachythecium – 2/176				
B. poadelphus Müll. Hal.*	FOD	-	-	-
B. ruderale (Brid.) W.R. Buck	FOD, FOM, FED	-	-	-
Meteoridium – 1/2				
M. remotifolium (Müll. Hal.) Manuel	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
Palamocladium – 1/4				
P. leskeoides (Hook.) E. Britton	FOD, FOM, FED	-	-	-
Platyhypnidium – 1/16				
P. aquaticum (A. Jaeger) Fleisch.	FOD, FOM, FED	-	-	-
Pseudoscleropodium – 1/1				
P. purum (Hedw.) M. Fleisch.	FOD	-	-	-
Puiggariopsis – 1/1				
P. aurifolia (Mitt.) M. Menzel	FOD, FOM, FED	-	-	-
Rhynchostegium – 1/128				
R. conchophyllum (Tayl.) A. Jaeger	FOD	-	-	-
Squamidium – 6/10				
S. brasiliense Broth.	FOD, FOM, FED	-	-	-
S. diversicoma (Hampe) Broth.	FOD, FOM, FED	-	-	-
S. isocladum (Ren. & Card) Broth.	FOD	-	-	-
S. leucotrichum (Tayl.) Broth.	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
S. macrocarpum (Spruce *ex* Mitt.) Broth.	FOD, FOM, FED	-	-	-
S. nigricans (Hook.) Broth.	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
Zelometeorium – 3/5				
Z. ambiguum (Hornsch.) Manuel	FOD, FOM, FED	-	-	-
Z. patens (Hook.) Manuel	FOD	-	-	-
Z. patulum (Hedw.) Manuel	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
BRUCHIACEAE – 5/109				
Eobruchia – 1/1				
E. bruchioides (Müll. Hal.) W.R. Buck*	FOD	-	-	-
Pringleella – 1/3				

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
P. subulata (Müll. Hal.) Broth.*	FOD	-	VU	ANEXO I
Trematodon – 3/83				
T. ambiguous (Hedw.) Hornsch.*	FOD	-	-	-
T. longicollis Michx.	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
T. vaginatus Müll. Hal.*	FOD	-	-	-
BRYACEAE – 49/51				
Anomobryum – 2/47				
A. conicum (Hornsch.) Broth.	FOD, FOM	-	-	-
A. julaceum (Schrad. *ex* P. Gaertn., B. Mey. & Schreb.) Schimp.	FOD	-	-	-
Brachymenium – 8/102				
B. consimile (Mitt.) A. Jaeger	FOD	-	-	-
B. fabronioides (Müll. Hal.) Par.	FOD	-	-	-
B. globosum A. Jaeger	FOD	-	-	-
B. hornschuchianum Mart.*	FOD, FOM, FED	-	-	-
B. klotzschii (Schwägr.) Par.	FOD	-	-	-
B. morasicum Besch.	FOD, FES	-	-	-
B. regnellii Hampe*	FOD, FOM	-	-	-
B. speciosum (Hook. f. & Wilson) Steere	FOD	-	-	-
Bryum – 12/448				
B. arachnoideum Müll. Hal.	FOD	-	-	-
B. argenteum Broth.	FOD, FOM, FED, FES, RST	-	-	-
Bryum atrovirens Brid.	FOD	-	-	-
B. duplicatum Broth.	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
B. leptocladon Sull.	RST	-	-	-
B. limbatum Müll. Hal.	FOD, FOM, FED	-	-	-
B. mattogrossense Broth.	FOD	-	-	-
B. pabstianum Müll. Hal.	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
B. paradoxum Schwägr.	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
B. renauldii Röll *ex* Renauld & Cardot	FOD, FED	-	-	-
B. torquatum Mohamed	FOD	-	-	-
B. turbinatum (Hedw.) Turn.	FOD	-	-	-
Gemmabryum – 8/35				
G. acuminatum (Harv.) J.R. Spence & H.P. Ramsay	FOD, FOM	-	-	-
G. apiculatum (Schwägr.) J.R. Spence & H.P. Ramsay	FOD, FOM, FED	-	-	-
G. clavatum (Müll. Hal.) J.R. Spence & H.P. Ramsay	FOD	-	-	-
G. coronatum (Schwägr.) J.R. Spence & H.P. Ramsay	FOD, FOM, FED, FES, RST	-	-	-
G. exile (Dozy & Molk.) J.R. Spence & H.P. Ramsay	FOD, FES, RST	-	-	-
G. laevigatum (Hook. f. & Wilson) J.R. Spence & H.P. Ramsay	FOD, FOM	-	-	-
G. radiculosum (Brid.) J.R. Spence & H.P. Ramsay	FOD, FOM	-	-	-
G. subapiculatum (Hampe) J.R. Spence & H.P. Ramsay	FOD, FOM, FED	-	-	-
Imbribryum – 1/5				
I. muhlenbeckii (Bruch & Schimp.) N. Pedersen	FES	-	-	-
Leptostomopsis – 1/25				
L. systylium (Müll. Hal.) J.R. Spence & H.P. Ramsay	FOD	-	-	-
Plagiobryum – 3/9				
P. capillare (Hedw.) J.R. Spence	FOD, FOM, FED, FES, RST	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
P. cellulare (Hook.) J.R. Spence & H.P. Ramsay	FOD	-	-	-
P. pseudotriquetrum (Hedw.) J.R. Spence & H.P. Ramsay	FOD, FOM	-	-	-
Ptychostomum – 2/32				
P. caespiticium (Brid.) J.R. Spence & H.P. Ramsay	FOD	-	-	-
P. wrightii (Sull.) J.R. Spence & H.P. Ramsay	FOD	-	-	-
Rhodobryum – 8/34				
R. aubertii (Schwägr.) Thér.	FOD	-	-	-
R. beyrichianum (Hornsch.) Müll. Hal.	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
R. grandifolium (J. Taylor) Schimp.	FOD, FOM	-	-	-
R. procerum (Schimp.) Par.	FOD	-	-	-
R. pseudomarginatum (Geh. & Hampe) Paris*	FOD, FOM	-	-	-
R. roseolum Müll. Hal.	FOD, FED, FES	-	-	-
R. roseum (Hedw.) Limpr.	FOD, FES	-	-	-
R. subverticillatum Broth.	FOD, FOM, FES	-	-	-
Rosulabryum – 4/14				
R. billardieri (Schwägr.) J.R. Spence	FOD, FOM, FED, FES, RST	-	-	-
R. densifolium (Brid.) Ochyra	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
R. huillense (Welw. & Duby) Ochyra	FOD	-	-	-
R. pseudocapillare (Besch.) Ochyra	FOD	-	-	-
CALYMPERACEAE – 27/215				
Calymperes – 10/53				
C. afzelii Sw.	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
C. erosum Müll. Hal.	FOD, FES	-	-	-
C. lonchophyllum Schwägr.	FOD, FOM, FES	-	-	-
C. othmeri Herz.	FOD	-	-	-
C. palisotii Schwägr.	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
C. pallidum Mitt.	FOD	-	-	-
C. platyloma Mitt.	FOD	-	-	-
C. rubiginosum (Mitt.) Reese	FOD	-	-	-
C. smithii E.B. Bartram	FOD	-	-	-
C. tenerum Müll. Hal.	FOD, RST, MAN	-	-	-
Leucophanes – 1/15				
L. molleri Müll. Hal.	FOD, FES	-	-	-
Octoblepharum – 3/16				
O. albidum Hedw.	FOD, FOM, FED, FES, RST	-	-	-
O. cocuiense Mitt.	FOD	-	-	-
O. pulvinatum (Dozy & Molk.) Mitt.	FOD, FOM, FES	-	-	-
Syrrhopodon – 13/101				
S. brasiliensis W.D. Reese*	FOD	-	-	-
S. cymbifolius Müll. Hal.	FOD	-	-	-
S. gardneri (Hook.) Schwägr.	FOD	-	-	-
S. gaudichaudii Mont.	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
S. graminicola Williams	FOD, FES	-	-	-
S. incompletus Schwägr.	FOD, FOM, FES	-	-	-
S. ligulatus Mont.	FOD, FES	-	-	-
S. lycopodioides (Brid.) Müll. Hal.*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
S. parasiticus (Brid.) Besch.	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
S. prolifer Schwägr.	FOD, FOM, FED, FES, RST	-	-	-
S. rigidus Hook. & Grev.	FOD	-	-	-
S. simmondsii Steere	FOD, FOM	-	-	-
S. tortilis Hampe	FOD, FOM	-	-	-
CAMPYLIACEAE – 4/131				
Anacamptodon – 1/12				
A. cubensis (Sull.) Mitt.	FOD	-	-	-
Campyliadelphus – 1/3				
C. chrysophyllus (Brid.) Kanda	FOD	-	-	-
Drepanocladus – 1/21				
D. perplicatus (Dusén) G. Roth	FOD	-	-	-
Warnstorfia – 1/10				
W. exannulata (Schimp.) Loeske	FOD, FED	-	-	-
CATAGONIACEAE – 3/4				
Catagonium – 3/4				
C. brevicaudatum Müll. Hal. *ex* Broth.	FOD, FOM	-	-	-
C. emarginatum Lin	FOD, FOM	-	-	-
C. nitens (Brid.) Card.	FOD	-	-	-
CRYPHAEACEAE – 8/94				
Cryphaea – 6/57				
C. brevipila Mitt.	FOD, FOM	-	-	-
C. jamesonii Tayl.	FOD, FOM, FED	-	-	-
C. orizabae Schimp. *ex* Besch.	FOM	-	-	-
C. patens Hornsch.	FOD, FOM, FED	-	-	-
C. ramosa (Mitt.) Wilson	FOM	-	-	-
C. rhacomitrioides Müll. Hal.*	FOD, FED	-	-	-
Schoenobryum – 2/16				
S. concavifolium (Griff.) Gangulee	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
S. rubricaule (Mitt.) Manuel	FOD, FOM, FED	-	-	-
DALTONIACEAE – 7/219				
Calyptrochaeta – 2/25				
C. albescens (Hampe) W.R. Buck*	FOD	-	-	-
C. setigera (Mitt.) W.R. Buck	FOD, FOM, FED	-	-	-
Daltonia – 4/60				
D. brasiliensis Mitt.	FOD, FOM	-	-	-
D. gracilis Mitt.	FOD	-	-	-
D. longifolia Tayl.	FES	-	-	-
D. stenophylla Mitt.	FOD	-	-	-
Leskeodon – 1/20				
L. aristatus (Geh. & Hampe) Broth.*	FOD, FOM, FED	-	-	-
DICRANACEAE – 49/901				
Aongstroemia – 3/7				
A. julacea (Hook.) Mitt.	FOD	-	-	-
A. longipes (Somerf.) B.S.G.	FOD	-	-	-
A. orientalis Mitt.	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Atractylocarpus – 2/10				
A. brasiliensis (Müll. Hal.) R.S. Williams*	FOD	-	VU	ANEXO I
A. longisetus (Hook.) E.B. Bartram	FOD	-	VU	ANEXO I
Bryohumbertia – 1/3				
B. filifolia (Hornsch.) J.-P. Frahm	FOD, FOM, FED	-	-	-
Campylopus – 30/161				
C. aemulans (Hampe) A. Jaeger	FOD, FOM, FED	-	-	-
C. angustiretis (Austin) Lesq. & James	FOD, FOM	-	-	-
C. arctocarpus (Hornsch.) Mitt.	FOD, FOM, FED	-	-	-
C. carolinae Grout	FOD, FOM	-	-	-
C. cryptopodioides Broth.	FOD, FOM, FED, RST	-	-	-
C. cuspidatus (Hornsch.) Mitt.	FOD	-	-	-
C. densicoma (Müll. Hal.) Paris	FOD	-	VU	ANEXO I
C. dichrostis (Müll. Hal.) Paris	FOD	-	-	-
C. fragilis (J.-P. Frahm) J.-P. Frahm*	FOD	-	-	-
C. gardneri (Müll. Hal.) Mitt.	FOD, FES	-	-	-
C. gastro-alaris (Müll. Hal.) Paris	FOD	-	-	-
C. gemmatus (Müll. Hal.) Paris*	FOD	-	-	-
C. griseus (Hornsch) A. Jaeger	FOD, FOM, FED	-	-	-
C. heterostachys (Hampe) A. Jaeger	FOD	-	-	-
C. jamesonii (Hook.) A. Jaeger	FOD, FED	-	-	-
C. julaceus A. Jaeger	FOD, FOM	-	-	-
C. julicaulis Broth.*	FOD, FOM, FED	-	-	-
C. lamellinervis (Müll. Hal.) Mitt.	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
C. occultus Mitt.	FOD, FOM, FED, FES, RST	-	-	-
C. pilifer Brid.	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
C. reflexisetus (Müll. Hal.) Broth.	FOD, FOM	-	-	-
C. richardii Brid.	FOD, FOM	-	-	-
C. savannarum (Müll. Hal.) Mitt.	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
C. sehnemii Brid.*	FOD, FOM, FED	-	-	-
C. subcuspidatus (Hampe) A. Jaeger	FOD	-	-	-
C. surinamensis Müll. Hal.	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
C. trachyblepharon (Müll. Hal.) Mitt.	FOD, FOM, FED, RST	-	-	-
C. twaitesii (Mitt.) A. Jaeger*	FOD	-	-	-
C. uleanus (Müll. Hal.) Broth.*	FOD, FOM	-	-	-
C. widgrenii (Müll. Hal.) Mitt.*	FOD, FOM	-	-	-
Dicranella – 2/164				
D. guilleminiana (Mont.) Mitt.	FOD	-	-	-
D. hilariana (Mont.) Mitt.	FOD, FOM, FES	-	-	-
Dicranodontium – 1/15				
D. pulchroalare (Herzog) J.-P. Frahm*	FOD	-	-	-
Dicranum – 1/93				
D. frigidum Müll. Hal.	FOD	-	-	-
Holomitrium – 2/50				
H. arboreum Mitt.	FOD, FES	-	-	-
H. crispulum Mart.	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Leucoloma – 3/103				
L. cruegerianum (Müll. Hal.) A. Jaeger	FOD, FES	-	-	-
L. serrulatum Brid.	FOD, FES	-	-	-
L. triforme (Mitt.) A. Jaeger*	FOD	-	-	-
Microcampylopus –1/3				
M. curvisetus (Hampe) Giese & J.-P. Frahm.	FOD	-	-	-
Microdus – 1/11				
M. brasiliensis (Dub.) Thér.	FOD	-	-	-
Paraleucobryum – 1/3				
P. longifolium (Broth.) P. Mueller & J. -P.Frahm*	FOD	-	-	-
Pilopogon – 1/8				
P. guadalupensis (Brid.) J.-P. Frahm	FOD, FOM, FED	-	-	-
DIPHYSCIACEAE – 1/20				
Diphyscium – 1/18				
D. longifolium Griff.	FOD	-	-	-
DITRICHACEAE – 12/186				
Ceratodon – 2/5				
C. purpureus (Hedw.) Brid.	FOD	-	-	-
C. stenocarpus Bruch & Schimp. *ex* Müll. Hal.	FOD	-	-	-
Chrysoblastella – 1/1				
C. chilensis (Mont.) Reimers	FOD	-	-	-
*Cladastomum** – 2/2				
C. robustum Broth.*	FOD	-	-	-
C. ulei Müll. Hal.*	FOD, FOM	-	-	-
*Crumuscus** – 1/1				
C. vitalis W.R. Buck & Snider*	FOD	-	-	-
Ditrichum – 5/68				
D. crinale (Tayl.) Kuntze	FOD	-	-	-
D. itatiaiae (Müll. Hal.) Paris*	FOD	-	-	-
D. liliputanum (Müll. Hal.) Paris*	FOD, FOM	-	-	-
D. paulense Geh. *ex* Hampe*	FOD, FOM, FED	-	-	-
D. ulei (Müll. Hal.) Paris*	FOD, FOM, FED	-	-	-
Eccremidium – 1/6				
E. floridanum H.A. Crum	FOD, FOM	-	-	-
ENTODONTACEAE – 11/135				
Entodon – 9/117				
E. beyrichii (Schwägr.) Müll. Hal.	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
E. campipatrum Sehnem*	FOM	-	-	-
E. gracilis (Ångstr.) A. Jaeger	FOD, FED	-	-	-
E. hampeanus Müll. Hal.	FOD	-	-	-
E. jamesonii (J. Taylor) Mitt.	FOD, FOM	-	-	-
E. lindbergii Hampe*	FOD, FED	-	-	-
E. macropodus (Hedw.) Müll. Hal.	FOD, FOM	-	-	-
E. mosenii Broth.*	FOD	-	-	-
E. splendidus Hampe	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Erythrodontium – 2/15				
E. longisetum (Hook.) Paris	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
E. squarrosum (Hampe) Paris	FOD, FOM, FED	-	-	-
EPHEMERACEAE – 4/38				
Ephemerum – 2/28				
E. pachyneuron Müll. Hal.*	FOD	-	-	-
E. uleanum Müll. Hal.	FOD	-	-	-
Micromitrium – 2/9				
M. tenerum (Bruch. & Schimp.) M.R. Crosby	FOD, FOM	-	-	-
M. thelephorothecum (Florsch.) Crosby	FOD, FES	-	-	-
ERPODIACEAE – 5/25				
Aulacopilum – 2/7				
A. glaucum Wilson	FOD, FOM	-	-	-
A. schaeferi H.A. Crum*	FOD	-	-	-
Erpodium – 3/16				
E. beccari Müll. Hal.	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
E. coronatum (Hook. f. & Wilson) Mitt.	FOD, FOM	-	-	-
E. glaziovii Hampe	FOD, FOM, FED	-	-	-
FABRONIACEAE – 4/79				
Dimerodontium – 2/10				
D. balansae Müll. Hal.	FOD, FOM	-	-	-
D. mendozense Mitt.	FOD, FOM, FED	-	-	-
Fabronia – 2/61				
F. ciliaris (Hook.) W.R. Buck	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
F. macroblepharis Schwägr.	FOD, FOM	-	-	-
FISSIDENTACEAE – 53/448				
Fissidens – 53/444				
F. acacioides Schrad.	FOD, FOM, FED	-	-	-
F. adiantoides Hedw.	FOD, FES	-	-	-
F. amoenus Müll. Hal.	FOD, FOM	-	-	-
F. angustelimbatus Mitt.	FOD, FOM, FED	-	-	-
F. asplenioides Hedw.	FOD, FOM	-	-	-
F. brachypus Mitt.	FOD, FOM	-	-	-
F. brevipes Besch.	FOD, FOM, FED	-	-	-
F. bryoides Hedw.	FOD	-	-	-
F. crispus Mont.	FOD, FOM	-	-	-
F. cryptoneuron Hedw.	FOD	-	-	-
F. curvatus Hornsch.	FOD, FOM	-	-	-
F. dendrophilus Brugg.-Nann. & Pursell*	FED	-	-	-
F. dissitifolius Sull.	FOD, FOM	-	-	-
F. elegans Brid.	FOD, FOM	-	-	-
F. flabellatus Hornsch.	FOD, FOM	-	-	-
F. flaccidus Mitt.	FOD, FES	-	-	-
F. fontanus (Pyl.) Steud.	FED	-	-	-
F. gardneri Mitt.*	FOD	-	-	-
F. goyazensis Broth.	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
F. guianensis Mont.	FOD, FES, RST	-	-	-
F. gymnostomus Brugg.-Nann.*	FOD	-	-	-
F. hornschuchii Mont.	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
F. inaequalis Mitt.	FOD, FES	-	-	-
F. intromarginatus (Hampe) A Jaeger	FOD, FOM	-	-	-
F. lagenarius (Spruce *ex* Mitt.) Pursell	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
F. leptophyllus Mont.	FOD	-	-	-
F. lindbergii Mitt.	FOD	-	-	-
F. neglectus Crum	FOD, FES	-	-	-
F. oediloma Müll. Hal. *ex* Broth.	FOD, FOM, FED	-	-	-
F. ornatus Herzog	FOD, FES	-	-	-
F. pallidinervis Mitt.	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
F. palmatus Hedw.	FOD, FES	-	-	-
F. pauperculus Howe	FES	-	-	-
F. pellucidus Hornsch.	FOD, FOM	-	-	-
F. perfalcatus Broth.	FOD	-	-	-
F. prionodes Mont.	FOD, FES	-	-	-
F. radicans Mont.	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
F. ramicola Broth.	FOD	-	-	-
F. rigidulus Hook. f. & Wilson	FOD	-	-	-
F. saprophilus Broth.	FOD, FOM	-	-	-
F. scalaris Mitt.	FOD, FED	-	-	-
F. scariosus Mitt.	FOD, FOM, FES	-	-	-
F. semicompletus Hedw.	FOM	-	-	-
F. serratus Müll. Hal.	FOD, FES	-	-	-
F. stenophyllus Ångstr.*	FOD	-	-	-
F. submarginatus Bruch	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
F. subradicans Broth.	FOD, FOM, FED	-	-	-
F. subulatus Mitt.	FOD, FES	-	-	-
F. spuriolimbatus Broth.	FOD, FED	-	-	-
F. termitarum (Herzog) Pursell	FOD	-	-	-
F. wallisii Müll. Hal.	FOD	-	-	-
F. weirii Mitt.	FOM, FES	-	-	-
F. zollingerii Mont.	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
FONTINALACEAE – 1/27				
Fontinalis – 1/20				
F. duriaei Schimp.	FED	-	-	-
FUNARIACEAE – 8/255				
Entosthodon – 1/83				
E. bonplandii (Hook.) Mitt.	FOD, FOM, FED	-	-	-
Funaria – 3/86				
F. beyrichii Hampe*	FOD, FOM	-	-	-
F. hygrometrica Hedw.	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
F. luteolimbata Broth.*	FOD, FCA, FED	-	-	-
Physcomitrium – 4/68				
P. acutifolium Broth.*	FOD, FED	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
P. badium Broth.*	FOD, FCA, FED	-	-	-
P. brevisrostre Broth.*	FOM, FCA, FED	-	-	-
P. sylvestre Müll. Hal.*	FOD, FOM, FED	-	-	-
GRIMMIACEAE – 8/278				
Grimmia – 7/122				
G. atrata Miel. *ex* Hornsch.	FOM	-	-	-
G. elongata Kaulf.	FOD	-	-	-
G. laevigata (Brid.) Brid.	FCA	-	-	-
G. longirostris Hook.	FOD	-	-	-
G. navicularis (Hedw.) Lindb.	FOD	-	-	-
G. ovalis (Hedw.) Lindb.	FOD	-	-	-
G. trichophylla Grev.	FOD, FOM	-	-	-
Racomitrium – 1/81				
R. crispipilum (Taylor) A. Jaeger	FOD	-	-	-
HEDWIGIACEAE – 5/30				
Braunia – 2/23				
B. plicata (Mitt.) A. Jaeger	FED	-	-	-
B. subincana Broth.*	FOM, FED	-	-	-
Hedwigia – 1/4				
H. ciliata (Hedw.) Ehrh. *ex* P. Beauv.	FOM, FED	-	-	-
Hedwigidium – 2/2				
H. glyohocarpum (Hampe) A. Jaeger	FOD, FOM	-	-	-
H. integrifolium (P. Beauv.) Dixon	FOD, FOM, FED	-	-	-
HELICOPHYLLACEAE – 1/1				
Helicophyllum – 1/1				
H. torquatum (Hook.) Brid.	FOD, FOM, FES	-	-	-
HOOKERIACEAE – 2/53				
Calyptrochaeta – 1/25				
C. albescens (Hampe) W.R. Buck*	FOD	-	-	-
Hookeria – 1/9				
H. acutifolia Hook. & Grev.	FOD, FOM, FED	-	-	-
HYDROPOGONACEAE – 1/2				
Hydropogon – 1/1				
H. fontinaloides (Hook.) Brid.	FOD	-	-	-
HYPNACEAE – 22/897				
Chrysohypnum – 2/12				
C. diminutivum (Hampe) W.R. Buck	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
C. elegantulum (Hook.) Hampe	FOD, FOM, FED	-	-	-
Ctenidium – 1/23				
C. malacodes Mitt.	FOD, FOM	-	-	-
Ectropothecium – 1/202				
E. leptochaeton (Schwägr.) W.R. Buck	FOD, FOM	-	-	-
Hypnum – 1/81				
H. amabile (Mitt.) Hampe	FOD, FOM	-	-	-
Isopterygium – 5/151				
I. affusum Mitt.	FOD, FOM	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
I. byssobolax (Müll. Hal.) Paris	FOD, FOM	-	-	-
I. subbrevisetum (Hampe) Broth.	FOD, FOM	-	-	-
I. tenerifolium Mitt.	FOD, FOM, FED, RST	-	-	-
I. tenerum (Sw.) Mitt.	FOD, FOM, FED, FES, RST	-	-	-
Mittenothamnium – 9/82				
M. expallescens (Hampe) Cardot	FOD, FOM	-	-	-
M. heterostachys (Hampe) Cardot	FOD, FED	-	-	-
M. hylophilum (Müll. Hal.) Cardot	FOD, FOM, FED	-	-	-
M. macrodontium (Hornsch.) Cardot	FOD, FOM, FED	-	-	-
M. reptans (Hedw.) Cardot	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
M. simorrhynchum (Hampe) Cardot	FOD, FOM	-	-	-
M. subcampaniforme (Geh. & Hampe) Cardot	FOD, FOM, FED	-	-	-
M. subdiminutivum (Geh. & Hampe) Cardot	FOD, FOM	-	-	-
M. submacrodontium (Geh. & Hampe) Cardot	FOD, FOM, FED	-	-	-
Phyllodon – 1/3				
P. truncatulus (Müll. Hal.) W.R. Buck	FOD, FOM	-	-	-
Taxiphyllum – 1/31				
T. taxirameum (Mitt.) Fleisch.	?	-	-	-
Vescicularia – 1/116				
V. vesicularis (Schwägr.) Broth.	?	-	-	-
HYPOPTERYGIACEAE – 2/73				
Hypopterygium – 1/55				
H. tamarisci (Sw.) Müll. Hal.	FOD, FOM, FED	-	-	-
Lopidium – 1/16				
L. concinnum (Hook.) Wilson	FOD, FOM, FED	-	-	-
LEMBOPHYLLACEAE – 5/78				
Pilotrichella – 1/50				
P. flexilis (Hedw.) Ångstr.	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
Orthostichella – 4/7				
O. pachygastrella (Müll. Hal. *ex* Ångstr.) B.H. Allen & Magill	FOD, FOM, FED	-	-	-
O. rigida (Müll. Hal. *ex* Ångstr.) B.H. Allen & Magill	FOD, FED	-	-	-
O. versicolor (Müll. Hal.) B.H. Allen & Buck	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
O. welwitschii (Duby) B.H. Allen & Buck	FOD, FOM	-	-	-
LESKEACEAE – 1/176				
Haplocladium – 1/17				
H. microphyllum (Hedw.) Broth.	FOD, FED	-	-	-
LEUCOBRYACEAE – 7/95				
Leucobryum – 6/83				
L. albicans (Schwägr.) Lindb.	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
L. albidum (Brid. *ex* P. Beauv.) Lindb.	FOD, FOM, FED	-		
L. clavatum Hampe	FOD, FOM, FED, MAN	-	-	-
L. crispum Müll. Hal.	FOD, FOM, FED	-	-	-
L. giganteum Müll. Hal.	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
L. martianum (Hornsch.) Hampe *ex* Müll. Hal.	FOD, FOM, FES	-	-	-
Ochrobryum – 1/7				
O. gardneri (Müll. Hal.) Lindb.	FOD, FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
LEUCODONTACEAE – 1/51				
Pterigoniadelphus – 1/3				
P. assimilis (Müll. Hal.) Ochyra & Zijstra	FOD, FOM, FED	-	-	-
LEUCOMIACEAE – 4/12				
Leucomium – 2/5				
L. steerei B. H. Allen & Veling	FOD	-	-	-
L. strumosum (Hornsch.) Mitt.	FOD, FOM, FES	-	-	-
Philophyllum – 1/1				
P. tenuifolium (Mitt.) Broth.	FOD, FOM	-	-	-
Rhynchostegiopsis – 1/6				
R. flexuosa (Sull.) Müll. Hal.	FOD	-	-	-
METEORIACEAE – 12/199				
Aerobryopsis – 1/14				
A. capensis (Müll. Hal.) Fleisch.	FOD	-	-	-
Cryptopappilaria – 1/5				
C. penicillata (Hedw.) Dozy & Molk.	FOD	-	-	-
Floribundaria – 1/18				
F. flaccida (Miit.) Broth.	FOD, FOM, FED	-	-	-
Meteoriopsis – 1/10				
M. auronitens (Hornsch.) Broth.*	FOD, FOM, FED	-	-	-
Meteorium – 6/37				
M. araucariophila Fleisch.*	FOD, FOM, FED	-	-	-
M. deppei (Hornsch.) Mitt.	FOD, FOM, FES	-	-	-
M. gerale (Müll. Hal.) Broth.*	FOD, FOM, FED	-	-	-
M. medium (Ångstr.) Broth.*	FOD, FOM, FED	-	-	-
M. nigrescens (Hedw.) Dozy & Molk.	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
M. squamidioides Sehnem*	FOD	-	-	-
Toloxis – 1/3				
T. imponderosa (Tayl.) W.R. Buck	FOD	-	-	-
Trachypus – 1/5				
T. bicolor Reinw. & Hornsch.	FOD	-	-	-
MNIACEAE – 10/219				
Plagiomnium – 1/25				
P. rhynchophorum (Hook.) T.J. Kop.	FOD, FOM, FED	-	-	-
Pohlia – 4/127				
P. camptotrachela (Renauld & Cardot) Broth.	FOD	-	-	-
P. elongata Hedw.	FOD	-	-	-
P. papillosa (Müll. Hal. *ex* A. Jaeger) Broth.	FOD	-	-	-
P. tenuifolia (A. Jaeger) Broth.	FOD	-	-	-
Schizymenium – 5/51				
S. brevicaule (Hornsch.) A.J. Shaw & S.P. Churchill	-	-	-	-
S. campylocarpum (Arn. & Hook.) Shaw	FOD, FOM	-	-	-
S. lindigii (Hampe) A.J. Shaw	FOD	-	-	-
S. linearicaule (Müll. Hal.) A.J. Shaw	FOD	-	-	-
S. pusillum (Hook. f. & Wilson) A. J. Shaw	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
MYRINIACEAE – 5/27				
Austinia – 1/1				
A. tenuinervis (Mitt.) Müll. Hal.	FOD	-	-	-
Helicodontium – 3/21				
H. capillare (Hedw.) A. Jaeger	FOD, FOM, FED	-	-	-
H. clarazii (Duby) Par.*	FOM, FED	-	-	-
H. pervirens (Müll. Hal.) Par.	FES	-	-	-
Myrinia – 1/2				
M. brasiliensis (Hampe) Schimp.*	FOD, FOM, FED	-	-	-
NECKERACEAE – 20/305				
Homalia – 1/6				
H. glabella (Hedwig) Schimp.	FOD	-	-	-
Homaliodendron – 1/27				
H. piniforme (Brid.) Enroth.	FOD, FOM, FES	-	-	-
Isodrepanium – 1/1				
I. lentulum (Wilson) E. Britton	FOD	-	-	-
Neckera – 4/71				
N. caldensis Lindb.*	FOD, FOM, FED	-	-	-
N. scabridens Müll. Hal.	FOD, FOM, FED	-	-	-
N. urnigera Müll. Hal.	FOD, FOM	-	-	-
N. villae-ricae Besch.	FOD, FOM, FED	-	-	-
Neckeropsis – 3/30				
N. disticha (Hedw.) Kindb.	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
N. foveolata (Mitt.) Broth.	FOD	-	-	-
N. undulata (Hedw.) Reichardt.	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
Pinnatella – 1/16				
P. minuta (Mitt.) Broth.	FOD, FOM	-	-	-
Porotrichum – 8/38				
P. filiferum Mitt.	FOD	-	-	-
P. korthalsianum (Dozy & Molk.) Mitt.	FOD, FED, FES	-	-	-
P. lancifrons (Hampe) Mitt.	FOD, FOM, FED	-	-	-
P. leucocaulon Müll. Hal.	FOD, FOM, FED	-	-	-
P. longirostre (Hook.) Mitt.	FOD, FOM, FED	-	-	-
P. mutabile Hampe	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
P. substriatum (Hampe) Mitt.	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
P. thieleanarum (Müll. Hal.) Mitt.*	FOD, FOM, FED	-	-	-
Thamnobryum – 1/42				
T. fasciculatum (Hedw.) I. Sastre	FOD, FOM, FED	-	-	-
ORTHODONTIACEAE – 1/14				
Orthodontium – 1/14				
O. pellucens (Hook.) B.S.G.	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
ORTHOTRICHACEAE – 44/842				
Cardotiella – 1/7				
C. quinquefaria (Hornsch.) Vitt	FOD, FOM, FED	-	-	-
Groutiella – 3/13				
G. apiculata (Hook.) H.A. Crum & Steere	FOD, FOM, FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
G. tomentosa (Hornsch.) Wijk & Margad.	FOD, FES	-	-	-
G. tumidula (Mitt.) Vitt	FOD, FOM	-	-	-
Macrocoma – 4/10				
M. brasiliensis (Mitt.) Vitt*	FOD, FOM, FED	-	-	-
M. frigida (Müll. Hal.) Vitt	FOD	-	-	-
M. orthotrichoides (Raddi) Wijk & Margad.	FOD, FOM, FED	-	-	-
M. tenue (Müll. Hal.) Vitt	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
Macromitrium – 14/368				
M. adnatum Müll. Hal.	FOD, FES	-	-	-
M. argutum Hampe	FOD, FOM, FED	-	-	-
M. catharinense Paris*	FOD, FOM, FED	-	-	-
M. cirrosum (Hedw.) Brid. var. cirrosum	FOD, FOM, FED	-	-	-
M. guatemalense Müll. Hal.	FOD, FOM	-	-	-
M. longifolium (Hook.) Brid.	FOD, FES	-	-	-
M. microstomum (Hook. & Grev.) Schwägr.	FOD, FOM	-	-	-
M. nitidum Hook. f. & Wilson	FOD, FOM, FED	-	-	-
M. pellucidum Mitt.	FOD, FES	-	-	-
M. podocarpi Müll. Hal.	FOD, FES	-	-	-
M. punctatum (Hook. & Grev.) Brid.	FOD, FED	-	-	-
M. richardii Schwägr.	FOD, FOM, FED, FES, RST	-	-	-
M. stellulatum (Hornsch.) Brid.	FOD, FES	-	-	-
M. undatum Müll. Hal.*	FOD, FED	-	-	-
Orthotrichum – 2/146				
O. araucarieti Müll. Hal.	FOD, FOM, FED	-	-	-
O. diaphanum (Müll. Hal.) Lewinsky	FCA	-	-	-
Schlotheimia – 13/121				
S. appressifolia Mitt.	FOD, FOM, FED	-	-	-
S. breviseta Ångstr.*	FOD, FOM, FED	-	-	-
S. chamissonis Hornsch.*	FOD, FOM	-	-	-
S. clavata Geh. & Hampe*	FOD, FOM, FED	-	-	-
S. compacta Müll. Hal.*	FOD, FOM	-	-	-
S. fuscoviridis Hornsch.	FOD, FOM, FED	-	-	-
S. gracilescens Broth.*	FOD, FOM, FED	-	-	-
S. jamesonii (Arnott) Brid.	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
S. pseudoaffinis Müll. Hal.*	FOD, FED	-	-	-
S. rugifolia (Hook.) Schwägr.	FOD, FOM, FED, FES, RST, MAN	-	-	-
S. tecta Hook f. & Wilson	FOD, FOM, FED	-	-	-
S. torquata (Hedw.) Brid.	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
S. trichomitria Schwägr.	FOD, FOM, FED	-	-	-
Sehnemobryum – 1/1				
S. paraguense (Besch.) Lewinsky-Haapasaari & Hedenas*	FOM, FED	-	-	-
Zygodon – 6/92				
Z. campylophyllus Müll. Hal.*	FOD	-	-	-
Z. obtusifolius Hook.	FOD, FOM	-	-	-
Z. patrum Sehnem*	FOM	-	-	-
Z. pungens Müll. Hal.	FOD, FOM	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Z. reinwardtii (Hornsch.) A. Braun	FOD, FOM, FED	-	-	-
Z. viridissimus (Dicks.) Brid.	FOD	-	-	-
PHYLLOGONIACEAE – 2/3				
Phyllogonium – 2/3				
P. fulgens (Hedw.) Brid.	FOD, FOM, FES	-	-	-
P. viride Brid.	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
PILOTRICHACEAE – 43/442				
Brymela – 1/10				
B. fluminensis (Hampe) W. R. Buck*		-	-	-
Callicostella – 7/97				
C. apophysata (Hampe) A. Jaeger	FOD	-	-	-
C. depressa (Hedw.) A. Jaeger	FOD	-	-	-
C. martiana (Hornsch.) A. Jaeger	FOD, FOM, FED	-	-	-
C. merkelii (Hornsch.) A. Jaeger	FOD, FOM	-	-	-
C. microcarpa Ångstr.	FOD, FOM	-	-	-
C. pallida (Hornsch.) Ångstr.	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
C. rufescens (Mitt.) A. Jaeger	FOD	-	-	-
Crossomitrium – 3/10				
C. epiphyllum (Mitt.) Müll. Hal.	FOD	-	-	-
C. patrisiae (Brid.) Müll. Hal.	FOD, FOM, FES	-	-	-
C. saprophilum Broth.	FOD	-	-	-
Cyclodictyon – 5/90				
C. albicans (Hedw.) O. Kuntze	FOD, FOM, FED	-	-	-
C. limbatum (Hampe) O. Kuntze	FOD, FOM, FED	-	-	-
C. marginatum (Hook. f. & Wilson) O. Kuntze*	FOD, FOM, FED	-	-	-
C. olfersianum (Hornsch.) O. Kuntze	FOD, FOM, FED	-	-	-
C. varians (Sull.) O. Kuntze	FOD	-	-	-
Hypnella – 3/9				
H. pallescens (Hook.) A. Jaeger	FOD	-	-	-
H. pilifera (Hook. f. & Wilson) A. Jaeger	FOD, FOM, FED	-	-	-
H. punctata Broth.	FOD	-	-	-
Lepidopilidium – 5/31				
L. aureo-purpureum (Geh. & Hampe) Broth.*	FOD, FOM	-	-	-
L. brevisetum (Hampe) Broth.*	FOD, FOM, FED	-	-	-
L. laevisetum (Hampe) Broth.	FOD, FOM, FED	-	-	-
L. plebejum (Müll. Hal.) Sehnem	FOD, FOM, FED	-	-	-
L. potoricense (Müll. Hal.) H.A. Crum & Steere	FOD	-	-	-
Lepidopilum – 9/61				
L. affine Müll. Hal.	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
L. brevipes Mitt.	FOD, FOM, FED	-	-	-
L. caudicaule (Müll. Hal.) Broth.*	FOD, FOM	-	-	-
L. longifolium Hampe	FOD	-	-	-
L. muelleri (Hampe) Mitt.	FOD, FED	-	-	-
L. ovalifolium (Duby) Broth.*	FOD, FOM, FED	-	-	-
L. scabrisetum (Schwägr.) Steere	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
L. subsubulatum Geh. & Hampe*	FOD, FOM, FED	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
L. surinamense Müll. Hal.	FOD	-	-	-
Pilotrichum – 2/22				
P. bipinnatum (Schaegr.) Brid.	FOD	-	-	-
P. evanescens (Müll. Hal.) Müll. Hal.	FOD, FOM, FES	-	-	-
Thamniopsis – 5/14				
T. incurva (Hornsch.) W.R. Buck	FOD, FOM, FED	-	-	-
T. langsdorffi (Hook.) W.R. Buck	FOD, FOM, FED	-	-	-
T. pendula (Hook.) M. Fleisch.	FOD	-	-	-
T. purpureophylla (Müll. Hal. *ex* E. Britton.) W.R. Buck	FOD	-	-	-
T. undata (Hedw.) W.R. Buck	FOD, FOM	-	-	-
Trachyxiphium – 3/11				
T. aduncum (Mitt.) W.R. Buck	FOD, FED	-	-	-
T. guadalupense (Brid.) W.R. Buck	FOD, FOM, FED	-	-	-
T. variable (Mitt.) W.R. Buck	FOD, FED	-	-	-
PLAGIOTHECIACEAE – 2/52				
Plagiothecium – 2/52				
P. lucidum (Hook f. & Wilson) Paris	FOD, FOM	-	-	-
P. novogranatense (Hampe) Mitt.	FOD, FOM, FED	-	-	-
POLYTRICHACEAE – 14/218				
Atrichum – 2/20				
A. oerstedianum (Müll. Hal.) Nyholm	FOD, FOM, FED	-	-	-
A. polycarpum (Müll. Hal.) Mitt.	FOD, FED	-	-	-
*Itatiella** – 1/1				
I. ulei (Broth. *ex* Müll. Hal.) G.L. Smith*	FOD	-	-	-
Notoligotrichum – 1/9				
N. minimum (Cardot) G.L. Smith	FOM	-	-	-
Oligotrichum – 1/28				
O. denudatum G.L. Merill*	FOD	-	-	-
Pogonatum – 4/57				
P. campylocarpon (Müll. Hal.) Mitt.	FOD	-	-	-
P. pensilvanicum (E.B. Bartram *ex* Hedw.) P. Beauv.	FOD, FOM, FED	-	-	-
P. perichaetiale (Kunze *ex* Müll. Hal.) Hyvönen	FOD, FOM	-	-	-
P. tortile (Sw.) Brid.	FOD	-	-	-
Polytrichadelphus – 1/25				
P. pseudopolytrichum (Raddi) G.L. Smith.	FOD, FOM, FED	-	-	-
Polytrichum – 4/39				
P. angustifolium Mitt. *	FOD	-	-	-
P. commune L. *ex* Hedw.	FOD, FOM, FED	-	-	-
P. juniperinum Willd. *ex* Hedw.	FOD, FOM, FED	-	-	-
P. strictum Menzies *ex* Brid.	FOM	-	-	-
POTTIACEAE – 49/1.356				
Acaulon – 1/20				
A. uleanum Müll. Hal.*	FOM, FED	-	-	-
Anoectangium – 1/49				
A. aestivum (Hedw.) Mitt.	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Barbula – 3/171				
B. afrofontana (Müll. Hal.) Broth.	FOD	-	-	-
B. indica (Hook.) Spreng.	FOD, FES	-	-	-
B. riograndensis Bartr.*	FOD, FED	-	-	-
Chenia – 1/3				
C. leptophylla (Müll. Hal.) R.H. Zander	FOD, FOM	-	-	-
Didymodon – 2/122				
D. australasiae (Hook. & Grev.) R.H. Zander	FOD, FOM	-	-	-
D. rigidulus Hedw.	FOD	-	-	-
Dolotortula – 1/1				
D. mnifolia (Sull.) R H. Zander	FOD	-	-	-
Erythrophyllastrum – 1/1				
E. andinum (Sull.) R.H. Zander	FES	-	CR	ANEXO I
Eucladium – 1/1				
E. verticillatum (Brid.) B.S. & G.	FOD	-	-	-
Ganguleea – 1/1				
G. angulosa (Broth. & Dix.) R.H. Zander	FOD	-	-	-
Gyminostomiella – 1/5				
G. vernicosa (Harv.) M. Fleisch.	FOD	-	-	-
Hymenostyliella – 1/3				
H. alata (Herzog) Robins.*	FOD	-	-	-
Hymenostylium – 1/16				
H. recurvirostrum (Hedw.) Dixon	FOD, FOM	-	-	-
Hyophila – 2/72				
H. blanda (Hook. f. & Wilson) A. Jaeger	FOD	-	-	-
H. involuta (Hook.) A. Jaeger	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
Hyophiladelphus – 1/1				
H. agrarius (Hedw.) R.H. Zander	FOD, FES, RST	-	-	-
Leptodontium – 8/36				
L. araucarieti (Müll. Hal.) Paris	FOD, FOM, FED	-	-	-
L. filicola Herzog	FOD, FED	-	-	-
L. flexifolium (Dicks.) Hampe	FOD	-	-	-
L. luteum (Taylor) Mitt.	FOD	-	-	-
L. pungens (Mitt.) Kindb.	FED	-	-	-
L. stellatifolium (Hampe) Broth.*	FOD, FOM	-	-	-
L. viticulosoides (P. Beauv.) Wijk & Margad.	FOD, FOM, FED	-	-	-
L. wallisii (Müll. Hal.) Kindb.	FOD	-	VU	ANEXO I
Luisierella – 1/1				
L. barbula (Schwaegr) Steere	FOD	-	-	-
Molendoa – 1/15				
M. sendtneriana (Bruch, Schimp. & W. Gümbel) Limpr.	FOD, FOM	-	-	-
Plaubelia – 1/2				
P. sprengelii (Schwägr.) R.H. Zander	FOD, FES	-	-	-
Pleurochaete – 1/4				
P. luteola (Besch.) Thér.	FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Pseudocrossidium – 1/17				
P. replicatum (Taylor) R.H. Zander	FOD, FOM	-	-	-
Pseudosymblefaris – 2/10				
P. cavernarum (Broth.) R. H. Zander*	FOD	-	-	-
P. schimperiana (Paris) H.A. Crum	FOD, FOM, FED	-	-	-
Streptocalypta –1/4				
S. lorentziana Müll. Hal.	FOD, FOM, FED	-	-	-
Streptopogon – 2/13				
S. calymperes Müll. Hal.	FOD	-	-	-
S. cavifolius Mitt.	FOD, FOM, FED	-	-	-
Syntrichia – 3/79				
S. amphidiacea (Müll. Hal.) R.H. Zander	FOD, FOM	-	-	-
S. fragilis (J. Taylor) Ochyra	FOD, FED	-	-	-
S. pagorum (Midle) Amann	FOD, FOM, FED	-	-	-
Timmiella – 1/13				
T. barbuloides (Brid.) Moenk.	FOD	-	-	-
Tortella – 2/48				
T. humilis (Hedw.) Jenn.	FOD, FOM, FED	-	-	-
T. linearis (Web. & Mohr) R.H. Zander	FOD	-	-	-
Tortula – 1/144				
T. muralis Hedw.	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
Trichostomum – 3/116				
T. brachydontium Bruch.	FOD, FES	-	-	-
T. tenuirostre (Hook. & Taylor) Lindb.	FOD	-	-	-
T. termitarum (Müll. Hal.) R.H. Zander*	FOD	-	-	-
Weissia – 4/90				
W. breutelli Müll. Hal.	FOD, FOM, FED	-	-	-
W. controversa Hedw.	FOD, FOM, FED	-	-	-
W. glazioui R.H. Zander	FOD, FED	-	-	-
W. jamaicensis (Mitt.) Grout.	FOD, FOM	-	-	-
PRIONODONTACEAE – 1/9				
Prionodon – 1/9				
P. densus (Hedw.) Müll. Hal.	FOD, FOM, FED	-	-	-
PTERIGYNANDRACEAE – 1/26				
Trachyphyllum – 1/8				
T. dusenii (Müll. Hal. *ex* Broth.) Broth.	FOD	-	-	-
PTEROBRYACEAE – 12/169				
Calyptothecium – 1/30				
C. duplicatum (Schwägr.) Broth.	FOD, FOM, FED	-	-	-
Henicodium – 1/1				
H. geniculatum (Mitt.) W.R. Buck	FOD, FES	-	-	-
Hildebrantiella – 1/5				
H. guyanensis (Mont.) W.R. Buck	FOD	-	-	-
Jaegerina – 1/9				
J. scariosa (Lorentz) Arz.	FOD, FES	-	-	-
Orthostichopsis – 4/17				
O. tenuis (A. Jaeger) Broth.	FOD, FOM, FED	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
O. tetragona (Hedw.) Broth.	FOD, FES	-	-	-
O. tijucae (Müll. Hal.) Broth.*	FOD, FOM, FED	-	-	-
O. tortipilis (Müll. Hal.) Broth.	FOD, FES	-	-	-
Pireella – 2/12				
P. cymbifolia (Sull.) Cardot	FOD	-	-	-
P. pohli (Schwägr.) Card.	FOD, FOM	-	-	-
Pterobryon – 1/8				
P. densum (Schwägr.) Hornsch.	FOD, FOM, FED	-	-	-
Spiridentopsis – 1/1				
S. longissima (Raddi) Broth.	FOD, FOM	-	-	-
PTYCHOMITRIACEAE – 2/71				
Ptychomitrium – 2/54				
P. sellowianum (Müll. Hal.) A. Jaeger	FOD, FOM, FED	-	-	-
P. vaginatum Besch.*	FOD, FOM, FED	-	-	-
PTYCHOMNIACEAE – 1/15				
Ptychomnion – 1/5				
P. fruticetorum Müll. Hal.*	FOD, FOM, FED	-	-	-
RACOPILACEAE – 1/61				
Racopilum – 1/53				
R. tomentosum (Hedw.) Brid.	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
RHABDOWEISIACEAE – 2/25				
Oreoweisia – 1/15				
O. brasiliensis Hampe	FOD	-	-	-
Rhabdoweisia – 1/9				
R. fugax (Hedw.) B.S.G.	FOD	-	-	-
RHACHITHECIACEAE – 5/17				
Jonesiobryum – 2/3				
J. cerradense Vital *ex* B.H. Allen & Pursell	FOD	-	-	-
J. termitarum Vital *ex* B.H. Allen & Pursell*	FOD	-	-	-
Rhachithecium – 1/4				
R. perpusillum (Thaites & Mitt.) Broth.	FOD	-	-	-
Uleastrum – 1/2				
U. palmicola (Müll. Hal.) R.H. Zander	FOD, FOM, FED	-	-	-
Zanderia – 1/1				
Z. octoblepharis (A. Jaeger) Goffinet	FOD	-	-	-
RHACOCARPACEAE – 2/9				
Rhacocarpus – 2/8				
R. inermis (Müll. Hal.) Lindb.*	FOD, FOM, FED	-	-	-
R. purpurascens (Brid.) Paris	FOD, FED	-	-	-
RHIZOGONIACEAE – 3/34				
Hymenodon – 1/5				
H. aeruginosus (Hook f. & Wilson) Müll. Hal.	FOD, FOM, FED	-	-	-
Pyrrhobryum – 1/12				
P. spiniforme (Hedw.) Mitt.	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
Rhizogonium – 1/8				
R. novae-hollandiae (Brid.) Brid.	FOD	-	-	-


ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
RIGODIACEAE – 1/7				
Rigodium – 1/7				
R. toxarion (Schwägr.) Schimp.	FOD, FOM, FED	-	-	-
RUTTENBERGIACEAE – 1/7				
Pseudocryphaea – 1/1				
P. domingensis (Spreng.) W.R. Buck	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
SELIGERIACEAE – 2/83				
Blindia – 1/24				
B. magellanica Schimp. *ex* Müll. Hal.*	FOD	-	-	-
Brachydontium – 1/9				
B. notorogenes W.R. Buck & Schaf.-Verw.*	FOD	-	-	-
SEMATOPHYLLACEAE – 48/863				
Acroporium – 6/68				
A. caespitosum (Hedw.) W.R. Buck	FOD, FOM, FED	-	-	-
A. catharinense Sehnem*	FOD, FOM, FED	-	-	-
A. estrellae (Müll. Hal.) W.R. Buck & Schäf.-Verw.	FOD, FOM, FED	-	-	-
A. exiguum (Broth.) W.R. Buck & Schäf.-Verw.*	FOD	-	-	-
A. longirostre (Brid.) W.R. Buck	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
A. pungens (Hedw.) Broth.	FOD, FOM, FED	-	-	-
Aptychella – 1/7				
A. proligera (Broth.) Herzog	FOD, FOM	-	-	-
Aptychopsis – 3/4				
A. pungifolia (Hampe) Broth.*	FOD, FED	-	-	-
A. pyrrophylla (Müll. Hal.) Wijk & Margad.	FOD, FOM	-	-	-
A. subpungifolia (Broth.) Broth.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
Colobodontium – 1/1				
C. vulpinum (Mont.) S.P. Churchill	FOD, FED	-	-	-
Donnellia – 3/7				
D. commutata (Müll. Hal.) W.R. Buck	FOD	-	-	-
D. lagenifera (Müll. Hal.) W.R. Buck*	FOD, FOM, FED	-	-	-
D. lageniformis (Müll. Hal.) W.R. Buck	FOD, FOM, FED	-	-	-
Meiothecium – 2/32				
M. boryanum (Müll. Hal.) Mitt.	FOD	-	-	-
M. revolubile Mitt.	FOD, FES	-	-	-
*Paranapiacabeae** – 1/1				
P. paulista W.R. Buck & Vital*	FOD, FOM	-	-	-
Potamium – 1/1				
P. lonchophyllum (Mont.) Mitt.	FOD	-	-	-
Pterogonidium – 1/2				
P. pulchellum (Hook.) Müll. Hal.	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
Pylaisiadelpha – 1/7				
P. brasiliensis H.A. Crum*	FOD	-	-	-
Sematophyllum – 17/170				
S. adnatum (Michx.) Brid.	FOD, FED, RST	-	-	-
S. beyrichii (Hornsch.) Broth.	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
S. cataractae W.R. Buck*	FOM	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
S. cuspidiferum Mitt.	FOD	-	-	-
S. decumbens Mitt.	FOD, FOM, FED	-	-	-
S. galipense (Müll. Hal.) Mitt.	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
S. leucostomum (Hampe) W.R. Buck*	FOD, FOM, FED	-	-	-
S. lithophilum (Hornsch.) Ångstr.	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
S. macrorhynchium (Hornsch.) Mitt.*	FOD, FOM, FED	-	-	-
S. oedophysidium W.R. Buck	FOD	-	-	-
S. subfulvum (Broth.) Broth.*	FOD, FOM	-	-	-
S. subpinnatum (Brid.) E. Britton	FOD, FOM, FED, FES, RST, MAN	-	-	-
S. subsimplex (Hedw.) Mitt.	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
S. succedaneum (Hook f. & Wilson) Mitt.*	FOD, FOM, FED	-	-	-
S. swartzii (Schwägr.) W.H. Welch & H.A. Crum	FOD	-	-	-
S. tequendamense (Hampe) Mitt.	FOD	-	-	-
S. warmingii (Hampe) W.R. Buck*	FOD, FOM, FED	-	-	-
Taxithelium – 3/108				
T. juruense (Broth.) Broth.	FOD	-	-	-
T. planum (Brid.) Mitt.	FOD, FOM, FES	-	-	-
T. pluripunctatum (Ren. & Card.) W.R. Buck	FOD, FES	-	-	-
Trichosteleum – 7/130				
T. brachydictyon (Besch.) A. Jaeger	FOD	-	-	-
T. cyparissoides (Hornsch.) R.S. Williams	FOD, FOM, FED	-	-	-
T. glaziovii W.R. Buck*	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
T. papillosum (Hornsch.) A. Jaeger	FOD, FOM, FES	-	-	-
T. sentosum (Sull.) A. Jaeger	FOD, FES	-	-	-
T. subdemissum (Besch.) A. Jaeger	FOD	-	-	-
T. sublaevigatum Herzog*	FOD	-	-	-
Wijkia – 1/47				
W. flagellifera (Broth.) H.A. Crum	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
SPHAGNACEAE – 81/290				
Sphagnum – 81/290				
S. aciphyllum Müll. Hal.	FOD, FOM	-	-	-
S. acutirameum H.A. Crum*	FOD	-	-	-
S. aequalipunctatum H.A. Crum*	FOM	-	-	-
S. alegrense Warnst.	FOD, FOM	-	-	-
S. amoenoides H.A. Crum*	FOD	-	-	-
S. amoenum Warnst.*	FOD	-	-	-
S. atroligneum H.A. Crum*	FOM	-	-	-
S. billbuckii H.A. Crum*	FOD	-	-	-
S. bocainense H.A. Crum*	FOD	-	-	-
S. brachybolax Müll. Hal. *ex* Warnst.*	FOD, FOM, FED	-	-	-
S. brasiliense Warnst.*	FOD	-	-	-
S. brevirameum Hampe	FOD, FES	-	-	-
S. buckianum H.A. Crum*	FOD	-	-	-
S. capillifolium (Ehrhart) Hedw.	FOD, FOM, FED	-	-	-
S. carneum Müll. Hal. & Warnst.*	FOD	-	-	-
S. chi-chiense H.A. Crum	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
S. columniforme H.A. Crum*	FOD	-	-	-
S. contortulum H.A. Crum*	FOD	-	-	-
S. costae H.A. Crum & Pinheiro da Costa*	FOD	-	-	-
S. crumii Schaf.-Verw.*	FOD, FOM	-	-	-
S. cuspidatum Ehrh. *ex* Hoffm.	FOD, FOM, FED, RST	-	-	-
S. cyclophyllum Sull. & Lesq.	FOD, FOM	-	-	-
S. divisum H.A. Crum	FOD, FOM	-	-	-
S. exile H.A. Crum*	FOD	-	-	-
S. exquisitum H.A. Crum*	FOD, FOM	-	-	-
S. frahmii H.A. Crum*	FOD	-	-	-
S. geraisense H.A. Crum*	FOD	-	-	-
S. globicephalum Müll. Hal. *ex* Warnst.*	FOD, FOM	-	-	-
S. gracilescens Müll. Hal.*	FOD, FOM	-	-	-
S. guanabarae H.A. Crum*	FOD	-	-	-
S. harleyi H.A. Crum*	FOD	-	-	-
S. homophyllum H.A. Crum*	FOM	-	-	-
S. imbricatum Hornsch.*	FOD, FOM	-	-	-
S. itatiaiae Müll. Hal. & Warnst.*	FOD	-	-	-
S. laxulum H.A. Crum*	FOD	-	-	-
S. leonii H.A. Crum*	FOD	-	-	-
S. lindbergii Schimp.	FOD	-	-	-
S. longicomosum Müll. Hal. *ex* Warnst.	FOD	-	-	-
S. longistolo Müll. Hal.	FOD, FOM	-	-	-
S. luetzelburgii H.K.G. Paul *ex* H.A. Crum*	FOD	-	-	-
S. magellanicum Brid.	FOD, FOM, FED	-	-	-
S. meridense (Hampe) Müll. Hal.	FOD, FOM, FED	-	-	-
S. microcuspidatum H.A. Crum*	FOD, FED	-	-	-
S. mirabile Müll. Hal. & Warnst.*	FOD	-	-	-
S. molle Sull.	FOD	-	-	-
S. mosenii Warnst.*	FOD	-	-	-
S. multiporosum H.A. Crum*	FED	-	-	-
S. obliquefibrosum H.A. Crum*	FOM	-	-	-
S. ornatum H.A. Crum	FOD	-	-	-
S. oxyphyllum Warnst.	FOD, FOM	-	-	-
S. palustre L.	FOD, FOM, FED, FES, RST	-	-	-
S. papillosum Lindb.	FOD	-	-	-
S. paranense H.A. Crum	FOM	-	-	-
S. parcoramosum H.A. Crum*	FOM	-	-	-
S. pendulirameum H.A. Crum*	FOD	-	-	-
S. perforatum Warnst.	FOD, FOM	-	-	-
S. perichaetiale Hampe	FOD, FOM, FED, FES, RST	-	-	-
S. platyphylloides Warnst.	FOD	-	-	-
S. pluriporosum H.A. Crum*	FOD, FOM	-	-	-
S. pseudoramulinum H.A. Crum*	FOD	-	-	-
S. ramulinum Warnst.*	FOD	-	-	-
S. recurvum P. Beauv.	FOD, FOM, FED	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
S. roseum Warnst.*	FOD	-	-	-
S. rotundatum Müll. Hal. & Warnst.*	FOD, FOM	-	-	-
S. sanguinale Warnst.	FOD	-	-	-
S. scorpioides (Hampe) H.A. Crum*	FOD	-	-	-
S. sehnemii H. A. Crum*	FOM	-	-	-
S. septatoporosum H.A. Crum*	FOD	-	-	-
S. sparsum Hampe	FOD, RST	-	-	-
S. strictum Sull.	FOD	-	-	-
S. subhomophyllum H.A. Crum*	FOD	-	-	-
S. submedium Warnst.*	FOD	-	-	-
S. subsecundum Nees	FOD, FOM, FED	-	-	-
S. sucrei H. A. Crum*	FOD	-	-	-
S. tabuleirense O. Yano & H.A. Crum*	FOD, RST	-	-	-
S. tenellum Ehrh. *ex* Hoffm.	FOD	-	-	-
S. tenerum Sull. & Lesq.	FOD, FOM, FED	-	-	-
S. triporosum H.A. Crum*	FOD	-	-	-
S. turgens Warnst.*	FOD	-	-	-
S. umbrosum Warnst.*	FOD	-	-	-
S. vitalii H.A. Crum*	FOD	-	-	-
SPLACHNACEAE – 4/73				
Moseniella – 1/2				
M. brasiliensis Broth.*	FOD	-	-	-
Tayloria – 1/41				
T. arenaria (Müll. Hal.) Broth.	FOD	-	-	-
Tetraplodon – 2/9				
T. itatiaiae Müll. Hal.*	FOD, FED	-	-	-
T. tomentosus Sehnem*	FOM	-	-	-
SPLACHNOBRYACEAE – 1/26				
Splachnobryum – 1/26				
S. obtusum (Brid.) Müll. Hal.	FOD, FED	-	-	-
STEREOPHYLLACEAE – 6/50				
Entodontopsis – 3/17				
E. leucostega (Brid.) W.R. Buck & Ireland	FOD, FES	-	-	-
E. nitens (Mitt.) W.R. Buck & Ireland	FOD, FOM, FES	-	-	-
E. panamensis (Bartr.) W.R. Buck & Ireland	FOD	-	-	-
Eulacophyllum – 1/1				
E. cultelliforme (Sull.) W.R. Buck & Ireland	FOD, FOM, FES	-	-	-
Pilosium – 1/1				
P. chlorophyllum (Hornsch.) Müll. Hal.	FOD, FES	-	-	-
Stereophyllum – 1/23				
S. radiculosum (Hook.) Mitt.	FOD, FOM, RST	-	-	-
SYMPHYODONTACEAE – 1/95				
Symphyodon – 1/17				
S. imbricatifolius (Mitt.) S.P. Churchill	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
THUIDIACEAE – 15/139				
Pelekium – 5/3				
P. involvens (Hedw.) Touw	FOD	-	-	-
P. minutulum (Hedw.) Touw	FOD, FOM, FED	-	-	-
P. scabrosulum (Mitt.) Touw	FOD	-	-	-
P. schistocalyx (Müll. Hal.) Touw	FOD	-	-	-
P. subpinnatum (Broth.) Touw	FOD	-	-	-
Thuidiopsis – 1/7				
T. furfurosa (Hook f. & Wilson) M. Fleisch.	FOD, FOM, FED	-	-	-
Thuidium – 9/73				
T. brasiliense Mitt.	FOD, FOM, FED	-	-	-
T. delicatulum (Hedw.) Bruch & Schimp.	FOD, FES	-	-	-
T. granulatum (Hampe) A. Jaeger*	FOD	-	-	-
T. patrum Sehnem*	FOM	-	-	-
T. pseudoprotensum (Müll. Hal.) Mitt.	FOD, FOM, FED	-	-	-
T. serricola (Müll. Hal.) Paris	FOM	-	-	-
T. tamariscinum (Hedw.) B.S.G.	FOD, FED	-	-	-
T. tomentosum Schimp. *ex* Besch.	FOD, FOM, FES	-	-	-
T. urceolatum Lorentz	FOD, FOM, FED	-	-	-



Lista das Pteridófitas

Anemiaceae

Alexandre Salino & Thaís Elias Almeida

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
ANEMIACEAE – 39/100				
Anemia – 39/100				
A. alfredi-rohrii Brade*	FOD	-	-	-
A. aspera (Fée) Baker*	FOD	-	-	-
A. blechnoides Sm.*	FOD, FES	-	CR	ANEXO II
A. candidoi Brade	FED	-	-	-
A. collina Raddi	FES, AFL	-	-	-
A. dentata Gardner	FES	-	-	-
A. duartei Brade	FOD, FES	-	-	-
A. elegans (Gardner) C. Presl	FOD, FCA	-	-	-
A. espiritosantensis Brade*	FOD, FES	-	-	-
A. ferruginea Kunth	FOD, FES, FCA	-	-	-
A. flexuosa (Savigny) Sw.	FOD, FES	-	-	-
A. gardneri Hook.*	FOD, FES, FCA	-	EN	ANEXO II
A. glaziosa Gardner	FCA	-	-	-
A. gomesii Christ	FCA	-	-	-
A. hirsuta (L.) Sw.	FOD, FES, FED	-	-	-
A. hirta (L.) Sw.	FOD, FES	-	-	-
A. imbricata J.W. Sturm	FOD, FES, FCA	-	-	-
A. lanuginosa Brongn. *ex* J.W. Sturm	FES, FCA	-	-	-
A. luetzelburgii Rosenst.*	FOD, FES	-	-	-
A. mandioccana Raddi*	FOD, FES	-	-	-
A. oblongifolia (Cav.) Sw.	FOD, FES, FCA	-	-	-
A. organensis Rosenst.*	FOD, FCA	-	EN	ANEXO II
A. ouropretana Christ	FOD, FES	-	-	-
A. pallida Gardner	FES	-	-	-
A. pastinacaria Moritz *ex* Prantl	FOD, FES	-	-	-
A. phyllitidis (L.) Sw.	FOD, FES, FED	-	-	-
A. presliana Prantl	FOD, FCA	-	-	-
A. raddiana Link	FOD, FES	-	-	-
A. repens Raddi	FCA	-	-	-
A. retroflexa Brade*	FES	-	-	-
A. rotundifolia Schrad.	FES, FED	-	-	-
A. simplicior (Christ) Mickel*	FOD	-	-	-
A. spicantoides Mabb.*	FOD	-	-	-
A. tenella (Cav.) Sw.	FES, FED	-	-	-
A. tenera Pohl *ex* J.W. Sturm	FES	-	-	-
A. tomentosa (Savigny) Sw.	FOD, FES, FED	-	-	-

(*) Caráter endêmico do grupo taxonômico: gênero e espécie.
Os números que estão à frente de cada gênero e família representam o número de espécies ocorrentes na Floresta Atlântica e número total de espécies ocorrentes no mundo, repectivamente.
Vegetação: FOD – Floresta Ombrófila Densa/Aberta; FOM – Floresta Ombrófila Mista; FES – Floresta Estacional Semidecidual; FED – Floresta Estacional Decidual; FCA – Formações Campestres; AFL – Afloramentos Rochosos; RST – Restinga; MAN – Manguezal; RUD – Ruderal.
Categoria de Ameaça: CR – Criticamente em Perigo; EN – Em Perigo; VU – Vulnerável; EX – Extinta; EW – Extinta na Natureza; ANEXO I – Ameaçada e ANEXO II – Dados Deficientes.

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
A. ulbrichtii Rosenst.*	FOD	-	-	-
A. villosa Willd.	FOD, FES, FCA	-	-	-
A. warmingii Prantl*	FOD, FES	-	-	-

Aspleniaceae

Lana da Silva Sylvestre

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
ASPLENIACEAE – 58/654				
Antigramma – 3/4				
A. balansae (Baker) L. Sylvestre & P.G. Windisch*	FOD, FES	-	-	-
A. brasiliensis (Sw.) T. Moore*	FOD, FOM	-	-	-
A. plantaginea (Schrad.) C. Presl*	FOD	-	CR	ANEXO II
Asplenium – 55/650				
A. abscissum Willd.	FOD, FOM, FES	-	-	-
A. alatum Willd.	FOD	-	-	-
A. auriculatum Sw.	FOD, FOM, FES	-	-	-
A. auritum Sw.	FOD, FOM, FES	-	-	-
A. austrobrasiliense (Christ) Maxon*	FOD	-	-	-
A. badinii L. Sylvestre & P.G. Windisch*	FOD	-	-	-
A. bradeanum Handro*	FOD	-	VU	ANEXO I
A. bradei Rosenst.*	FOD	-	-	-
A. campos-portoi Brade*	FOD	-		
A. cariocanum Brade*	FOD	-	-	-
A. castaneum Schltdl. & Cham.	FOD	-	CR	ANEXO I
A. cirrhatum Rich. *ex* Willd.	FOD, FOM	-	-	-
A. claussenii Hieron.	FOD, FOM	-	-	-
A. cristatum Lam.	FOD, FES	-	-	-
A. dimidiatum Sw.	FES	-	-	-
A. feei Kunze *ex* Fée	FOD, FOM	-	-	-
A. flabellulatum Kunze	FOD	-	-	-
A. formosum Willd.	FOD, FES	-	-	-
A. gastonis Fée*	FOD, FOM	-	EN	ANEXO II
A. harpeodes Kunze	FOD, FOM	-	-	-
A. inaequilaterale Willd.	FOD, FOM	-	-	-
A. incurvatum Fée*	FOD, FOM	-	-	-
A. kunzeanum Klotzsch. *ex* Rosenst.*	FOD, FOM	-	-	-
A. lacinulatum Schrad.	FOD	-	-	-
A. laetum Sw.	FOD, FES	-	-	-
A. martianum C. Chr.*	FOD, FOM	-	-	-
A. monanthes L.	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
A. mourai Hieron.*	FOD	-	-	-
A. mucronatum C. Presl*	FOD, FOM	-	-	-
A. muellerianum Rosenst.*	FOD	-	-	-
A. oligophyllum Kaulf.	FOD, FOM	-	-	-
A. otites Link	FOD, FES	-	-	-
A. pediculariifolium A. St.-Hil.	FES	-	-	-
A. praemorsum Sw.	FOD, FES	-	-	-
A. pseudonitidum Raddi*	FOD	-	-	-
A. pteropus Kaulf.	FOD, FOM	-	-	-
A. pulchellum Raddi*	FOD	-	-	-
A. pumilum Sw.	FOD, FES	-	-	-
A. raddianum Gaudich.	FOD	-	-	-
A. radicans L.	FOD, FOM	-	-	-
A. regulare Sw.*	FOD	-	-	-
A. resiliens Kunze	FOD	-	-	-
A. scandicinum Kaulf.*	FOD, FOM	-	-	-
A. schwackei Christ*	FES	-	CR	ANEXO I
A. sellowianum (Hieron.) Hieron.	FOD, FOM	-	-	-
A. serra Langsd. & Fisch.	FOD, FOM, FES	-		
A. serratum L.	FOD, FOM	-	-	-
A. squamosum L.	FOD, FOM	-	-	-
A. stuebelianum Hieron.	FOD, FES	-	-	-
A. theciferum (Kunth) Mett.	FOD	-		
A. triquetrum N. Murak. & R.C. Moran	FOD, FOM	-	-	-
A. trunconum F.B. Matos, Labiak & Sylvestre*	FOD	-	-	-
A. ulbrichtii Rosenst.	FOD, FOM	-	-	-
A. uniseriale Raddi	FOD, FOM	-	-	-
A. wacketii Rosenst.*	FOD	-	-	-

Blechnaceae

Vinícius Antônio de Oliveira Dittrich

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
BLECHNACEAE – 27/202				
Blechnum – 26/200				
B. andinum (Baker) C. Chr.	FCA	-	CR	ANEXO I
B. asplenioides Sw.	FES	-	-	-
B. australe L.	FOM, FCA, RST	-	-	-
B. austrobrasilianum de la Sota	FOD, FOM, FES, FED, FCA	-	-	-
B. binervatum (Poir.) C.V. Morton & Lellinger	FOD, FOM, FES, FED, RST	-	-	-
B. brasiliense Desv.	FOD, FOM, FES, FED, RST	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
B. cordatum (Desv.) Hieron.	FOD, FOM, FES	-	-	-
B. divergens (Kunze) Mett.	FOD, FES, FED	-	-	-
B. glaziovii Christ	FOD, FES	-	-	-
B. gracile Kaulf.	FOD, FES, FED	-	-	-
B. laevigatum Cav.	FOM, FES	-	-	-
B. lanceola Sw.	FOD, FES, FED	-	-	-
B. lehmannii Hieron.	FOD, FES	-	-	-
B. occidentale L.	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
B. organense Brade	FOD, FOM	-	-	-
B. penna-marina (Poir.) Kuhn	FCA	-	-	-
B. polypodioides Raddi	FOD, FOM, FES	-	-	-
B. proliferum Rosenst.	FOD, FES	-	-	-
B. pteropus (Kunze) Mett.*	FOD	-	-	-
B. sampaioanum Brade*	FOD	-	-	-
B. schomburgkii (Klotzsch) C. Chr.	FOD, FOM, FES, FED, FCA	-	-	-
B. serrulatum Rich.	FOD, FES, RST, FCA	-	-	-
B. spannagelii Rosenst.*	FOD, FOM, FCA	-	-	-
B. sprucei C. Chr.	FOD	-	CR	ANEXO I
B. squamipes (Hieron.) M. Kessler & A.R. Sm.	FOD, FOM	-	EN	ANEXO I
B. usterianum (Christ) C. Chr.	FCA	-	-	-
Salpichlaena – 1/2				
S. volubilis (Kaulf.) J. Sm.	FOD, FED	-	-	-

Culcitaceae

Alexandre Salino & Thaís Elias Almeida

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
CULCITACEAE – 1/2				
Culcita – 1/2				
C. coniifolia (Hook.) Maxon	FCA	-	EN	ANEXO II

Cyatheaceae

Alexandre Salino & Thaís Elias Almeida

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
CYATHEACEAE – 25/600				
Alsophila – 4/235				
A. capensis subsp. *polypodioides* (Sw.) Conant	FOD, FES	-	-	-
A. salvinii Hook.	FOD	-	-	-
A. setosa Kaulf.*	FOD, FES	-	-	-
A. sternbergii (Pohl *ex* Sternb.) D.S. Conant	FOD, FES	-	-	-
Cnemidaria – 1/25				
C. uleana (Samp.) R.M. Tryon	FOD, FES	-	-	-
Cyathea – 19/120				
C. abreviata Fernandes*	FOD	-	-	-
C. atrocastanea Labiak & F.B. Matos*	FOD	-	-	-
C. atrovirens (Langsd. & Fisch.) Domin*	FOD, FES	-	-	-
C. axillaris (Fée) Lellingert *	FOD, FES	-	-	-
C. bipinnatifida (Baker) Domin	FOD	-	-	-
C. corcovadensis (Raddi) Domin	FOD, FES, FCA	-	-	-
C. delgadii Sternb.	FOD, FES, FCA	-	-	-
C. dichromatolepis (Fée) Domin*	FOD, FES	-	-	-
C. glaziovii (Fee) Domin*	FOD	-	-	-
C. hirsuta C. Presl*	FOD, FES	-	-	-
C. macrocarpa (C. Presl) Domin	FOD	-	-	-
C. microdonta (Desv.) Domin	FOD, FES, MAN	-	-	-
C. myriotricha (Baker) R.C. Moran & J. Prado	FOD, FES	-	-	-
C. phalerata Mart.	FOD, FES, FCA	-	-	-
C. poeppigii (Hook.) Domin	FOD, FES	-	-	-
C. praecincta (Kunze) Domin*	FOD	-	-	-
C. pungens (Willd.) Domin	FOD, FES	-	-	-
C. rufa (Fée) Lellinger*	FOD, FES	-	-	-
C. villosa Willd.	FOD, FES, FCA	-	-	-
Sphaeropteris – 1/110				
S. gardneri (Hook.) R.M. Tryon*	FOD, FOM, FES	-	-	-

Dennstaedtiaceae

Alexandre Salino & Thaís Elias Almeida

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
DENNSTAEDTIACEAE – 13/170				
Blotiella – 1/15				
B. lindeniana (Hook.) R.M. Tryon	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Dennstaedtia – 4/45				
D. cicutaria (Sw.) T. Moore	FOD, FES	-	-	-
D. cornuta (Kaulf.) Mett.	FOD	-	-	-
D. dissecta (Sw.) T. Moore	FOD, FES	-	-	-
D. globulifera (Poir.) Hieron.	FOD, FES, FED	-	-	-
Histiopteris – 1/1				
H. incisa (Thunb.) J.Sm.	FOD, FES, FCA	-	-	-
Hypolepis – 4/45				
H. aquilinaris (Fée) Christ	FOD, FES	-	-	-
H. mitis Kunze *	FOD, FOM	-	-	-
H. repens (L.) C. Presl	FOD, FES	-	-	-
H. stolonifera Fée*	FOD	-	-	-
Microlepia – 1/45				
M. speluncae (L.) T. Moore	FOD	-	-	-
Paesia – 1/12				
P. glandulosa (Sw.) Kuhn	FOD, FCA	-	-	-
Pteridium – 1/12				
P. arachnoideum (Kaulf.) Maxon	FOD, FES, FCA	-	-	-

Dicksoniaceae

Alexandre Salino & Thaís Elias Almeida

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
DICKSONIACEAE– 2/30				
Dicksonia – 1/20				
D. sellowiana (Hook.) Maxon	FOD, FES	-	EN	ANEXO I
Lophosoria – 1/3				
L. quadripinnata (J.F. Gmel.) C. Chr.	FOD, FES	-	-	-

Dryopteridaceae

Alexandre Salino, Thaís Elias Almeida & Luciana Cláudio Neves Melo

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
DRYOPTERIDACEAE – 126/1700				
Arachniodes – 1/50				
A. denticulata (Sw.) Ching	FOD, FES, FOM	-	-	-
Bolbititis – 1/45				
B. serratifolia Schott	FOD, FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Ctenitis – 15/150				
C. abyssi (Sehnem) Salino & Morais*	FOD, FCA	-	-	-
C. ampla (Willd.) Ching	FES	-	-	-
C. anniesii (Rosenst.) Copel.*	FOD	-	-	-
C. aspidioides (C. Presl) Copel.*	FOD, FES	-	-	-
C. bigarellae Schwartsb., Labiak & Salino*	FES	-	-	-
C. deflexa (Kaulf.) Copel.*	FOD	-	-	-
C. distans (Brack.) Ching*	FOD, FES	-	-	-
C. eriocaulis Fée*	FOD, FES	-	-	-
C. falciculata (Raddi) Ching	FOD, FES	-	-	-
C. fenestralis (C. Chr.) Copel.*	FOD	-	-	-
C. flexuosa (Fée) Copel.*	FOD	-	-	-
C. laetevirens (Rosenst.) Salino & Morais*	FOD	-	-	-
C. nigrovenia (Christ) Copel.	FOD	-	-	-
C. pedicellata (Christ) Copel.	FOD	-	-	-
C. submarginalis (Langsd. & Fisch.) Ching	FOD, FES	-	-	-
Cyclodium – 2/10				
C. heterodon (Schrad.) T. Moore*	FOD, FES	-	-	-
C. meniscioides (Willd.) C. Presl	FOD, FES	-	-	-
Didymochlaena – 1/1				
D. truncatula (Sw.) J. Sm.	FOD, FES	-	-	-
Dryopteris – 2/225				
D. patula (Sw.) Underw.	FOD, FES, FOM	-	-	-
D. wallichiana (Spreng.) Hyl.	FOD, FOM	-	-	-
Elaphoglossum – 62/600				
E. acrocarpum (Mart.) T. Moore*	FES	-	-	-
E. actinotrichum (Mart.) T. Moore	FES, FOD	-	-	-
E. alpestre (Gardner) T. Moore*	FOD	-	-	-
E. ambiguum (Mett. *ex* Christ) Alston	FOD	-	-	-
E. amplissimum (Fée) Christ*	FOD	-	-	-
E. angustum (Fée) Christ*	FOD	-	-	-
E. apparicioi Brade*	FES	-	-	-
E. badinii Novelino	FES	-	-	-
E. bahiense Rosenst.*	FES	-	-	-
E. beaurepairei (Fée) Brade	FES, FOD	-	-	-
E. beckeri Brade	AFL	-	CR	ANEXO II
E. bellermanianum (Klotzsch) T. Moore	FES, FOD	-	-	-
E. burchelii (Baker) C. Chr.	FES, FOD	-	-	-
E. chrysolepis (Fée) Alston*	FOD	-	-	-
E. decoratum (Kunze) T. Moore	FES, FOD	-	-	-
E. didymoglossoides C. Chr.*	FOD	-	-	-
E. dutrae Brade*	FOD	-	-	-
E. edwalii Rosenst.	FOD	-	-	-
E. gardnerianum (Kunze *ex* Fée) T. Moore	FOD	-	-	-
E. gayanum (Fée) T.Moore	FES, FOD	-	-	-
E. gehrtii Sehnem*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
E. glabellum J. Sm.	FES, FOD	-	-	-
E. glaziovii (Fée) Brade	FOD	-	-	-
E. herminieri (Bory *ex* Fée) T. Moore	FOD	-	-	-
E. horridulum (Kaulf.) J. Sm.	FOD	-	-	-
E. huacsaro (Rúiz) Christ.	FOD	-	-	-
E. hybridum (Bory) Brack.	FES, FOD	-	-	-
E. hymenodiastrum (Fée) Brade	FES, FOD	-	-	-
E. iguapense Brade*	FOD, RST	-	-	-
E. itatiayense Rosenst.	FES, FOD	-	-	-
E. jamesonii (Hook. & Grev.) T. Moore	FCA	CR	-	-
E. lagesianum Rosent.*	FES, FOD	-	-	-
E. langsdorffii (Hook. & Grev.) T. Moore	FES, FOD	-	-	-
E. liaisianum (Glaz. *ex* Fée) Brade*	FCA	-	-	-
E. lineare (Fée) T. Moore	FOD	-	-	-
E. lingua (C. Presl) Brack.	FES, FOD	-	-	-
E. longifolium (Jacg.) J. Sm.	FES, FOD	-	-	-
E. Luridum (Fée) Christ.	FES, FOD	-	-	-
E. macahense (Fée) Rosenst.*	FES, FOD	-	-	-
E. nigrescens (Hook.) T. Moore	FOD	-	-	-
E. obliquatum (Fée) Christ*	FOD	-	-	-
E. omphalodes (Fée) Brade*	FCA	-	-	-
E. organense Brade*	FOD	-	-	-
E. pachydermum (Fée) T. Moore	FES	-	-	-
E. paulistanum Rosenst.*	FOD	-	-	-
E. peltatum (Sw.) Urb.	FOD	-	-	-
E. plumosum (Fée) T. Moore	FES, FOD	-	-	-
E. pteropus C. Chr.	FES, FOD	-	-	-
E. reitzii Brade*	FOD	-	-	-
E. scalpellum (Mart.) T.Moore	FOD	-	-	-
E. scolopendrifolium (Raddi) J. Sm.	FES, FOD	-	-	-
E. sehnemii Brade*	FOD	-	-	-
E. squamipes (Hook.) T. Moore	FOD	-	-	-
E. strictum (Raddi) T. Moore	FOD	-	-	-
E. tectum (Willd.) T. Moore	FES, FOD	-	-	-
E. tenax Rosenst.	FOD	-	-	-
E. tenuiculum (Fée) T. Moore*	FES	-	-	-
E. ulei Christ	FOD	-	-	-
E. vagans (Mett.) Hieron.	FES, FOD	-	-	-
E. villosum (Sw.) J. Sm.	FOD	-	-	-
E. viscidum (Fée) Christ*	FOD, FCA	-	-	-
E. wettsteinii Christ*	FOD	-		-
Lastreopsis – 3/36				
L. acuta (Hook.) Tindale*	FES	-	-	-
L. amplissima (C. Presl) Tindale	FOD, FES	-	-	-
L. effusa (Sw.) Tindale	FES	-	-	-
Lomagramma – 1/1				
L. guianensis (Aubl.) Ching	FOD, FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Megalastrum – 18/55				
M. abundans (Rosenst.) A.R. Sm. & R.C. Moran*	FOD, FES	-	-	-
M. adenopteris (C. Chr.) A.R. Sm. & R.C. Moran	FOD	-	-	-
M. albidulum R.C. Moran, J. Prado & Labiak*	FOD	-	-	-
M. brevipubens R.C. Moran, J. Prado & Labiak *	FOD	-	-	-
M. canescens (Kunze *ex* Mett.) A.R. Sm. & R.C. Moran*	FOD	-	-	-
M. connexum (Kaulf.) A.R. Sm. & R.C. Moran*	FOD, FES	-	-	-
M. crenulans (Fée) A.R. Sm. & R.C. Moran*	FOD, FES, FOM	-	-	-
M. eugenii (Brade) A.R. Sm. & R.C. Moran*	FOD, FES	-	-	-
M. grande (C. Presl) A.R. Sm. & R.C. Moran*	FOD, FES	-	-	-
M. inaequale (Kaulf. *ex* Link) A.R. Sm. & R.C. Moran*	FOD, FES	-	-	-
M. indusiatum R.C. Moran, J. Prado & Labiak*	FOD	-	-	-
M. littorale R.C. Moran, J. Prado & Labiak*	FOD	-	-	-
M. oreocharis (Sehnem) Ponce & Salino	FOD, FOM	-	-	-
M. organense R.C. Moran, J. Prado & Labiak*	FOD	-	-	-
M. retrorsum R.C. Moran, J. Prado & Labiak*	FOD	-	-	-
M. substrigosum R.C. Moran, J. Prado & Labiak*	FOD	-	-	-
M. umbrinum (C. Chr.) A.R. Sm. & R.C. Moran*	FOD, FES	-	-	-
M. wacketii (Rosenst. *ex* C. Chr.) A.R. Sm. & R.C. Moran*	FOD	-	-	-
Olfersia – 1/1				
O. cervina (L.) Kunze	FOD, FES	-	-	-
Polybotrya – 6/35				
P. cylindrica Kaulf.*	FOD, FES	-	-	-
P. espiritosantensis Brade*	FOD	-	-	-
P. goyazensis Brade	FES	-	-	-
P. semipinnata Fée*	FOD	-	-	-
P. sorbifolia Kuhn	FOD	-	-	-
P. speciosa Schott*	FOD, FES	-	-	-
Polystichum – 4/200				
P. bradei Rosenst.*	FOD	-	EN	ANEXO II
P. montevidense (Spreng.) Rosenst.	FOD, FES	-	-	-
P. platyphyllum (Willd.) C. Presl	FES	-	-	-
P. rochaleanum Glaz.*	FCA	-	-	-
Rumohra – 3/6				
R. adiantiformis (G. Forst) Ching	FOD, FES, FOM, AFR, RST	-	-	-
R. quadrangularis (Fée) Brade*	FCA	-	-	-
R. turficola Senna*	FCA	-	-	-
Stigmatopteris – 6/23				
S. brevinervis (Fée) R.C. Moran*	FOD, FES	-	-	-
S. caudata (Raddi) C. Chr.*	FOD	-	-	-
S. heterocarpa (Fée) Rosenst.*	FOD	-	-	-
S. prionites (Kunze) C. Chr.*	FOD, FES	-	-	-
S. tyucana (Raddi) C. Chr.*	FOD, FES	-	-	-
S. ulei (Christ) Sehnem*	FOD	-	-	-

Equisetaceae

Alexandre Salino & Thaís Elias Almeida

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
EQUISETACEAE – 1/15				
Equisetum – 1/15				
E. giganteum L.	FES, FCA	-	-	-

Gleicheniaceae

Alexandre Salino, Thaís Elias Almeida & Marcela Maia Viana

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
GLEICHENIACEAE –13/125				
Dicranopteris – 3/10				
D. flexuosa (Schrad.) Underw.	FOD, FES, FCA	-	-	-
D. nervosa (Kaulf.) Maxon	FOD, FCA	-	-	-
D. rufinervis (Mart.) Ching	FOD, FES	-	-	-
Gleichenella – 1/1				
G. pectinata (Willd.) Ching	FOD, FES	-	-	-
Sticherus – 9/90				
S. bifidus (Willd.) Ching	FOD, FES	-	-	-
S. decurrens (Raddi) J. Gonzales	FOD	-	-	-
S. ferrugineus (Raddi) J. Gonzales	FES	-	-	-
S. gracilis (Mart.) Copel.	FOD, FES, FCA	-	-	-
S. lanosus (Christ) J. Gonzales	FOD, FES	-	-	-
S. lanuginosus (Fée) Nakai	FOD, FES, FCA	-	-	-
S. nigropaleaceus (J.W. Sturm) J. Prado & Lellinger	FOD, FES	-	-	-
S. pruinosus (Mart.) Ching	FOD, FCA	-	-	-
S. remotus (Kaulf.) Chrysler	FOD	-	-	-

Hymenophyllaceae

Alexandre Salino & Thaís Elias Almeida

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
HYMENOPHYLLACEAE – 50/600				
Abrodyctium – 1/25				
A. rigidum (Sw.) Ebihara & Dubuisson	FOD, FES	-	-	-
Didymoglossum – 9/30				
D. angustifrons Fée	FOD	-	-	-
D. hymenoides (Hedw.) Copel.	FOD, FOM	-	-	-
D. kapplerianum (J.W. Sturm) Ebihara & Dubuisson	FOD	-	-	-
D. krausii (Hook. & Grev.) C. Presl	FOD, FES	-	-	-
D. nummularium Bosch.	FOD	-	-	-
D. ovale E. Fourn.	FOD	-	-	-
D. punctatum (Poir.) Desv.	FOD	-	-	-
D. pusillum (Sw.) Desv.	FOD	-	-	-
D. reptans (Sw.) C. Presl	FOD	-	-	-
Hymenophyllum – 21/250				
H. asplenioides (Sw.) Sw.	FOD, FES	-	-	-
H. caparaoense Brade*	FOD	-	-	-
H. caudiculatum Mart.	FOD, FES, FCA	-	-	-
H. crispum Kunth	FOD	-	-	-
H. elegans Spreng.	FOD, FES	-	-	-
H. fendlerianum J.W. Sturm	FOD	-	-	-
H. filmenofilicum Christenh. & Schwartsb.*	FOM	-	-	-
H. fragile (Hedw.) C.V. Morton	FOD, FES	-	-	-
H. fucoides (Sw.) Sw.	FOD	-	-	-
H. glaziovii Baker*	FOD	-	-	-
H. hirsutum (L.) Sw.	FOD	-	-	-
H. magellanicum Willd. *ex* Kunze	FOD	-	VU	ANEXO II
H. microcarpum Desv.	FOD	-	-	-
H. peltatum (Poir.) Desv.	FCA	-	EN	ANEXO II
H. plumosum Kaulf.	FOD, FES	-	-	-
H. polyanthos (Sw.) Sw.	FOD, FES, FCA	-	-	-
H. pulchellum Schltdl. & Cham.	FOD	-	-	-
H. rufum Fée*	FOD, FCA	-	-	-
H. sampaioanum Brade & Rosenst.*	FOD	-	VU	ANEXO II
H. silveirae Christ*	FOD	-	EN	ANEXO II
H. undulatum (Sw.) Sw.	FOD, FES, FCA	-	-	-
Polyphlebium – 4/15				
P. angustatum (Carmich.) Ebihara & Dubuisson	FOD, FES	-	-	-
P. diaphanum (Kunth.) Ebihara & Dubuisson	FOD, FES	-	-	-
P. hymenophylloides (Bosch.) Ebihara & Dubuisson	FOD	-	-	-
P. pyxidiferum (L.) Ebihara & Dubuisson	FOD	-	-	-
Trichomanes – 13/60				
T. accedens C. Presl	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
T. anadromum Rosenst.	FOD	-	-	-
T. arbuscula Desv.	FOD	-	-	-
T. crispum L.	FOD	-	-	-
T. cristatum Kaulf.	FOD, FES	-	-	-
T. elegans Rich.	FOD, FES	-	-	-
T. hostmannianum (Klotzsch) Kunze	FOD	-	-	-
T. lucens Sw.	FOD	-	VU	ANEXO II
T. pedicellatum Desv.	FOD	-	-	-
T. pellucens Kunze	FOD, FES, FCA	-	-	-
T. pilosum Raddi	FOD, FES, FCA	-	-	-
T. pinnatum Hedw.	FOD, FES	-	-	-
T. polypodioides L.	FOD, FES	-	-	-
Vandenboschia – 2/15				
V. radicans (Sw.) Copel.	FOD, FES	-	-	-
V. rupestris (Raddi) Ebihara & K. Iwats	FOD, FES	-	-	-

Isoetaceae

Alexandre Salino e Thaís Elias Almeida

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
ISOETACEAE – 11/200				
Isoetes – 11/200				
I. bradei Herter*	FCA	-	EX	ANEXO I
I. brasiliensis H.P. Fuchs*	FCA	-	-	-
I. fusco-marginata H.P. Fuchs*	FCA	-	-	-
I. gigantea U. Weber	FCA	-	CR	ANEXO II
I. martii A. Braun	FCA	-	VU	ANEXO II
I. organensis U. Weber*	FCA	-	EN	ANEXO II
I. ramboi Herter*	FCA	-	-	-
I. sehnemii H.P. Fuchs*	FCA	-	-	-
I. smithii H.P. Fuchs*	FCA	-	-	-
I. spannagelii H.P. Fuchs*	FCA	-	-	-
I. weberi Herter*	FCA	-	-	-

Lindsaeaceae

Alexandre Salino, Thaís Elias Almeida& Diego Soares Lara

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
LINDSAEACEAE – 13/200				
Lindsaea – 13/150				
L. arcuata Kunze	FOD, FES	-	-	-
L. bifida (Kaulf.) Mett. *ex* Kuhn*	FOD, FES	-	-	-
L. botrychioides A.St.-Hil.*	FOD, FES	-	-	-
L. coarctata K.U. Kramer	FOD	-	-	-
L. divaricata Klotzsch	FOD, FES	-	-	-
L. filipendula (Rosenst.) K.U. Kramer	FOD	-	-	-
L. guianensis (Aubl.) Dryand.	FOD	-	-	-
L. lancea (L.) Bedd.	FOD, FES	-	-	-
L. macrophylla Kaulf.	FOD	-	-	-
L. ovoidea Fée*	FOD	-	-	-
L. quadrangularis Raddi	FOD, FES	-	-	-
L. stricta (Sw.) Dryand.	FOD, FES, FED	-	-	-
L. virescens Sw.*	FOD, FES	-	-	-

Lomariopsidaceae

Alexandre Salino & Thaís Elias Almeida

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
LOMARIOPSIDACEAE – 7/70				
Lomariopsis – 2/40				
L. japurensis (Mart.) J.Sm.	FOD	-	-	-
L. marginata (Schrad.) Kuhn	FOD, FES	-	-	-
Nephrolepis – 5/25				
N. biserrata (Sw.) Schott	FOD, FES	-	-	-
N. cordifolia (L.) C. Presl	FOD, FES, FCA	-	-	-
N. pectinata (Willd.) Schott	FOD, FES, FCA	-	-	-
N. pendula (Raddi) J.Sm.	FOD, FES	-	-	-
N. rivularis (Vahl) Mett. *ex* Krug	FOD, FES	-	-	-

Lycopodiaceae

Alexandre Salino, Thaís Elias Almeida & Diego Soares Lara

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
LYCOPODIACEAE – 41/380				
Huperzia – 29/300				
H. acerosa (Sw.) Holub	FOD	-	-	-
H. aqualupiana (Spring) Rothm.	FOD	-	CR	ANEXO I
H. badiniana B. Øllg. & P.G Windisch*	FCA	-	-	-
H. biformis (Hook.) Holub*	FOD, FES	-	-	-
H. christii (Silveira) Holub*	FCA	-	-	-
H. comans (Nessel) B. Øllg. & P.G Windisch*	FOD	-	-	-
H. deminuens (Herter) B. Øllg.*	FCA	-	-	-
H. erythrocaulon (Fée) Holub*	FCA	-	-	-
H. flexibilis (Fée) B. Øllg.*	FOD, FES	-	-	-
H. fontinaloides (Spring) Trevis.*	FOD, FES	-	-	-
H. friburgensis (Nessel) B. Øllg. & P.G. Windisch*	FOD	-	-	-
H. hemleri (Nessel) B. Øllg.*	FOD	-	EN	ANEXO II
H. heterocarpon (Fée) Holub*	FOD, FOM	-	-	-
H. hexasticha B. Øllg. & P.G. Windisch	FOD, FOM	-	-	-
H. intermedia Trevis.	FCA	-	-	-
H. loefgreniana (Silveira) B. Øllg. & P.G. Windisch*	FOD	-	-	-
H. mandiocana (Raddi) Trevis.	FOD	-	-	-
H. martii (Wawra) Holub	FOD	-	-	-
H. mollicoma (Spring) Holub	FOD	-	-	-
H. nuda (Nessel) B. Øllg. & P.G. Windisch*	FCA	-	-	-
H. pungentifolia (Silveira) B. Øllg.	FCA	-	-	-
H. quadrifariata (Bory) Rothm.*	FOD	-	-	-
H. reflexa (Lam.) Trevis.	FOD, FES, FCA	-	-	-
H. regnellii (Maxon) B. Øllg. & P.G. Windisch*	FCA	-	EN	ANEXO II
H. sellowiana (Herter) B. Øllg.*	FOD	-	-	-
H. serrata (Thunb. *ex* Murray) Trevis.	FCA	-	-	-
H. silveirae (Nessel) B. Øllg. & P.G. Windisch*	FOD	-	-	-
H. taxifolia (Sw.) Trevis.	FOD	-	-	-
H. treitubensis (Silveira) B. Øllg.	FCA	-	EN	ANEXO II
Lycopodiella – 8/40				
L. alopecuroides (L.) Cranfill	FCA	-	-	-
L. bradei (Herter) B. Øllg.*	FCA	-	CR	ANEXO II
L. camporum B. Øllg. & P.G. Windisch	FCA	-	-	-
L. carnosa (Silveira) B. Øllg.	FCA	-	-	-
L. caroliniana (L.) Pic.Serm.	FCA	-	-	-
L. cernua (L.) Pic.Serm.	FOD, FES, FOM, FCA	-	-	-
L. geometra B. Øllg. & P.G. Windisch	FCA	-	-	-
L. pendulina (Hook.) B. Øllg.	FOD, FCA	-	-	-
Lycopodium – 4/40				
L. assurgens Fée	FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
L. clavatum L.	FOD, FES, FCA	-	-	-
L. jussiaei Poir.	FOD, FCA	-	EN	ANEXO II
L. thyoides Willd.	FCA	-	-	-

Lygodiaceae

Alexandre Salino & Thaís Elias Almeida

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
LYGODIACEAE – 2/25				
Lygodium – 2/25				
L. venustum Sw.	FOD, FES	-	-	-
L. volubile Sw.	FOD, FES	-	-	-

Marattiaceae

Alexandre Salino & Thaís Elias Almeida

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
MARATTIACEAE – 7/150				
Danaea – 5/50				
D. bipinnata H. Tuomisto	FOD, FES	-	-	-
D. excurrens Rosenst.	FOD	-	-	-
D. geniculata Raddi	FOD, FES	-	-	-
D. moritziana C. Presl	FOD, FES	-	-	-
D. sellowiana C. Presl	FOD, FES	-	-	-
Eupodium – 1/2				
E. kaulfussii (J. Sm) J. Sm. *	FOD, FES	-	-	-
Marattia – 1/7				
M. cicutifolia Kaulf.*	FOD, FES	-	-	-

Marsileaceae

Alexandre Salino & Thaís Elias Almeida

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
MARSILEACEAE – 6/70				
Marsilea – 4/64				
M. ancylopoda A. Braun	FCA	-	-	-
M. deflexa A. Braun	RST	-	-	-
M. minuta L.	FOD	-	-	-
M. polycarpa Hook. & Grev.	FED	-	-	-
Pilularia – 1/5				
P. americana A. Braun	FCA	-	-	-
Regnellidium – 1/1				
R. diphyllum Lindm.	FCA	-	VU	ANEXO II

Metaxyaceae

Alexandre Salino & Thaís Elias Almeida

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
METAXYACEAE – 1/2				
Metaxya – 1/2				
M. rostrata (Kunth) C. Presl	FOD	-	-	-

Oleandraceae

Alexandre Salino & Thaís Elias Almeida

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
OLEANDRACEAE – 2/40				
Oleandra – 2/40				
O. articulata (Sw.) C. Presl	FOD	-	-	-
O. hirta Brack.	FOD	-	-	-

Ophioglossaceae

Alexandre Salino & Thaís Elias Almeida

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
OPHIOGLOSSACEAE – 6/80				
Botrychium – 1/60				
B. virginianum (L.) Sw.	FOD, FOM, FCA	-	VU	ANEXO II
Ophioglossum – 5/20				
O. crotalophoroides Walter	FCA	-	-	-
O. ellipticum Hook. & Grev.	FCA	-	-	-
O. nudicaule L.f.	FCA	-	-	-
O. palmatum L.	FCA	-	-	-
O. reticulatum L.	FOD, FES, FCA	-	-	-

Osmundaceae

Alexandre Salino & Thaís Elias Almeida

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
OSMUNDACEAE – 2/20				
Osmunda – 1/10				
O. regalis L.	FOD, FES, FCA	-	-	-
Osmundastrum – 1/1				
O. cinnamomeum (L.) C. Presl	FOD, FES, FCA	-	-	-

Plagiogyriaceae

Alexandre Salino & Thaís Elias Almeida

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
PLAGIOGYRIACEAE – 1/15				
Plagiogyria – 1/15				
P. fialhoi (Fée & Glaz.) Mett.	FOD, FCA	-	VU	ANEXO II

Polypodiaceae

Alexandre Salino, Thaís Elias Almeida& Marcela Maia Viana

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
POLYPODIACEAE – 112/1200				
Campyloneurum – 11/50				
C. acrocarpon Fée*	FES, FOD	-	-	-
C. aglaolepis (Alston) de la Sota	FOD, FES, FCA	-	-	-
C. austrobrasilianum (Alston) de la Sota	FOD, FES	-	-	-
C. centrobrasilianum Lellinger	FOD, FES	-	-	-
C. decurrens (Raddi) C. Presl	FOD, FES	-	-	-
C. fallax Fée*	FOD	-	-	-
C. magnificum T. Moore	FOD	-	-	-
C. minus Fée	FOD, FES	-	-	-
C. nitidum (Kaulf.) C. Presl	FOD, FES	-	-	-
C. rigidum J. Sm.*	FOD, FES	-	-	-
C. vulpinum (Lindm.) Ching	FOD	-	-	-
Ceradenia – 6/55				
C. albidula (Baker) L.E. Bishop*	FOD, FES	-	-	-
C. capillaris (Desv.) L.E. Bishop*	FOD	-	EN	ANEXO II
C. glaziovii (Baker) Labiak*	FOD	-	EN	ANEXO II
C. itatiaiensis Labiak & Condack	FOD	-	-	-
C. spixiana (Mart. *ex* Mett.) L.E. Bishop	FOD	-	-	-
C. warmingii (C. Chr.) Labiak*	FOD	-	CR	ANEXO I
Cochlidium – 3/16				
C. pumilum C. Chr.	FOD	-	-	-
C. punctatum (Raddi) L.E. Bishop	FOD, FES, FCA	-	-	-
C. serrulatum (Sw.) L.E. Bishop	FOD, FES, FCA	-	-	-
Grammitis – 2/15				
G. fluminensis Fée*	FOD	-	-	-
G. leptopoda (C.H. Wright) Copel.	FOD, FES	-	-	-
Lellingeria – 13/60				
L. apiculata (Kunze *ex* Klotzsch) A.R. Sm. & R.C. Moran	FOD, FES, FCA	-	-	-
L. brasiliensis (Rosenst.) Labiak*	FOD	-	-	-
L. brevistipes (Mett. *ex* Kuhn) A.R. Sm. & R.C. Moran*	FOD, FES	-	-	-
L. depressa (C. Chr.) A.R. Sm. & R.C. Moran*	FOD	-	-	-
L. itatimensis (C. Chr.) A.R. Sm. & R.C. Moran*	FOD	-	EN	ANEXO II
L. limula (Christ) A.R. Sm. & R.C. Moran	FOD, FES	-	-	-
L. myosuroides (Sw.) A.R. Sm. & R.C. Moran	FOD	-	-	-
L. organensis (Gardner) A.R. Sm. & R.C. Moran*	FOD	-	-	-
L. pumila Labiak*	FOD	-	-	-
L. schenckii (Hieron.) A.R. Sm. & R.C. Moran*	FOD	-	-	-
L. suspensa (L.) A.R. Sm. & R.C. Moran	FOD	-	-	-
L. tamandarei (Rosenst.) A.R. Sm. & R.C. Moran*	FOD	-	-	-
L. wittigiana (Fée & Glaz.) A.R. Sm. & R.C. Moran	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Melpomene – 6/32				
M. albicans Lenhert	FOD	-	-	-
M. flabelliformis (Poir.) A.R. Sm. & R.C. Moran	FOD	-	-	-
M. melanostica (Kunze) A.R. Sm. & R.C. Moran	FOD, FES	-	-	-
M. moniliformis (Lag. *ex* Sw.) A.R. Sm. & R.C. Moran	FOD	-	-	-
M. peruviana (Desv.) A.R. Sm. & R.C. Moran	FOD	-	-	-
M. pilosissima (M. Martens & Galeotti) A.R. Sm. & R.C. Moran	FOD, FES, FCA	-	-	-
Microgramma – 11/30				
M. acatallela Alston	FOD	-		
M. crispata (Fée) R.M. Tryon & A.F. Tryon	FOD	-	EN	ANEXO II
M. geminata (Schrad.) A.F. Tryon & R.M. Tryon	FOD, RST	-	-	-
M. lindbergii (Kuhn) de la Sota	FOD, FES, FED	-	-	-
M. lycopodioides (L.) Copel.	FOD, FES	-	-	-
M. microsoroides Salino, T.E. Almeida & A.R. Sm.*	FOD	-	-	-
M. percussa (Cav.) de la Sota	FOD, FES, FCA	-	-	-
M. persicariifolia (Schrad.) C. Presl	FOD, FES	-	-	-
M. squamulosa (Kaulf.) de la Sota	FOD, FES, FCA	-	-	-
M. tecta (Kaulf.) Alston	FOD, FES	-	-	-
M. vaccinniifolia (Langsd. & Fisch.) Copel.	FOD, FES, RST	-	-	-
Micropolypodium – 5/30				
M. achilleifolium (Kaulf.) Labiak & F.B. Matos*	FOD, FES	-	-	-
M. gradatum (Baker) Labiak & F.B. Matos	FOD, FES	-	-	-
M. nanum (Fée) A.R. Sm.*	FOD	-		
M. perpusillum (Maxon) A.R. Sm.*	FOD	-	EN	ANEXO II
M. setosum (Kaulf.) A.R. Sm.*	FOD	-	-	-
Niphidium – 2/10				
N. crassifolium (L.) Lellinger	FOD, FES, FCA	-	-	-
N. rufosquamatum Lellinger	FOD, FCA	-	-	-
Pecluma – 16/35				
P. camptophyllaria (Fée) M.G. Price	FOD, FES	-	-	-
P. chnoophora (Kunze) Salino & F.C. Assis	FOD, FES	-	-	-
P. dispersa (A.M. Evans) M.G. Price	FOD	-	-	-
P. filicula (Kaulf) M.G. Price	FOD, FES	-	-	-
P. imbeana (Brade) Salino*	FOD	-	CR	ANEXO II
P. insularis (Brade) Salino	FOD	-	CR	ANEXO II
P. macedoi (Brade) M. Kessler & A.R. Sm.	FOD	-	-	-
P. paradiseae (Langsd. & Fisch.) M.G. Price*	FOD	-	-	-
P. pectinatiformis (Lindm.) M.G. Price*	FOD, FES	-	-	-
P. pilosa (A.M. Evans) M. Kessler & A.R. Sm.	FOD, FES	-	-	-
P. plumula (Willd.) M.G. Price	FOD, FES	-	-	-
P. recurvata (Kaulf.) M.G. Price*	FOD, FES	-	-	-
P. robusta (Fée) M. Kessler & A.R. Sm.	FOD, FES	-	-	-
P. sicca (Lindm.) M.G. Price*	FOD	-	-	-
P. singeri (de la Sota) M.G. Price*	FOD, FOM, FES	-	-	-
P. trunconum (Lindm.) M.G. Price*	FOD, FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Phlebodium – 2/4				
P. areolatum (Willd.) J. Sm.	FOD, FES, FCA	-	-	-
P. decumanum (Willd.) J. Sm.	FOD, FES	-	-	-
Pleopeltis – 14/80				
P. alborufula (Brade) Salino*	FOD	-	-	-
P. astrolepis (Liebm.) E. Fourn.	FOD, FES	-	-	-
P. bradei (de la Sota) Salino*	AFL	-	-	-
P. desvauxii (Klotzsch) Salino	FOD	-	-	-
P. hirsutissima (Raddi) de la Sota	FOD, FES	-	-	-
P. lepidopteris (Langsd. & Fisch.) de la Sota	FOD, RST	-	-	-
P. macrocarpa (Willd.) Kaulf.	FOD, FES	-	-	-
P. minarum (Weath.) Salino	FOD, FES, AFL	-	-	-
P. monoides (Weath.) Salino*	FOD, FES	-	-	-
P. pleopeltidis (Fée) de la Sota*	FOD, FES	-	-	-
P. pleopeltifolia (Raddi) Alston	FOD, FES, FED	-	-	-
P. polypodioides (L.) E.G. Andrews & Windham	FOD, FES	-	-	-
P. squalida (Vell.) de la Sota	FOD, FES, FED	-	-	-
P. trindadensis (Brade) Salino *	FCA	-	-	-
Polypodium – 1/30				
P. dulce Poir.	FOD	-	-	-
Serpocaulon – 12/43				
S. adnatum (Kunze *ex* Klotzsch) A.R. Sm.	FOD	-	-	-
S. catharinae (Langsd. & Fisch.) A.R. Sm.	FOD, FES, FCA	-	-	-
S. fraxinifolium (Jacq.) A.R. Sm.	FOD, FES	-	-	-
S. giganteum (Desv.) A.R. Sm.	FOD,FES	-	-	-
S. glandulosissimum (Brade) Labiak & J. Prado*	FOD, AFL	-	-	-
S. levigatum (Cav.) A.R. Sm.	FOD	-	-	-
S. latipes (Langsd. & Fisch.) A.R. Sm.	FOD, FES	-	-	-
S. meniscifolium (Langsd. & Fisch.) A.R. Sm.	FOD, FES	-	-	-
S. mexiae (Copel.) A.R. Sm.	AFL	-	-	-
S. sehnemii (Pic.Serm.) Labiak & J. Prado	FOD,FES	-	-	-
S. triseriale (Sw.) A.R. Sm.	FOD, FES, RST	-	-	-
S. vacillans (Link) A.R. Sm.	FOD, FES	-	-	-
Terpsichore – 7/50				
T. alfarii (Donn. Sm.) A.R. Sm.	FOD	-	-	-
T. asplenifolia (L.) A.R. Sm.	FOD	-	-	-
T. chrysleri (Copel.) A.R. Sm.	FOD, FES	-	-	-
T. reclinata (Brack.) Labiak	FOD, FES	-	-	-
T. semihirsuta (Klotzsch) A.R. Sm.	FOD	-	CR	ANEXO I
T. senilis (Fée) A.R. Sm.	FOD	-	-	-
T. taxifolia (L.) A.R. Sm.	FOD	-	-	-
Zygophlebia – 1/10				
Z. longipilosa (C. Chr.) L.E. Bishop*	FOD	-	-	-

Psilotaceae

Alexandre Salino & Thaís Elias Almeida

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
PSILOTACEAE – 1/12				
Psilotum – 1/2				
P. nudum (L.) P. Beauv.	FOD, FES, FCA	-	-	-

Pteridaceae

Alexandre Salino, Thaís Elias Almeida & Gustavo Heringer

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
PTERIDACEAE – 133/950				
Acrostichum – 2/3				
A. aureum L.	RST, FCA	-	-	-
A. danaeifolium Langsd. & Fisch.	RST, FCA	-	-	-
Adiantopsis – 6/8				
A. cheilanthoides Senna*	FCA	-	-	-
A. chlorophylla (Sw.) Fée	FOD, FES, FCA	-	-	-
A. occulta Sehnem*	FOD	-	-	-
A. perfasciculata Sehnem	FOD, FES, FED	-	-	-
A. radiata (L.) Fée	FOD, FES, FCA	-	-	-
A. regularis (Kunze) T. Moore	FOD, FES	-	-	-
Adiantum – 41/200				
A. abscissum Schrad.	FOD, FES, FED	-	-	-
A. argutum Splitg.	FES	-	-	-
A. calcareum Gardner	FED	-	-	-
A. concinnum Willd.	FES	-	-	-
A. curvatum Kaulf.	FES,FOD	-	-	-
A. deflectens Mart.	FOD, FES, FED	-	-	-
A. digitatum C. Presl *ex* Hook.	FES	-	-	-
A. diogoanum Glaz. *ex* Baker	FOD, FES, FED	-	-	-
A. diphyllum (Fée) Maxon*	FOD	-	CR	ANEXO I
A. discolor J. Prado*	FOD, FES	-	CR	ANEXO II
A. dolosum Kunze	FOD, FES	-	-	-
A. fructuosum Poepp. *ex* Spreng.	FES	-	-	-
A. glaucescens Klotzsch	FOD, FES	-	-	-
A. gracile Fée	FOD, FES	-	-	-
A. humile Kunze	FES	-	-	-
A. incertum Lindm.	FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
A. intermedium Sw.	FES, FED	-	-	-
A. latifolium Lam.	FOD, FES, FED	-	-	-
A. lorentzii Hieron.	FOD, FES, FED	-	-	-
A. lucidum (Cav.) Sw.	FOD,FES	-	-	-
A. macrophyllum Sw.	FES	-	-	-
A. mathewsianum Kunze	FES	-	-	-
A. mynssenae J. Prado*	FOD, FES	-	-	-
A. obliquum Willd.	FES	-	-	-
A. ornithopodum C. Presl	FES	-	-	-
A. papillosum Handro*	FES	-	-	-
A. pectinatum Kunze *ex* Baker	FES, FED	-	-	-
A. pentadactylon Langsd. & Fisch.*	FOD, FES	-	-	-
A. petiolatum Desv.	FES	-	-	-
A. platyphyllum Sw.	FES, FED	-	-	-
A. poiretii Wikstr.	FES	-	-	-
A. pseudotinctum Hieron.	FES	-	-	-
A. pulverulentum L.	FES	-	-	-
A. raddianum C. Presl	FOD, FES, FED	-	-	-
A. rhizophytum Schrad.	FES, FED	-	-	-
A. serratodentatum Willd.	FES, FED	-	-	-
A. subcordatum Sw.	FOD, FES	-	-	-
A. terminatum Kunze *ex* Miq.	FOD, FES	-	-	-
A. tetragonum Schrad.	FES, FED	-	EN	ANEXO II
A. tetraphyllum Willd.	FOD, FES	-	-	-
A. windischii J. Prado	FOD, FES	-	-	-
Ananthacorus – 1/1				
A. angustifolius (Sw.) Underw. & Maxon	FOD	-	-	-
Anetium – 1/1				
A. citrifolium (L.) Splitg.	FOD	-	-	-
Anogramma – 4/7				
A. chaerophylla (Desv.) Link	FOD, FES	-	-	-
A. leptophylla (L.) Link	FOD	-	-	-
A. lorentzii (Hieron.) Diels	FES	-	-	-
A. osteniana Dutra	FES	-	-	-
Argyrochosma – 1/20				
A. nivea (Poir.) Windham	FES	-	-	-
Ceratopteris – 2/4				
C. pteridoides (Hook.) Hieron.	FOD, FES	-	-	-
C. thalictroides (L.) Brongm.	FOD, FES	-	-	-
Cheilanthes – 8/150				
C. dichotoma Sw.	FOD	-	-	-
C. incisa Kunze *ex* Mett.*	FOD	-	CR	ANEXO I
C. hieronymi Herter	FES	-	-	-
C. juergensii Rosenst.	FOD	-	EN	ANEXO II
C. micropteris Sw.	FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
C. myriophylla Desv.	FOD	-	-	-
C. regnelliana Mett.*	AFL, FCA	-	-	-
C. regularis Mett.	FOD, FES, FOM	-	-	-
Doryopteris – 26/30				
D. acutiloba (Prantl) Diels*	FOD	-	-	-
D. angustata Sehnem	FOD	-	-	-
D. collina (Raddi) J. Sm.	FOD, FES, FCA	-	-	-
D. concolor (Langsd. & Fisch.) Kuhn	FOD, FES	-	-	-
D. crenulans (Fée) Christ	FOD, FES, FCA	-	-	-
D. itatiaiensis (Fée) Christ*	FCA	-	EN	ANEXO II
D. jequitinhonhensis Salino*	FED	-	-	-
D. juergensii Rosenst.*	FOD	-	-	-
D. leitei R.M. Tryon	FOD	-	-	-
D. lomariacea Kaulf	FOD, FES, FCA	-	-	-
D. lorentzii (Hieron.) Diels	FOD, FCA	-	-	-
D. majestosa J.C. Yesilyurt	FOD, FES	-	-	-
D. nobilis (T. Moore) C. Chr.	FOD	-	-	-
D. ornithopus (Mett. *ex* Hook. & Baker) J. Sm.	FOD, FES, FCA	-	-	-
D. paradoxa (Fée) Christ*	FOD, FED, FCA	-	EN	ANEXO II
D. pentagona Raddi	FOD, FES	-	-	-
D. quinquelobata (Fée) Diels*	FOD	-	CR	ANEXO II
D. rediviva Fée*	FOD, FES	-	-	-
D. rosenstockii Brade*	FCA	-	CR	ANEXO II
D. rufa Brade*	FCA	-	EN	ANEXO II
D. sagittifolia (Raddi) J. SM.	FOD, FES	-	-	-
D. stierii Rosenst.	FOD	-	-	-
D. subsimplex (Fée) Diels*	FOD	-	EN	ANEXO II
D. tijucana Brade & Rosenst.*	FOD	-	CR	ANEXO II
D. triphylla (Lam.) Christ	FOD	-	-	-
D. varians (Raddi) J. Sm.	FOD, FES, FCA	-	-	-
Eriosorus – 8/26				
E. areniticola Schwatsb. & Labiak	AFL	-	-	-
E. biardii (Fée) A.F. Tryon*	FOD, FCA	-	EN	ANEXO II
E. chei lanthoides (Sw.) A.F. Tryon	FCA	-	CR	ANEXO II
E. flexuosus (Kunth) Copel.	FCA	-	EN	ANEXO I
E. insignis (Kuhn) A.F. Tryon*	FOD, FCA	-	VU	ANEXO II
E. myriophyllus (Sw.) Copel.	FOD, FCA	-	-	-
E. rufescens (Fée) A.F. Tryon	FCA	-	CR	ANEXO I
E. sellowianus (Kuhn) Copel.	FCA	-	-	-
Hecistopteris – 1/3				
H. pumila (Spreng.) J. Sm.	FOD	-	-	-
Hemionitis – 2/10				
H. palmata L.	FOD	-	-	-
H. tomentosa (Lam.) Raddi	FOD, FES, FED	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Jamesonia – 1/22				
J. brasiliensis Christ	FCA	-	CR	ANEXO II
Pellaea – 1/35				
P. flavescens Fée*	FOD	-	-	-
Pityrogramma – 4/17				
P. calomelanos (L.) Link	FCA, FOD, FES, AFL	-	-	-
P. ebenea (L.) Proctor	AFL	-	-	-
P. tartarea (Cav.) Maxon	FOD, FCA	-	-	-
P. trifoliata (L.) R.M. Tryon	FOD, FES	-	-	-
Polytaenium – 3/9				
P. cajenense (Desv.) Benedict	FOD, FES	-	-	-
P. feei (W. Schaffn.) Maxon	FOD	-	-	-
P. lineatum (Sw.) J. Sm.	FOD, FES	-	-	-
Pteris – 17/250				
P. altissima Poir.	FOD, FES	-	-	-
P. angustata (Fée) C.V. Morton*	FOD, FES	-	-	-
P. biaurita L.	FOD, FES	-	-	-
P. brasiliensis Raddi	FOD, FES	-	-	-
P. congesta J. Prado*	FOD	-	CR	ANEXO II
P. decurrens C. Presl	FOD, FES	-	-	-
P. deflexa Link	FOD, FES	-	-	-
P. denticulata Sw.	FOD, FES	-	-	-
P. lechleri Mett.	FOD, FES	-	-	-
P. leptophylla Sw.*	FOD, FES	-	-	-
P. limae Brade*	FOD	-	EN	ANEXO II
P. plumula Desv.	FOD, FES	-	-	-
P. podophylla Sw.	FOD	-	-	-
P. propinqua J. Agardh	FOD, FES	-	-	-
P. pungens Willd.	FOD	-	-	-
P. schwackeana Christ*	FOD, FES	-	-	-
P. splendens Kaulf.*	FOD, FES	-	-	-
Radiovittaria – 2/8				
R. gardneriana (Fée) E.H. Crane	FOD, FES	-	-	-
R. stipitata (Kunze) E.H. Crane	FOD, FES	-	-	-
Vittaria – 2/6				
V. graminifolia Kaulf.	FOD, FOM, FES	-	-	-
V. lineata (L.) Sm.	FOD, FOM, FES	-	-	-

Saccolomataceae

Alexandre Salino & Thaís Elias Almeida

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
SACCOLOMATACEAE – 2/12				
Saccoloma – 2/12				
S. elegans Kaulf.	FOD, FES	-	-	-
S. inaequale (Kunze) Mett.	FOD, FES	-	-	-

Salviniaceae

Alexandre Salino & Thaís Elias Almeida

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
SALVINIACEAE – 6/17				
Azolla – 2/6				
A. caroliniana Willd.	FAQ	-	-	-
A. microphylla Kaulf.	FAQ	-	-	-
Salvinia – 4/11				
S. adnata Desv.	FAQ	-	-	-
S. auriculata Aubl.	FAQ	-	-	-
S. biloba Raddi	FAQ	-	-	-
S. minima Baker	FAQ	-	-	-

Schizaeaceae

Alexandre Salino & Thaís Elias Almeida

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
SCHIZAEACEAE – 4/60				
Actinostachys – 2/20				
A. pennula (Sw.) Hook.	RST	-	-	-
A. subtrijuga (Mart.) C. Presl	FOD, RST	-	-	-
Schizaea – 2/40				
S. elegans (Vahl) Sw.	FOD, FES	-	-	-
S. fluminensis Miers	FOD, RST	-	-	-

Selaginellaceae

Alexandre Salino, Thaís Elias Almeida & Gustavo Heringer

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
SELAGINELLACEAE – 22/700				
Selaginella – 22/700				
S. bahiensis Spring	FOD	-	-	-
S. contigua Baker*	FOD, FES	-	-	-
S. convoluta (Arn.) Spring	FOD, FES, FED, AFL	-	-	-
S. decomposita Spring*	FOD, FCA	-	-	-
S. erectifolia Spring*	FOD, FCA	-	-	-
S. erythropus (Mart.) Spring	FES	-	-	-
S. flexuosa Spring	FOD, FES, FED	-	-	-
S. fragillima Silveira	FOD, FES	-	-	-
S. jungermannioides (Gaudich.) Spring*	FOD	-	-	-
S. macrostachya (Spring) Spring*	FOD	-	-	-
S. marginata (Willd.) Spring	FOD, FES, FED, FCA	-	-	-
S. mendoncae Hieron.*	FOD	-	VU	ANEXO II
S. microphylla (Kunth) Spring	FOD, FES	-	-	-
S. muscosa Spring	FOD, FES	-	-	-
S. palmiformis Alston *ex* Crabbe & Jermy	FOD	-	-	-
S. producta Baker	FOD	-	-	-
S. sellowii Hieron.	FOD, FES	-	-	-
S. suavis (Spring) Spring	FOD, FES	-	-	-
S. sulcata (Desv.) Spring	FOD, FES	-	-	-
S. tenuissima Fée	FOD, FES, FCA	-	-	-
S. valida Alston*	FOD	-	EN	ANEXO II
S. vestiens Baker*	FCA	-	-	-

Tectariaceae

Alexandre Salino & Thaís Elias Almeida

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
TECTARIACEAE – 7/220				
Tectaria – 4/200				
T. buchtienii (Rosenst.) Maxon	FOD, FES	-	-	-
T. incisa Cav.	FOD, FES	-	-	-
T. pilosa (Fée) R.C. Moran	FOD, FES	-	-	-
T. vivipara Jermy & T.G. Walker	FOD, FES	-	-	-
Triplophyllum – 3/20				
T. boliviense J. Prado & R.C. Moran	FOD, FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
T. funestum (Kunze) Holttum	FOD, FES	-	-	-
T. hirsutum (Holttum) J. Prado & R.C. Moran	FOD, FES	-	-	-

Thelypteridaceae

Alexandre Salino & Thaís Elias Almeida

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
THELYPTERIDACEAE – 78/950				
Thelypteris – 78/900				
T. abbiattiae C.F. Reed	FOM	-	-	-
T. abrupta (Desv.) Proctor	FOD	-	-	-
T. amambayensis (Christ) Ponce*	FOD, FOM, FES	-	-	-
T. angustifolia (Willd.) Proctor	FES	-	-	-
T. anoptera (Kunze *ex* Kuhn) C.F. Reed*	FOD, FES	-	-	-
T. araucariensis Ponce*	FOD, FOM	-	-	-
T. berroi (C. Chr.) C.F. Reed	FES, FED	-	-	-
T. biformata (Rosenst.) R.M. Tryon	FES	-	-	-
T. biolleyi (Christ) Proctor	FOD	-	-	-
T. burkartii Abbiatti*	FOD, FES	-	-	-
T. cheilanthoides (Kunze) Proctor	FOD, FES	-	-	-
T. chrysodioides (Fée) C.V. Morton	FES	-	-	-
T. concinna (Willd.) Ching	FOD, FES	-	-	-
T. conspersa (Schrad.) A.R. Sm.	FES, FED	-	-	-
T. cuneata (C. Chr.) C.F. Reed*	FOD	-	-	-
T. cutiataensis (Brade) Salino*	FOD	-	-	-
T. decurtata (Link) de la Sota	FOD, FOM	-	-	-
T. decussata (L.) Proctor	FOD	-	-	-
T. devolvens (Baker) C.F. Reed	FOD, FES	-	-	-
T. eriosora (Fée) Ponce*	FOD, FCA	-	-	-
T. gardneriana (Baker) C.F. Reed	FOD, FES	-	-	-
T. glaziovii (Christ) C.F. Reed	FOD, FES	-	-	-
T. grandis A.R. Sm.	FES	-	-	-
T. gymnosora Ponce	FOD	-	-	-
T. hatschbachii A.R. Sm.	FOD, FES	-	-	-
T. heineri (C. Chr.) C.F. Reed	FOD, FES	-	-	-
T. hispidula (Decne.) C.F. Reed	FES, FOD	-	-	-
T. iguapensis (C. Chr.) Salino*	FOD	-	-	-
T. interrupta (Willd.) K. Iwats	FOD, FES	-	-	-
T. ireneae (Brade) Lellinger*	FOD, FES	-	-	-
T. jamesonii (Hook.) R.M. Tryon	FES	-	-	-
T. juergensii (Rosenst.) C.F. Reed*	FOD, FOM	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
T. leprieurii (Hook.) R.M. Tryon	FOD, FES	-	-	-
T. littoralis Salino*	FOD	-	-	-
T. longifolia (Desv.) R.M. Tryon	FOD, FES	-	-	-
T. lugubris (Mett.) R.M. Tryon & A.F. Tryon	FOD, FES	-	-	-
T. macrophylla (Kunze) C.V. Morton	FOD, FES	-	-	-
T. maxoniana A.R. Sm.	FOD, FES	-	-	-
T. metteniana Ching*	FOD, FES	-	-	-
T. mexiae (Copel.) Ching*	FES	-	-	-
T. monosora (C. Presl) Salino*	FOD, FES	-	-	-
T. montana Salino*	FOD, FES	-	-	-
T. mosenii (C. Chr.) C.F. Reed	FES	-	-	-
T. multigemmifera Salino	FES	-	-	-
T. neglecta (Brade) Lellinger*	FOD, FES	-	-	-
T. novaeana (Brade) Ponce*	FOD	-	CR	ANEXO I
T. oligocarpa (Willd.) Ching	FOD, FES	-	-	-
T. opposita (Vahl) Ching	FOD, FES	-	-	-
T. pachyrhachis (Kunze *ex* Mett.) Ching	FOD, FES	-	-	-
T. paranaensis Salino*	FOD	-	-	-
T. patens (Sw.) Small	FOD, FES	-	-	-
T. platypes (Fée) Ponce*	FES	-	-	-
T. pleiophylla (Sehnem) Ponce*	FOD, FOM	-	-	-
T. podotricha (Sehnem) Ponce*	FOM	-	-	-
T. poiteana (Bory) Proctor	FOD, FES	-	-	-
T. polypodioides (Raddi) C.F. Reed*	FOD, FES	-	-	-
T. ptarmica (Mett.) C.F. Reed*	FOD	-	-	-
T. raddii (Rosenst.) Ponce*	FOD, FES	-	-	-
T. recumbens (Rosenst.) C.F. Reed*	FOD, FOM	-	-	-
T. refracta (Fisch. & C. Meyer *ex* Kunze) C.F. Reed*	FOD	-	-	-
T. regnelliana (C. Chr.) Ponce*	FES, FOD	-	-	-
T. retusa (Sw.) C.F. Reed*	FOD, FES	-	-	-
T. riograndensis (Lindm.) C.F. Reed	FES	-	-	-
T. rioverdensis (C.Chr.) Ponce*	FOD, FES	-	-	-
T. rivularioides (Fée) Abbiatti	FOD, FES, FCA	-	-	-
T. salzmannii (Fée) C.V. Morton	FES	-	-	-
T. sancta-catharinae (Rosenst.) Ponce*	FOD	-	-	-
T. scabra (C. Presl) Lellinger	FOD, FES	-	-	-
T. schwackeana (Christ) Salino*	FES	-	-	-
T. semirii Salino & Melo *	FES	-	-	-
T. serrata (Cav.) Alston	FOD, FES, FED	-	-	-
T. soridepressa Salino & Dittrich	FES	-	-	-
T. stierii (Rosenst.) C.F. Reed*	FES	-	-	-
T. tamandarei (Rosenst.) Ponce	FOD	-	-	-
T. tenerrima (Fée) C.F. Reed*	FOD	-	-	-
T. tetragona (Sw.) Small	FES	-	-	-
T. villosa (Link) C.F. Reed*	FOD	-	-	-
T. vivipara (Raddi) C.F.Reed*	FOD	-	-	-

Woodsiaceae

Claudine Mynssen, Alexandre Salino & Thaís Elias Almeida

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
WOODSIACEAE – 21/700				
Athyrium – 1/100				
A. filix-femina (L.) Roth	FOD	-	EN	ANEXO II
Cystopteris – 1/10				
C. fragilis (L.) Bernh.	FOD	-	-	-
Diplazium – 17/375				
D. ambiguum Raddi	FOD	-	-	-
D. asplenioides (Kunze) C. Presl	FOD, FES	-	-	-
D. celtidifolium Kunze	FOD	-	-	-
D. cristatum (Desr.) Alston	FOD, FES	-	-	-
D. herbaceum Fée	FOD	-	-	-
D. lechleri (Mett.) T. Moore	FOD	-	-	-
D. leptocarpon Fée*	FOD, FES	-	-	-
D. lindbergii (Mett.) Christ	FOD, FES	-	-	-
D. longipes Fée*	FOD	-	-	-
D. mattogrossense A. Sampaio*	FOD, FES	-	-	-
D. mutilum Kunze*	FOD, FES	-	-	-
D. plantaginifolium (L.) Urb.	FOD, FES	-	-	-
D. riedelianum (Bong. *ex* Kuhn) C. Chr.	FOD	-	-	-
D. roemerianum (Kunze) C. Presl	FOD	-	-	-
D. rostratum Fée	FOD	-	-	-
D. tamandarei Rosenst.*	FOD	-	-	-
D. turgidum Rosenst.*	FOD	-	-	-
Hemidictyum – 1/1				
H. marginatum (L.) C. Presl	FOD, FES	-	-	-
Woodsia – 1/35				
W. montevidensis (Spreng.) Hieron.	FCA	-	-	-



Lista das Gimnospermas e Angiospermas

Gimnospermas

João Renato Stehmann

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
ARAUCARIACEAE – 1/32				
Araucaria – 1/18				
A. angustifolia (Bertol.) Kuntze*	FOM	-	EN	ANEXO I
EPHEDRACEAE – 1/60				
Ephedra – 1/60				
E. tweediana Fisch. & C.A. Mey.	RST	-	VU	ANEXO I
PODOCARPACEAE – 2/ca. 125				
Podocarpus – 2/100				
P. lambertii Klotzsch ex Endl.	FOD, FOM	-	-	-
P. sellowii Klotzsch	FOD, FES	-	-	-

(*) Caráter endêmico do grupo taxonômico: gênero e espécie.
Os números que estão à frente de cada gênero e família representam o número de espécies ocorrentes na Floresta Atlântica e número total de espécies ocorrentes no mundo, repectivamente.
Vegetação: FOD – Floresta Ombrófila Densa/Aberta; FOM – Floresta Ombrófila Mista; FES – Floresta Estacional Semidecidual; FED – Floresta Estacional Decidual; FCA – Formações Campestres; AFL – Afloramentos Rochosos; RST – Restinga; MAN – Manguezal; RUD – Ruderal.
Categoria de Ameaça: CR – Criticamente em Perigo; EN – Em Perigo; VU – Vulnerável; EX – Extinta; EW – Extinta na Natureza; ANEXO I – Ameaçada e ANEXO II – Dados Deficientes.

Angiospermas
Acanthaceae
Cíntia Kameyama

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
ACANTHACEAE – 143/3500				
Aphelandra – 33/175				
A. bahiensis (Nees) Wassh.*	FOD	-	-	-
A. blanchetiana (Nees) Hook.*	FOD	-	-	-
A. bradeana Rizzini*	FOD	-	-	-
A. chamissoniana Nees*	FOD	-	-	-
A. claussenii Wassh.*	FOD, FES	-	-	-
A. colorata (Vell.) Wassh.*	FOD	-	-	-
A. decorata (Nees) Wassh.*	FOD	-	-	-
A. espirito-santensis Profice & Wassh.*	FOD	-	-	-
A. gigantea (Rizzini) Profice*	FOD	-	-	-
A. grazielae Profice*	FOD	-	-	-
A. harleyi Wassh.*	FOD	-	-	-
A. hirta (Klotzsch) Wassh.*	FOD	-	-	-
A. hymenobracteata Profice*	FOD	-	-	-
A. ignea (Schrader) Nees *ex* Steud.*	FES	-	-	-
A. liboniana Linden *ex* Hook.*	FOD	-	-	-
A. longiflora (Lindl.) Profice	FOD, FES	-	-	-
A. marginata Nees & Mart.*	FES	-	-	-
A. maximiliana (Nees) Benth.*	FOD	-	-	-
A. neesiana Wassh.*	FOD	-	-	-
A. nemoralis Nees*	FOD	-	-	-
A. nitida Nees & Mart.*	FOD	-	-	-
A. nuda Nees*	FOD	-	-	-
A. obtusifolia (Nees) Wassh.*	FOD	-	-	-
A. ornata (Nees) T.Anderson*	FOD	-	-	-
A. paulensis Wassh.*	FOD	-	-	-
A. phrynioides Lindau*	FOD	-	-	-
A. prismatica (Vell.) Hiern *	FOD	-	-	-
A. rigida Glaz. *ex* Mildbr.*	FOD	-	-	-
A. schottiana (Nees) Profice	FOD, FES	-	-	-
A. squarrosa Nees*	FOD, FES	-	-	-
A. stephanophysa Nees*	FOD	-	-	-
A. variegata Morel*	FOD	-	-	-
A. wasshausenii Profice*	FES	-	-	-
Chamaeranthemum – 2/4				
C. beyrichii Nees*	FOD	-	-	-

(*) Caráter endêmico do grupo taxonômico: gênero e espécie.
Os números que estão à frente de cada gênero e família representam o número de espécies ocorrentes na Floresta Atlântica e número total de espécies ocorrentes no mundo, repectivamente.
Vegetação: FOD – Floresta Ombrófila Densa/Aberta; FOM – Floresta Ombrófila Mista; FES – Floresta Estacional Semidecidual; FED – Floresta Estacional Decidual; FCA – Formações Campestres; AFL – Afloramentos Rochosos; RST – Restinga; MAN – Manguezal; RUD – Ruderal.
Categoria de Ameaça: CR – Criticamente em Perigo; EN – Em Perigo; VU – Vulnerável; EX – Extinta; EW – Extinta na Natureza; ANEXO I – Ameaçada e ANEXO II – Dados Deficientes.

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
C. gaudichaudii Nees*	FOD	-	-	-
Clistax – 1/2				
C. brasiliensis Mart.	FOD, FES	-	-	-
Dicliptera – 2/150				
D. mucronifolia Nees	FES	-	-	-
D. squarrosa Nees	FES	-	-	-
Dyschoriste – 3/50				
D. hygrophiloides (Nees) Kuntze	FCA	-	-	-
D. lavandulacea (Nees) Kuntze	FCA	-	-	-
D. trichanthera Kobuski	FES	-	-	-
Elytraria – 1/17				
E. imbricata (Vahl) Pers.	FES, FED FCA	-	-	-
Herpetacanthus – 4/10				
H. longiflorus Moric.*	FOD	-	-	-
H. macahensis Nees*	FOD	-	-	-
H. melancholicus Nees*	FOD	-	-	-
H. rubiginosus Nees*	FOD	-	-	-
Hygrophila – 1/25				
H. costata Nees	FOD, FES	-	-	-
Justicia – 34/600				
J. axillaris (Nees) Lindau	FCA	-	-	-
J. beyrichii (Nees) Lindau *	FOD	-	-	-
J. brasiliana Roth	FOD, FES	-	-	-
J. carnea Lindl.	FOD, FES	-	-	-
J. catharinensis Lindau*	FOD	-	-	-
J. clausseniana (Nees) Profice*	FOD	-	-	-
J. comata (L.) Lam.	FOD, FES, FED	-	-	-
J. congrua (Nees *ex* Mart.) Lindau	FES	-	-	-
J. cydoniifolia (Nees *ex* Mart.) Lindau	FOD, FES	-	-	-
J. cyrtantheriformis (Rizzini) Profice*	FOD	-	-	-
J. dasyclados (Nees) Lindau	FOD, FES	-	-	-
J. floribunda (C.Koch) Wassh.	FOM, FES	-	-	-
J. genuflexa Nees & Mart.	FOD	-	-	-
J. glaziovii Lindau	FOD, FES	-	-	-
J. goudotii V.A.W.Graham	FES, FED, FCA	-	-	-
J. hatschbachii (Rizzini) Wassh. & L.B.Sm.*	FOD, FES	-	-	-
J. holochila (Rizzini) Profice*	FOD	-	-	-
J. involucrata (Nees) Leonard*	FOD	-	-	-
J. kleinii Wassh. & L.B.Sm.*	FOD	-	-	-
J. luschnathii Lindau	FOD	-	-	-
J. lythroides (Nees) V.A.W.Graham	FOD, FES	-	-	-
J. meyeniana (Nees) Lindau*	FOD	-	-	-
J. nervata (Lindau) Profice*	FOD	-	-	-
J. oblonga (Nees) Lindau	FOD, FES	-	-	-
J. plumbaginifolia Jacq.*	FOD	-	-	-
J. polita (Nees) Profice*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
J. pygmaea Lindau*	FOD	-	-	-
J. reitzii Leonard*	FCA	-	-	-
J. scheidweileri V.A.W.Graham*	FES	-	-	-
J. schenckiana Lindau*	FOD	-	-	-
J. sebastianopolitana Profice*	FOD	-	-	-
J. symphyantha (Nees *ex* Mart.) Lindau	?		-	-
J. tijucensis V.A.W.Graham	FOD	-	-	-
J. yhuensis Lindau	FOD	-	-	-
Lepidagathis – 5/115				
L. alopecuroides (Vahl.) Griseb.	FOD	-	-	-
L. cuneiformis Kameyama*	FOD	-	-	-
L. laxifolia (Nees) Kameyama*	FOD	-	-	-
L. meridionalis Kameyama*	FOD	-	-	-
L. nemoralis (Mart. *ex* Nees) Kameyama*	FOD	-	-	-
Mendoncia – 5/60				
M. bahiensis Profice*	FOD	-	-	-
M. blanchetiana Profice*	FOD	-	-	-
M. mollis Lindau	FOD, FES	-	-	-
M. puberula Mart.	FOD, FES	-	-	-
M. velloziana Mart.	FOD, FES	-	-	-
Odontonema – 1/36				
O. barlerioides (Nees) Kuntze*	FOD	-	-	-
Pachystachys – 1/12				
P. spicata (Ruiz & Pav.) Wassh.	FOD	-	-	-
Poikilanthus – 1/6				
P. flexuosus (Nees) Lindau	FOD, FES	-	-	-
Pseuderanthemum – 4/60				
P. exaequatum (Nees) Radlk.*	FOD	-	-	-
P. heterophyllum (Nees) Radlk.*	FOD, FES	-	-	-
P. riedelianum (Nees) Rizzini*	FOD	-	-	-
P. verbenaceum (Nees & Mart.) Radlk.*	FOD	-	-	-
Ruellia – 18/150				
R. affinis (Nees) Lindau*	FOD, FES	-	-	-
R. angustifolia (Nees) Lindau	FES	-	-	-
R. brevicaulis (Nees) Lindau	FOD, FOM	-	-	-
R. brevifolia (Pohl) Ezcurra	FOD, FES	-	-	-
R. bulbifera Lindau	FCA	-	-	-
R. curviflora Nees & Mart.*	FOD	-	-	-
R. elegans Poir.	FOD, FES	-	-	-
R. epallocaulos Leonard *ex* C.Ezcurra & Wassh.	FOD, FES	-	-	-
R. erythropus (Nees) Lindau	FES, FED	-	-	-
R. geminiflora Kunth	FCA	-	-	-
R. kleinii C.Ezcurra & Wassh.*	FOD	-	-	-
R. macrantha Mart. *ex* Nees	FES	-	-	-
R. menthoides (Nees) Hiern	FOD, FES	-	-	-
R. multifolia (Nees) Lindau	FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
R. puri (Nees) Mart. *ex* B.D.Jacks.	FES	-	-	-
R. reitzii Wassh. & L.B.Sm.*	FOD	-	-	-
R. solitaria Vell.*	FOD	-	-	-
R. subssessilis (Nees) Lindau*	FOD, FES	-	-	-
Schaueria – 4/8				
S. calicotricha (Link & Otto) Nees	FOD	-	-	-
S. gonyostachya Nees	FOD?	-	-	-
S. lachnostachya Nees*	FOD	-	-	-
S. lophura Nees	FOD	-	-	-
*Sebastianoschaueria** – 1/1				
S. oblongata Nees*	FOD	-	-	-
Staurogyne – 19/140				
S. alba D.M.Braz & R.Monteiro*	FOD	-	-	-
S. anigozanthus (Nees) Kuntze	FES	-	-	-
S. brachiata (Hiern) Leonard *	FOD	-	VU	ANEXO I
S. elegans (Nees) Kuntze	FES	-	VU	ANEXO II
S. ericoides Lindau*	FES	-	-	-
S. euryphylla E.Hossain*	FOD	-	-	-
S. eustachya Lindau*	FOD	-	-	-
S. flava D.M.Braz & R.Monteiro	FES	-	-	-
S. hirsuta (Nees) Kuntze	FCA	-	-	-
S. itatiaiae (Wawra) Leonard *	FOD	-	VU	ANEXO II
S. mandioccana (Nees) Kuntze*	FOD	-	-	-
S. minarum (Nees) Kuntze*	FES	-	-	-
S. parva D.M.Braz & R.Monteiro*	FOD	-	-	-
S. riedeliana (Nees) Kuntze*	FOD	-	-	-
S. rubescens D.M.Braz & R.Monteiro*	FOD	-	-	-
S. silvatica Lindau *ex* D.M.Braz & R.Monteiro*	FOD	-	-	-
S. vauthieriana (Nees) Kuntze*	FES	-	EN	ANEXO II
S. veronicifolia (Nees) Kuntze*	FOD	-	VU	ANEXO I
S. warmingiana (Hiern) Leonard *	FES	-	CR	ANEXO I
Stenandrium – 2/25				
S. mandioccanum Nees	FOD, FES	-	-	-
S. tenellum Nees*	FOD	-	-	-
Stenostephanus – 1/6				
S. lobeliiformis Nees*	FOD	-	-	-

Achariaceae

Caetano Troncoso Oliveira

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
ACHARIACEAE – 2/150				
Carpotroche – 1/11				
C. brasiliensis Endl.*	FOD, FES	-	-	-
Kuhlmanniodendron * – 1/1				
K. apterocarpum (Kuhlm.) Fiaschi & Groppo*	FOD	-	-	-

Achatocarpaceae

Márcio de Souza Werneck

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
ACHATOCARPACEAE – 1/ca.11				
Achatocarpus – 1/ca.10				
A. praecox Griseb.	FES	-	-	-

Adoxaceae

Luciana H. Yoshino Kamino

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
ADOXACEAE – 1/200				
Sambucus – 1/10				
S. australis Cham. & Schltdl.	FOM, FES, FED	-	-	-

Aizoaceae

Claudio Nicoletti Fraga

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
AIZOACEAE – 1/ca. 2500				
Sesuvium – 1/12				
S. portulacastrum (L.) L.	RST	-	-	-

Alismataceae

Flávio Dayrell Gontijo

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
ALISMATACEAE – 17/53				
Echinodorus – 12/25				
E. aschersonianus Graebn.	FAQ	-	-	-
E. bolivianus (Rusby) Holm-Niels.	FAQ	-	-	-
E. glandulosus Rataj	FAQ	-	-	-
E. grandiflorus (Cham. & Schltdl.) Micheli	FAQ	-	-	-
E. lanceolatus Rataj	FAQ	-	-	-
E. longipetalus Micheli	FAQ	-	-	-
E. macrophyllus (Kunth) Mich.	FAQ	-	-	-
E. palifolius (Nees & Mart.) J.F.Macbr.	FAQ	-	-	-
E. paniculatus Micheli	FAQ	-	-	-
E. pubescens (Mart.) Seub. *ex* Warm.	FAQ	-	-	-
E. subulatus Griseb.	FAQ	-	-	-
E. uruguayensis Arechav.	FAQ	-	-	-
Helanthium – 1/3				
H. tenellus (Mart. *ex* Schult. & Schult.f.) Buchenau	FAQ	-	-	-
Sagittaria – 4/25				
S. guayanensis Kunth	FAQ	-	-	-
S. lancifolia L.	FAQ	-	-	-
S. montevidensis Cham. & Schltdl.	FAQ	-	-	-
S. rhombifolia Cham.	FAQ	-	-	-

Alliaceae

Julie H. A. Dutilh

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
ALLIACEAE – 19/795				
Nothoscordum – 19/35				
N. aparadense Ravenna*	FCA	-	-	-
N. cambarense Ravenna*	FCA	-	-	-
N. capivarinum Ravenna*	FCA	-	-	-
N. catharinense Ravenna*	FCA	-	-	-
N. clevelandicum Ravenna*	FCA	-	-	-
N. curvipes Ravenna*	FCA	-	-	-
N. exile Ravenna*	FCA	-	-	-
N. gibbatum Ravenna*	FCA	-	-	-
N. gracile (Aiton) Stearn	FCA	-	-	-
N. gracilipes Ravenna*	FCA	-	-	-
N. ibiramense Ravenna*	FCA	-	-	-
N. leptogynum Ravenna*	FCA	-	-	-
N. luteomajus Ravenna*	FCA	-	-	-
N. muscorum Ravenna*	FCA	-	-	-
N. nudicaule (Lehm.) Guagl.	FCA	-	-	-
N. nutans Ravenna*	FCA	-	-	-
N. portoalegrense Ravenna*	FCA	-	-	-
N. sengesianum Ravenna*	FCA	-	-	-
N. tibaginum Ravenna*	FCA	-	-	-

Alstroemeriaceae

Marta Camargo de Assis

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
ALSTROEMERIACEAE – 24/190				
Alstroemeria – 23/100				
A. amabilis M.C.Assis*	FCA	-	VU	ANEXO II
A. apertiflora Baker*	FCA	-	VU	ANEXO II
A. capixaba M.C.Assis*	FES	-	CR	ANEXO I
A. calliantha M. C. Assis*	FOD	-	-	-
A. caryophyllaea Jacq.*	FOD, FES	-	-	-
A. cunha Vell.*	FOD, FES	-	-	-
A. foliosa Mart. *ex* Schult. & Schult.f.*	FES, AFL	-	-	-
A. fuscovinosa Ravenna*	FES	-	-	-
A. gardneri Baker	AFL	-	-	-
A. inodora Herb.*	FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
A. isabelleana Herb.	FCA	-	-	-
A. longistaminea Mart. *ex* Schult. & Schult.f.	FED	-		
A. longistyla Schenk	FCA	-	-	-
A. malmeana Kraenzl.	FCA	-	EN	ANEXO II
A. ochracea M.C.Assis	FES	-	-	-
A. plantaginea Mart. *ex* Schult. & Schult.f.	AFL	-	-	-
A. psittacina Lehm.	FES	-	-	-
A. radula Dusén*	FES	-	-	-
A. sellowiana Seub. *ex* Schenk*	FCA	-	-	-
A. speciosa M.C.Assis*	FOD, FES	-	-	-
A. stenophylla M.C.Assis	AFL	-	-	-
A. variegata M.C.Assis*	AFL	-	VU	ANEXO II
A. viridiflora Warm.	FES	-	-	-
Bomarea – 1/214				
B. edulis (Tussac.) Herb.	FES	-	-	-

Amaranthaceae

Maria Salete Marchioretto

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
AMARANTHACEAE – 22/2000				
Alternanthera – 3/100				
A. brasiliana (L.) Kuntze	FOD	-	-	-
A. sessilis (L.) DC	FOD	-	-	-
A. tenella Colla	FOM	-	-	-
Celosia – 2/45				
C. corymbifera Didr.	FOD	-	-	-
C. grandifolia Moq.	FOD	-	-	-
Chamissoa – 2/2				
C. acuminata Mart.	FOM	-	-	-
C. altissima (Jacq.) Kunth	FES	-	-	-
Chenopodium – 2/100				
C. album L.	RUD	-	-	-
C. ambrosioides L.	FOD, FOM, FES, FED, FCA	-	-	-
Gomphrena – 3/120				
G. elegans Mart.	FES	-	-	-
G. scandens (R.E.Fr.) J.C.Siqueira	FCA	-	VU	ANEXO I
G. vaga Mart.	FCA	-	-	-
Hebanthe – 3/7				
H. eriantha Mart.	FOM	-	-	-
H. pulverulenta Mart.	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
H. spicata Mart.	FES	-	-	-
Herbstia – 1/1				
H. brasiliana (Moquin) Sohmer	FOM	-	-	-
Iresine – 1/80				
I. diffusa Humb. & Bonpl.	FOM	-	-	-
*Lecosia** – 2/2				
L. formicarum Pedersen*	FOD	-	-	-
L. oppositifolia Pedersen*	FOD	-	CR	ANEXO I
Pfaffia – 3/30-40				
P. glomerata (Spreng.) Pedersen	FOM	-	-	-
P. gnaphaloides (L.f.) Mart.	FOD	-	-	-
P. tuberosa (Spreng.) Hicken	FOM	-	-	-

Amaryllidaceae

Julie H. A. Dutilh

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
AMARYLLIDACEAE – 40/227				
Crinum – 1/65				
C. americanum L.	RST, MAN, FOD	-	-	-
*Eithea** – 1/1				
E. blumenavia (K.Koch & Bouché) Ravenna*	FOD	-	-	-
Griffinia – 14/20				
G. alba Preuss & Meerow*	FOD	-	-	-
G. arifolia Ravenna*	FOD	-	-	-
G. colatinensis Ravenna*	FOD	-	-	-
G. concinna (Mart.) Ravenna*	FES	-	-	-
G. espiritensis Ravenna*	FOD, FES	-	VU	ANEXO II
G. hyacinthina Ker-Gawler*	FOD	-	-	-
G. ilheusiana Ravenna*	FOD	-	-	-
G. intermedia Lindl.*	FOD	-	-	-
G. itambensis Ravenna*	FES	-	-	-
G. mucurina Ravenna*	FOD	-	-	-
G. ornata Moore*	FOD	-	-	-
G. parviflora Ker-Gawler*	FOD	-	VU	ANEXO II
G. paubrasilica Ravenna*	FOD	-	VU	ANEXO II
G. rochae Morel*	FOD	-	VU	ANEXO II
Habranthus – 1/30				
H. concinnus Ravenna*	FES	-	-	-
Hippeastrum – 15/60				
H. aulicum Herb.*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
H. blossfeldiae (Traub & Doran) van Scheepen*	RST, FES	-	-	-
H. brasilianum (Traub & J.L.Doran) Dutilh*	AFL	-	VU	ANEXO I
H. breviflorum Herb.*	FCA, FAQ	-	EN	ANEXO II
H. calyptratum Herb.*	FOD	-	-	-
H. glaucescens (Mart.) Herb.	FCA	-	-	-
H. heuserianum Karsten*	FOD	-	-	-
H. lavrense Ravenna*	AFL	-	-	-
H. marumbiense (Ravenna) Van Scheepen*	FOD	-	-	-
H. papilio (Ravenna) Van Scheepen*	FES	-	CR	ANEXO II
H. psittacinum Herb.*	FES	-	EN	ANEXO II
H. puniceum (Lam.) Kuntze	FCA, FES, FED, AFL	-	-	-
H. reticulatum Herb.*	RST, FES	-	-	-
H. santacatarina (Traub) Dutilh*	FCA	-	EN	ANEXO II
H. striatum (Lam.) Moore*	FOD, FES	-	-	-
*Worsleya** – 1/1				
W. rayneri (Hook.) Traub. & Moldenke*	AFL	-	CR	ANEXO I
Zephyranthes – 7/50				
Z. amoena Ravenna*	FES	-	-	-
Z. capivarina Ravenna*	FES	-	-	-
Z. flavissima Ravenna*	FCA	-	-	-
Z. gratissima Ravenna*	FES	-	-	-
Z. lagesiana Ravenna*	FCA	-	-	-
Z. paranaensis Ravenna*	FCA	-	-	-
Z. robusta Baker	RST, FES	-	-	-

Anacardiaceae

Ary Teixeira de Oliveira-Filho

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
ANACARDIACEAE – 23/116				
Anacardium – 1/15				
A. occidentale L.	FES, FCA, RST	-	-	-
Astronium – 4/14				
A. concinnum Schott *ex* Spreng.*	FOD, FES	-	-	-
A. fraxinifolium Schott *ex* Spreng.	FES, FED, FCA	-	-	-
A. graveolens Jacq.	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
A. nelsonrosae Santin	FES, FCA	-	-	-
Cyrtocarpa – 1/6				
C. caatingae J.D.Mitch. & Daly	FES, FED, FCA	-	EN	ANEXO II
Lithraea – 2/10				
L. brasiliensis Marchand*	FOD, FOM, FES, FCA, RST	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
L. molleoides (Vell.) Engl.	FOD, FOM, FES, FED, FCA	-	-	-
Myracrodruon – 2/2				
M. balansae (Engl.) Santin	FES, FED, FCA	-	VU	ANEXO II
M. urundeuva M.Allemão	FES, FED, FCA	-	VU	ANEXO I
Schinopsis – 1/7				
S. brasiliensis Engl.	FES, FED, FCA	-	VU	ANEXO II
Schinus –5/30				
S. lentiscifolius Marchand	FOD, FOM, FES, FED, FCA	-	-	-
S. molle L.	FES, FED, FCA	-	-	-
S. pearcei Engl.	FES, FED, FCA	-	-	-
S. polygamus (Cav.) Cabrera	FOD, FOM, FES, FED, FCA, RST-		-	-
S. terebinthifolius Raddi*	FOD, FOM, FES, FED, FCA, RST-		-	-
Spondias – 4/11				
S. macrocarpa Engl.*	FOD, FES	-	-	-
S. mombin L.	FOD, FES, FED, RST	-	-	-
S. tuberosa Arruda	FES, FED, FCA	-	-	-
S. venulosa Mart. *ex* Engl.*	FOD, FES, FED, FCA, RST	-	-	-
Tapirira – 2/15				
T. guianensis Aubl.	FOD, FES, FCA, RST	-	-	-
T. obtusa (Benth.) J.D.Mitch.	FOD, FES, FCA	-	-	-
Thyrsodium – 1/6				
T. spruceanum Salzm. *ex* Benth.	FOD, FES	-	-	-

Annonaceae

Adriana Quintella Lobão, Paul J. M. Maas & Renato de Mello-Silva

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
ANNONACEAE – 86/2500				
Anaxagorea – 2/26				
A. dolichocarpa Sprague & Sandwith	FOD	-	-	-
A. silvatica R.E.Fr.*	FOD	-	EN	ANEXO II
Annona – 18/155				
A. acutiflora Mart.*	RST, FOD	-	-	-
A. bahiensis (Maas & Westra) H.Rainer*	FOD	-	-	-
A. cacans Warm.*	FOD	-	-	-
A. dolabripetala Raddi*	FOD	-	-	-
A. emarginata (Schltdl.) H.Rainer	FOD	-	-	-
A. exsucca DC.	FOD	-	-	-
A. ferruginea (R.E.Fr.) H.Rainer*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
A. glabra L.*	MAN	-	-	-
A. impressivenia Saff. *ex* R.E.Fr.*	FOD	-	-	-
A. maritima (Záchia) H.Rainer*	FOD	-	-	-
A. montana Macfad.	FOD	-	-	-
A. neosericea H.Rainer*	FOD	-	-	-
A. parviflora (A.St.-Hil.) H.Rainer*	FOD	-	-	-
A. pickelii (Diels) H.Rainer*	FOD	-	-	-
A. salzmannii A.DC.*	FOD	-	-	-
A. sylvatica A.St.-Hil.*	FOD	-	-	-
A. ubatubensis (Maas & Westra) H.Rainer*	FOD	-	-	-
A. xylopiifolia A.St.-Hil. & Tul.*	FOD	-	-	-
Bocagea – 2/3				
B. longepedunculata Mart.	FOD	-	-	-
B. viridis A.St.-Hil.	FOD	-	-	-
Cymbopetalum – 1/27				
C. brasiliense (Vell.) Benth. *ex* Baill.	FOD	-	-	-
Duguetia – 15/94				
D. bahiensis Maas*	FOD	-	-	-
D. chrysocarpa Maas*	FOD	-	-	-
D. flagellaris Huber	FOD	-	-	-
D. lanceolata A.St.-Hil.	FOD	-	-	-
D. magnolioidea Maas*	RST	-	EN	ANEXO II
D. microphylla (R.E.Fr.) R.E.Fr.*	FOD	-	-	-
D. moricandiana Mart.*	RST	-	-	-
D. pohliana Mart.*	FOD	-	-	-
D. restingae Maas*	RST	-	CR	ANEXO II
D. reticulata Maas*	FOD	-	EN	ANEXO II
D. riedeliana R.E.Fr.*	RST	-	-	-
D. salicifolia R.E.Fr.*	FOD	-	VU	ANEXO II
D. scottmorii Maas*	FOD	-	CR	ANEXO II
D. sessilis (Vell.) Maas*	RST	-	-	-
D. sooretamae Maas*	RST	-	VU	ANEXO II
Guatteria – 15/299				
G. australis A.St.-Hil.*	FOD	-	-	-
G. campestris R.E.Fr.	FOD	-	-	-
G. candolleana Schltdl.*	FOD, RST	-	-	-
G. emarginata Lobão *et al.**	FOD	-	-	-
G. ferruginea A.St.-Hil.*	FOD	-	-	-
G. latifolia (Mart.) R.E.Fr.*	FOD	-	-	-
G. macropus Mart.*	FOD	-	-	-
G. oligocarpa Mart.*	FOD	-	-	-
G. pogonopus Mart.*	FOD	-	-	-
G. pohliana Schltdl.*	FOD	-	-	-
G. schomburgkiana Mart.	FOD	-	-	-
G. sellowiana Schltdl.	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
G. stenocarpa Lobão *et al.**	FOD	-	-	-
G. aff. *tomentosa* Rusby	FOD	-	-	-
G. villosissima A.St.-Hil.	FOD, FES, FED	-	-	-
*Hornschuchia** – 10/10				
H. alba (A.St.-Hil.) R.E.Fr.*	RST	-	CR	ANEXO II
H. bryotrophe Nees*	FOD	-	-	-
H. cauliflora Maas & Setten*	FOD	-	EN	ANEXO II
H. citriodora D.M.Johnson*	FOD	-	-	-
H. leptandra D.M.Johnson*	FOD	-	-	-
H. lianarum D.M.Johnson*	FES	-	-	-
H. myrtillus Nees*	FOD	-	-	-
H. obliqua Maas & Setten*	FOD	-	EN	ANEXO II
H. polyantha Maas & Setten*	FOD	-	-	-
H. santosii D.M.Johnson*	FOD	-	-	-
Malmea – 1/14				
M. obovata R.E.Fr.*	FOD	-	CR	ANEXO II
Oxandra – 3/22				
O. martiana (Schltdl.) R.E.Fr.*	FOD	-	-	-
O. nitida R.E.Fr.*	FOD	-	-	-
O. reticulata Maas	FOD	-	-	-
Porcelia – 1/7				
P. macrocarpa (Warm.) R.E.Fr.*	FOD	-	-	-
Pseudoxandra – 2/22				
P. bahiensis Maas*	FOD	-	-	-
P. spiritus-sancti Maas*	FOD	-	-	-
Trigynaea – 2/8				
T. axilliflora D.M.Johnson & N.A.Murray*	FOD	-	VU	ANEXO II
T. oblongifolia Schltdl.*	FOD	-	-	-
Unonopsis – 6/50				
U. aurantiaca Maas & Westra*	FOD	-	-	-
U. bahiensis Maas & Orava*	FOD	-	-	-
U. bauxitae Maas *et al.**	FOD	-	-	-
U. renati Maas & Westra*	FOD	-	-	-
U. riedeliana R.E.Fr.*	FOD	-	VU	ANEXO II
U. sanctae-teresae Maas & Westra*	FOD	-	-	-
Xylopia – 8/150				
X. brasiliensis Spreng.*	FOD	-	-	-
X. decorticans D.M.Johnson & Lobão*	FOD	-	-	-
X. frutescens Aubl.*	FOD	-	-	-
X. involucrata M.C.Dias & Kinoshita*	FOD	-	-	-
X. laevigata (Mart.) R.E.Fr.	FOD	-	-	-
X. langsdorffiana A.St.-Hil. & Tul.*	FOD	-	-	-
X. ochrantha Mart.*	RST	-	-	-
X. sericea A.St.-Hil.	FOD	-	-	-

Apiaceae

Marcos Sobral

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
APIACEAE – 75/3540				
Apium – 2/25				
A. prostratum Labill.	FCA	-	-	-
A. sellowianum H.Wolff	FCA	-	-	-
Bowlesia – 1/15				
B. incana Ruiz & Pav.	FCA	-	-	-
Centella – 1/40				
C. asiatica (L.) Urb.	FCA	-	-	-
Cyclospermum –1/3				
C. leptophyllum (Pers.) Sprague *ex* Britton & P.Wilson	FCA	-	-	-
Daucus – 1/22				
D. pusillus Michx.	FCA	-	-	-
Eryngium – 61/250				
E. aloifolium Mart. *ex* Urb.*	FCA	-	-	-
E. bracteosum (DC.) Griseb.	FCA	-	-	-
E. canaliculatum Cham. & Schltdl.	FCA	-	-	-
E. ciliatum Cham. & Schltdl.	FCA	-	-	-
E. corallinum Mathias & Constance*	FCA	-	-	-
E. coronatum Hook. & Arn.	FCA	-	-	-
E. coronopifolium Decne.	FCA	-	-	-
E. decaisneanum Urb.	FCA	-	-	-
E. divaricatum Hook. & Arn.	FCA	-	-	-
E. dusenii H.Wolff*	FES	-	-	-
E. ebracteatum Lam.	FCA	-	-	-
E. eburneum Decne.	FCA	-	-	-
E. echinatum Urb.	FCA	-	-	-
E. ekmanii H.Wolff*	FES	-	-	-
E. elegans Cham. & Schltdl.	FCA	-	-	-
E. eriophorum Cham. & Schltdl.	FCA	-	-	-
E. eurycephalum Malme	FCA	-	-	-
E. falcifolium Irgang*	FCA	-	-	-
E. flaccidum Hook. & Arn.	FCA	-	-	-
E. floribundum Cham. & Schltdl.	FCA	-	-	-
E. fluminense Urb.	FCA	-	-	-
E. foetidum L.	FCA	-	-	-
E. foliosum Scheele	FCA	-	-	-
E. glaziovianum Urb.*	FCA	-	-	-
E. goulartii Glaz. & Urb. *ex* Urb.*	FCA	-	-	-
E. hemisphaericum Urb.	FCA	-	-	-
E. horridum Malme	FCA	-	-	-
E. junceum Cham. & Schltdl.	FCA	-	-	-
E. juncifolium (Urb.) Mathias & Constance	FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
E. koehneanum Urb.*	FCA	-	-	-
E. lacustre Pohl *ex* Urb.	FCA	-	-	-
E. leptophyllum Urb.	FCA	-	-	-
E. luzulifolium Cham. & Schltdl.	FCA	-	-	-
E. malmeanum H.Wolff	FCA	-	-	-
E. marginatum Pohl *ex* Urb.	FCA	-	-	-
E. megapotamicum Malme	FCA	-	-	-
E. nudicaule Lam.	FCA	-	-	-
E. nudum Gill. & Hook.	FCA	-	-	-
E. oligodon Griseb.	FCA	-	-	-
E. ombrophilum Dusén & Wolff*	FOD	-	-	-
E. pandanifolium Cham. & Schltdl.	FCA	-	-	-
E. paniculatum Cav. & Dombey *ex* F.Delaroche	FCA	-	-	-
E. paraguariense Urb.	FCA	-	-	-
E. pohlianum Urb.	FCA	-	-	-
E. pristis Cham. & Schltdl.	FCA	-	-	-
E. proliferum Brade*	FCA	-	-	-
E. ramboanum Mathias & Constance*	FCA	-	-	-
E. raulinii Mathias & Constance*	FCA	-	-	-
E. regnellii Malme	FCA	-	-	-
E. reitzii Mathias & Constance*	FCA	-	-	-
E. rochei Constance	FCA	-	-	-
E. sanguisorba Cham. & Schltdl.	FCA	-	-	-
E. schwackeanum Urb. *ex* H.Wolff	FCA	-	-	-
E. scirpinum Cham.	FCA	-	-	-
E. sellowii H.Wolff	FCA	-	-	-
E. serra Cham. & Schltdl.	FCA	-	-	-
E. smithii Mathias & Constance*	FCA	-	-	-
E. stenophyllum Urb.	FCA	-	-	-
E. subinerme (H.Wolff) Mathias & Constance	FCA	-	-	-
E. urbanianum H.Wolff*	FCA	-	-	-
E. zosterifolium H.Wolff*	FCA	-	-	-
Klotzschia – 3/3				
K. brasiliensis Cham.	FCA	-	-	-
K. glaziovii Urb.	FCA	-	-	-
K. rhizophylla Urb.	FCA	-	-	-
Lilaeopsis – 4/13				
L. attenuata (Hook. & Arn.) Fernald	FCA	-	-	-
L. brasiliensis (Glaz.) Affolter	?	-	-	-
L. caroliniensis J.M.Coult. & Rose	?	-	-	-
L. minor (A.W.Hill) Pérez-Mor.	FCA	-	-	-
Spananthe – 1/1				
S. paniculata Jacq.	FCA	-	-	-

Apocynaceae

Ingrid Koch & André Olmos Simões (Apocynoideae, Rauvolfioideae)
Alessandro Rapini & Jorge Fontella Pereira (Asclepiadoideae)

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
APOCYNACEAE – 323/4500				
Allamanda – 3/14				
A. cathartica L.	FES, FOD	-	-	-
A. doniana Müll.Arg.	AFL	-	-	-
A. schottii Pohl	FOD, FES	-	-	-
Araujia – 1/8				
A. sericifera Brot.	FOD, FOM, FED	-	-	-
Asclepias – 6/125				
A. aequicornu E.Fourn.	FCA	-	-	-
A. bracteolata E.Fourn.	RST, FCA	-	-	-
A. candida Vell.	FCA	-	-	-
A. curassavica L.	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
A. langsdorffii E.Fourn.	FCA	-	-	-
A. mellodora A.St.-Hil.	FCA, RST	-	-	-
Aspidosperma – 16/43				
A. australe Müll.Arg.*	FES, FOD	-	-	-
A. camporum Müll.Arg.*	FOD, FES	-	-	-
A. compactinervium Kuhlm.*	FOD	-	-	-
A. cuspa (Kunth) S.F.Blake *ex* Pittier	FES	-	-	-
A. cylindrocarpon Müll.Arg.*	FES	-	-	-
A. discolor A.DC.	FES, FOD	-	-	-
A. illustre (Vell.) Kuhlm. & Pirajá*	FES, RST	-	-	-
A. olivaceum Müll.Arg.*	FES	-	-	-
A. parvifolium A.DC.*	FOD	-	-	-
A. polyneuron Müll.Arg.*	FES	-	-	-
A. quirandy Hassl.	FES	-	-	-
A. ramiflorum Müll.Arg.*	FES, FOD	-	-	-
A. riedelii Müll.Arg.*	FES, AFL	-	-	-
A. spruceanum Benth. *ex* Müll.Arg.	FES, FOD	-	-	-
A. subincanum Mart.	FES	-	-	-
A. thomasii Marc.-Ferr.*	FOD	-	-	-
Bahiella – 2/2				
B. blanchetii (A.DC.) J.F.Morales	FOD	-	-	-
B. infundibuliflora J.F.Morales*	FOD	-	-	-
Barjonia – 1/6				
B. erecta (Vell.) K.Schum.	FCA	-	-	-
Blepharodon – 5/25				
B. ampliflorum E.Fourn.	FCA	-	-	-
B. bicuspidatum E.Fourn.	FOM, FCA	-	-	-
B. lineare (Decne.) Decne.	FCA	-	-	-
B. nitidum (Vell.) J.F.Macbr.	FOM, FCA	-	-	-
B. reflexum Malme	FOM	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Condylocarpon – 1/7				
C. isthmicum (Vell.) A.DC.	FES, FOD	-	-	-
Couma – 1/15				
C. rigida Müll.Arg.	FOD, FES	-	-	-
Cynanchum – 4/150				
C. brasiliense (Morillo) Liede & Meve*	?	-	-	-
C. caudiculatum Rapini*	FOM	-	-	-
C. montevidense Spreng.	FOM	-	-	-
C. roulinioides (E.Fourn.) Rapini	FOM	-	-	-
Ditassa – 32/100				
D. aequicymosa E.Fourn.	FOM	-	-	-
D. arianeae Fontella & E.A.Schwarz	RST	-	VU	ANEXO I
D. banksii R.Br. *ex* Schult.*	RST, FOM	-	-	-
D. bicolor Decne.*	FOD	-	-	-
D. blanchetii Decne.*	RST	-	-	-
D. burchellii Hook. & Arn.	FOD, RST, FOM	-	-	-
D. conceptionis Fontella*	FOD, FOM	-	-	-
D. congesta E.Fourn.	FOD	-	-	-
D. crassifolia Decne.*	RST	-	-	-
D. duartei Fontella & T.U.P.Konno*	FOD	-	-	-
D. edmundoi Fontella & Valente*	FOM	-	-	-
D. gracilis Hand.-Mazz.*	FOM, FCA	-	-	-
D. hispida (Vell.) Fontella	FOM, FOD, RST	-	-	-
D. imbricata E.Fourn.*	FOD	-	-	-
D. laevis Mart.*	FCA	-	VU	ANEXO II
D. lenheirensis Silveira	FCA	-	-	-
D. leonii Fontella & T.U.P.Konno*	FCA	-	VU	ANEXO II
D. linearis Mart.*	FCA	-	-	-
D. longicaulis (E.Fourn.) Rapini	FOM	-	-	-
D. longisepala (Hua) Fontella & E.A.Schwarz*	FCA	-	-	-
D. maricaensis Fontella & E.A.Schwarz*	RST	-	EN	ANEXO I
D. mucronata Mart.	FOM	-	-	-
D. nitida Decne.*	FOM	-	-	-
D. obcordata Mart.	FOM	-	-	-
D. oberdanii Fontella & M.Alvarez*	FOD	-	-	-
D. oxyphylla Turcz.	FOM	-	-	-
D. pedunculata Malme*	FCA	-	-	-
D. pohliana E.Fourn.	FOM	-	-	-
D. retusa Mart.	FCA	-	-	-
D. subumbellata Malme*	FOD, RST	-	-	-
D. succedanea Rapini	FCA	-	-	-
D. tomentosa (Decne.) Fontella	FOD, FOM, FCA	-	-	-
Fischeria – 1/6				
F. stellata (Vell.) E.Fourn.	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
Forsteronia – 11/46				
F. australis Müll.Arg.	FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
F. cordata (Müll.Arg.) Woodson	FOD, RST	-	-	-
F. glabrescens Müll.Arg.	FES	-	-	-
F. leptocarpa (Hook. & Arn.) A.DC.*	FOD	-	-	-
F. montana Müll.Arg.*	FOD, RST	-	-	-
F. pilosa (Vell.) Müll.Arg.	FES	-	-	-
F. pubescens A.DC.	FES	-	-	-
F. refracta Müll.Arg.*	FES, FOD	-	-	-
F. rufa Müll.Arg.	FOD	-	-	-
F. thyrsoidea (Vell.) Müll.Arg.*	FES	-	-	-
F. velloziana (A.DC.) Woodson	FES	-	-	-
Funastrum – 1/17				
F. clausum (Jacq.) Schltr.	FOM, RST	-	-	-
Geissospermum – 1/5				
G. laeve (Vell.) Miers	FOD	-	-	-
Gonolobus – 3/145				
G. dorothyanus Fontella*	RST	-	EN	ANEXO I
G. parviflorus Decne.	FOD, FOM	-	-	-
G. rostratus (Vahl) R.Br. *ex* Schltr.	FOD, FOM	-	-	-
Gyrostelma – 2/2				
G. bornmuelleri Schltr. *ex* Malme*	FCA	-	-	-
G. oxypetaloides E.Fourn.	FCA	-	-	-
Hemipogon – 4/15				
H. acerosus Decne.	FCA	-	-	-
H. carassensis (Malme) Rapini	FCA	-	-	-
H. hemipogonoides (Malme) Rapini	FCA	-	-	-
H. setaceus Decne.	FCA	-	-	-
Himatanthus – 2/13				
H. bracteatus (A.DC.) Woodson	FOD	-	-	-
H. drasticus (Müll.Arg.) Woodson	FOD, RST	-	-	-
*Hypolobus** – 1/1				
H. infractus E.Fourn.*	?	-	-	-
Jobinia – 6/12				
J. connivens (Hook. & Arn.) Malme	FOM, FOD, RST	-	-	-
J. grandis (Hand.-Mazz.) Fontella & Goes	FOD	-	-	-
J. hatschbachii Fontella & E.A.Schwarz	FOM	-	-	-
J. lindbergii E.Fourn.	FOD, FOM, FCA	-	-	-
J. longicoronata Goes & Fontella*	FOD	-	-	-
J. paranaensis Fontella & Valente*	FOD	-	-	-
*Kerbera** – 1/1				
K. eichleri E.Fourn.*	?	-	-	-
Lacmellea – 2/22				
L. bahiensis J.F.Morales*	FOD	-	-	-
L. pauciflora (Kuhlm.) Markgr.	FOD	-	-	-
Macoubea – 2/2				
M. guianensis Aubl.	FOD	-	-	-
M. sprucei (Müll.Arg.) Markgr.	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Macroditassa – 8/15				
M. adnata (E.Fourn.) Malme	FCA	-	-	-
M. grandiflora (E.Fourn.) Malme	FOD, FOM, RST	-	-	-
M. lagoensis (E.Fourn.) Malme	FOM	-	-	-
M. laurifolia (Decne.) Fontella	FOM	-	-	-
M. laxa (Malme) Fontella & de Lamare*	FOM	-	-	-
M. macrophylla Malme	FOM	-	-	-
M. marianae Fontella & M.V.Ferreira*	RST	-	-	-
M. morilloana Fontella & M.V.Ferreira*	FOM	-	-	-
Macroscepis – 1/19				
M. aurea E.Fourn.	FED	-	-	-
Malouetia – 1/25				
M. cestroides (Nees *ex* Mart.) Müll.Arg.	FOD	-	-	-
Mandevilla – 32/108				
M. atroviolacea (Stadelm.) Woodson	FES, FCA, AFL	-	-	-
M. clandestina J.F.Morales	FES	-	-	-
M. coccinea (Hook. & Arn.) Woodson	FOD	-	-	-
M. crassinoda (Gardner) Woodson*	FOD	-	-	-
M. duartei Markgr.*	AFL	-	-	-
M. emarginata (Vell.) C.Ezcurra	AFL, FES	-	-	-
M. fistulosa M.F.Sales *et al.**	AFL	-	-	-
M. fragrans (Stadelm.) Woodson*	FOD, RST	-	-	-
M. funiformis (Vell.) K.Schum.	FOD, RST	-	-	-
M. grazielae M.F.Sales *et al.**	AFL	-	-	-
M. guanabarica Casar. *ex* M.F.Sales *et al.**	FOD, RST	-	-	-
M. harleyi M.F.Sales *et al.**	AFL	-	-	-
M. hirsuta (A.Rich.) K.Schum.	FES	-	-	-
M. illustris (Vell.) Woodson	FES	-	-	-
M. immaculata Woodson*	FOD	-	-	-
M. lucida Woodson*	FOD	-	-	-
M. luetzelburgii Woodson*	AFL	-	-	-
M. martiana (Stadelm.) Woodson*	AFL, FES	-	-	-
M. moricandiana (A.DC.) Woodson	RST	-	-	-
M. pendula (Ule) Woodson*	FOD	-	-	-
M. pentlandiana (A.DC.) Woodson	RST	-	-	-
M. permixta Woodson*	FOD	-	-	-
M. pohliana (Stadelm.) A.H.Gentry	RST, FCA	-	-	-
M. scabra (Hoffmanns. *ex* Roem. & Schult.) K.Schum.	FCA, FES	-	-	-
M. sellowii (Müll.Arg.) Woodson*	FES, AFL	-	-	-
M. spigeliiflora (Stadelm.) Woodson	FES	-	-	-
M. splendens (Hook.f.) Woodson*	FES, FOD	-	-	-
M. tenuifolia (J.C.Mikan) Woodson	FCA, FES	-	-	-
M. urceolata Markgr.*	FES, FCA	-	-	-
M. urophylla (Hook.f.) Woodson	FOD	-	-	-
M. venulosa (Müll.Arg.) Woodson*	AFL	-	-	-
M. widgrenii C.Ezcurra	FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Marsdenia – 12/300				
M. altissima (Jacq.) Dugand	FOM, FCA	-	-	-
M. amorimii Morillo*	RST	-	-	-
M. carvalhoi Morillo & Carnevali*	FOD	-	-	-
M. dorothyae Fontella & Morillo*	RST	-	-	-
M. glaziovii (E.Fourn.) Spellman & Morillo*	?	-	-	-
M. hilariana E.Fourn.	FOD, FOM, RST	-	-	-
M. loniceroides (Hook.) E.Fourn.*	FOD, RST, AFL	-	-	-
M. macrophylla (Humb. & Bonpl.) E.Fourn.	FOD	-	-	-
M. montana Malme	FOD	-	-	-
M. otoniense Fontella & Morillo*	FES	-	-	-
M. sessilifolia (E.Fourn.) Fontella*	FCA, AFL	-	-	-
M. suberosa (E.Fourn.) Malme	FOM	-	-	-
Matelea – 17/250				
M. bahiensis Morillo & Fontella*	FOD, RST	-	VU	ANEXO II
M. barrosiana Fontella*	FOD	-	-	-
M. capillacea (E.Fourn.) Fontella & E.A.Schwarz	FOD	-	-	-
M. denticulata (Vahl) Fontella & E.A.Schwarz	FOD, FOM	-	-	-
M. dusenii Morillo*	FOM	-	-	-
M. fournieri Morillo*	?	-	-	-
M. glaziovii (E.Fourn.) Morillo	FOD	-	-	-
M. hatschbachii (Fontella & Valente) Morillo*	?	-	-	-
M. marcoassisii Fontella*	FOD	-	VU	ANEXO I
M. maritima (Vell.) Fontella	FES, RST, FOM	-	-	-
M. orthosioides (E.Fourn.) Fontella	FOD	-	-	-
M. pedalis (E.Fourn.) Fontella & E.A.Schwarz	FOD	-	-	-
M. pyrrhotricha (Decne.) Fontella	FOD	-	-	-
M. quinquedentata (E.Fourn.) Morillo*	RST	-	-	-
M. reitzii Fontella*	FOM	-	-	-
M. riparia Morillo	FOD	-	-	-
M. santosii Morillo & Fontella*	FOD, FOM	-	VU	ANEXO II
Mesechites – 1/10				
M. mansoanus (A.DC.) Woodson	FES	-	-	-
Minaria – 6/19				
M. abortiva (Silveira) Rapini	FCA	-	-	-
M. acerosa (Mart.) T.U.P.Konno & Rapini	FCA, AFL	-	-	-
M. cordata (Turcz.) T.U.P.Konno & Rapini	FCA	-	-	-
M. decussata (Mart.) T.U.P.Konno & Rapini	FCA, AFL, RST	-	-	-
M. micromeria (Decne.) T.U.P.Konno & Rapini	FCA	-	-	-
M. monocoronata (Rapini) T.U.P.Konno & Rapini*	FCA, AFL	-	-	-
Nautonia – 1/1				
N. nummularia Decne.	FCA	-	-	-
Odontadenia – 1/20				
O. gracilipes (Stadelm.) Woodson	FES	-	-	-
Orthosia – 15/40				
O. arenosa Decne.*	RST	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
O. congesta Decne.	FOD, FOM	-	-	-
O. dusenii (Malme) Fontella*	FOD	-	-	-
O. eichleri E.Fourn.*	FOD	-	-	-
O. guilleminiana (Decne.) Liede & Meve	FOD, FOM	-	-	-
O. hatschbachii Fontella & Goes*	FOM	-	-	-
O. itatiaiensis Malme*	FOD	-	-	-
O. latipes (Decne.) Malme*	FOM	-	-	-
O. loandensis Fontella & Valente*	FOD	-	-	-
O. multiflora E.Fourn.*	FOM	-	-	-
O. parviflora (E.Fourn.) Liede & Meve	FOD	-	-	-
O. scoparia (Nutt.) Liede & Meve	FOD, FOM	-	-	-
O. umbrosa Decne.*	FOD	-	-	-
O. urceolata E.Fourn.	FOD, FOM	-	-	-
O. virgata (Poir.) E.Fourn.	FES	-	-	-
Oxypetalum – 69/130				
O. alpinum (Vell.) Fontella	RST, FOD, FCA, FES	-	-	-
O. appendiculatum Mart.	FCA, FES, FOM, FOD	-	-	-
O. arachnoideum E.Fourn.	FOD, FOM, FES	-	-	-
O. arnnotianum Buek	FCA, RST	-	-	-
O. balansae Malme	FES	-	-	-
O. banksii R.Br. *ex* Schult.	RST, FOM, FOD	-	-	-
O. capitatum Mart.	FCA	-	-	-
O. charrua T.Mey.*	FCA	-	-	-
O. chodatianum Malme	FCA	-	-	-
O. coalitum E.Fourn.	FCA	-	-	-
O. commersonianum (Decne.) Fontella & E.A.Schwarz	FCA	-	-	-
O. confusum Malme	FCA	-	-	-
O. costae Occhioni*	FOD	-	-	-
O. crispum Wight *ex* Hook. & Arn.	FCA	-	-	-
O. curtifolium Malme	FCA	-	-	-
O. dusenii Malme*	FCA	-	-	-
O. erectum Mart.	FCA	-	-	-
O. erianthum Decne.	FOM	-	-	-
O. erostre E.Fourn.	FOM, FCA	-	-	-
O. foliosum Mart.	FCA	-	-	-
O. glabrum (Decne.) Malme	FCA	-	-	-
O. glaziovianum Loes.*	FOD	-	-	-
O. glaziovii (E.Fourn.) Fontella & Marquete*	FOM, FCA	-	-	-
O. hoehnei Malme*	FOM, FCA	-	-	-
O. humile (Morong) Hassl.	FCA	-	-	-
O. incanum E.Fourn.	FCA	-	-	-
O. insigne (Decne.) Malme*	FOD, FOM, FCA, RST	-	-	-
O. jacobinae Decne.	FOM, FCA	-	-	-
O. joergensenii T.Mey.	FCA	-	-	-
O. kleinii Fontella & Marquete*	FOD	-	-	-
O. lanatum Decne. *ex* E.Fourn.*	FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
O. leonii Fontella*	FCA	-	VU	ANEXO II
O. lineare Decne.	FCA	-	-	-
O. lutescens E.Fourn.*	FOM	-	-	-
O. macrolepis (Hook. & Arn.) Decne.	FOM	-	-	-
O. malmei Hoehne	FCA	-	-	-
O. martii E.Fourn.	FCA	-	-	-
O. megapotamicum Spreng.	FOM	-	-	-
O. mexiae Malme*	FOD, FES	-	-	-
O. microphyllum Hook. & Arn.	FCA	-	-	-
O. minarum E.Fourn.*	FCA	-	-	-
O. molle Hook. & Arn.	FOM, FOD, FED	-	-	-
O. montanum Mart.	FCA	-	-	-
O. morilloanum Fontella*	FCA	-	-	-
O. mosenii (Malme) Malme	FCA, FOM	-	-	-
O. muticum E.Fourn.	FCA	-	-	-
O. obtusifolium Malme	FCA, FOM	-	-	-
O. ostenii Malme	FOM	-	-	-
O. pachyglossum Decne.	FCA, FOM	-	-	-
O. pachygynum Decne.	FCA	-	-	-
O. pannosum Decne.	FCA, FES, FOM, FOD	-	-	-
O. parviflorum (Decne.) Decne.	FCA	-	-	-
O. patulum E.Fourn.	FCA	-	-	-
O. pedicellatum Decne.*	FOD, FOM	-	-	-
O. pilosum Gardner*	FOD, FOM	-	-	-
O. polyanthum (Hoehne) Rapini	FCA	-	-	-
O. rariflorum Malme*	FOM, FCA	-	-	-
O. regnellii (Malme) Malme*	FOD, FOM	-	-	-
O. reitzii Fontella & Marquete*	FOD	-	-	-
O. schottii E.Fourn.*	FOD, FOM	-	-	-
O. solanoides Hook. & Arn.	FCA	-	-	-
O. stipatum Malme	FCA?	-	-	-
O. strictum Mart.	FCA	-	-	-
O. sublanatum Malme	FCA, FOD, FOM	-	-	-
O. subopposítum Malme	FCA	-	-	-
O. tomentosum Wight *ex* Hook. & Arn.*	RST	-	-	-
O. tubatum Malme*	FCA, RST, FOD, FOM	-	-	-
O. warmingii (E.Fourn.) Fontella & Marquete	FCA	-	-	-
O. wightianum Hook. & Arn.*	FOD, FOM	-	-	-
Peltastes – 1/5				
P. peltatus (Vell.) Woodson	FOD, FES	-	-	-
Peplonia – 6/6				
P. asteria (Vell.) Fontella & E.A.Schwarz*	RST	-	-	-
P. axillaris (Vell.) Fontella & Rapini*	RST, FOM, FOD	-	-	-
P. bradeana (Fontella & E.A.Schwarz) Fontella & Rapini*	FOM	-	-	-
P. hatschbachii (Fontella & E.Lam.) Fontella & Rapini*	FOD	-	-	-
P. organensis (E.Fourn.) Fontella & Rapini	FOM	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
P. riedelii (E.Fourn.) Fontella & Rapini*	FOD	-	-	-
Petalostelma – 1/10				
P. calcaratum (Decne.) Fontella	FOM, FES	-	-	-
Prestonia – 14/60				
P. acutifolia (Benth. *ex* Müll.Arg.) K.Schum.	FES	-	-	-
P. bahiensis Müll.Arg.	FES	-	-	-
P. calycina Müll.Arg.	FES	-	-	-
P. coalita (Vell.) Woodson	FES	-	-	-
P. denticulata (Vell.) Woodson*	FOD	-	-	-
P. didyma (Vell.) Woodson	FOD	-	-	-
P. dusenii (Malme) Woodson	FOD	-	-	-
P. hassleri Woodson	FES	-	-	-
P. lindmanii (Malme) Hoehne	FES	-	-	-
P. perplexa Woodson	FOD	-	-	-
P. riedelii (Müll.Arg.) Woodson	FES	-	-	-
P. solanifolia (Müll.Arg.) Markgr.	FES	-	-	-
P. tomentosa R.Br.	FES, RST	-	-	-
P. trifida (Poepp.) Woodson*	FOD	-	-	-
Pseudibatia – 1/1				
P. suberosa Malme	FCA	-	-	-
Rauvolfia – 8/80				
R. atlantica Emygdio*	FOD	-	-	-
R. bahiensis A.DC.*	FOD, RST	-	-	-
R. capixabae I.Koch & Kin.-Gouv.*	RST	-	-	-
R. grandiflora Mart.*	FOD, RST	-	-	-
R. mattfeldiana Markgr.	FES, RST	-	-	-
R. moricandii A.DC.*	FES	-	-	-
R. pruinosifolia I.Koch & Kin.-Gouv.*	FES	-	-	-
R. sellowii Müll.Arg.*	FES	-	-	-
Rhabdadenia – 1/4				
R. pohlii Müll.Arg.	FES	-	-	-
Schistogyne – 2/8				
S. decaisneana H.Karst.	FCA	-	-	-
S. sylvestris Hook. & Arn.	FOM	-	-	-
Schubertia – 2/5				
S. grandiflora Mart.	FOM	-	-	-
S. multiflora Mart.	FES	-	-	-
Secondatia – 1/7				
S. densiflora A.DC.	FES, CE	-	-	-
Skytanthus – 1/3				
S. hancorniifolius (A.DC.) Miers	FOD, RST	-	-	-
Tabernaemontana – 6/110				
T. catharinensis A.DC.	FES	-	-	-
T. flavicans Willd. *ex* Roem. & Schult.	FOD, FES	-	-	-
T. hystrix Steud.	FOD, FES	-	-	-
T. laeta Mart.	FOD, FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
T. salzmannii A.DC.*	FOD	-	-	-
T. solanifolia A.DC.	FES	-	-	-
Tassadia – 3/24				
T. berteriana (Spreng.) D.W.Stevens	FOM, FES	-	-	-
T. obovata Decne.	FOD	-	-	-
T. propinqua Decne.	FOD, FES, FOM, RST	-	-	-
Temnadenia – 2/4				
T. odorifera (Vell.) J.F.Morales*	FOD, RST	-	-	-
T. violacea (Vell.) Miers	FES	-	-	-
Widgrenia – 1/1				
W. corymbosa Malme	FCA	-	-	-

Apodanthaceae

Marcos Sobral

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
APODANTHACEAE – 5/25				
Apodanthes – 2/7				
A. casearíae Poit.	FOD	-	-	-
A. minarum Vattimo-Gil	FOD	-	-	-
Pilostyles – 3/12				
P. ingae (H.Karst.) Hook.f.	FOD	-	-	-
P. stawiarskii Vattimo-Gil	FOD	-	-	-
P. ulei Solms	FOD	-	-	-

Aquifoliaceae

Milton Groppo

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
AQUIFOLIACEAE – 32/> 500				
Ilex – 32/> 500				
I. affinis Gardner	FES	-	-	-
I. biserrulata Loes.	FOD?	-	-	-
I. blanchetii Loes.*	RST	-	-	-
I. brasiliensis (Spreng.) Loes.	FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
I. brevicuspis Reissek*	FOD, FOM	-	-	-
I. buxifolia Gardner*	AFL	-	-	-
I. cerasifolia Reissek	FES	-	-	-
I. cognata Reissek*	?	-	-	-
I. congonhinha Loes.*	AFL	-	-	-
I. conocarpa Reissek	AFL	-	-	-
I. dumosa Reissek	FOD, FOM, FCA, AFL, RST	-	-	-
I. euryiformis Reissek*	AFL	-	-	-
I. floribunda Reissek *ex* Maxim.*	RST	-	-	-
I. friburgensis Loes.*	AFL	-	-	-
I. glazioviana Loes.*	AFL	-	-	-
I. grandis Reissek	FOD	-	-	-
I. integerrima (Vell.) Reissek*	AFL, FCA, FOD, FOM, RST	-	-	-
I. longipetiolata Loes.*	RST?	-	-	-
I. loranthoides Mart. *ex* Reissek*	AFL	-	VU	ANEXO II
I. lundii Warm.	AFL	-	-	-
I. microdonta Reissek*	FOD, FOM	-	-	-
I. nummularia Reissek	AFL, FCA	-	-	-
I. oligoneura Loes.	AFL	-	-	-
I. organensis Loes.*	AFL	-	-	-
I. paraguariensis A.St.-Hil.	FOD, FOM	-	-	-
I. psammophila Mart. *ex* Reissek*	RST	-	-	-
I. pseudobuxus Reissek*	FOD, AFL, RST	-	-	-
I. sapotifolia Reissek	FOD	-	-	-
I. schwackeana Loes.*	FOM	-	-	-
I. taubertiana Loes.*	FOD, FOM	-	-	-
I. theezans Mart. *ex* Reissek	FOD, FOM, FCA, AFL, RST	-	-	-
I. virgata Loes.*	AFL?, FOM?	-	-	-

Araceae

Marcus Alberto Nadruz Coelho, Cássia Mônica Sakuragui, Eduardo Gomes Gonçalves, Lívia Temponi & Rodrigo Teófilo Valadares

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
ARACEAE – 165/4.025				
Anthurium – 70/ca. 1000				
A. acutum N.E.Br.*	FOD	-	-	-
A. ameliae Nadruz & Catharino*	FOD	-	-	-
A. augustinum K.Koch & Lauche*	FOD	-	-	-
A. bellum Schott*	RST, FOD	-	-	-
A. binotii Linden*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
A. bocainense Catharino & Nadruz*	FOD	-	-	-
A. boudetii Nadruz*	FOD	-	-	-
A. brachypodum G.Barroso*	FOD	-	-	-
A. bragae Nadruz*	FOD	-	-	-
A. bromelicola Mayo & L.P.Felix*	RST	-	-	-
A. cleistanthum G.Barroso*	RST, FOD	-	-	-
A. comtum Schott*	FOD	-	-	-
A. coriaceum G.Don*	FOD	-	-	-
A. eichleri Engl.*	FOD, AFL	-	-	-
A. fontellanus Nadruz & Leoni*	FOD	-	CR	ANEXO II
A. fragae Nadruz*	FOD	-	-	-
A. galeottii K.Koch*	FOD	-	-	-
A. gaudichaudianum Kunth*	FOD	-	-	-
A. geitnerianum A.Regel*	FOD	-	-	-
A. gladiifolium Schott*	FOD	-	-	-
A. gomesianum Nadruz*	FOD	-	-	-
A. harrisii (Graham) Endl.*	RST, FOD	-	-	-
A. hoehnei K.Krause*	FOD	-	-	-
A. ianthinopodium (Schott *ex* Engl.) Nadruz & Mayo*	FOD	-	-	-
A. inconspicuum N.E.Br.*	FOD	-	-	-
A. intermedium Kunth*	FOD, FED	-	-	-
A. itanhaense Engl.*	RST, FOD	-	-	-
A. jilekii Schott*	FOD	-	-	-
A. jureianum Catharino & Olaio*	FOD	-	-	-
A. langsdorffii Schott*	FOD	-	VU	ANEXO I
A. laucheanum K.Koch*	FOD	-	-	-
A. leonii E.G.Gonç.*	FES	-	-	-
A. lhotzkyanum Schott*	FOD	-	-	-
A. loefgrenii Engl.*	RST, FOD	-	-	-
A. longicuspidatum Engl.*	FOD	-	-	-
A. longifolium (Hoffmanns.) G.Don*	FOD	-	-	-
A. longipes N.E.Br.	RST	-	-	-
A. lucidum Kunth*	FOD	-	VU	ANEXO II
A. lucioi Nadruz*	FOD, FES	-	-	-
A. luschnathianum Kunth*	RST, FOD	-	VU	ANEXO I
A. marense K.Krause*	FOD	-	-	-
A. maricense Nadruz & Mayo*	RST	-	-	-
A. maximilianii Schott*	FOD	-	-	-
A. megapetiolatum E.G.Gonç.*	FES	-	-	-
A. microphyllum (Raf.) G.Don*	FOD	-	-	-
A. minarum Sakur. & Mayo	FOD, FES	-	-	-
A. miquelianum C.Koch & Augustin*	FOD	-	-	-
A. mourae Engl.*	FES	-	-	-
A. nitidulum Engl.*	FOD	-	-	-
A. organense Engl.*	FOD	-	-	-
A. parasiticum (Vell.) Stellfeld*	FOD, FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
A. parvum N.E.Br.*	FOD, FES	-	-	-
A. pentaphyllum (Aubl.) G.Don	RST, FOD, FES	-	-	-
A. petrophilum K.Krause	FED	-	-	-
A. pilonense Reitz*	FOD	-	-	-
A. radicans K.Koch & Haage*	FOD	-	-	-
A. regnellianum Engl.*	FOD	-	-	-
A. santaritensis Nadruz & Croat*	FES	-	-	-
A. scandens (Aubl.) Engl.*	RST, FOD, FED, FES	-	-	-
A. sellowianum Kunth*	FOD, FES	-	-	-
A. simonii Nadruz*	FOD	-	-	-
A. sinuatum Benth. *ex* Schott	FED, FES	-	-	-
A. solitarium Schott*	FOD, FES	-	-	-
A. sucrei G.Barroso*	FOD	-	-	-
A. undatum Schott*	FES	-	-	-
A. unense Catharino & Nadruz*	FOD	-	-	-
A. urvilleanum Schott*	RST, FOD	-	-	-
A. validinervium Engl.*	RST, FOD	-	-	-
A. victorii Nadruz & Catharino*	FOD	-	-	-
A. xanthophylloides G.Barroso*	FOD	-	-	-
Asterostigma – 10/10				
A. colubrinum Schott*	FES, FOD	-	-	-
A. concinnum Schott*	FES, FOD	-	-	-
A. cryptostylum Bogner	FES	-	-	-
A. cubense (A.Rich.) K.Krause *ex* Bogner*	FOD	-	-	-
A. lividum (Lodd.) Engl.*	FOD	-	-	-
A. lombardii E.G.Gonç.*	FES, FOD	-	-	-
A. luschnathianum Schott*	FES, FOD	-	-	-
A. reticulatum E.G.Gonç.*	FOM	-	-	-
A. riedelianum (Schott) Kuntze*	FOD	-	-	-
A. tweedianum Schott*	FOD, FOM	-	-	-
Caladium – 2/12				
C. bicolor (Aiton) Vent.	FES, FOD	-	-	-
C. striatipes (Kunth & C.D.Bouché) Schott	FES	-	-	-
*Dracontioides** – 1/1				
D. desciscens (Schott) Engl. *	FED, FOD	-	-	-
Heteropsis – 3/19				
H. oblongifolia Kunth	RST, FOD, FES	-	-	-
H. rigidifolia Engl.*	FOD	-	-	-
H. salicifolia Kunth*	FES, FOD	-	-	-
Lemna – 3/12				
L. aequinoctialis Welw.	FOD, FAQ	-	-	-
L. minuta Kunth	FOM, FAQ	-	-	-
L. valdiviana Phil.	FOD, FAQ	-	-	-
Mangonia – 1/2				
M. tweediana Schott	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Monstera – 3/ca. 40				
M. adansonii Schott	RST, FOD, FES	-	-	-
M. obliqua Miq.	FOD	-	-	-
M. praetermissa E.G.Gonç. & Temponi*	FOD	-	-	-
Montrichardia – 1/2				
M. linifera (Arruda) Schott	RST, MAN, FOD, FAQ	-	-	-
Philodendron – 53/ca. 500				
P. acutatum Schott	FOD, FCA, AFL	-	-	-
P. adamantinum Mart.	AFL	-	-	-
P. aemulum Schott*	FOD	-	-	-
P. alternans (Vell.) Schott*	FOD	-	-	-
P. altomacaense Nadruz & Mayo*	FOD	-	-	-
P. appendiculatum Nadruz & Mayo*	FOD. FOM, FES	-	-	-
P. bipennifolium Schott*	FOD, RST	-	-	-
P. bipinnatifidum Schott	FOM, FES, FCA, FOD	-	-	-
P. biribiriense Sakur. & Mayo	AFL	-	-	-
P. blanchetianum Schott*	FOD, AFL	-	-	-
P. brasiliense Engl.	FCA	-	-	-
P. cipoense Sakur. & Mayo	AFL	-	-	-
P. corcovadense Kunth*	RST	-	-	-
P. cordatum Schott*	FOD, FOM, RST	-	-	-
P. crassinervium Lindl.*	FOD, FOM, FES, AFL	-	-	-
P. curvilobum Schott*	FOD	-	-	-
P. dardanianum Mayo	FCA	-	-	-
P. edmundoi G.Barroso*	FOD, FOM	-	-	-
P. eximium Schott*	FOD	-	-	-
P. fragrantissimum (Hook.) G.Don	FOD	-	-	-
P. fragile Nadruz & Mayo*	FOD	-	VU	ANEXO I
P. glaziovii Hook.f.*	FOD, AFL	-	-	-
P. hastatum K.Koch & Sello*	FOD	-	-	-
P. hatschbachii Nadruz & Mayo*	FOD	-	-	-
P. hederaceum (Jacq.) Schott	RST	-	-	-
P. inops Schott*	FOD	-	-	-
P. kautskyi G.S.Bunting	FOD	-	-	-
P. leal-costae Mayo & G.Barroso	AFL	-	-	-
P. loefgrenii Engl.*	FOM, FES	-	-	-
P. longilaminatum Schott*	RST, FOD	-	-	-
P. martianum Engl.*	FOD, FOM	-	-	-
P. millerianum Nadruz & Sakur.*	FOD	-	-	-
P. minarum Engl.	AFL	-	-	-
P. missionum (Hauman) Hauman*	FOD, FOM, FES	-	-	-
P. obliquifolium Engl.*	FOD, FOM	-	-	-
P. ochrostemon Schott*	FOD	-	-	-
P. ornatum Schott*	FOD	-	-	-
P. paludicola E.G.Gonç. & Salviani*	FOD	-	-	-
P. pedatum (Hook.) Kunth*	FOD, FOM, RST	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
P. propinquum Schott*	FOD	-	-	-
P. recurvifolium Schott	FOD	-	-	-
P. renauxii Reitz*	FOD	-	-	-
P. rhizomatosum Sakur. & Mayo	AFL	-	-	-
P. roseopetiolatum Nadruz & Mayo*	FOD	-	-	-
P. rudgeanum Schott	FOD, FES	-	-	-
P. simonianum Sakur.*	FOD	-	-	-
P. speciosum Schott *ex* Endl.*	FOD	-	-	-
P. spirictus-sancti G.S.Bunting*	FOD	-	CR	ANEXO I
P. stenolobum E.G.Gonç.*	FOD	-	-	-
P. surinamense (Miq.) Engl.	FOD	-	-	-
P. tenuispadix E.G.Gonç.	FOD	-	-	-
P. vargealtense Sakur.*	FOD	-	-	-
P. williamsii Hook.f.*	FOD	-	-	-
Pistia – 1/1				
P. stratiotes Link	FOD, FES	-	-	-
Rhodospatha – 2/ca. 75				
R. latifolia Poepp.	FOD, FED, FES	-	-	-
R. oblongata Poepp.	FOD, FED, FES	-	-	-
Spathicarpa – 1/5				
S. hastifolia Hook.	FES, FOM	-	-	-
Spirodela – 1/3				
S. intermedia W.Koch	FOD, FOM, FAQ	-	-	-
Stenospermation – 1/ca. 60				
S. ulei K.Krause	FOD, FAQ	-	-	-
Syngonium – 1/36				
S. podophyllum Schott	FES, FOD, FED	-	-	-
Taccarum – 2/5				
T. peregrinum (Schott) Engl.	FOM	-	-	-
T. warmingii Engler.	FES	-	-	-
Urospatha – 1/ca. 10				
U. loefgreniana Engl.	FED,	-	-	-
Wolffiella – 1/10				
W. neotropica Landolt	FOD, FAQ	-	-	-
Xanthosoma – 4/57				
X. maximiliani Schott	FOD, FES	-	-	-
X. platylobum Schott	FOM	-	-	-
X. riedelianum (Schott) Schott*	?	-	-	-
X. sagittifolium Liebm.*	FOD	-	-	-
*Zomicarpa** – 3/3				
Z. pythonium (Mart.) Schott*	FOD	-	-	-
Z. riedelianum Schott*	FOD	-	-	-
Z. steigeriana Maxim. *ex* Schott*	FOD	-	-	-

Araliaceae

Pedro Fiaschi & Marcela Firens da Silveira

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
ARALIACEAE – 44/1800				
Aralia – 1/75				
A. warmingiana (Marchal) J.Wen	FES	-	-	-
Dendropanax – 13/100				
D. amorimii Fiaschi*	FOD	-	-	-
D. australis Fiaschi & Jung-Mend.*	FOD	-	-	-
D. bahiensis Fiaschi*	FOD	-	-	-
D. brasiliensis (Seem.) Frodin*	FOD	-	-	-
D. caudatus Fiaschi*	FOD	-	-	-
D. cuneatus (DC.) Decne. & Planch.	FES	-	-	-
D. denticulatus Fiaschi*	FOD	-	-	-
D. exilis (Toledo) Jung-Mend.*	FOD	-	-	-
D. geniculatus Fiaschi*	FES	-	-	-
D. langsdorffii (Marchal) Frodin*	FOD	-	-	-
D. monogynus (Vell.) Seem.*	FOD	-	-	-
D. nebulosus Fiaschi & Jung-Mend.*	FOD	-	-	-
D. trilobus (Gardner) Seem.*	FOD	-	-	-
Hydrocotyle – 15/150				
H. barbarossa Cham. & Schltdl.*	FOD, FOM	-	-	-
H. bonariensis Lam.	FOM, FES, FED, RST	-	-	-
H. bowlesioides Mathias & Constance	FOM, FED	-	-	-
H. callicephala (Cham.) Urb.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
H. exigua (Urb.) Malme*	FOD, FOM, FES	-	-	-
H. hirta R.Br. *ex* A.Rich.*	FOM	-	-	-
H. itatiaiensis Brade*	FOM, FOD	-	-	-
H. langsdorffii DC.*	FOM, FOD	-	-	-
H. leucocephala Cham. & Schltdl.	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
H. pusilla A.Rich.	FOD, FOM, FES	-	-	-
H. quinqueloba Ruiz & Pav.	FOD, FOM, FES, FED, FCA	-	-	-
H. ranunculoides L.f.	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
H. sibthorpioides Lam.*	FOD	-	-	-
H. ulei H.Wolff*	FOD	-	-	-
H. verticillata Thunb.	FOD, FOM, FES, FED, RST	-	-	-
Oreopanax – 2/100				
O. capitatus (Jacq.) Decne. & Planch.	FOD	-	-	-
O. fulvus Marchal*	FOD	-	-	-
Schefflera – 13/800				
S. angustissima (Marchal) Frodin*	FOD, RST	-	-	-
S. aurata Fiaschi*	RST	-	VU	ANEXO II
S. calva (Cham.) Frodin & Fiaschi	FOD, FES	-	-	-
S. capixaba Fiaschi*	FOD	-	-	-
S. grandigemma Fiaschi*	FOD	-	-	-
S. kollmannii Fiaschi*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
S. longipetiolata (Pohl *ex* DC.) Frodin & Fiaschi*	FOD	-	-	-
S. morototoni (Aubl.) Maguire *et al.*	FOD, FES	-	-	-
S. racemifera Fiaschi & Frodin*	FOD	-	-	-
S. ruschiana Fiaschi & Pirani*	FOD	-	-	-
S. selloi (Marchal) Frodin & Fiaschi*	RST	-	-	-
S. succinea Frodin & Fiaschi*	FOD	-	VU	ANEXO II
S. varisiana Frodin	FOD	-	-	-

Arecaceae

Hélio Boudet Fernandes & Amauri Cesar Marcato

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
ARECACEAE – 58/2.361				
Acrocomia – 1/2				
A. aculeata (Jacq.) Lodd. *ex* Mart.	FES, FCA	-	-	-
Allagoptera – 2/4				
A. arenaria (Gomes) Kuntze *	RST, AFL	-	VU	ANEXO II
A. brevicalyx M.Moraes*	RST	-	VU	ANEXO II
Astrocaryum – 1/50				
A. aculeatissimum (Schott) Burret	FOD, FES, RST	-	-	-
Attalea – 7/29				
A. brejinhoensis Glassman	FES	-	-	-
A. dubia (Mart.) Burret*	FOD, RST	-	-	-
A. funifera Mart. *ex* Spreng*	FOD, RST	-	VU	ANEXO II
A. humilis Mart. *ex* Spreng*	FOD, FES, RST	-	-	-
A. oleifera Barb.Rodr*	FOD, FOM, FES	-	-	-
A. pindobassu Bondar*	FES	-	-	-
A. salvadorensis Glassman*	FOD	-	-	-
Bactris – 13/240				
B. acanthocarpa Mart.	FOD	-	-	-
B. bahiensis Noblick*	FOD, RST	-	-	-
B. caryotifolia Mart.*	FOD, RST	-	-	-
B. ferruginea Burret*	FOD	-	-	-
B. glassmanii Medeiros-Costa & Noblick*	FOD, RST	-	-	-
B. hatschbachii Noblick*	FOD, RST	-	EN	ANEXO I
B. hirta Mart.	FOD	-	-	-
B. horridispatha Noblick*	FOD, RST	-	-	-
B. pickelli Burret*	FOD	VU	VU	ANEXO II
B. setosa Mart.*	FOD, RST	-	-	-
B. soeiroana Noblick*	RST	-	-	-
B. timbuiensis Boudet Fernandes*	FOD	-	VU	ANEXO II

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
B. vulgaris Barb.Rodr.*	FOD, RST	-	-	-
Butia – 5/8				
B. campicola (Barb.Rodr.) Noblick*	FCA	-	CR	ANEXO II
B. capitata (Mart.) Becc.	RST	-	-	-
B. eriospatha (Mart. *ex* Drude) Becc.*	FCA, FOM	VU	VU	ANEXO I
B. marmorii Noblick*	FCA	-	-	-
B. microspadix Burret	FCA	-	VU	ANEXO II
Desmoncus – 2/7				
D. orthacanthos Mart.	FOD, FES, RST	-	-	-
D. polyacanthos Mart.	FOD, FES, RST	-	-	-
Euterpe – 2/8				
E. edulis Mart.	FOD, FES, RST, FOM	-	EN	ANEXO I
E. espiritosantensis Boudet Fernandes*	FOD	-	-	-
Geonoma – 10/75				
G. blanchetiana H.Wendl.*	FOD	-	-	-
G. elegans Mart.*	FOD	-	-	-
G. fiscellaria Mart. *ex* Drude*	FOD	-	-	-
G. gamiova Barb.Rodr.*	FOD	-	-	-
G. pauciflora Mart.*	FOD	-	-	-
G. pohliana Mart.*	FOD	-	-	-
G. rodeiensis Barb.Rodr.*	FOD	-	-	-
G. rubescens Wendl. *ex* Drude*	FOD	-	-	-
G. schottiana Mart.	FOD, FES, RST	-	-	-
G. wittigiana Glaz. *ex* Drude*	FOD	-	-	-
*Lytocaryum** – 3/3				
L. hoehnei (Burret) Toledo*	FOD	-	-	-
L. insigne (Drude) Toledo*	FOD	-	-	-
L. weddelianum (H.Wendl.) Toledo*	FOD	-	-	-
*Polyandrococos** – 1/1				
P. caudescens (Mart.) Barb.Rodr.*	FOD, FES, RST	-	-	-
Scheelea – 1/?				
S. phalerata (Mart. *ex* Spreng.) Burret	FES, FCA	-	-	-
Syagrus – 9/30				
S. botryophora (Mart.) Mart.*	FOD	-	-	-
S. coronata (Mart.) Becc.	RST, FOD	-	-	-
S. macrocarpa Barb.Rodr.*	FES, FOD	EN	EN	ANEXO II
S. oleracea (Mart.) Becc.	FES	-	-	-
S. picrophylla Barb.Rodr.*	FOD, FES, AFL, RST	-	VU	ANEXO II
S. pseudococos (Raddi) Glassman *	FOD, FES, AFL, RST	-	-	-
S. romanzoffiana (Cham.) Glassman	FOD, FES, AFL, RST	-	-	-
S. ruschiana (Bondar) Glassman *	AFL, FES	-	VU	ANEXO II
S. schizophylla (Mart.) Glassman *	RST	-	-	-
Trithrinax – 1/3				
T. brasiliensis Mart.	FOM	-	VU	ANEXO II

Aristolochiaceae

Márcio de Souza Werneck

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
ARISTOLOCHIACEAE – 49/ca. 600				
Aristolochia – 49/ca. 500				
A. arcuata Mast.	FOD, FES, FCA	-	-	-
A. bahiensis F.González*	FOD	-	-	-
A. birostris Duch.*	FOD, FES, RST	-	-	-
A. cauliflora Ule	FOD	-	-	-
A. chamissonis (Klotzsch) Duch.	FOD, FES	-	-	-
A. cymbifera Mart. & Zucc.*	FOD, FES, RST	-	-	-
A. cynanchifolia Mart. & Zucc.*	FOD	-	-	-
A. elegans Mast.	FOD, FES	-	-	-
A. eriantha Mart. & Zucc.*	FOD	-	-	-
A. esperanzae Kuntze	FES	-	-	-
A. fimbriata Cham. & Schltdl.	FES	-	-	-
A. giberti Hook.	FES	-	-	-
A. gigantea Mart. & Zucc.	FES	-	-	-
A. grandiflora Sw.*	FOD	-	-	-
A. hispida Pohl *ex* Duch.*	FOD	-	-	-
A. hypoglauca Kuhlm.*	FOD	-	-	-
A. labiata Willd.	FOD, FES, FCA	-	-	-
A. leuconeura Linden*	FOD	-	-	-
A. limae Hoehne*	FOD, FES	-	-	-
A. lindneri A.Berger	FOD	-	-	-
A. lingulata Ule	FOD, FES	-	-	-
A. loefgrenii Hoehne	FOD, FES	-	-	-
A. longispathulata F.González*	FOD	-	-	-
A. macroura Gomes	FOD, FES, RST	-	-	-
A. marianensis Ahumada*	FES	-	-	-
A. maxima Jacq.	FOD	-	-	-
A. melastoma Silva Manso *ex* Duch.*	FOD, FES	-	-	-
A. mishuyacensis O.C.Schmidt	FOD	-	-	-
A. mossii S.Moore	FOD, FES	-	-	-
A. nevesarmondiana Hoehne*	FOD, FES	-	-	-
A. nummularifolia Kunth	FOD, FCA	-	-	-
A. odora Steud.*	FOD	-	-	-
A. odoratissima L.	FOD, FES	-	-	-
A. papillaris Mast.	FOD	-	-	-
A. paulistana Hoehne*	FOD, RST	-	-	-
A. pilosa Kunth	FOD	-	-	-
A. pistolochia L.*	FOD	-	-	-
A. pohliana Duch.	FOD, FES	-	-	-
A. pubescens (Klotzsch) Klotzsch*	FOD, FES, RST	-	-	-
A. raja Mart. & Zucc.*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
A. ridicula N.E.Br.	FOD, FES	-	-	-
A. ringens Link & Otto*	FOD	-	-	-
A. robertii Ahumada*	FOD, FES	-	-	-
A. sessilifolia (Klotzsch) Duch.	FOD, FCA	-	-	-
A. tamnifolia (Klotzsch) Duch.*	FOD	-	-	-
A. triangularis Cham. & Schltdl.*	FOD, FES	-	-	-
A. trilobata L.*	FOD	-	-	-
A. urbaniana Taub.	FES	-	-	-
A. wendeliana Hoehne*	FOD	-	-	-

Asteraceae

Aristônio Magalhães Teles (Coordenador), Benoit Loeuille, Eric Koiti Okiyama Hattori, Gustavo Heiden, Hortensia Pousada Bautista, Larissa Grokoviski, Mara Rejane Ritter, Mariana Machado Saavedra, Nádia Roque, Polyana Noronha Soares, Rafael Augusto Xavier Borges & Renata Moura de Liro

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
ASTERACEAE – 910/23.000				
Acanthospermum – 1/5-6				
A. australe (Loefl.) Kuntze	FCA, AFL	-	-	-
Acanthostyles – 1/1				
A. buniifolius (Hook. & Arn.) R.M.King & H.Rob.	FCA	-	-	-
Achyrocline – 6/32				
A. alata DC.	FCA	-	-	-
A. albicans Griseb.	FCA	-	-	-
A. arrojadoana Mattf.	FCA	-	-	-
A. flaccida (Weinm.) DC.	RST	-	-	-
A. macella Deble & Marchiori	FCA	-	-	-
A. satureioides DC.	FCA	-	-	-
Acmella – 10/30				
A. alpestris (Griseb.) R.K.Jansen	FCA	-	-	-
A. bellidioides (Sm.) R.K.Jansen	FCA, AFL	-	-	-
A. brachyglossa Cass.	FOD, FCA, RUD	-	-	-
A. ciliata (Kunth) Cass.	FES	-	-	-
A. decumbens (Sm.) R.K.Jansen	FCA	-	-	-
A. grisea (Chodat) R.K.Jansen	FCA, AFL	-	-	-
A. leptophylla (DC.) R.K.Jansen	FOM, FCA	-	-	-
A. pusilla (Hook. & Arn.) R.K.Jansen	FCA, RST	-	-	-
A. serratifolia R.K.Jansen	FOM, FCA	-	-	-
A. uliginosa (Sw.) Cass.	RST, FAQ	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Adenostemma – 4/26				
A. brasilianum (Pers.) Cass.	FES	-	-	-
A. involucratum R.M.King & H.Rob.	FCA	-	-	-
A. swartzii Cass.*	FOM	-	-	-
A. verbesina (L.) Kuntze	FOM	-	-	-
Ageratum – 3/40				
A. conyzoides L.	FOD	-	-	-
A. fastigiatum (Gardner) R.M.King & H.Rob.	FOD	-	-	-
A. melissifolium DC.*	FOD	-	-	-
Albertinia – 1/1				
A. brasiliensis Spreng.	FOD, RST, AFL	-	-	-
Ambrosia – 3/30				
A. artemisiifolia L.	RST	-	-	-
A. microcephala DC.	FES, RST	-	-	-
A. tenuifolia Spreng.	RST	-	-	-
Apopyros – 1/2				
A. corymbosus (Hook. & Arn.) G.L.Nesom	FCA	-	-	-
Aspilia – 16/125				
A. clausseniana Baker	FES	-	-	-
A. cupulata Baker	FCA	-	-	-
A. foliacea Baker	FCA	-	-	-
A. fruticosa Baker	FCA	-	-	-
A. hirsuta (Gardn.) Benth. *ex* Jacks. & Hook.f.	FCA	-	-	-
A. hispidula Baker	?	-	-	-
A. itabaianensis J.U.M.Santos*	FCA	-	-	-
A. martii Baker	?	-	-	-
A. montevidensis (Spreng.) Kuntze	FCA	-	-	-
A. pascalioides Griseb.	?	-	-	-
A. procumbens Baker	?	-	CR	ANEXO I
A. ramosissima (Gardn.) H.Rob.	?	-	-	-
A. reflexa (Sch.Bip. *ex* Baker) Baker	FCA	-	-	-
A. setosa Griseb.	FCA	-	-	-
A. subalpestris Baker	FCA	-	-	-
A. subpetiolata Baker	?	-	-	-
Asteropsis – 1/1				
A. megapotamica (Spreng.) Marchesi *et al.*	FCA	-	-	-
*Austrocritonia** – 4/4				
A. angulicaulis (Sch.Bip. *ex* Baker) R.M.King & H.Rob.*	FOD, FCA, FES	-	-	-
A. rosea (Gardner) R.M.King & H.Rob.*	FCA	-	-	-
A. taunayana (Glaz. *ex* B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob.*	FCA, AFL	-	-	-
A. velutina (Gardner) R.M.King & H.Rob.*	FOD, FCA, FES	-	-	-
Austroeupatorium – 10/13				
A. apensis (Chodat) R.M.King & H.Rob. *	FOD	-	-	-
A. entreriense (Hieron.) R.M.King & H.Rob.*	FOD	-	-	-
A. inulifolium (Kunth.) R.M.King & H.Rob.	FOD, FED, RST	-	-	-
A. laete-virens (Hook. & Arn.) R.M.King & H.Rob.*	FOD, FCA, FES, FOM	-	-	-
A. morii R.M.King & H.Rob.*	FES, RST	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
A. neglectum (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob.*	FCA, FOM	-	-	-
A. petrophilum (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob.*	FCA	-	-	-
A. picturatum (Mart.) R.M.King & H.Rob.	FOM, FED	-	-	-
A. rosmarinaceum (Cabrera & Vittet) R.M.King & H.Rob.*	FCA	-	-	-
A. silphiifolium (Mart.) R.M.King & H.Rob.	FES, FOD	-	-	-
Ayapana – 1/16				
A. amygdalina (Lam.) R.M.King & H.Rob.	FCA	-	-	-
Baccharis – 113/ca. 360				
B. aliena (Spreng.) Joch.Müll.	FCA, AFL, RST	-	-	-
B. amambayensis Zardini & Soria*	FES, FCA, FED	-	-	-
B. angusticeps Dusén *ex* Malme*	FCA	-	-	-
B. anomala DC.*	FOD, FOM, FES, RST, FED	-	-	-
B. aphylla (Vell.) DC.	FCA, AFL	-	-	-
B. arassatubensis Malag. & Hatschb. *ex* G.Barroso*	FCA	-	-	-
B. articulata (Lam.) Pers.	FOM, FCA, AFL, FED	-	-	-
B. axillaris DC.*	FOM, FCA	-	-	-
B. bifrons Baker*	FED, RST	-	-	-
B. brevifolia DC.	FCA, AFL	-	-	-
B. breviseta DC.	FCA, FED	-	-	-
B. calvescens DC.	FOD, FOM, FES, FCA, AFL, RST	-	-	-
B. camporum DC.	FCA, FED	-	-	-
B. caprariifolia DC.	FCA, AFL, FED	-	-	-
B. ciliata Gardner*	AFL	-	-	-
B. cinerea DC.*	FES, FOD	-	-	-
B. cognata DC.	FCA, AFL, FED	-	-	-
B. conyzoides (Less.) DC.*	FOD	-	-	-
B. coridifolia DC.	FCA, AFL, FED	-	-	-
B. coronata Giuliano*	FCA	-	-	-
B. crispa Spreng.	FCA, AFL, RST, FED	-	-	-
B. cultrata Baker	FCA, RST	-	-	-
B. curitybensis Heering*	FCA, AFL, FOM	-	-	-
B. deblei A.S.Oliveira & Marchiori*	FCA	-	-	-
B. dentata (Vell.) G.Barroso	FCA, AFL, FOD, FED	-	-	-
B. dracunculifolia DC.	FCA, AFL, FOD, FOM, FES, RST, FED	-	-	-
B. dubia Deble & A.S.Oliveira*	FCA, AFL	-	-	-
B. elaeagnoides Steud. *ex* Baker*	FCA, AFL, FOD, FOM, FED	-	-	-
B. erigeroides DC.	FCA, AFL	-	-	-
B. erioclada DC.*	FCA, FOM	-	-	-
B. gibertii Baker	RST	-	-	-
B. glaziovii Baker*	FOD, FCA, FES, FOM	-	-	-
B. gracilis DC.	FCA, AFL	-	-	-
B. grandimucronata Malag.*	FCA, AFL	-	-	-
B. helichrysoides DC.	FCA, AFL, FED	-	-	-
B. hirta DC.	FCA, AFL	-	-	-
B. hypericifolia Baker	FCA, AFL	-	-	-
B. illinita DC.	FCA, FES, FED	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
B. incisa Hook. & Arn.	FCA, AFL	-	-	-
B. intermixta Gardner	FCA, AFL, FES	-	-	-
B. isabelae Soria & Zardini*	FCA, AFL, FED	-	-	-
B. itatiaiae Wawra	FCA, AFL	-	-	-
B. jocheniana G.Heiden & L.Macias*	FES, FOM, AFL	-	-	-
B. lateralis Baker*	FCA, AFL	-	-	-
B. leptocephala Baker	FCA, AFL, FED	-	-	-
B. leucocephala Dusén*	FOM, FCA	-	-	-
B. leucopappa DC.	FCA, AFL,	-	-	-
B. ligustrina DC.	FCA, AFL, FES	-	-	-
B. linearifolia (Lam.) Pers.	FCA, AFL, FED	-	-	-
B. longoattenuata A.S.Oliveira	RST, FES	-	-	-
B. lychnophora Gardner	FCA, FES	-	-	-
B. lymanii G.Barroso*	FCA, AFL	-	-	-
B. macrophylla Dusén*	FCA	-	-	-
B. macroptera D.J.N.Hind	FCA	-	CR	ANEXO II
B. malmei Joch.Müll.	FOD, FES	-	-	-
B. maxima Baker*	FCA	-	-	-
B. medullosa DC.	FCA, AFL, FED	-	-	-
B. megapotamica Spreng.	FCA	-	-	-
B. mesoneura DC.*	AFL	-	-	-
B. microcephala (Less.) DC.	FCA, RST, FED	-	-	-
B. microdonta DC.	FCA, AFL, FES, FED	-	-	-
B. milleflora (Less.) DC.*	FCA	-	-	-
B. muelleri Baker*	FCA, RST	-	-	-
B. myricifolia DC.	FCA	-	-	-
B. myriocephala DC.	FCA, AFL, FOM, FOD, FES, RST, FED		-	- -
B. nebulae Malag. & Hatschb. *ex* A.S.Oliveira*	FOD, FCA	-	-	-
B. nummularia Heering *ex* Malme*	FOM, FCA	-	-	-
B. oblongifolia (Ruiz & Pav.) Pers.	FCA, FOD, FES, AFL	-	-	-
B. ochracea Spreng.	FCA, RST	-	-	-
B. opuntioides Mart. *ex* Baker*	FCA, AFL	-	-	-
B. oreophila Malme*	FCA, FOD, FES	-	-	-
B. organensis Baker*	FCA, FOD, FOM	-	-	-
B. oxyodonta DC.*	FOD, FES, FOM, FED	-	-	-
B. palustris Heering*	FCA	-	-	-
B. parvidentata Malag.*	FCA, AFL	-	-	-
B. paucifloscula DC.*	FCA, FOM	-	-	-
B. pentodonta Malme	FCA, FED	-	-	-
B. pentziifolia Sch.Bip *ex* Baker	FCA	-	-	-
B. petraea Heering	FCA, FED	-	-	-
B. phylicifolia DC.	FCA, RST	-	-	-
B. platypoda DC.	FCA, FES, AFL	-	-	-
B. pseudomyriocephala Malag.*	FCA, AFL	-	-	-
B. pseudovaccinioides Malag.*	FCA, AFL	-	-	-
B. pseudovillosa Malag. & J.E.Vidal*	FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
B. psiadioides (Less.) Joch.Müll.	FCA, RST, AFL	-	-	-
B. punctulata DC.	FCA, AFL, FES, FOD, FOM, FED	-	-	-
B. radicans DC.	FCA, RST	-	-	-
B. ramboi G.Heiden & L.Macias*	FCA, RST	-	-	-
B. regnellii Sch.Bip *ex* Baker*	FCA	-	-	-
B. reticularia DC.	FCA, AFL, FES, RST	-	-	-
B. retusa DC.	FCA, FED	-	-	-
B. riograndensis Malag. & J.E.Vidal	FCA, AFL, RST	-	-	-
B. rufidula (Spreng.) Joch.Müll.*	FCA, FES, FOD	-	-	-
B. sagittalis (Less.) DC.	FCA, RST, FED	-	-	-
B. schultzii Baker	FCA, FOD, AFL	-	-	-
B. selloi Baker*	FCA, FOM	-	-	-
B. semiserrata DC.*	FCA, FOD, FOM, FES	-	-	-
B. serrulata (Lam.) Pers.	FCA, FOD, FOM, FES, RST, AFL	-	-	-
B. sessiliflora Vahl	FCA, FED	-	-	-
B. singularis (Vell.) G.Barroso*	FCA, RST, FOD	-	-	-
B. spicata (Lam.) Baill.	FCA, RST, FED	-	-	-
B. stenocephala Baker	FCA	-	-	-
B. stylosa Gardner*	FCA, AFL	-	-	-
B. subdentata DC.	FCA, FED	-	-	-
B. tarchonanthoides DC.	FCA, AFL	-	-	-
B. tridentata Vahl	FCA, AFL, FED	-	-	-
B. trinervis (Lam.) Pers.	FCA, FES, FOM, FOD, RST, AFL, FED		-	- -
B. uleana Malag.*	FCA	-	-	-
B. uncinella DC.*	FCA, AFL	-	-	-
B. usterii Heering	FCA, RST	-	-	-
B. vincifolia Baker*	FOM, FCA	-	-	-
B. vulneraria Baker	FCA, FES, RST, FED	-	-	-
B. wagenitzii (F.H.Hellw.) Joch.Müll.*	FCA, AFL	-	-	-
*Bahianthus** – 1/1				
B. viscosus (Spreng.) R.M.King & H.Rob.*	RST	-	-	-
Barnadesia – 1/19				
B. caryophylla (Vell.) S.F.Blake	FCA, FES	-	-	-
Barrosoa – 7/9				
B. apiculata (Gardner) R.M.King & H.Rob. *	RST, FCA, AFL, FOD	-	-	-
B. atlantica R.M.King & H.Rob.*	RST, FES	-	-	-
B. betoniciformis (DC.) R.M.King & H.Rob.	RST, FCA,	-	-	-
B. cabrerae (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob.*	FCA	-	-	-
B. candolleana (Hook. & Arn.) R.M.King & H.Rob.	FCA	-	-	-
B. organensis (Gardner) R.M.King & H.Rob.	FCA, FOD, AFL	-	-	-
B. ramboi (Cabrera) R.M.King & H.Rob.*	FCA	-	-	-
Bejaranoa – 2/2				
B. balansae (Hieron.) R.M.King & H.Rob.	FCA	-	-	-
B. semistriata (Baker) R.M.King & H.Rob.	FCA, FES	-	-	-
Bidens – 12/280				
B. alba (L.) DC.	FOM	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
B. bipinnata L.	FOD	-	-	-
B. gardneri Baker	FES	-	-	-
B. laevis (L.) Britton *et al.**	FCA	-	-	-
B. pilosa L.	FOM	-	-	-
B. pinnata Noronha	?	-	-	-
B. riparia Kunth	?	-	-	-
B. rubiflora Kunth	?	-	-	-
B. segetum Mart. *ex* Colla	FOD	-	-	-
B. squarrosa Kunth	?	-	-	-
B. subalternans DC.	RST	-	-	-
B. urophylla Sherff	FES	-	-	-
Calea – 25/125				
C. acaulis Baker	FCA	-	-	-
C. angusta S.F.Blake	RST	-	-	-
C. asclepiifolia Hassl.	FCA	-	-	-
C. belemii H.Rob.	FCA	-	-	-
C. candolleana (Gardner) Baker	FCA, RST	-	-	-
C. clausseniana Baker	FCA	-	-	-
C. clematidea Baker	FCA	-	VU	ANEXO II
C. cuneifolia Baker	FCA	-	-	-
C. cymosa Less.	FCA	-	-	-
C. divergens Baker	FCA	-	-	-
C. frutticosa (Gardner) Urbatsch	FCA, AFL	-	-	-
C. gentianoides DC.	FCA	-	-	-
C. hispida Baker	FCA	-	-	-
C. ilienii Malme	FCA	-	-	-
C. lemmatioides Baker	FCA, AFL	-	-	-
C. myrtifolia Baker	FCA	-	-	-
C. nitida Less.	FCA, AFL	-	-	-
C. phyllolepis Baker	FCA	-	-	-
C. pilosa Baker	FCA	-	-	-
C. pinnatifida (R.Br.) Less.	AFL	-	-	-
C. platylepis Sch.Bip.	FCA	-	-	-
C. rotundifolia (Less.) Baker	FCA, AFL	-	-	-
C. serrata Less.	FOM, FES, FED	-	-	-
C. sessiliflora Less.	FOM, FCA	-	-	-
C. wedellioides (Baker) S.F.Blake*	AFL	-	-	-
Calyptocarpus – 1/2				
C. biaristatus (DC.) H.Rob.	FOM, FED	-	-	-
Campovassouria – 1/1				
C. cruciata (Vell.) R.M.King & H.Rob.	FOM	-	-	-
Campuloclinium – 7/14				
C. burchellii (Baker) R.M.King & H.Rob.	?	-	-	-
C. chlorolepis (Baker) R.M.King & H.Rob.	?	-	-	-
C. macrocephalum (Mart. *ex* Baker) R.M.King & H.Rob.	FCA	-	-	-
C. parvulum (Glaziou *ex* B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob.	?	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
C. purpurascens (Sch.Bip. *ex* Baker) R.M.King & H.Rob.	FCA	-	-	-
C. riedelii (Baker) R.M.King & H.Rob.	?	-	-	-
C. tubaraoense (Hieron.) R.M.King & H.Rob.*	FOD, RST	-	-	-
Centratherum – 2/3				
C. punctulatum Cass.	FOD, RST	-	-	-
C. violaceum (Schrank) Gleason	RST	-	-	-
Cephalopappus – 1/1				
C. sonchifolius Nees & Mart.	FOD	-	-	-
Chacoa – 1/1				
C. pseudoprasiifolia (Hassl.) R.M.King & H.Rob.	FED	-	-	-
Chaptalia – 8/60				
C. cordifolia (Baker) Cabrera	FOD	-	-	-
C. hermogenis M.D.Moraes*	FOD	-	CR	ANEXO II
C. integerrima (Vell.) Burkart	FCA, RST, AFL	-	-	-
C. mandonii (Sch.Bip.) Burkart	FCA	-	-	-
C. nutans (L.) Polak.	RUD	-	-	-
C. piloselloides (Vahl) Baker	FCA	-	-	-
C. runcinata Kunth	FCA, FOD	-	-	-
C. sinuata (Less.) Baker	FOD, FCA	-	-	-
Chevreulia – 2/6				
C. acuminata Less.	FOM, FCA, AFL	-	-	-
C. sarmentosa (Pers.) S.F.Blake	FCA, AFL	-	-	-
Chionolaena – 6/18				
C. arbuscula DC.	FCA, AFL	-	-	-
C. capitata (Baker) S.E.Freire	FCA, AFL	-	-	-
C. glomerata Baker	?	-	-	-
C. isabellae Baker*	FCA, AFL	-	-	-
C. lychnophorioides Sch.Bip.	FCA, AFL	-	VU	ANEXO II
C. wittigiana Baker	?	-	-	-
Chresta – 1/12				
C. souzae H.Rob.	FCA	-	-	-
Chromolaena – 28/165				
C. ascendens (Sch.Bip. *ex* Baker) R.M.King & H.Rob.	FCA, AFL	-	-	-
C. congesta (Hook. & Arn.) R.M.King & H.Rob.	FCA, AFL	-	-	-
C. cylindrocephala (Baker) R.M.King & H.Rob.	FCA, AFL	-	-	-
C. elliptica (Hook. & Arn.) R.M.King & H.Rob.	FCA	-	-	-
C. hirsuta (Hook. & Arn.) R.M.King & H.Rob.	FCA, RST	-	-	-
C. ivifolia (L.) R.M.King & H.Rob.	FCA	-	-	-
C. kleinii (Cabrera) R.M.King & H.Rob.*	FCA, AFL	-	-	-
C. laevigata (Lam.) R.M.King & H.Rob.	FOD, FOM,	-	-	-
C. maximilianii (Schrad. *ex* DC.) R.M.King & H.Rob.	FCA	-	-	-
C. minasgeraesensis (Hieron.) R.M.King & H.Rob.	?	-	-	-
C. morii R.M.King & H.Rob.	FCA	-	-	-
C. multiflosculosa (DC.) R.M.King & H.Rob.	FCA, AFL	-	-	-
C. odorata (L.) R.M.King & H.Rob.	FCA, RST	-	-	-
C. oinopolepis (Malme) R.M.King & H.Rob.	FCA, AFL	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
C. oxylepis (DC.) R.M.King & H.Rob.	FCA, AFL	-	-	-
C. palmaris (Sch.Bip. *ex* Baker) R.M.King & H.Rob.	FCA, AFL	-	-	-
C. pedalis (Sch.Bip. *ex* Baker) R.M.King & H.Rob.	FCA, AFL	-	-	-
C. pedunculosa (Hook. & Arn.) R.M.King & H.Rob.	RST	-	-	-
C. punctulata (DC.) R.M.King & H.Rob.	RST	-	-	-
C. rhinanthacea (DC.) R.M.King & H.Rob.	?	-	-	-
C. squalida (DC.) R.M.King & H.Rob.	FCA, RST	-	-	-
C. squarrulosa (Hook. & Arn.) R.M.King & H.Rob.	?	-	-	-
C. stachyophylla (Spreng.) R.M.King & H.Rob.	FCA, AFL	-	-	-
C. tecta (Gardner) R.M.King & H.Rob.	FCA	-	-	-
C. ulei (Hieron.) R.M.King & H.Rob.*	RST	-	-	-
C. umbelliformis (Dusén *ex* Malme) R.M.King & H.Rob.	FCA, AFL	-	-	-
C. verbenacea (DC.) R.M.King & H.Rob.	FCA	-	-	-
C. xylorhiza (Sch.Bip. *ex* Baker) R.M.King & H.Rob.	FCA, AFL	-	-	-
Chrysolaena – 7/9				
C. flexuosa (Sims) H.Rob.*	FCA, AFL, RST	-	-	-
C. guaranitica Dematt.*	FCA, AFL	-	-	-
C. lithospermifolia (Hieron.) H.Rob.*	FCA, AFL, RST	-	-	-
C. oligophylla (Vell.) H.Rob.	FCA, AFL	-	-	-
C. platensis (Spreng.) H.Rob.	FCA, RST	-	-	-
C. propinqua (Hieron.) H.Rob.	FCA, AFL	-	-	-
C. verbascifolia (Less.) H.Rob.	FCA	-	-	-
Clibadium – 1/24				
C. armanii (Balb.) Sch.Bip. *ex* O.E.Schulz	FCA	-	-	-
Conocliniopsis – 1/1				
C. prasiifolia (DC.) R.M.King & H.Rob.	RST	-	-	-
Conyza – 10/60-100				
C. blakei (Cabrera) Cabrera	FCA, RST, FED	-	-	-
C. bonariensis (L.) Cronquist	AFL, FCA, RST, FOD, FES, FED	-	-	-
C. catharinensis Cabrera*	FCA	-	-	-
C. glandulitecta Cabrera*	FCA, FED	-	-	-
C. macrophylla Spreng.*	FCA	-	-	-
C. monorchis (Griseb.) Cabrera	FCA, AFL	-	-	-
C. primulifolia (Lam.) Cuatr. & Lourteig	FCA, FOM, FOD, FES, FED	-	-	-
C. reitziana Cabrera*	FCA	-	-	-
C. retirensis Cabrera*	FCA, RST	-	-	-
C. sumatrensis (Retz.) E.Walker	FCA, FED	-	-	-
Criscia – 1/1				
C. stricta (Spreng.) Katinas	FOM, FCA	-	-	-
Critoniopsis – 2/76				
C. quinqueflora (Less.) H.Rob.	FOD, FOM	-	-	-
C. stellata (Spreng.) H.Rob.	FOD	-	-	-
Cyrtocymura – 2/6				
C. mattos-silvae (H.Rob.) H.Rob.	FOD, RST	-	-	-
C. scorpioides (Lam.) Pers.	FOD, FOM, FES, FCA, AFL, RST	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Dasyanthina – 1/2				
D. serrata (Less.) H.Rob.	RST	-	-	-
Dasycondylus – 1/8				
D. debeauxii (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob.	FOD	-	-	-
Dasyphyllum – 20/40				
D. brasiliense (Spreng.) Cabrera	FOD, FES	-	-	-
D. candolleanum (Gardner) Cabrera	FES, AFL	-	-	-
D. cryptocephalum (Baker) Cabrera*	FOD, FCA	-	-	-
D. flagellare (Casar.) Cabrera	FCA, FOD	-	-	-
D. floribundum (Gardner) Cabrera	?	-	-	-
D. fodinarum (Gardner) Cabrera*	FOD, FCA	-	-	-
D. lanceolatum (Less.) Cabrera*	FOD	-	-	-
D. latifolium (Gardner) Cabrera	?	-	-	-
D. leptacanthum (Gardner) Cabrera	FOD	-	-	-
D. maria-lianae Zardini & Soria*	?	-	-	-
D. orthacanthum (DC.) Cabrera	FOD	-	-	-
D. spinescens (Less.) Cabrera*	FOD	-	-	-
D. sprengelianum (Gardner) Cabrera	FES, FCA	-	-	-
D. synacanthum (Baker) Cabrera	FOD	-	-	-
D. tomentosum (Spreng.) Cabrera	FOD	-	-	-
D. trichophyllum (Baker) Cabrera	?	-	-	-
D. vagans (Gardner) Cabrera	FCA, FOD	-	-	-
D. varians (Gardner) Cabrera	?	-	-	-
D. velutinum (Baker) Cabrera	FOD, FCA	-	-	-
D. vepreculatum (D.Don) Cabrera	?	-	-	-
Delilia – 1/2				
D. biflora (L.) Kuntze	FES	-	-	-
Dendrophorbium – 9/75				
D. brachycodon (Baker) C.Jeffrey*	FCA	-	-	-
D. bradei (Cabrera) C.Jeffrey*	FCA	-	-	-
D. catharinense (Dusén *ex* Cabrera) C.Jeffrey*	FED	-	CR	ANEXO II
D. fastigiaticephalum (Cabrera) C.Jeffrey*	FCA	-	-	-
D. fruticosum (Vell.) C.Jeffrey*	FCA	-	-	-
D. glaziovii (Baker) C.Jeffrey*	FOD	-	-	-
D. limosum C.Jeffrey*	FOD	-	-	-
D. pellucidinerve (Sch.Bip. *ex* Baker) C. Jeffrey*	FCA	-	-	-
D. restingae A.Teles *et al.* *	RST	-	-	-
*Diacranthera** – 3/3				
D. crenata (Mart.) R.M.King & H.Rob.*	RST, FOD	-	-	-
D. hebeclinia H.Rob.*	FOD, FCA	-	-	-
D. ulei R.M.King & H.Rob.*	FOD, FCA	-	-	-
Disynaphia – 12/16				
D. senecionidea (Baker) R.M.King & H.Rob.	FCA	-	-	-
D. achillea (Chodat) R.M.King & H.Rob.	FCA	-	-	-
D. calyculata (Hook. & Arn.) R.M.King & H.Rob.	RST	-	-	-
D. ericoides (DC.) R.M.King & H.Rob.	?	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
D. filifolia (Hassl.) R.M.King & H.Rob.	FCA	-	-	-
D. ligulifolia (Hook. & Arn.) R.M.King & H.Rob.	FCA	-	-	-
D. littoralis (Cabrera) R.M.King & H.Rob.*	FCA	-	-	-
D. multicrenulata (Baker) R.M.King & H.Rob.	FCA, FOM	-	-	-
D. radula (Chod.) R.M.King & H.Rob.	FCA	-	-	-
D. senecionidea (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob.	FCA	-	-	-
D. spathulata (Hook. & Arn.) R.M.King & H.Rob.	FCA	-	-	-
D. variolata (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob.	FCA	-	-	-
Elephantopus – 3/12				
E. hirtiflorus DC.	FOM, RST	-	-	-
E. mollis Kunth	FOD, FOM	-	-	-
E. scaber L.	FCA	-	-	-
Enydra – 4/10				
E. anagallis Gardner	RST	-	-	-
E. fluctuans Lour.	RST	-	-	-
E. rivularis Gardner	FCA	-	-	-
E. sessilis (Sw.) DC.	FCA, RST	-	-	-
Epaltes – 1/14				
E. brasiliensis DC.	FCA, RST	-	-	-
Eremanthus – 4/25				
E. capitatus (Spreng.) MacLeish	FCA, RST	-	-	-
E. crotonoides (DC.) Sch.Bip.	AFL, FCA, FOD	-	-	-
E. erythropappus (DC.) MacLeish	AFL, FCA, FOD, RST	-	-	-
E. incanus (Less.) Less.	AFL, FCA	-	-	-
Facelis – 1/4				
F. retusa (Lam.) Sch.Bip.	FCA, RST	-	-	-
Fleischmannia – 5/95				
F. dissolvens (Baker) R.M.King & H.Rob.	FCA	-	-	-
F. laxa (Gardner) R.M.King & H.Rob.	FCA	-	-	-
F. laxicephala (Cabrera) R.M.King & H.Rob.*	FOD	-	-	-
F. microstemon (Cass.) R.M.King & H.Rob.	FCA	-	-	-
F. remotifolia (DC.) R.M.King & H.Rob.	FOD, FCA	-	-	-
Galinsoga – 2/17				
G. ciliata (Raf.) S.F.Blake	FCA	-	-	-
G. parvifolia Cav.	FOM, FCA	-	-	-
Gamochaeta – 7/50-80				
G. americana (Mill.) Wedd.	FCA, AFL	-	-	-
G. calviceps (Fernald) Cabrera	FCA	-	-	-
G. falcata (Lam.) Cabrera	FCA	-	-	-
G. filaginea (DC.) Cabrera	FCA, RST	-	-	-
G. hiemalis (Rizzini) Cabrera	?	-	-	-
G. pennsylvanica (Willd.) Cabrera	FCA	-	-	-
G. purpurea (L.) Cabrera	FCA	-	-	-
Gnaphalium – 2/ca. 80				
G. cheiranthifolium Lam.	FCA	-	-	-
G. gaudichaudianum DC.	FOD, FOM, FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Gochnatia – 14/ca. 60				
G. argyrea (Dusén *ex* Malme) Cabrera*	FCA	-	-	-
G. barrosii Cabrera	FCA	-	-	-
G. blanchetiana (DC.) Cabrera	AFL	-	-	-
G. floribunda Cabrera	FCA	-	-	-
G. haumaniana Cabrera	FCA	-	-	-
G. mollisima (Malme) Cabrera	FOD	-	-	-
G. orbiculata (Malme) Cabrera	FCA	-	VU	ANEXO II
G. paniculata (Less.) Cabrera	FCA, FOD	-	-	-
G. polymorpha (Less.) Cabrera	FCA, FOD	-	-	-
G. pulchra Cabrera	FCA, FOD	-	-	-
G. ramboi Cabrera	FCA	-	-	-
G. rotundifolia Less.	FCA	-	-	-
G. sordida (Less.) Cabrera	FOD	-	-	-
G. velutina (Bong.) Cabrera	FCA	-	-	-
Gorceixia – 1/1				
G. decurrens Baker	?	-	-	-
*Graphistylis** – 9/9				
G. argyrotricha (Dusén) B.Nord.*	FCA	-	-	-
G. cuneifolia (Dusén) B.Nord.*	FCA	-	-	-
G. dichroa (Bong.) D.J.N.Hind*	FCA	-	-	-
G. itatiaiae (Dusén) B.Nord.*	FCA	-	-	-
G. oreophila (Dusén) B.Nord.*	FCA	-	-	-
G. organensis (Casar.) B.Nord.*	FCA	-	-	-
G. riopretensis A.Teles & B.Nord.*	FCA	-	-	-
G. serrana (Zardini) B.Nord.*	FCA	-	-	-
G. toledoi (Cabrera) B.Nord.*	FCA	-	-	-
Grazielia – 10/11				
G. alpestris (Gardner) R.L.Esteves	FOM, FCA	-	-	-
G. anethifolia (DC.) R.M.King & H.Rob.	?	-	-	-
G. coriacea (Scheele) R.M.King & H.Rob.	?	-	-	-
G. dimorpholepis (Baker) R.M.King & H.Rob.	FCA	-	-	-
G. gaudichaudiana (DC.) R.M.King & H.Rob.	FCA	-	-	-
G. intermedia (DC.) R.M.King & H.Rob.	FOM, FCA	-	-	-
G. multifida (DC.) R.M.King & H.Rob.	FCA, AFL	-	-	-
G. nummularia (Hook. & Arn.) R.M.King & H.Rob.*	FCA	-	-	-
G. schultzii R.M.King & H.Rob.	FCA	-	-	-
G. serrata (Spreng.) R.M.King & H.Rob.	FOM, FCA	-	-	-
Grindelia – 1/ca. 70				
G. scorzonerifolia Hook. & Arn.	FCA, FED	-	-	-
Gyptidium – 1/2				
G. trichobasis (Baker) R.M.King & H.Rob.	FCA	-	-	-
Gyptis – 5/7				
G. crassipes (Hieron.) R.M.King & H.Rob.	FCA	-	-	-
G. lanigera (Hook. & Arn.) R.M.King & H.Rob.	FCA, AFL	-	-	-
G. pinnatifida Cass.	FCA, AFL	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
G. tanacetifolia Cass.	FCA, AFL	-	-	-
G. vernonioides (Sch.Bip. *ex* Baker) R.M.King & H.Rob.	?	-	-	-
Hatschbachiella – 2/2				
H. polyclada (Dusén *ex* Malme) R.M.King & H.Rob.	FCA, AFL	-	-	-
H. tweediana (Hook. & Arn.) R.M.King & H.Rob.	FOM, FCA, AFL	-	-	-
Hebeclinium – 1/20				
H. macrophyllum (L.) DC.	FOD	-	-	-
Helenium – 1/30				
H. alternifolium Cabrera	FCA	-	-	-
Heterocondylus – 11/13				
H. alatus (Vell.) R.M.King & H.Rob.	FCA, FES, RST, FOD, AFL	-	-	-
H. amphidictyus (DC.) R.M.King & H.Rob.	FCA	-	-	-
H. grandis (Sch.Bip) R.M.King & H.Rob.	FCA	-	-	-
H. itacolumiensis (Sch.Bip. *ex* Baker) R.M.King & H.Rob.*	FCA	-	-	-
H. jaraguensis (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob.*	FCA, FOD	-	-	-
H. leptolepis (Baker) R.M.King & H.Rob.*	FCA	-	-	-
H. pandurifolius (Baker) R.M.King & H.Rob.	FCA	-	-	-
H. pumilus (Gardner) R.M.King & H.Rob.	FCA	-	-	-
H. reitzii R.M.King & H.Rob. *	FCA, AFL	-	-	-
H. vauthierianus (DC.) R.M.King & H.Rob.	FOM, FCA	-	-	-
H. vitalbae (DC.) R.M.King & H.Rob.	FOD, FES, FOM, AFL	-	-	-
Hieracium – 3/ca. 90				
H. commersonii Monnier	FCA	-	-	-
H. ignatianum Baker	FCA, AFL	-	-	-
H. urvillei Sch.Bip.	FCA, AFL	-	-	-
Holocheilus – 5/7				
H. brasiliensis (L.) Cabrera	FCA, AFL	-	-	-
H. hieracioides (D.Don) Cabrera	?	-	-	-
H. illustris (Vell.) Cabrera	FCA	-	-	-
H. pinnatifidus (Less.) Cabrera	FOD, FOM, FCA	-	-	-
H. schultzii (Cabrera) Cabrera	FCA	-	-	-
Hypochaeris – 5/ca. 50				
H. albiflora (Kuntze) Azevedo-Gonçalves & Matzenbacher*	?	-	-	-
H. brasiliensis (Hook. & Arn.) Baker	FCA	-	-	-
H. catharinensis Cabrera*	FCA, AFL	-	-	-
H. gardneri Baker	FCA, AFL	-	-	-
H. lutea (Sch.Bip.) Cabrera	FCA, BRE*	-	-	-
Hysterionica – 2/7				
H. pinnatiloba Matzenb. & Sobral*	AFL	-	CR	ANEXO II
H. pinnatisecta Matzenb. & Sobral*	AFL	-	CR	ANEXO I
Ichthyothere – 3/20				
I. mollis Baker	FCA	-	-	-
I. rufa Gardner	FCA	-	-	-
I. terminalis (Spreng.) Blake	FOD	-	-	-
Inulopsis – 2/4				
I. scaposa (DC.) O.Hoffm.	FCA, FED	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
I. stenophylla Dusén*	FCA	-	-	-
Jungia – 2/ca. 32				
J. floribunda Less.	FOM, FED	-	-	-
J. sellowii Less.	FCA, AFL	-	-	-
Kaunia – 1/14				
K. rufescens (Lund. *ex* DC.) R.M.King. & H.Rob.	FOD	-	-	-
Koanophyllon – 7/ca. 120				
K. baccharifolium (Gardner) R.M.King & H.Rob.	?	-	-	-
K. conglobatum (DC.) R.M.King & H.Rob.	FCA	-	-	-
K. consanguineum (DC.) R.M.King & H.Rob.	RST	-	-	-
K. lobatifolium (Cabrera) R.M.King & H.Rob.*	FOD	-	-	-
K. simillimum (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob.	FCA	-	-	-
K. thysanolepis (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob.	FCA, AFL	-	-	-
K. tinctorium Arruda	FOD	-	-	-
Lepidaploa – 20/ca. 130				
L. alvimii (H.Rob.) H.Rob.	FOD, RST	-	-	-
L. araripensis (Gardner) H.Rob.	FOD, FES, FCA	-	-	-
L. argyrotricha (Sch.Bip. *ex* Baker) H.Rob.	FOD, FES	-	-	-
L. balansae (Hieron.) H.Rob.	FOD, FOM	-	-	-
L. chalybaea (Mart. *ex* DC.) H.Rob.	FED, RST	-	-	-
L. chamissonis (Less.) H.Rob.*	FOD, RST	-	-	-
L. eriolepis (Gardner) H.Rob.	FOM, FCA, AFL	-	-	-
L. macahensis (Glaz. *ex* G.Barroso) H.Rob.	FOD	-	-	-
L. mucronifolia (DC.) H.Rob.	RST	-	-	-
L. muricata (DC.) H.Rob.	RST	-	-	-
L. obtusifolia (Less.) H.Rob.	RST	-	-	-
L. persericea (H.Rob.) H.Rob.	RST	-	-	-
L. persicifolia (Desf.) H.Rob.	RST	-	-	-
L. reflexa (Gardner) H.Rob.	FED	-	-	-
L. remotiflora (Rich.) H.Rob.	FOD, RST	-	-	-
L. rufogrisea (A.St.-Hil.) H.Rob.	RST	-	-	-
L. salzmannii (DC.) H.Rob.	FED, FES	-	-	-
L. sororia (DC.) H.Rob.	FOD, FCA, RST	-	-	-
L. subsquarrosa (DC.) H.Rob.	FOD, RST	-	-	-
L. vauthieriana (DC.) H.Rob.	FES	-	-	-
Leptostelma – 4/6				
L. camposportoi (Cabrera) A.Teles & Sobral*	FCA, AFL	-	-	-
L. catharinensis (Cabrera) A.Teles & Sobral*	FCA, AFL	-	-	-
L. maxima D.Don	FCA, AFL, RST, FOM, FOD, FED	-	-	-
L. tweediei (Hook. & Arn.) D.J.N.Hind & G.L.Nesom	FCA, AFL, FED	-	-	-
Lessingianthus – 18/ca. 102				
L. brevifolius (Less.) H.Rob.	FCA	-	-	-
L. cataractarum (Hieron.) H.Rob.	FOD, FOM	-	-	-
L. decumbens (Gardner) H.Rob.*	FCA, AFL	-	-	-
L. exiguus (Cabrera) H.Rob.*	FCA, AFL	-	-	-
L. glabratus (Less.) H.Rob.	FCA, AFL	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
L. hypochaeris (DC.) H.Rob.	FCA, AFL	-	-	-
L. ibitipocensis R.Borges & Dematt.*	FCA, AFL	-	-	-
L. lorentzii (Hieron.) H.Rob.*	FCA	-	-	-
L. macrophyllus (Less.) H.Rob.	FOD, FOM	-	-	-
L. mollissimus (D.Don *ex* Hook. & Arn.) H.Rob.	FCA, AFL	-	-	-
L. niederleinii (Hieron.) H.Rob.	FCA, AFL	-	-	-
L. plantaginodes (Kuntze) H.Rob.	FCA	-	-	-
L. polyphyllus (Sch.Bip. *ex* Baker) H.Rob.	FCA			
L. reitzianus (Cabrera) H.Rob.	FCA	-	-	-
L. rubricaulis (Humb. & Bonpl.) H.Rob.	FCA, AFL	-	-	-
L. sellowii (Less.) H.Rob.	FCA	-	-	-
L. simplex (Less.) H.Rob.	FCA	-	-	-
L. ulei (Hieron.) H.Rob.	RST	-	-	-
*Litothamnus** – 3/3				
L. ellipticus R.M.King & H.Rob. *	RST	-	-	-
L. nitidus (DC.) W.C.Holmes*	RST	-	-	-
L. saundersiae B.L.Turner*	RST	-	-	-
Lourteigia – 1/ca. 11				
L. ballotifolia (Kunth) R.M.King & H.Rob.	?	-	-	-
Lucilia – 5/11				
L. acutifolia (Poir.) Cass.	FCA, AFL, RST	-	-	-
L. ferruginea Baker*	FCA, AFL	-	-	-
L. flagelliformis Weddell	FCA	-	-	-
L. linearifolia Baker	FCA, AFL	-	-	-
L. nitens Less.	FCA, AFL, RST	-	-	-
Macropodina – 3/3				
M. blumenavii (Hieron.) R.M.King & H.Rob.	FOD, FOM, FED	-	-	-
M. bradei R.M.King & H.Rob.*	FCA, FOD	-	-	-
M. reitzii R.M.King & H.Rob.	FOM	-	-	-
Malmeanthus – 1/3				
M. subintegerrimus (Malme) R.M.King & H.Rob.	FOM	-	-	-
Melampodium – 1/40				
M. divaricatum (Rich.) DC.	RST	-	-	-
Melanthera – 1/20				
M. latifolia (Gardner) Cabrera	FOM	-	-	-
Mikania – 122/ca. 400				
M. acuminata DC.	FOD, FCA	-	-	-
M. additicia B.L.Rob.	?	-	-	-
M. alexandrae G.Barroso	FOD	-	-	-
M. argyriae DC.*	FOD	-	-	-
M. barrosoana G.Barroso	?	-	-	-
M. belemii R.M.King & H.Rob.*	FOD	-	-	-
M. biformis DC.	?	-	-	-
M. bradei B.L.Rob.	?	-	-	-
M. brunnescens B.L.Rob.	?	-	-	-
M. buddleiifolia DC.*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
M. burchellii Baker*	FOD, FOM	-	-	-
M. cabrerae G.Barroso	?	-	-	-
M. campanulata Gardner*	FOD, FOM	-	-	-
M. camporum B.L.Rob.	?	-	-	-
M. campos-portoana G.Barroso	FOD	-	-	-
M. capricornii B.L.Rob.	FES, FCA	-	VU	ANEXO II
M. cardiophylla B.L.Rob.	?	-	-	-
M. casarettoi B.L.Rob.	FOD	-	-	-
M. chlorolepis Baker	FOD, FED	-	-	-
M. citriodora W.C.Holmes	?	-	-	-
M. clematidifolia Dusén*	FOD	-	-	-
M. coarctata Gardner	?	-	-	-
M. conferta Gardner*	FOD	-	-	-
M. confertissima Sch.Bip.	FOD	-	-	-
M. cordifolia (L.f.) Willd.	FOD	-	-	-
M. cynanchifolia Hook. & Arn. *ex* B.L.Rob.	FOD	-	-	-
M. decumbens Malme	FOM, FCA	-	-	-
M. diversifolia DC.*	FOD	-	-	-
M. duckei G.Barroso	?	-	-	-
M. dusenii B.L.Rob.	FED	-	-	-
M. erioclada DC.	?	-	-	-
M. eriostrepta B.L.Rob.	?	-	-	-
M. firmula Baker	?	-	-	-
M. fulva Baker	FOM, FES, FCA	-	-	-
M. glaziovii Baker	?	-	-	-
M. glomerata Spreng.	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
M. guilleminii B.L.Rob.	?	-	-	-
M. hastato-cordata Malme*	FOD, FES	-	-	-
M. hastifolia Baker	?	-	-	-
M. hemisphaerica Sch.Bip *ex* Baker	FOD	-	-	-
M. hirsutissima DC.	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
M. hoehnei B.L.Rob.*	FOD	-	-	-
M. hoffmanniana Dusén*	FOD, FOM	-	-	-
M. inordinata R.M.King & H.Rob.*	FOD, RST	-	-	-
M. involucrata Hook. & Arn.	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
M. kleiniana Cabrera*	FCA	-	-	-
M. kubitzkii R.M.King & H.Rob.	?	-	-	-
M. laevigata Sch.Bip. *ex* Baker*	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
M. lanuginosa DC.	FOD, FOM	-	-	-
M. lasiandrae DC.*	FOD	-	-	-
M. latisquama Cabrera*	FOD	-	-	-
M. leiolaena DC.	?	-	-	-
M. leptotricha Baker	?	-	-	-
M. ligustrifolia DC.	FOD, FOM	-	-	-
M. lindbergii Baker*	FOD	-	-	-
M. lindleyana DC.	FOD, FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
M. linearifolia DC.	?	-	-	-
M. longipes Baker	?	-	-	-
M. lundiana DC.	FOD	-	-	-
M. mattos-silvae R.M.King & H.Rob.*	FOD	-	-	-
M. micrantha Kunth	FOD, FOM, FES, FED, RST	-	-	-
M. microdonta DC.	?	-	-	-
M. microlepis Baker*	FOD, FOM	-	-	-
M. microphylla Sch.Bip.	?	-	-	-
M. microptera DC.	FOD, FES	-	-	-
M. morii R.M.King & H.Rob.*	FOD, RST	-	-	-
M. mosenii Malme	?	-	EN	ANEXO II
M. myriocephala DC.	?	-	-	-
M. neurocaula DC.	?	-	-	-
M. nodulosa Sch.Bip.	?	-	-	-
M. nummularia DC.	?	-	-	-
M. oblongifolia DC.*	FOM	-	-	-
M. obsoleta (Vell.) G.Barroso*	FOD	-	-	-
M. obtusata DC.	?	-	-	-
M. officinalis Mart.	FOM	-	-	-
M. oliveirae R.Esteves & Capel	?	-	-	-
M. oreophila Ritter & Miotto *	FOM	-	-	-
M. orleansensis Hieron.*	FOD, FES	-	-	-
M. pacei W.C.Holmes	?	-	-	-
M. pachychaeta (Baker) G.Barroso	?	-	-	-
M. paniculata DC.*	FOD	-	-	-
M. paranahybensis G.Barroso	?	-	-	-
M. paranensis Dusén*	FOM	-	-	-
M. parodii Cabrera	FOD, FES	-	-	-
M. parvifolia Baker	?	-	-	-
M. phaeoclados Mart.	?	-	-	-
M. pinnatiloba DC.	FCA, AFL	-	-	-
M. populifolia Gardner	?	-	-	-
M. pseudohoffmanniana G.Barroso	FOM	-	-	-
M. ramosissima Gardner	?	-	-	-
M. retifolia Sch.Bip.	?	-	-	-
M. reynoldsii W.C.Holmes	?	-	-	-
M. rothii G.Barroso	?	-	-	-
M. rotundifolia G.Barroso	?	-	-	-
M. rufescens Sch.Bip.*	FOD	-	-	-
M. salicifolia Hassl.*	FOD, FOM	-	-	-
M. salzmanniifolia DC.	?	-	-	-
M. santosii R.M.King & H.Rob.*	FOD	-	-	-
M. scabrida Baker	?	-	-	-
M. schenckii Hieron.	?	-	-	-
M. sericea Hook. & Arn.*	FOD	-	-	-
M. sessilifolia DC.	FCA, AFL	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
M. setigera Sch.Bip.	?	-	-	-
M. smaragdina Dusén *ex* Malme *	FOM	-	-	-
M. stenomeres B.L.Rob.	?	-	-	-
M. stipulacea Willd.	FOM	-	-	-
M. stylosa Gardner	?	-	-	-
M. subverticillata Baker	?	-	-	-
M. sulcata (Hook. & Arn.) B.L.Rob.	?	-	-	-
M. ternata (Vell.) B.L.Rob.	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
M. ternifolia DC.	FCA, AFL	-	-	-
M. testudinaria DC.	?	-	-	-
M. triangularis Baker*	FOD	-	-	-
M. trinervis Hook. & Arn.*	FOD, FES	-	-	-
M. ulei Hieron.*	FOD	-	-	-
M. variifolia Hieron.*	FOD	-	-	-
M. vauthieriana Baker	FOD	-	-	-
M. viminea DC.*	FES	-	-	-
M. virgata B.L.Rob.	?	-	-	-
M. vismiifolia DC.	?	-	-	-
M. vitifolia DC.	FOD, FES, FED	-	-	-
M. warmingii Sch.Bip.	?	-	-	-
Moquinia – 1/1				
M. racemosa (Spreng.) DC.	FES, FCA	-	-	-
Mutisia – 3/ca. 62				
M. campanulata Less.	FES, RST	-	-	-
M. coccinea A.St.-Hil.	FOD, FOM	-	-	-
M. speciosa Aiton *ex* Hook.	FOD, FOM, RST	-	-	-
Neja – 2/6				
N. filiformis (Spreng.) Nees	FCA, AFL	-	-	-
N. pinifolia (Poir.) G.L.Nesom	FCA, AFL	-	-	-
Neocabreria – 3/5				
N. catharinensis (Cabrera) R.M.King & H.Rob.*	FCA, AFL	-	-	-
N. malacophylla (Klatt) R.M.King & H.Rob.	FOM, FED	-	-	-
N. serrulata (DC.) R.M.King & H.Rob.	FCA	-	-	-
Noticastrum – 7/19				
N. calvatum (Baker) Cuatrec.	FCA, RST, FOM	-	-	-
N. decumbens (Baker) Cuatrec.*	FCA, AFL	-	-	-
N. diffusum (Pers.) Cabrera	FCA	-	-	-
N. gnaphalioides (Baker) Cuatrec.	FCA, FED	-	-	-
N. hatschbachii Zardini*	FCA, RST	-	VU	ANEXO II
N. malmei Zardini*	FCA	-	VU	ANEXO II
N. psammophilum (Klatt) Cuatrec.*	RST	-	VU	ANEXO II
Ophryosporus – 10/37				
O. axilliflorus (Griseb.) Hieron.	FOD, FCA	-	-	-
O. burkartii Cabrera*	FOD	-	-	-
O. charua (Griseb.) Hieron.	FOD, FCA	-	-	-
O. freyreysii (Thunb.) Baker	FOD, FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
O. laxiflorus Baker	FCA	-	-	-
O. lorentzii Hieron.	FOD, FCA	-	-	-
O. macrodon Griseb.	FCA	-	-	-
O. organensis Cabrera*	FOD	-	CR	ANEXO II
O. piquerioides (DC.) Benth. *ex* Baker	FCA, FOD	-	-	-
O. regnellii Baker	FCA, FOD	-	-	-
Orthopappus – 1/1				
O. angustifolius (Sw.) Gleason	FCA, RST	-	-	-
Pamphalea – 2/9				
P. bupleurifolia Less.	FCA, AFL	-	VU	ANEXO II
P. cardaminifolia Less.	FCA, AFL	-	-	-
Pectis – 2/ca. 85				
P. brevipedunculata (Gardner) Sch.Bip.	FCA, RUD	-	-	-
P. rigida Baker*	FCA	-	-	-
Pentacalia – 2/ca. 200				
P. desiderabilis (Vell) Cuatrec.*	FCA	-	-	-
P. tropicalis (Cabrera) C.Jeffrey*	FCA	-	-	-
Perezia – 1/ca. 32				
P. cubataensis Less.	FCA	-	-	-
Picrosia – 2/2				
P. cabreriana A.G.Schulz	?	-	-	-
P. longifolia D.Don	FES, FCA, RST	-	-	-
Piptocarpha – 23/43				
P. angustifolia Dusén *ex* Malme*	FOM	-	-	-
P. axillaris (Less.) Baker*	FOM, FOD	-	-	-
P. brasiliana Cass.*	FOD	-	-	-
P. densifolia Dusén *ex* G.Lom.Sm.*	FOD	-	-	-
P. isotricha (DC.) Cabrera & Vittet	FOD	-	-	-
P. leprosa (Less.) Baker	FOD	-	-	-
P. lucida (Spreng.) Benn. *ex* Baker*	FOD	-	-	-
P. lundiana (Less.) Baker*	FOD	-	-	-
P. macropoda (DC.) Baker	FOD	-	-	-
P. notata (Less.) Baker*	FOD	-	-	-
P. oblonga (Gardner) Baker	FOD	-	-	-
P. organensis Cabrera*	FOD	-	-	-
P. pyrifolia (DC.) Baker*	FOD	-	-	-
P. quadrangularis (Vell.) Baker*	FOD	-	-	-
P. ramboi G.Lon.Sm.*	FOM	-	-	-
P. ramiflora (Spreng.) Baker*	FOD	-	-	-
P. regnellii (Sch.Bip.) Cabrera*	FOM	-	-	-
P. reitzii Cabrera*	FOD	-	-	-
P. riedelii (Sch.Bip.) Baker*	FOD	-	-	-
P. robusta G.Barroso*	FOD	-	-	-
P. sellowii (Sch.Bip.) Baker*	FES	-	-	-
P. tomentosa Baker	FOD, FOM	-	-	-
P. verticillata (Vell.) G.Lon.Sm. *ex* H.Rob.*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Pluchea – 4/ca. 80				
P. laxiflora Hook. & Arn. *ex* Baker*	FOD, FOM, RST	-	-	-
P. oblongifolia DC.	FCA	-	-	-
P. sagittalis (Lam.) Cabrera	RST	-	-	-
P. suaveolens (Vell.) Kuntze	FOD, FCA	-	-	-
Podocoma – 6/ca. 9				
P. asperrima Dusén *ex* Malme*	FCA	-	-	-
P. bellidifolia Baker	FCA, FED	-	-	-
P. hieraciifolia (Poir.) Cass.	FCA, FED	-	-	-
P. hirsuta (Hook. & Arn.) Baker	FCA	-	-	-
P. notobellidiastrum (Griseb.) G.L.Nesom	FOD, AFL, FCA, FOM, FED	-	-	-
P. rivularis (Gardner) G.L.Nesom*	FOD	-	-	-
Polymnia – 2/3				
P. connata (Spreng.) S.F.Blake	FOM	-	-	-
P. silphioides DC.	FCA	-	-	-
Porophyllum – 3/30				
P. lanceolatum DC.	FCA	-	-	-
P. obscurum (Spreng.) DC.	FCA	-	-	-
P. ruderale (Jacq.) Cass.	FCA, RUD	-	-	-
Praxelis – 5/14				
P. clematidea (Griseb.) R.M.King & H.Rob.	FOM, RST	-	-	-
P. grandiflora (DC.) Sch.Bip	FCA	-	-	-
P. missiona (Malme) R.M.King & H.Rob.	FCA, AFL	-	-	-
P. pauciflora (Kunth) R.M.King & H.Rob.	FCA, RST	-	-	-
P. sanctopaulensis (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob.	FCA	-	-	-
Pseudobrickellia – 1/2				
P. angustissima (Spreng. *ex* Baker) R.M.King & H.Rob.	FCA, FES	-	-	-
Pseudogynoxys – 1/14				
P. cabrerae H.Rob. & Cuatrec.	FOD	-	-	-
Pterocaulon – 11/18				
P. alopecuroides (Lam.) DC.	FES, FCA, RST	-	-	-
P. angustifolium DC.	FCA, RST	-	-	-
P. balansae Chodat	FOD, FCA	-	-	-
P. cordobense Kuntze	?	-	-	-
P. interruptum DC.*	FES	-	-	-
P. lanatum Kuntze	FCA, RST	-	-	-
P. lorentzii Malme	FCA	-	-	-
P. polystachyum DC.	?	-	-	-
P. rugosum (Vahl) Malme	FCA	-	-	-
P. subvirgatum Malme	FCA	-	-	-
P. virgatum (L.) DC.	FES, FCA, RST	-	-	-
Radlkoferotoma – 1/3				
R. cistifolium (Less.) Kuntze*	FCA	-	-	-
Raulinoreitzia – 3/3				
R. crenulata (Spreng.) R.M.King & H.Rob.	FOM, FCA, AFL	-	-	-
R. leptophlebia (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob.	FOM, FES, FCA	-	-	-
R. tremula (Hook. & Arn.) R.M.King & H.Rob.	FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Rolandra – 1/1				
R. argentea Rottb.	FOD, FCA	-	-	-
*Scherya** – 1/1				
S. bahiensis R.M.King & H.Rob. *	FCA	-	-	-
Schkuhria – 1/6				
S. pinnata (Lam.) Kuntze *ex* Thell.	FCA	-	-	-
Schlechtendalia – 1/1				
S. luzulifolia Less.	?	-	VU	ANEXO II
Senecio – 27/ca. 1250				
S. adamantinus Bong.	FCA	-	-	-
S. albus J.N.Nakaj. & A.Teles*	FCA	-	-	-
S. almasensis Mattf.*	FCA	-	EN	ANEXO II
S. brasiliensis (Spreng.) Less.	FCA	-	-	-
S. caparaoensis Cabrera*	FCA	-	CR	ANEXO I
S. claussenii Decne.*	FCA	-	-	-
S. colpodes Bong.*	FCA	-	-	-
S. dumetorum Gardner*	FCA	-	-	-
S. erisithalifolius Sch.Bip. *ex* Baker	FCA	-	-	-
S. graciellae Cabrera*	FCA	-	-	-
S. grandis Gardner*	FOM	-	-	-
S. harleyi D.J.N.Hind*	FCA	-	-	-
S. hatschbachii Cabrera*	FCA	-	CR	ANEXO II
S. hemmendorffii Malme*	FOM	-	-	-
S. icoglossus DC.	FCA	-	-	-
S. juergensii Mattf.	FCA	-	-	-
S. linearilobus Bong.	FCA	-	-	-
S. macrotis Baker*	FCA	-	-	-
S. malacophyllus Dusén*	FCA	-	-	-
S. nemoralis Dusén*	FCA	-	-	-
S. oleosus Vell.*	FCA	-	-	-
S. pohlii Sch.Bip. *ex* Baker	FCa	-	-	-
S. pseudostigophlebius Cabrera*	FCA	-	-	-
S. pulcher Hook. & Arn.	FCA	-	-	-
S. ramentaceus Baker*	FCA	-	-	-
S. regis H.Rob.*	FCA	-	-	-
S. rossianus Mattf.*	FCA	-	-	-
Solidago – 1/ca. 100				
S. chilensis Meyen	FCA, AFL, RST, FED	-	-	-
Sommerfeltia – 1/2				
S. spinulosa (Spreng.) Less.	FCA, RST	-	-	-
Sparganophora – 1/1				
S. sparganophorum (L.) Kuntze	FOD, FOM	-	-	-
Sphagneticola – 1/4				
S. brachycarpa (Baker) Pruski	?	-	-	-
Stenachaenium – 2/5				
S. campestre Baker	FCA, AFL	-	-	-
S. riedelii Baker	FOM, FED, FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Stenocephalum – 1/5				
S. megapotamicum (Spreng.) Sch.Bip	FOM, FCA, AFL	-	-	-
Stenocline – 2/3				
S. chionaea DC.	FCA	-	-	-
S. gardneri Baker	?	-	-	-
Stevia – 31/230				
S. alternifolia Hieron.	?	-	EN	ANEXO II
S. catharinensis Cabrera	FCA	-	-	-
S. cinerascens Sch.Bip *ex* Baker	FCA	-	-	-
S. claussenii Sch.Bip *ex* Baker	FCA, AFL	-	-	-
S. collina Gardner	FCA	-	-	-
S. commixta B.L.Rob.	FCA	-	-	-
S. crenulata Baker	?	-	-	-
S. decussata Baker	FCA	-	-	-
S. entrerriensis Hieron. *ex* Arechav.	FCA	-	-	-
S. gardneriana Baker	FCA	-	-	-
S. heptachaeta DC.	FCA	-	-	-
S. hypericifolia Hieron.	FCA	-	-	-
S. hyptifolia Gardner	?	-	-	-
S. leptophylla Sch.Bip *ex* Baker	FCA, AFL	-	CR	ANEXO II
S. linearifolia DC.	FCA, AFL	-	-	-
S. lucida Lag.	FCA	-	-	-
S. lundiana DC.	FCA	-	-	-
S. menthifolia Sch.Bip *ex* Baker	FCA	-	-	-
S. multiaristata Spreng.	FCA	-	-	-
S. myriadenia Sch.Bip *ex* Baker	FCA	-	-	-
S. oligocephala DC.	FCA	-	-	-
S. ophryophylla B.L.Rob.	FCA	-	-	-
S. organensis Gardner*	FCA	-	CR	ANEXO II
S. parvifolia Hassl.	FCA	-	-	-
S. pohliana Baker	FCA	-	-	-
S. rebaudiana Bertoni	FCA	-	-	-
S. satureiifolia (Lam.) Sch.Bip.	FCA	-	-	-
S. selloi (Spreng.) Sch.Bip. *ex* Baker	FCA	-	-	-
S. tenuis Hook. & Arn.	FCA	-	-	-
S. urticifolia Thunb.	?	-	-	-
S. veronicae DC.	FCA	-	-	-
Steyermarkina – 3/4				
S. dispalata (Gardner) R.M.King & H.Rob.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
S. dusenii (Malme) R.M.King & H.Rob. *	FOD, FOM	-	-	-
S. pyrifolia (DC.) R.M.King & H.Rob.	FOD, FES, FOM	-	-	-
Stifftia – 5/8				
S. chrysantha Baker*	FOD	-	-	-
S. fruticosa (Vell.) D.J.N.Hind & Semir*	FOD	-	VU	ANEXO II
S. hatschbachii H.Robinson*	FOD	-	-	-
S. parviflora (Leandro) D.Don	FCA, FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
S. racemosa H.Rob.	FCA	-	-	-
Stilpnopappus – 1/20				
S. cearensis Huber*	RST	-	VU	ANEXO II
Symphyopappus – 9/11				
S. angustifolius Cabrera	FCA, AFL	-	-	-
S. casarettoi B.L.Rob.*	FCA, RST	-	EN	ANEXO II
S. compressus (Gardner) B.L.Rob.	FOM, FCA	-	-	-
S. cuneatus (DC.) Sch.Bip. *ex* Baker	FCA, AFL	-	-	-
S. decussatus Turcz.	FCA	-	-	-
S. itatiayensis (Hieron.) R.M.King & H.Rob.	FOD, FOM, FCA	-	-	-
S. lymansmithii B.L.Rob.*	FOD, FOM,	-	EN	ANEXO II
S. reitzii (Cabrera) R.M.King & H.Rob.*	FCA, AFL	-	-	-
S. reticulatus Baker	FCA, AFL	-	-	-
Symphyotrichum – 2/ca. 96				
S. regnellii (Baker) G.L.Nesom	FCA, AFL	-	-	-
S. squamatum (Spreng.) G.L.Nesom	FCA, FED	-	-	-
Synedrella – 1/1				
S. nodiflora (L.) Gaertn.	?	-	-	-
Tilesia – 1/3				
T. baccata (L.) Pruski	FOD, FES, FCA, RST	-	-	-
Trichocline – 5/21				
T. catharinensis Cabrera*	FCA	-	-	-
T. linearifolia Malme*	FCA	-	-	-
T. macrocephala Less.*	FCA	-	-	-
T. nervosa Less.*	FCA	-	-	-
T. speciosa Less.	FCA	-	-	-
Trichogonia – 6/30				
T. attenuata G.Barroso	FCA	-	-	-
T. crenulata (Gardner) D.J.N.Hind	FCA	-	-	-
T. hirtiflora (DC.) Sch.Bip. *ex* Baker	FCA	-	-	-
T. rhodotricha Malme	FCA	-	-	-
T. salviifolia Gardner	FCA, FOD	-	-	-
T. villosa (Spreng.) Sch.Bip. *ex* Baker	FCA, FOD	-	-	-
*Trichogoniopsis** – 4/4				
T. adenantha (DC.) R.M.King & H.Rob.*	FOD	-	-	-
T. grazielae Soares Nunes*	RST	-	-	-
T. morii R.M.King & H.Rob.*	RST			
T. podocarpa (DC.) R.M.King & H.Rob.*	RST	-	-	-
Trixis – 9/50-60				
T. antimenorrhoea (Schrank) Kuntze	FES, FOD	-	-	-
T. glaziovii Baker*	FCA	-	-	-
T. lessingii DC.	FCA	-	-	-
T. nobilis (Vell.) Katinas	FCA	-	-	-
T. praestans (Vell.) Cabrera	FCA, FOD	-	-	-
T. spicata Gardner	FCA	-	-	-
T. thyrsoidea Dusén *ex* Malme*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
T. vauthieri DC.	AFL, FCA	-	-	-
T. verbascifolia S.F.Blake	FOD	-	-	-
Urolepis – 1/1				
U. hecatantha (DC.) R.M.King & H.Rob.	FOD, FOM, FES	-	-	-
Verbesina – 6/ca. 300				
V. diversifolia DC.	FOM, FES	-	-	-
V. encelioides (Cav.) Benth. & Hook.f. *ex* A.Gray	RST	-	-	-
V. floribunda Gardner	FOD	-	-	-
V. glabrata Hook. & Arn.	FOD, FOM	-	-	-
V. guianensis Baker	FOD	-	-	-
V. macrophylla (Cass.) S.F.Blake	FED, FES, RST	-	-	-
Vernonanthura – 19/ca. 65				
V. beyrichii (Less.) H. Rob	FES, RST	-	-	-
V. catharinensis (Cabrera) H.Rob.*	FOD, FOM	-	-	-
V. chamaedrys (Less.) H.Rob.	FCA	-	-	-
V. crassa (Vell.) H.Rob.	FCA, AFL	-	-	-
V. diffusa (Less.) H.Rob.	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
V. discolor (Spreng.) H.Rob.	FOD, FOM	-	-	-
V. ferruginea (Less.) H.Rob.	FES, RST	-	-	-
V. loretensis (Hieron.) H.Rob.	FCA	-	-	-
V. lucida (Less.) H.Rob.	FCA, AFL	-	-	-
V. mucronulata (Less.) H.Rob.	FCA	-	-	-
V. nudiflora (Less.) H.Rob.	FCA, AFL	-	-	-
V. oligactoides (Less.) H.Rob.	FCA, AFL	-	-	-
V. oligolepis (Sch.Bip) H.Rob.	FCA, AFL	-	-	-
V. petiolaris (DC.) H.Rob.	FOD, FOM	-	-	-
V. phosphorica (Vell.) H.Rob.	FOD, FES, RST	-	-	-
V. puberula (Less.) H.Rob.	FOD, RST	-	-	-
V. tweediana (Baker) H.Rob.	FOD, FOM, FCA	-	-	-
V. vinhae (H.Rob.) H.Rob.*	FOD	-	-	-
V. westiniana (Less.) H.Rob.	FCA	-	-	-
Viguiera – 14/ca. 140				
V. amphychlora S.F.Blake	?	-	-	-
V. anchusifolia (DC.) Baker	FOD, FOM	-	-	-
V. aspilioides Baker*	FCA	-	VU	ANEXO I
V. bakeriana S.F.Blake	FCA, AFL	-	-	-
V. linearifolia Chodat	FCA, AFL	-	CR	ANEXO II
V. macrorhiza Baker	FCA	-	-	-
V. nudibasilaris S.F.Blake	FES, FCA	-	-	-
V. nudicaulis Baker	FCA	-	-	-
V. paranensis (Malme) J.U.M.Santos	FCA, AFL	-	CR	ANEXO I
V. pilosa Baker	FOM, FES, FCA	-	-	-
V. robusta Gardner	FCA	-	-	-
V. squalida Moore	FCA	-	-	-
V. trichophylla Dusén	FCA	-	-	-
V. tuberosa Benth. & Hook.f.	FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Vittetia – 1/2				
V. orbiculata (DC.) R.M.King & H.Rob.	FCA, AFL	-	-	-
Wedelia – 7/ca. 110				
W. alagoensis Baker	FED, FCA	-	-	-
W. brasiliensis (Baker) S.F.Blake	FOD	-	-	-
W. kerrii Hassl.	FOM	-	-	-
W. paludosa DC.	FES, FCA, RST	-	-	-
W. pilosa (Baker) Hassl.	FOD, RST	-	-	-
W. subvelutina DC.	FOM, FCA	-	-	-
W. villosa Gardner	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
Wunderlichia – 3/5				
W. azulensis Maguire & G.Barroso*	AFL	-	CR	ANEXO II
W. insignis Baill.*	AFL	-	-	-
W. mirabilis Riedel *ex* Baker	FCA, AFL	-	-	-

Balanophoraceae

Marcelo Ferreira de Vasconcelos

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
BALANOPHORACEAE –7/ca. 50				
Helosis – 1/1				
H. cayennensis (Sw.) Spreng.	FOD, FOM, FES	-	-	-
Langsdorffia – 1/3				
L. hypogaea Mart.	FOD, FES, FCA, AFL	-	-	-
Lathrophytum – 1/1				
L. peckoltii Eichler	FOD, FES	-	-	-
Lophophytum – 2/4				
L. leandri Eichler*	FOD, FOM, FES	-	-	-
L. mirabile Schott & Endl.	FOD, FES	-	-	-
Scybalium – 2/4				
S. fungiforme Schott & Endl.	FOD, FES	-	-	-
S. glaziovii Eichler*	FOD, FES	-	-	-

Basellaceae

Márcio de Souza Werneck

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
BASELLACEAE – 2/19				
Anredera – 2/11				
A. cordifolia (Ten.) Steenis	FOD, FES	-	-	-
A. tucumanensis (Lillo & Hauman) Sperling	FOD	-	-	-

Bataceae

Márcio de Souza Werneck

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
BATACEAE – 1/2				
Batis – 1/2				
B. maritima L.	MAN	-	-	-

Begoniaceae

Eliane de Lima Jacques

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
BEGONIACEAE – 179/ca. 1400				
Begonia – 179/1400				
B. acetosa Vell.	FOD	-	-	-
B. acida Vell.	FOD	-	-	-
B. aconitifolia A.DC.*	FOD	-	-	-
B. admirabilis Brade*	FOD	-	-	-
B. aguiabrancensis L.Kollmann*	FOD	-	-	-
B. albidula Brade*	FOD, FCA	-	VU	ANEXO II
B. altamiroi Brade*	FOD	-	VU	ANEXO II
B. angraensis Brade*	FOD	-	-	-
B. angularis Raddi*	FOD	-	-	-
B. angulata Vell.*	FOD	-	-	-
B. apparicioi Brade*	FOD	-	-	-
B. arborescens Raddi*	FOD	-	-	-
B. bahiensis A.DC.*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
B. barkleyana L.B.Sm.*	FOD	-	-	-
B. besleriifolia Schott*	FOD, FES	-	-	-
B. bidentata Raddi*	FOD	-	-	-
B. biguassuensis Brade*	FOD	-	-	-
B. bonitoensis Brade*	FOD	-	-	-
B. boraceiensis Handro*	FOD	-	-	-
B. bradei Irmsch.*	FOD	-	-	-
B. brevilobata Irmsch.*	FOD	-	-	-
B. cacauicola L.B.Sm. *ex* S.F.Sm & Wassh.	FOD	-	-	-
B. calvescens (Brade *ex* L.B.Sm. & R.C.Sm.) E.L.Jacques & Mamede*	FOD, AFL	-	-	-
B. camposportoana Brade*	FOD	-	-	-
B. capanemae Brade*	FOD	-	-	-
B. caparaoensis E.L.Jacques & L.Kollmann*	FOD	-		
B. caraguatatubensis Brade*	FOD	-	-	-
B. catharinensis Brade*	FOD	-	-	-
B. cerasiphylla L.B.Sm. & Wassh.	FOD	-	-	-
B. coccinea Hook.*	FOD	-	-	-
B. collaris Brade*	FOD	-	-	-
B. concinna Schott*	FOD	-	-	-
B. convolvulacea (Klotzsch) A.DC. *	FOD	-	-	-
B. cordata Vell.	FOD	-	-	-
B. cornitepala Irmsch.*	FOD	-	-	-
B. crispula Brade*	FOD	-	EN	ANEXO II
B. cucullata Willd.	FOD	-	-	-
B. curtii L.B.Sm. & B.G.Schub. *	FOD	-	-	-
B. declinata Vell. *	FOD	-	-	-
B. densifolia Irmsch.*	FOD	-	-	-
B. dentatiloba A.DC. *	FOD	-	-	-
B. depauperata Schott*	FOD	-	-	-
B. descoleana L.B.Sm. & B.G.Schub.	FOD, FES	-	-	-
B. dietrichiana Irmsch.*	FOD	-	-	-
B. digitata Raddi	FOD	-	-	-
B. echinosepala Regel*	FOD	-	-	-
B. edmundoi Brade*	FOD	-	-	-
B. egregia N.E.Br.	FOD	-	-	-
B. epibaterium Mart. *ex* A.DC. *	FOD	-	-	-
B. epipsila Brade*	FOD	-	-	-
B. erecta Vell.	FOD	-	-	-
B. espiritosantensis E.L.Jacques & Mamede*	FOD	-	EN	ANEXO II
B. euryphylla L.B.Sm. *ex* S.F.Sm & Wassh.	FOD	-	-	-
B. fabulosa L.B.Sm. & Wassh.	FOD	-	-	-
B. fagifolia Otto & A.Dietr. *	FOD	-	-	-
B. fernandocostae Irmsch. *	FOD	-	-	-
B. fischeri Schrank	FOD, RST	-	-	-
B. fluminensis Brade*	FOD	-	-	-
B. friburgensis Brade*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
B. fruticosa (Klotzsch) A.DC. *	FOD	-	-	-
B. fulvosetulosa Brade*	FOD	-	-	-
B. fuscocaulis Brade*	FOD	-	-	-
B. gardneri A.DC. *	FOD	-	-	-
B. garuvae L.B.Sm. & R.C.Sm.	FOD	-	-	-
B. gehrtii Irmsch.	FOD	-	-	-
B. hammoniae Irmsch.*	FOD	-	-	-
B. handroi Brade*	FOD	-	-	-
B. herbacea Vell. *	FOD	-	-	-
B. heringeri Brade*	FOD	-	-	-
B. herteri Irmsch. *	FOD	-	-	-
B. hilariana A.DC.*	FOD	-	-	-
B. hirtella Link	FOD, RST	-	-	-
B. hispida Schott*	FOD	-	-	-
B. hoehneana Irmsch.*	FOD	-	-	-
B. hookeriana Gardner*	FOD	-	-	-
B. hugelii (Klotzsch) A.DC. *	FOD	-	-	-
B. ibitiocensis E.L.Jacques & Mamede*	FOD	-	CR	ANEXO II
B. incisoserrata A.DC. *	FOD	-	-	-
B. inconspicua Brade*	FOD	-	-	-
B. insularis Brade*	FOD	-	-	-
B. integerrima Spreng.*	FOD	-	-	-
B. isopterocarpa Irmsch. *	FOD	-	-	-
B. itaguassuensis Brade*	FOD	-	-	-
B. itatiaiensis Brade*	FOD	-	-	-
B. itatinensis Irmsch. *ex* Brade*	FOD	-	-	-
B. itupavensis Brade*	FOD	-	-	-
B. jocelinoi Brade*	FOD	-	-	-
B. juliana Loefgr. & Hoehne*	FOD	-	-	-
B. jureiensis Gomes da Silva & Mamede*	FOD	-	VU	ANEXO I
B. konderreisiana L.B.Sm & R.C.Sm. *	FOD	-	-	-
B. kuhlmannii Brade*	FOD, AFL	-	-	-
B. lanceolata Vell. *	FOD	-	-	-
B. lanstyakii Brade*	FOD	-	-	-
B. larorum L.B.Sm. & Wassh.*	FOD	-	-	-
B. lealii Brade	FOD	-	-	-
B. lindmanii Brade	FES	-	-	-
B. lineolata Brade*	FOD	-	-	-
B. lobata Schott	FOD	-	-	-
B. longibarbata Brade*	FOD	-	-	-
B. lossiae L.Kollmann*	FOD	-	-	-
B. lubbersii E.Morren*	FOD	-	-	-
B. lunaris E.L.Jacques*	FOD	-	-	-
B. luxurians Scheidw.	FOD	-	-	-
B. maculata Raddi	FOD, RST	-	-	-
B. magdalenensis Brade*	FOD	-	-	-
B. mattossilvae L.B.Sm. *ex* S.F.Sm & Wassh.	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
B. membranacea A.DC.	FOD	-	-	-
B. moysesii Brade*	FOD	-	-	-
B. mysteriosa L.Kollmann & A.P.Fontana*	FOD	-		
B. neglecta A.DC.	FOD	-	-	-
B. neocomensium A.DC.	FOD	-	-	-
B. novalombardiensis L.Kollmann*	FOD	-	-	-
B. nuda Irmsch.*	FOD	-	-	-
B. obscura Brade	FOD	-	-	-
B. occhionii Brade*	FOD	-	-	-
B. odeteiantha Handro*	FOD	-	-	-
B. olsoniae L.B.Sm. & B.G.Schub. *	FOD	-	-	-
B. organensis Brade*	FOD	-	-	-
B. paleata Schott *ex* A.DC. *	FOD	-	-	-
B. paranaensis Brade*	FOD	-	-	-
B. parilis Irmsch. *	FOD	-	-	-
B. parvifolia Schott*	FOD	-	-	-
B. parvistipulata Irmsch. *	FOD	-	-	-
B. paulensis A.DC.*	FOD	-	-	-
B. peltifolia Schott	FOD	-	-	-
B. pentaphylla Walp.	FOD	-	-	-
B. perdusenii Brade	FOD	-	-	-
B. peristegia Stapf	FOD	-	-	-
B. pernambucensis Brade	FOD	-	-	-
B. peruibensis Handro*	FOD	-	-	-
B. pickelii Irmsch.*	FOD	-	-	-
B. pilgeriana Irmsch*	FOD	-	-	-
B. pinheironis L.B.Sm. *ex* S.F.Sm & Wassh.	FOD	-	-	-
B. piresiana Handro*	FOD	-	-	-
B. platanifolia Schott	FOD	-	-	-
B. pluvialis L.B.Sm. *ex* S.F.Sm & Wassh.	FOD	-	-	-
B. polyandra Irmsch.*	FOD	-	-	-
B. polygonifolia A.DC. *	FOD	-	-	-
B. princeps A.DC. *	FOD	-	-	-
B. pseudolubbersii Brade*	FOD	-	-	-
B. pulchella Raddi*	FOD	-	-	-
B. radicans Vell. *	FOD	-	-	-
B. ramentacea Paxton*	FOD	-	-	-
B. reniformis Dryand.	FOD	-	-	-
B. riedelii A.DC.*	FOD	-	-	-
B. rotunda Vell.	FOD	-	-	-
B. rubropilosa A.DC.*	FOD	-	-	-
B. rufosericea Toledo*	FOD	-	-	-
B. rupium Irmsch. *	FOD	-	-	-
B. ruschii L.Kollmann*	FOD	-	VU	ANEXO II
B. russelliana L.B.Sm. *ex* S.F.Sm & Wassh.	FOD	-	-	-
B. salesopolensis Gomes da Silva & Mamede*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
B. sanguinea Raddi*	FOD	-	-	-
B. santoslimae Brade*	FOD	-	-	-
B. saxicola A.DC.	FOD	-	-	-
B. saxifraga A.DC.	FOD	-	-	-
B. scharffii Hook.*	FOD	-	-	-
B. semidigitata Brade*	FOD	-	-	-
B. semperflorens Link & Otto	FOD	-	-	-
B. serranegrae L.B.Sm. *ex* S.F.Sm & Wassh.	FOD	-	-	-
B. smilacina A.DC. *	FOD	-	-	-
B. solananthera A.DC. *	FOD	-	-	-
B. solitudinis Brade*	FOD	-	-	-
B. spinibarbis Irmsch.*	FOD	-	-	-
B. squamipes Irmsch.*	FOD	-	-	-
B. stenolepis L.B.Sm. & R.C.Sm.*	FOD	-	-	-
B. stenophylla A.DC.	FOD	-	-	-
B. subacida Irmsch.*	FOD	-	-	-
B. subvillosa Klotzsch	FOD, FES	-	-	-
B. sylvatica Meisn. *ex* A.DC. *	FOD	-	-	-
B. toledoana Handro*	FOD	-	-	-
B. tomentosa Schott*	FOD	-	-	-
B. ulmifolia Willd.	FOD, FES	-	-	-
B. undulata Schott	FOD, RST	-	-	-
B. valdensium A.DC. *	FOD	-	-	-
B. velloziana Walp. *	FOD	-	-	-
B. venosa Skankex Hook.*	FOD	-	-	-
B. vicina Irmsch.*	FOD	-	-	-
B. windischii L.B.Sm. *ex* S.F.Sm & Wassh.	FOD	-	-	-

Berberidaceae

Caetano Troncoso Oliveira

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
BERBERIDACEAE – 4/650				
Berberis – 4/600				
B. camposportoi Brade*	FCA	-	VU	ANEXO II
B. glazioviana Brade*	FCA	-	-	-
B. kleinii Mattos*	FOM	-	VU	ANEXO II
B. laurina Billb.	FOM, FCA	-	-	-

Bignoniaceae

Lúcia G. Lohmann & Dayane Tarabay

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
BIGNONIACEAE – 199/827				
Adenocalymma – 30/79				
A. apparicianum J.C.Gomes	FOD	-	-	-
A. bracteatum (Cham.) DC.	FOM, FES	-	-	-
A. bracteolatum DC.	FES	-	-	-
A. bullatum Bureau & K.Schum.*	FES	-	-	-
A. comosum (Cham.) DC.	RST, FOD	-	-	-
A. coriaceum A.DC.	FOD	-	-	-
A. cymbalum (Cham.) Bureau & K.Schum.	FOD	-	-	-
A. divaricatum Miers	FOD	-	-	-
A. dusenii Kraenzl.*	FOD	-	-	-
A. hatschbachii A.H.Gentry	FOD	-	-	-
A. hirtum (Mart. *ex* DC.) Bureau & K.Schum.	FOD	-	-	-
A. hypostictum Bureau & K.Schum.	FOD	-	-	-
A. imperatoris-maximiliani (Wawra) L.G.Lohmann	FOD	-	-	-
A. involucratum (Bureau & K.Schum.) L.G.Lohmann	FOD	-	-	-
A. marginatum DC.	FOD, FOM, FES	-	-	-
A. neoflavidum L.G.Lohmann	FOD	-	-	-
A. nodosum (Silva Manso) L.G.Lohmann	FES	-	-	-
A. paulistarum Bureau & K.Schum.*	FES	-	-	-
A. pedunculatum (Vell.) L.G.Lohmann	FOD, FES	-	-	-
A. peregrinum (Miers) L.G.Lohmann	FOD, FOM, FES	-	-	-
A. pubescens (Spreng.) L.G.Lohmann	FOD, FES	-	-	-
A. reticulatum Bureau & K.Schum.	FOD	-	-	-
A. salmoneum J.C.Gomes*	FOD	-	-	-
A. scansile Miers	FOD, FOM, FES	-	-	-
A. subsessilifolium DC.*	FOD	-	-	-
A. subspicatum A.H.Gentry	FOD	-	-	-
A. ternatum (Vell.) Mello *ex* Bureau & K.Schum.*	FOD	-	-	-
A. trichocladum (DC.) L.G.Lohmann	FES	-	-	-
A. trifoliatum (Vell.) L.C.Larroche	FOD	-	-	-
A. ubatubense Assis & Semir*	FOD	CR	CR	ANEXO I
Amphilophium – 12/43				
A. bauhinioides (Bureau *ex* Baill.) L.G.Lohmann	FOD	-	-	-
A. bracteatum (Cham.) L.G.Lohmann	FOD	-	-	-
A. crucigerum (L.) L.G.Lohmann	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
A. cynanchoides (DC.) L.G.Lohmann	FES	-	-	-
A. dolichoides (Cham.) L.G.Lohmann*	FOD, FOM	-	-	-
A. elongatum (Vahl) L.G.Lohmann	FOD, FES	-	-	-
A. falcatum (DC.) L.G.Lohmann	FOD	-	-	-
A. frutescens (DC.) L.G.Lohmann*	FOD	-	-	-
A. glaziovii Bureau & K.Schum.	FOD, FOM	-	-	-
A. mansoanum (DC.) L.G.Lohmann	FOD, FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
A. paniculatum (L.) Kunth	FOD, FES	-	-	-
A. scabriusculum (Mart. *ex* DC.) L.G.Lohmann	FOD	-	-	-
Anemopaegma – 19/45				
A. acutifolium DC.	FOD, FES	-	-	-
A. album Mart. *ex* DC.	FCA	-	-	-
A. arvense (Vell.) Stellfeld *ex* de Souza	FOD, FOM, FES	-	-	-
A. chamberlaynii (Sims) Bureau & K.Schum.	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
A. citrinum Mart. *ex* DC.	FOD	-	-	-
A. flavum Morong	FES	-	-	-
A. floridum Mart. *ex* DC.	FOD	-	-	-
A. glaucum Mart. *ex* DC.	FOD, FES	-	-	-
A. goyazense K.Schum.	FOD	-	-	-
A. gracile Bureau & K.Schum.	FOD	-	-	-
A. hilarianum Bureau & K.Schum.*	FOD	-	-	-
A. laeve DC.	FOD	-	-	-
A. longipetiolatum Sprague	FES	-	-	-
A. pabstii A.H.Gentry	FOD	-	-	-
A. parkeri Sprague	FOD	-	-	-
A. prostratum DC.	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
A. scabriusculum Mart. *ex* DC.	FCA	-	-	-
A. setilobum A.H.Gentry	FOD	-	-	-
A. velutinum Mart. *ex* DC.	FOD, FES	-	-	-
Bignonia – 11/28				
B. binata Thunb.	FOD, FES	-	-	-
B. callistegioides Cham.	FES, FED	-	-	-
B. campanulata Cham.	FOD	-	-	-
B. convolvuloides (Bureau & K.Schum.) L.G.Lohmann	FOD	-	-	-
B. corymbosa (Vent.) L.G.Lohmann	FOD	-	-	-
B. costata (Bureau & K.Schum.) L.G.Lohmann*	FOD	-	-	-
B. decora (S.Moore) L.G.Lohmann	FES	-	-	-
B. prieurei DC.	FOD	-	-	-
B. ramentacea (Mart. *ex* DC.) L.G.Lohmann	FOD	-	-	-
B. sciuripabula (K.Schum.) L.G.Lohmann	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
B. uleana (Kraenzl.) L.G.Lohmann	FOD	-	-	-
Callichlamys – 1/1				
C. latifolia (Rich.) K.Schum.	FOD	-	-	-
Cuspidaria – 10/16				
C. argentea (Wawra) Sandwith	FOD	-	-	-
C. convoluta (Vell.) A.H.Gentry	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
C. floribunda (DC.) A.H.Gentry	FOD	-	-	-
C. lachnaea (Bureau) L.G.Lohmann	FOD	-	-	-
C. lateriflora (Mart.) DC.	FOD, FES	-	-	-
C. multiflora DC.	FOD	-	-	-
C. octoptera A.H.Gentry	FOD	-	-	-
C. puberula Mart. *ex* DC.	FOD	-	-	-
C. pulchra (Cham.) L.G.Lohmann	FOD, FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
C. sceptrum (Cham.) L.G.Lohmann	FOD, FES	-	-	-
Cybistax – 1/1				
C. antisyphilica (Mart.) Mart.	FOD	-	-	-
Dolichandra – 7/8				
D. chodatii (Hassl.) L.G.Lohmann	FES	-	-	-
D. cynanchoides Cham.	FES	-	-	-
D. dentata (K.Schum.) L.G.Lohmann	FES, FOM	-	-	-
D. quadrivalvis (Jacq.) L.G.Lohmann	FOD, FOM, FES	-	-	-
D. uncata (Andrews) L.G.Lohmann	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
D. unguiculata (Vell.) L.G.Lohmann*	FOD	-	-	-
D. unguis-cati (L.) L.G.Lohmann	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
Fridericia – 34/69				
F. bahiensis (Schauer) Sandwith & Moldenke	FOD	-	-	-
F. caudigera (S.Moore) L.G.Lohmann	FOD, FOM, FES	-	-	-
F. celastroides (Bureau *ex* K.Schum.) L.G.Lohmann	FOD	-	-	-
F. chica (Bonpl.) L.G.Lohmann	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
F. cinerea (Bureau *ex* K.Schum.) L.G.Lohmann	FOD	-	-	-
F. claussenii (A.DC.) L.G.Lohmann	FOD	-	-	-
F. conjugata (Vell.) L.G.Lohmann	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
F. corallina (Jacq.) L.G.Lohmann	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
F. corchoroides (Cham.) L.G.Lohmann	FOD	-	-	-
F. craterophora (DC.) L.G.Lohmann	FOD, FES	-	-	-
F. cuneifolia (DC.) Sandwith	FOD	-	-	-
F. dispar (Bureau & K.Schum.) L.G.Lohmann	FOD	-	-	-
F. elegans (Vell.) L.G.Lohmann*	FOD	-	-	-
F. erubescens (DC.) L.G.Lohmann	FOD	-	-	-
F. fagoides (Cham.) L.G.Lohmann	FOD, FES	-	-	-
F. florida (DC.) L.G.Lohmann	FOD, FES	-	-	-
F. formosa (Bureau) L.G.Lohmann	FOD	-	-	-
F. leucopogon (Cham.) L.G.Lohmann	FOD	-	-	-
F. limae (A.H.Gentry) L.G.Lohmann	FOD	-	-	-
F. mutabilis (Bureau & K.Schum.) L.G.Lohmann	FOD, FOM, FES	-	-	-
F. parviflora (Mart. *ex* DC.) L.G.Lohmann	FOD	-	-	-
F. patellifera (Schltdl.) L.G.Lohmann	FOD	-	-	-
F. platyphylla (Cham.) L.G.Lohmann	FOD, FOM, FES	-	-	-
F. poeppigii (DC.) L.G.Lohmann	FOD	-	-	-
F. pubescens (L.) L.G.Lohmann	FOD, FOM	-	-	-
F. pulchella (Cham.) L.G.Lohmann	FOD, FOM, FES	-	-	-
F. rego (Vell.) L.G.Lohmann*	FOD, RST	-	-	-
F. samydoides (Cham.) L.G.Lohmann	FOD, FOM, FES	-	-	-
F. speciosa Mart.	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
F. subincana (Mart.) L.G.Lohmann*	FOD, RST	-	-	-
F. subverticillata (Bureau & K.Schum.) L.G.Lohmann	FOD	-	-	-
F. trachyphylla (Bureau & K.Schum.) L.G.Lohmann*	FOD	-	-	-
F. triplinervia (Mart. *ex* DC.) L.G.Lohmann	FOD, FES	-	-	-
F. tynanthoides (A.H.Gentry) L.G.Lohmann*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Handroanthus – 13/30				
H. albus (Cham.) Mattos	FOD, FOM	-	-	-
H. arianeae (A.H.Gentry) S.Grose*	FOD	-	VU	ANEXO II
H. bureavii (Sandwith) S.Grose	FOD	-	-	-
H. chrysotrichus (Mart.ex.DC.) Mattos	RST	-	-	-
H. cristatus (A.H.Gentry) S.Grose	FOD	-	EN	ANEXO II
H. heptaphyllus (Vell.) Mattos	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
H. ochraceus (Cham.) Mattos	FOD, FOM	-	-	-
H. pedicellatus (Bureau *ex* K.Schum.) Mattos	FOD	-	-	-
H. pulcherrimus (Sandwith) S.Grose	RST	-	-	-
H. riodocensis (A.H.Gentry) S.Grose	FOD	-	VU	ANEXO II
H. serratifolius (Vahl) S.Grose	FOD, FES	-	-	-
H. umbellatus (Sond.) Mattos	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
H. vellosoi (Toledo) Mattos	FOD	-	-	-
Jacaranda – 11/48				
J. bracteata Bureau & K.Schum.	RST	-	-	-
J. crassifolia Morawetz*	FOD	EN	EN	ANEXO I
J. grandifoliolata A.H.Gentry*	RST	VU	VU	ANEXO II
J. jasminoides (Thunb.) Sandwith	FOD	-	-	-
J. macrantha Cham.	FOD	-	-	-
J. micrantha Cham.	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
J. microcalyx A.H.Gentry	FOD	VU	VU	ANEXO II
J. montana Morawetz*	FOD	-	-	-
J. obovata Cham.*	RST	-	-	-
J. puberula Cham.	FOD, FOM, FES	-	-	-
J. subalpina Morawetz*	FOD	VU	VU	ANEXO I
Lundia – 8/13				
L. cordata (Vell.) DC.	FOD, RST	-	-	-
L. corymbifera (Vahl) Sandwith	FOD	-	-	-
L. damazii DC.*	FOD	-	-	-
L. gardneri Sandwith	FOD	-	-	-
L. glazioviana Kraenzl.	FOD	-	-	-
L. neolonga L.G.Lohmann*	FOD	-	-	-
L. obliqua Sond.	FOD	-	-	-
L. virginalis DC.	FOD	-	-	-
Manaosella – 1/1				
M. cordifolia (DC.) A.H.Gentry	FOD	-	-	-
Mansoa – 7/12				
M. angustidens (DC.) Bureau & K.Schum.	RST	-	-	-
M. difficilis (Cham.) Bureau & K.Schum.	FOD, FOM, FES	-	-	-
M. glaziovii Bureau & K.Schum.	FOD	-	-	-
M. hirsuta DC.	FOD	-	-	-
M. hymenaea (DC.) A.H.Gentry	FOD	-	-	-
M. lanceolata (DC.) A.H.Gentry*	FOD	-	-	-
M. onohualcoides A.H.Gentry*	FOD	-	-	-
Martinella – 1/2				
M. obovata (Kunth) Bureau & K.Schum	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Neojobertia – 2/2				
N. candolleana (Mart. *ex* DC.) Bureau & K.Schum.	FOD	-	-	-
N. mirabilis (Sandwith) L.G.Lohmann	FOD	-	-	-
*Paratecoma** – 1/1				
P. peroba (Record) Kuhlm.*	FOD	-	-	-
Perianthomega – 1/1				
P. vellozoi Bureau	FOD	-	-	-
Pleonotoma – 6/15				
P. albiflora (Salzm. *ex* DC.) A.H.Gentry	FOD	-	-	-
P. fluminensis (Vell.) A.H.Gentry	FES	-	-	-
P. melioides (S.Moore) A.H.Gentry	FOD	-	-	-
P. pavettiflora Sandwith	FES	-	-	-
P. stichadenia K.Schum.	FOD	-	-	-
P. tetraquetra (Cham.) Bureau	FOD, FES	-	-	-
Pyrostegia – 1/2				
P. venusta (Ker Gawl.) Miers	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
Sparattosperma – 1/2				
S. leucanthum (Vell.) K.Schum.	FOD	-	-	-
Stizophyllum – 2/3				
S. perforatum (Cham.) Miers	FOD, FES	-	-	-
S. riparium (Kunth) Sandwith	FOD	-	-	-
Tabebuia – 4/67				
T. cassinoides (Lam.) DC.	FOD	VU	VU	ANEXO II
T. elliptica (DC.) Sandwith*	RST	-	-	-
T. obtusifolia (Cham.) Bureau	FOD	VU	VU	ANEXO II
T. stenocalyx Sprague & Stapf	FOD	-	-	-
Tanaecium – 5/16				
T. cyrtanthum (Mart. *ex* DC.) Bureau & K.Schum.	FES	-	-	-
T. duckei A.Samp.	FOD	-	-	-
T. neobrasiliensis L.G.Lohmann	FOD	-	-	-
T. pyramidatum (Rich.) L.G.Lohmann	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
T. selloi (Spreng.) L.G.Lohmann	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
Tynanthus – 5/15				
T. cognatus (Cham.) Miers	FOD, FES	-	-	-
T. elegans Miers*	FOD, FES	-	-	-
T. fasciculatus (Vell.) Miers	FOD, FES, FCA	-	-	-
T. labiatus (Cham.) Miers*	FOD	-	-	-
T. micranthus Mello *ex* K.Schum.	FOM, FES	-	-	-
Xylophragma – 4/6				
X. harleyi (A.H.Gentry *ex* M.M.Silva & L.P.Queiroz) L.G.Lohmann		FOD	-	- -
X. heterocalyx (Bureau & K.Schum.) A.H.Gentry	FOD	-	-	-
X. myrianthum (Cham.) Sprague	FOD, FOM, FES	-	-	-
X. pratense (Bureau & K.Schum.) Sprague	FES	-	-	-
Zeyheria – 1/2				
Z. tuberculosa (Vell.) Bureau *ex* Verl.	FOD	-	-	-

Bixaceae

Márcio de Souza Werneck

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
BIXACEAE – 3/23				
Bixa – 2/5				
B. arborea Huber	FOD, FES	-	-	-
B. orellana L.	FOD, FES	-	-	-
Cochlospermum – 1/13				
C. vitifolium (Willd.) Spreng.	FOD, FES	-	-	-

Bonnetiaceae

João Renato Stehmann

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
BONNETIACEAE – 1/35				
Bonnetia – 1/30				
B. stricta (Nees) Nees & Mart.	RST	-	-	-

Boraginaceae

Elsie Franklin Guimarães & Erika von Sohsten Medeiros

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
BORAGINACEAE – 4/1.600				
Moritzia – 2/6				
M. ciliata (Cham.) DC.	FCA	-	-	-
M. dusenii I.M.Johnst.*	FOM, FCA	-	-	-
Thaumatocaryon – 2/4				
T. dasyanthum (Cham.) I.M.Johnst.*	FCA	-	-	-
T. tetraquetrum (Cham.) I.M.Johnst.	FOD	-	-	-

Brassicaceae

Marcos Sobral

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
BRASSICACEAE – 21/3250				
Brassica – 2/35				
B. juncea (L.) Czern. & Cosson	FCA, RUD	-	-	-
B. rapa L.	FCA, RUD	-	-	-
Cakile – 1/7				
C. maritima Scop.	FCA, RUD	-	-	-
Capsella – 1/5				
C. bursapastoris (L.) Medik.	FCA, RUD	-	-	-
Cardamine – 3/200				
C. africana L.	FCA, RUD	-	-	-
C. bonariensis Pers.	FCA, RUD	-	-	-
C. chenopodiifolia Pers.	FCA, RUD	-	-	-
Coronopus – 1/10				
C. didymus (L.) Sm.	FCA, RUD	-	-	-
Lepidium – 2/140				
L. aletes J.F.Macbr.	FCA, RUD	-	-	-
L. bonariense L.	FCA, RUD	-	-	-
Raphanus – 2/3				
R. raphanistrum L.	FCA, RUD	-	-	-
R. sativus L.	FCA, RUD	-	-	-
Rapistrum – 1/2				
R. rugosum (L.) All.	FCA, RUD	-	-	-
Rorippa – 6/80				
R. bonariensis (Poir.) Mackloskie	FCA, RUD	-	-	-
R. clandestina (Spreng.) J.F.Macbr.	FCA, RUD	-	-	-
R. dubia (Pers.) Hara	FCA, RUD	-	-	-
R. hilariana (Walp.) Cabrera	FCA, RUD	-	-	-
R. nasturtiumaquaticum (L.) Hayek	FCA, RUD	-	-	-
R. palustris (L.) Besser	FCA, RUD	-	-	-
Sisymbrium – 2/90				
S. altissimum L.	FCA, RUD	-	-	-
S. irio L.	FCA, RUD	-	-	-

Bromeliaceae

Gustavo Martinelli, Cláudia Magalhães Vieira, Paula Leitman, Andrea Ferreira da Costa & Rafaela Campostrini Forzza

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
BROMELIACEAE – 816/3.172				
Acanthostachys – 2/2				
A. pitcairnioides (Mez) Rauh & Barthlott	?	-	-	-
A. strobilacea (Schult. & Schult.f.) Klotzsch	FOD, FES, FED	-	-	-
Aechmea – 136/254				
A. alba Mez*	FOD, RST	-	-	-
A. alopecurus Mez*	FOD, FES, FED	-	CR	ANEXO II
A. amicorum B.R.Silva & H.Luther*	RST	-	EN	ANEXO II
A. amorimii Leme*	FOD, RST	-	-	-
A. ampla L.B.Sm.*	RST	-	-	-
A. andersoniana Leme & H.Luther*	FOD	-	-	-
A. andersonii H.Luther & Leme*	RST	-	-	-
A. apocalyptica Reitz*	FOD, FOM	-	-	-
A. aquilega (Salisb.) Griseb.	FOD, FES, RST	-	-	-
A. araneosa L.B.Sm.*	FOD	-	-	-
A. atrovittata Leme & J.A.Siqueira*	FOD	-	-	-
A. azurea L.B.Sm.*	FOD	-	-	-
A. bambusoides L.B.Sm. & Reitz*	FES	-	-	-
A. bicolor L.B.Sm.*	FOD, RST	-	-	-
A. blanchetiana (Baker) L.B.Sm.*	FOD, RST	-	-	-
A. blumenavii Reitz*	FOD, FOM	-	-	-
A. bocainensis E.Pereira & Leme*	FOD	-	-	-
A. bromeliifolia (Rudge) Baker	FOD, FOM, FES, FED, FCA	-	-	-
A. bruggeri Leme*	FES	-	-	-
A. burle-marxii E.Pereira*	FOD, FES	-	-	-
A. caesia E.Morren *ex* Baker*	FOD, FOM	-	-	-
A. calyculata (E.Morren) Baker	FOD, FOM	-	VU	ANEXO II
A. canaliculata Leme & H.Luther*	FOD	-	-	-
A. candida E.Morren *ex* Baker*	FOD	-	-	-
A. capixabae L.B.Sm.*	FOD	-	-	-
A. cariocae L.B.Sm.*	FOD	-	VU	ANEXO I
A. carvalhoi E.Pereira & Leme*	FOD	-	-	-
A. castanea L.B.Sm.*	FOD	-	VU	ANEXO II
A. castelnavii Baker	FOD	-	-	-
A. catendensis J.A.Siqueira & Leme*	FOD, FES	-	-	-
A. caudata Lindm.	FOD, RST, AFL	-	-	-
A. cephaloides J.A.Siqueira & Leme*	FOD	-	-	-
A. chrysocoma Baker*	FOD	-	-	-
A. coelestis (K.Koch) E.Morren	FOD, FOM	-	-	-
A. comata (Gaudich.) Baker*	FOD, RST	-	-	-
A. conifera L.B.Sm.*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
A. constantinii (Mez) L.B.Sm.*	FOD	-	-	-
A. correia-araujoi E.Pereira & Moutinho*	FOD	-	-	-
A. curranii (L.B.Sm.) L.B.Sm. & M.A.Spencer*	FOD, FES	-	-	-
A. cylindrata Lindm.*	FOD, RST, MAN	-	-	-
A. dealbata E.Morren *ex* Baker*	RST	-	-	-
A. depressa L.B.Sm.*	FOD	-	VU	ANEXO II
A. digitata L.B.Sm. & R.W.Read*	FOD	-	-	-
A. discordiae Leme*	RST	-	-	-
A. disjuncta (L.B.Sm.) Leme & J.A.Siqueira*	FOD	-	-	-
A. distichantha Lem.	FOD, FOM, FES, FED, RST, AFL, FCA	-	-	-
A. echinata (Leme) Leme*	FOD	-	EN	ANEXO II
A. emmerichiae Leme*	FES	-	-	-
A. entringeri Leme*	FOD	-	-	-
A. eurycorymbus Harms*	FES, RST	-	CR	ANEXO I
A. farinosa (Regel) L.B.Sm.	FOD, RST, FES	-	-	-
A. fasciata (Lindl.) Baker*	FOD	-	-	-
A. flavorosea E.Pereira*	FOD	-	-	-
A. floribunda Mart. *ex* Schult. & Schult.f.*	FOD, RST	-	-	-
A. fosteriana L.B.Sm.*	FOD	-	EN	ANEXO II
A. fraudulosa Mez*	FOD	-	-	-
A. froesii (L.B.Sm.) Leme & J.A.Siqueira*	FOD, RST	-	-	-
A. fulgens Brongn.*	FOD, FES, RST	-	-	-
A. gamosepala Wittm.	FOD, FOM, RST	-	-	-
A. glandulosa Leme*	FOD	-	-	-
A. gracilis Lindm.*	FOD, FOM, RST	-	VU	ANEXO II
A. grazielae Martinelli & Leme*	FOD	-	-	-
A. guainumbiorum J.A.Siqueira & Leme*	FCA	-	-	-
A. guarapariensis E.Pereira & Leme*	FOD, RST	-	-	-
A. guaratubensis E.Pereira*	FOD	-	-	-
A. gurkeniana E.Pereira & Moutinho*	RST	-	-	-
A. gustavoi J.A.Siqueira & Leme*	FOD	-	EN	ANEXO II
A. hostilis E.Pereira*	FOD	-	-	-
A. incompta Leme & H.Luther*	FOD, RST	-	-	-
A. kertesziae Reitz	FOD, RST, AFL	-	-	-
A. kleinii Reitz*	FOD, FOM	-	-	-
A. lactifera Leme & J.A.Siqueira*	RST	-	-	-
A. laevigata Leme*	FOD	-	-	-
A. lamarchei Mez	FOD, FES	-	-	-
A. lanata (L.B.Sm.) L.B.Sm. & M.A.Spencer*	FOD	-	-	-
A. leonard-kentiana H.Luther & Leme*	FOD	-	-	-
A. leppardii Philcox*	FOD	-	-	-
A. leptantha (Harms) Leme & J.A.Siqueira	FOD, FES	-	-	-
A. leucolepis L.B.Sm.*	FOD	-	-	-
A. linharesiorum Leme*	FES	-	-	-
A. lymanii W.Weber*	FOD	-	-	-
A. maasii Gouda & W.Till*	FOD, RST	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
A. macrochlamys L.B.Sm.*	FOD	-	-	-
A. marauensis Leme*	FOD, RST	-	-	-
A. marginalis Leme & J.A.Siqueira*	FOD	-	CR	ANEXO II
A. mertensii (G.Meyer) Schult. & Schult.f.	FOD, FES, RST	-	-	-
A. miniata Beer	FOD, RST	-	-	-
A. mira Leme & H.Luther*	RST	-	-	-
A. mollis L.B.Sm.*	FOD, RST	-	-	-
A. mulfordii L.B.Sm.*	RST	-	-	-
A. multiflora L.B.Sm.*	FOD, FES, RST	-	-	-
A. muricata (Arruda) L.B.Sm.*	FOD, FES, RST	-	EN	ANEXO I
A. mutica L.B.Sm.*	FOD	-	VU	ANEXO II
A. nudicaulis (L.) Griseb.	FOD, FOM, FES, FCA, RST, AFL	-	-	-
A. organensis Wawra*	FOD, FOM, RST	-	-	-
A. orlandiana L.B.Sm.*	FOD	-	EN	ANEXO II
A. ornata Baker*	FOD, FES, RST	-	-	-
A. paradoxa (Leme) Leme*	FOD	-	-	-
A. patentissima (Mart. *ex* Schult. & Schult.f.) Baker*	FOD, FES, RST, MAN	-	-	-
A. pectinata Baker*	FOD, RST	-	-	-
A. pedicellata Leme & H.Luther*	FOD	-	-	-
A. perforata L.B.Sm.*	FOD	-	-	-
A. pernambucentris J.A.Siqueira & Leme*	FOD, FES	-	-	-
A. phanerophlebia Baker*	FOD, FES	-	-	-
A. pimenti-velosoi Reitz*	FOD, RST	-	-	-
A. pineliana (Brong. *ex* Planch.) Baker*	FOD, FES, RST	-	-	-
A. podantha L.B.Sm.*	FOD	-	-	-
A. prava E.Pereira*	FOD	-	-	-
A. pseudonudicaulis Leme*	FES	-	-	-
A. purpureorosea (Hook.) Wawra*	FOD	-	-	-
A. racinae L.B.Sm.*	FOD	-	-	-
A. ramosa Mart. *ex* Schult. & Schult.f.*	FOD, FES, RST	-	-	-
A. ramusculosa Leme*	RST	-	-	-
A. recurvata (Klotzsch) L.B.Sm.	FOD, FOM, AFL	-	-	-
A. roberto-seidelii E.Pereira*	FOD	-	-	-
A. rubrolilacina Leme*	FOD	-	-	-
A. saxicola L.B.Sm.*	FOD, RST	-	-	-
A. serragrandensis Leme & J.A.Siqueira*	FOD	-	-	-
A. sphaerocephala Baker*	FOD, RST	-	VU	ANEXO II
A. squarrosa Baker*	FES	-	-	-
A. sucreana Martinelli & C.Vieira*	RST	-	-	-
A. sulbahianensis Leme, Amorim & J.A.Siqueira*	FOD	-	-	-
A. tentaculifera Leme, Amorim & J.A.Siqueira*	FOD	-	-	-
A. tomentosa Mez*	FOD, FES, RST	-	-	-
A. triangularis L.B.Sm*	FOD	-	-	-
A. triticina Mez*	FOD, RST	-	-	-
A. turbinocalyx Mez*	FOD, RST	-	-	-
A. vanhoutteana (Van Houtte) Mez*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
A. victoriana L.B.Sm.*	FOD	-	-	-
A. viridostigma Leme & H.Luther*	FOD	-	-	-
A. warasii E.Pereira*	FOD	-	-	-
A. weberi (E.Pereira & Leme) Leme*	FOD, RST	-	-	-
A. weilbachii F.Didr.*	FOD	-	-	-
A. werdermannii Harms*	FES	-	CR	ANEXO I
A. winkleri Reitz*	FOD	-	VU	ANEXO I
A. wittmackiana (Regel) Mez*	FOD	-	-	-
Alcantarea – 21/23				
A. benzingii Leme*	AFL	-	CR	ANEXO II
A. brasiliana (L.B.Sm.) J.R.Grant*	AFL	-	-	-
A. burle-marxii (Leme) J.R.Grant*	AFL	-	-	-
A. distractila Leme & C.C.Paula	AFL	-	-	-
A. edmundoi (Leme) J.R.Grant*	AFL	-	-	-
A. extensa (L.B.Sm.) J.R.Grant*	AFL	-	-	-
A. farneyi (Martinelli & A.Costa) J.R.Grant*	AFL, FCA	-	VU	ANEXO II
A. geniculata (Wawra) J.R.Grant*	AFL, FCA	-	VU	ANEXO II
A. glaziouana (Leme) J.R.Grant*	AFL	-	VU	ANEXO II
A. heloisae J.R.Grant*	AFL	-	-	-
A. imperialis (Carriere) Harms*	AFL, FCA	-	EN	ANEXO II
A. lurida Leme	AFL	-	-	-
A. nahoumii (Leme) J.R.Grant	AFL	-	VU	ANEXO II
A. nevaresii (Leme) J.R.Grant*	AFL, FCA	-	VU	ANEXO II
A. odorata (Leme) J.R.Grant*	AFL	-	-	-
A. patriae Versieux & Wand.*	AFL	-	-	-
A. regina (Vell.) Harms*	AFL	-	-	-
A. roberto-kautskyi Leme*	AFL	-	-	-
A. tortuosa Versieux & Wand.*	AFL	-	-	-
A. turgida Versieux & Wand.	AFL	-	-	-
A. vinicolor (Pereira & Reitz) J.R.Grant*	AFL	-	-	-
Ananas – 3/7				
A. ananassoides (Baker) L.B.Sm.	FOD, FES	-	-	-
A. bracteatus (Lindl.) Schult. & Schult.f.	FOD, FES, FED, RST	-	-	-
A. fritzmuelleri Camargo*	FOD, RST	-	-	-
Araeococcus – 5/9				
A. chlorocarpus (Wawra) Leme & J.A.Siqueira*	FOD	-	-	-
A. montanus Leme*	FOD, FES	-	VU	ANEXO II
A. nigropurpureus Leme & J.A.Siqueira*	FOD	-	-	-
A. parviflorus (Mart.ex.Schult. & Schult.f.) Lindm.*	FOD, RST	-	VU	ANEXO II
A. sessiliflorus Leme & J.A.Siqueira*	FOD, FES	-	-	-
Billbergia – 34/63				
B. alfonsijoannis Reitz*	FOD, FOM, FES, AFL	-	-	-
B. amoena (Lodd.) Lindl.	FOD, FES, FED, FCA, RST	-	-	-
B. bradeana L.B.Sm.*	FOD, AFL	-	-	-
B. brasiliensis L.B.Sm.*	FOD, AFL	-	-	-
B. castelensis E.Pereira*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
B. chlorantha L.B.Sm.*	FOD	-	-	-
B. distachia (Vell.) Mez	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
B. elegans Mart. *ex* Schult. & Schult.f.	FES, FCA	-	-	-
B. euphemiae E.Morren	FOD, FES, RST	-	-	-
B. horrida Regel*	FOD, FES	-	-	-
B. iridifolia (Nees & Mart.) Lindl.	FOD, FES, RST	-	-	-
B. kautskyana E.Pereira*	FOD	-	-	-
B. laxiflora L.B.Sm.*	FOD	-	-	-
B. leptopoda L.B.Sm*	FOD, FES	-	-	-
B. lietzei E.Morren*	FOD	-	-	-
B. lymanii E.Pereira & Leme*	FOD, FES	-	-	-
B. macracantha E.Pereira*	FOD	-	-	-
B. macrocalyx Hook.*	FES	-	-	-
B. magnifica Mez	FOD	-	-	-
B. meyeri Mez	FES	-	-	-
B. minarum L.B.Sm.	FOD, FES	-	-	-
B. morelii Brongn.*	FOD	-	-	-
B. nana E.Pereira*	FOD	-	-	-
B. nutans H.H.Wendl. *ex* Regel	FOD, FOM	-	-	-
B. pohliana Mez*	FES	-	-	-
B. porteana Brongn. *ex* Beer	FES, FOD	-	-	-
B. pyramidalis (Sims) Lindl.	FOD, FES, RST	-	-	-
B. reichardtii Wawra	FES	-	-	-
B. sanderiana E.Morren*	FOD	-	-	-
B. saundersii Bull*	FOD, FES, RST	-	-	-
B. seidelii L.B.Sm. & Reitz*	FOD	-	-	-
B. tweedieana Baker*	FOD, FES, RST, AFL	-	-	-
B. vittata Brongn.	FOD, FES	-	-	-
B. zebrina (Herb.) Lindl.	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
Bromelia – 6/56				
B. antiacantha Bertol.	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
B. balansae Mez	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
B. binotii E.Morren *ex* Mez*	FOD	-	-	-
B. karatas L.	FOD, FES, FED	-	-	-
B. lagopus Mez	FOD	-	-	-
B. regnellii Mez	FES	-	-	-
*Canistropsis** – 11/11				
C. albiflora (L.B.Sm.) H.Luther & Leme*	FOD, RST	-	-	-
C. billbergioides (Schult. & Schult.f.) Leme*	FOD, RST	-	-	-
C. burchellii (Baker) Leme*	FOD	-	-	-
C. correia-araujoi (E.Pereira & Leme) Leme*	FOD	-	-	-
C. elata (E.Pereira & Leme) Leme*	FOD	-	CR	ANEXO II
C. exigua (E.Pereira & Leme) Leme*	FOD	-	-	-
C. marceloi (E.Pereira & Moutinho) Leme*	FOD	-	-	-
C. microps (E.Morren *ex* Mez) Leme*	FOD, RST	-	-	-
C. pulcherrima (E.Pereira) Leme*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
C. seidelii (L.B.Sm. & Reitz) Leme*	FOD	-	-	-
C. simulans (E.Pereira & Leme) Leme*	FOD	-	-	-
*Canistrum** – 14/14				
C. alagoanum Leme & J.A.Siqueira*	FOD	-	EN	ANEXO II
C. aurantiacum E.Morren*	FOD, FES, RST	-	EN	ANEXO II
C. auratum Leme*	FOD	-	-	-
C. camacaense Martinelli & Leme*	FOD	-	CR	ANEXO II
C. flavipetalum Wand. *	FES	-	-	-
C. fosterianum L.B.Sm. *	FOD, RST	-	CR	ANEXO I
C. guzmanioides Leme*	FOD	-	VU	ANEXO II
C. improcerum Leme & J.A.Siqueira*	FOD	-	-	-
C. lanigerum H.Luther & Leme*	RST	-	-	-
C. montanum Leme*	FOD	-	CR	ANEXO II
C. pickelii (A.Lima & L.B.Sm.) Leme & J.A.Siqueira*	FOD, FES, AFL	-	EN	ANEXO II
C. sandrae Leme*	FOD	-	-	-
C. seidelianum W.Weber*	FOD	-	-	-
C. triangulare L.B.Sm. & Reitz*	FOD	-	-	-
Catopsis – 2/18		-		
C. berteroniana (Schult. & Schult.f.) Mez	FOD, FES, RST, MAN	-	-	-
C. sessiliflora (Ruiz & Pav.) Mez	FOD, RST	-	-	-
Cryptanthus – 54/66				
C. acaulis (Lindl.) Beer*	FOD, RST, AFL	-	-	-
C. alagoanus Leme & J.A.Siqueira*	FOD	-	-	-
C. beuckeri E.Morren*	FOD, RST	-	-	-
C. bibarrensis Leme*	FED	-	-	-
C. bivittatus (Hook.) Regel	FOD	-	-	-
C. bromelioides Otto & A.Dietr.*	FOD, RST, AFL	-	-	-
C. burle-marxii Leme*	RST	-	VU	ANEXO I
C. capitatus Leme*	FOD	-	-	-
C. caracensis Leme & E.Gross*	FCA	-	VU	ANEXO II
C. caulescens I.Ramírez*	FOD	-	-	-
C. colnagoi Rauh & Leme	FES	-	-	-
C. coriaceus Leme*	FOD	-	-	-
C. correia-araujoi Leme*	FOD	-	-	-
C. delicatus Leme*	FES	-	-	-
C. dianae Leme*	FES	-	-	-
C. dorothyae Leme*	RST	-	-	-
C. exaltatus H.Luther*	FOD	-	-	-
C. felixii J.A.Siqueira & Leme*	FES	-	-	-
C. fernseeoides Leme*	FOD	-	-	-
C. fosterianus L.B.Sm.*	FES	-	EW	ANEXO I
C. giganteus Leme & A.P.Fontana*	FES	-	-	-
C. glazioui Mez*	FCA	-	VU	ANEXO II
C. grazielae H.Luther*	FOD	-	-	-
C. incrassatus L.B.Sm.*	FOD	-	-	-
C. latifolius Leme*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
C. leuzingerae Leme*	FOD	-	-	-
C. lutherianus I.Ramírez*	FOD	-	-	-
C. lyman-smithii Leme*	FOD	-	-	-
C. marginatus L.B.Sm.*	FOD	-	-	-
C. maritimus L.B.Sm.*	FOD	-	-	-
C. microglazioui I.Ramírez*	FOD	-	-	-
C. minarum L.B.Sm.*	?	-	-	-
C. odoratissimus Leme*	FOD	-	-	-
C. osiris W.Weber	?	-	-	-
C. pickelii L.B.Sm.*	FOD, RST	-	-	-
C. praetextus E.Morren & Baker*	FOD	-	-	-
C. pseudoglazioui Leme*	FOD	-	-	-
C. pseudopetiolatus Philcox*	RST	-	-	-
C. pseudoscaposus L.B.Sm.*	FOD	-	-	-
C. reisii Leme*	FES	-	-	-
C. reptans Leme & J.A.Siqueira*	FOD	-	-	-
C. roberto-kautskyi Leme	FOD	-	-	-
C. ruthae Philcox	FOD, RST	-	-	-
C. sanctaluciae Leme & L.Kollmann	FOD	-	-	-
C. scaposus E.Pereira	FOD	-	-	-
C. schwackeanus Mez	FCA	-	-	-
C. seidelianus W.Weber	?	-	-	-
C. sergipensis I.Ramírez	RST	-	-	-
C. sinuosus L.B.Sm.	RST, AFL	-	-	-
C. teretifolius Leme	RST	-	-	-
C. ubairensis I.Ramírez	FOD	-	-	-
C. vexatus Leme	FOD	-	-	-
C. whitmanii Leme	FOD	-	-	-
C. zonatus (Visiani) Beer	FOD, FES	-	CR	ANEXO II
Dyckia – 35/130				
D. agudensis Irgang & Sobral*	AFL	-	VU	ANEXO I
D. argentea Mez	FCA, AFL	-	-	-
D. bracteata (Wittm.) Mez	FCA, AFL	-	-	-
D. brevifolia Baker*	AFL	-	-	-
D. cabrerae L.B.Sm. & Reitz*	FCA, AFL	-	EN	ANEXO I
D. choristaminea Mez	AFL	-	EN	ANEXO II
D. cinerea Mez*	FCA, AFL	-	-	-
D. commixta Hassl.	FCA	-	-	-
D. consimilis Mez	FCA	-	-	-
D. crocea L.B.Sm.	FCA	-	-	-
D. delicata Larocca & Sobral*	FCA	-	VU	ANEXO II
D. densiflora Schult. & Schult.f.	FCA	-	-	-
D. distachya Hassl.	AFL	-	CR	ANEXO I
D. dusenii L.B.Sm.	AFL	-	-	-
D. encholirioides (Gaudich.) Mez*	RST, AFL	-	-	-
D. fosteriana L.B.Sm.	FCA, AFL	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
D. frigida Hook.f.	FCA	-	-	-
D. hatschbachii L.B.Sm.*	RST	-	VU	ANEXO I
D. ibiramensis Reitz*	AFL	-	CR	ANEXO I
D. irmgardiae L.B.Sm.	FCA	-	VU	ANEXO II
D. leptostachya Baker	FCA	-	-	-
D. maritima Baker*	RST, AFL	-	-	-
D. martinellii B.R.Silva & Forzza*	AFL	-	-	-
D. microcalyx Baker	AFL	-	-	-
D. minarum Mez	FCA, AFL	-	-	-
D. monticola L.B.Sm. & Reitz*	FCA, AFL	-	-	-
D. pernambucana L.B.Sm.	FCA, AFL	-	-	-
D. pseudococcinea L.B.Sm.*	RST	-	CR	ANEXO II
D. reitzii L.B.Sm.*	FCA, AFL	-	-	-
D. remotiflora Otto & A.Dietr.	FCA, AFL	-	-	-
D. saxatilis Mez	FCA	-	-	-
D. schwackeana Mez	FCA	-	-	-
D. selloa (K.Koch) Baker*	FCA	-	-	-
D. trichostachya Baker	AFL	-	-	-
D. tuberosa (Vell.) Beer	FCA, AFL	-	-	-
*Edmundoa** – 3/3				
E. ambigua (Wand. & Leme) Leme*	FOD	-	-	-
E. lindenii (Regel) Leme*	FOD, FES, RST	-	-	-
E. perplexa (L.B.Sm.) Leme*	FOD	-	-	-
*Eduandrea** – 1/1				
E. selloana (Baker) Leme *et al.**	FES	-	-	-
Encholirium – 2/23				
E. gracile L.B.Sm.*	AFL	-	EN	ANEXO II
E. horridum L.B.Sm.*	AFL	-	EN	ANEXO II
*Fernseea** – 2/2				
F. bocainensis E.Pereira & Moutinho*	FCA	-	VU	ANEXO II
F. itatiaiae (Wawra) Baker*	FCA	-	EN	ANEXO I
Guzmania – 3/200				
G. lingulata (L.) Mez	FOD, RST	-	-	-
G. monostachia (L.) Rusby *ex* Mez	FOD, FES	-	EN	ANEXO I
G. sanguinea (André) André *ex* Mez	FOD	-	EN	ANEXO II
Hohenbergia – 24/56				
H. augusta (Vell.) Morren*	FOD, RST	-	-	-
H. belemii L.B.Sm. & R.W.Read*	FOD, RST	-	VU	ANEXO II
H. blanchetii (Baker) E.Morren *ex* Mez*	FOD, RST	-	-	-
H. brachycephala L.B.Sm.*	FOD	-	-	-
H. burle-marxii Leme & W.Till*	?	-	-	-
H. castellanosii L.B.Sm & R.W.Read*	RST	-	CR	ANEXO I
H. catingae Ule	RST, FES ?, AFL?	-	-	-
H. conquistensis Leme	?	-	-	-
H. correia-araujoi E.Pereira & Moutinho*	FOD, FED ?	-	CR	ANEXO I
H. flava Leme & C.C.Paula*	FES, FED	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
H. hatschbachii Leme*	RST	-	-	-
H. horrida Harms*	FES, FCA, AFL?	-	-	-
H. itamarajuensis Leme & Baracho*	FOD	-	-	-
H. lanata E.Pereira & Moutinho*	FED ?	-	-	-
H. lemei H.Luther & K.Norton*	FOD	-	-	-
H. littoralis L.B.Sm.*	RST	-	CR	ANEXO I
H. minor L.B.Sm.*	FOD, FED ?	-	-	-
H. pabstii L.B.Sm. & R.W.Read*	FOD, FES, FED	-	-	-
H. ramageana Mez*	FOD, FES ?	-	-	-
H. ridleyi (Baker) Mez*	FOD, FES, RST	-	-	-
H. rosea L.B.Sm. & R.W.Read	FES	-	-	-
H. salzmannii (Baker) E.Morren *ex* Mez*	FOD, RST	-	-	-
H. stellata Schult. & Schult.f.	FOD, FES, FED, RST	-	-	-
H. utriculosa Ule	AFL	-	-	-
*Lymania** – 9/9				
L. alvimii (L.B.Sm. & R.W.Read) R.W.Read*	FOD	-	EN	ANEXO II
L. azurea Leme*	FOD	-	EN	ANEXO II
L. brachycaulis (E.Morren *ex* Baker) L.F.Sousa*	FOD	-	EN	ANEXO II
L. corallina (Brong. *ex* Beer) R.W.Read*	FOD, RST	-	VU	ANEXO II
L. globosa Leme*	FOD, RST	-	VU	ANEXO II
L. languida Leme*	FOD	-	-	-
L. marantoides (L.B.Sm.) R.W.Read*	FOD	-	-	-
L. smithii R.W.Read*	FOD, RST	-	-	-
L. spiculata Leme & Forzza*	FOD	-	VU	ANEXO II
Neoregelia – 97/112				
N. abendrothae L.B.Sm.*	FOD	-	-	-
N. ampullacea (E.Morren) L.B.Sm.*	FOD	-	-	-
N. angustibracteolata E.Pereira & Leme*	FOD	-	-	-
N. angustifolia E.Pereira*	FOD	-	-	-
N. atroviridifolia W.Weber	?	-	-	-
N. azevedoi Leme*	FOD	-	-	-
N. binotii (Antoine) L.B.Sm.*	FOD	-	EW	ANEXO I
N. bragarum (E.Pereira & L.B.Sm.) Leme*	FOD, FCA	-	-	-
N. brevifolia L.B.Sm. & Reitz*	FOD	-	-	-
N. brigadeirensis C.C.Paula & leme*	FES	-	-	-
N. brownii Leme*	FES	-	VU	ANEXO II
N. burle-marxii R.W.Read*	?	-	VU	ANEXO II
N. camorimiana E.Pereira & I.A.Penna*	FOD	-	-	-
N. capixaba E.Pereira & Leme*	FOD	-	-	-
N. carcharodon (Baker) L.B.Sm.*	FOD	-	-	-
N. carinata Leme*	FOD	-	-	-
N. carolinae (Beer) L.B.Sm.*	FOD, RST	-	-	-
N. chlorosticta (Baker) L.B.Sm.*	FOD, FES	-	-	-
N. coimbrae E.Pereira & Leme*	FOD	-	-	-
N. compacta (Mez) L.B.Sm.*	FOD, RST	-	EN	ANEXO II
N. concentrica (Vell.) L.B.Sm.*	FOD, RST	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
N. coriacea (Antoine) L.B.Sm.*	FOD	-	-	-
N. correia-araujoi E.Pereira & I.A.Penna*	?	-	-	-
N. crispata Leme*	FOD	-	-	-
N. cruenta (R.Graham) L.B.Sm.*	RST, AFL, MAN	-	VU	ANEXO II
N. cyanea (Beer) L.B.Sm.*	FES	-	-	-
N. diversifolia E.Pereira*	FOD	-	-	-
N. doeringiana L.B.Sm.*	FOD	-	-	-
N. dungsiana E.Pereira*	FOD	-	-	-
N. eltoniana W.Weber*	RST	-	-	-
N. farinosa (Ule) L.B.Sm.*	FOD, FES	-	-	-
N. fluminensis L.B.Sm.*	FOD	-	-	-
N. fosteriana L.B.Sm.*	FOD	-	-	-
N. gavionensis Martinelli & Leme*	FOD	-	-	-
N. gigas Leme & L.Kollmann*	FOD	-	-	-
N. guttata Leme*	FOD	-	-	-
N. hoehneana L.B.Sm.*	FOD	-	VU	ANEXO II
N. ibitipocensis (Leme) Leme*	FOD	-	-	-
N. indecora (Mez) L.B.Sm.*	FOD, RST	-	-	-
N. inexspectata Leme*	FOD	-	-	-
N. johannis (Carriere) L.B.Sm.*	FOD, RST	-	-	-
N. kautskyi E.Pereira*	FOD	-	-	-
N. kerryi Leme*	FOD	-	-	-
N. kuhlmannii L.B.Sm.*	FOD	-	-	-
N. lactea H.Luther & Leme*	FOD	-	-	-
N. laevis (Mez) L.B.Sm.*	FOD, RST	-	-	-
N. leprosa L.B.Sm.*	FOD	-	-	-
N. leucophloea (Baker) L.B.Sm.*	FOD	-	-	-
N. lilliputiana E.Pereira*	FOD	-	-	-
N. lillyae W.Weber	?	-	-	-
N. longipedicellata Leme*	FCA	-	-	-
N. longisepala E.Pereira & I.A.Penna*	FOD, RST	-	-	-
N. lymaniana R.Braga & D.Sucre*	FOD, FES	-	-	-
N. macahensis (Ule) L.B.Sm.*	FOD	-	-	-
N. macrosepala L.B.Sm.*	FOD	-	-	-
N. maculata L.B.Sm.*	FOD	-	-	-
N. macwilliamsii L.B.Sm.*	RST	-	-	-
N. magdalenae L.B.Sm. & Reitz*	FOD, FCA	-	-	-
N. marmorata (Baker) L.B.Sm.*	FOD, RST, AFL	-	-	-
N. martinellii W.Weber*	FOD	-	-	-
N. melanodonta L.B.Sm.*	?	-	-	-
N. menescalii Leme*	FOD	-	-	-
N. nevaresii Leme & H.Luther*	FOD	-	-	-
N. nivea Leme	?	-	-	-
N. odorata Leme*	FOD	-	-	-
N. olens (Hook.f.) L.B.Sm.	?	-	-	-
N. oligantha L.B.Sm.*	FES, FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
N. pascoaliana L.B.Sm.*	RST, MAN	-	EN	ANEXO II
N. pauciflora L.B.Sm.*	FOD	-	-	-
N. paulistana E.Pereira*	FOD	-	-	-
N. pernambucana Leme & J.A.Siqueira*	FOD	-	CR	ANEXO II
N. petropolitana Leme*	FOD	-	-	-
N. pineliana (Lem.) L.B.Sm.	?	-	-	-
N. pontualii Leme*	FOD	-	-	-
N. princeps (Baker) L.B.Sm.	FOD	-	-	-
N. punctatissima (Ruschi) Ruschi*	FOD	-	-	-
N. richteri W.Weber	?	-	-	-
N. roethii W.Weber*	?	-	-	-
N. rubrifolia Ruschi*	FOD	-	-	-
N. rubrovittata Leme*	FOD	-	-	-
N. ruschii Leme & B.R.Silva*	FOD	-	-	-
N. sanguinea Leme*	FOD	-	-	-
N. sapiatibensis E.Pereira & I.A.Perna*	FOD, RST	-	-	-
N. sarmentosa (Regel) L.B.Sm.*	FOD, FES, RST, AFL	-	-	-
N. schubertii Roth	?	-	-	-
N. seideliana L.B.Sm. & Reitz*	FOD	-	-	-
N. silvomontana Leme & J.A.Siqueira*	FOD	-	-	-
N. simulans L.B.Sm.*	FOD	-	-	-
N. smithii W.Weber	?	-	-	-
N. spectabilis (T.Moore) L.B.Sm.*	FOD	-	-	-
N. tenebrosa Leme*	FOD, FCA	-	-	-
N. tigrina (Ruschi) Ruschi*	FOD	-	-	-
N. tristis (Beer) L.B.Sm.*	FOD	-	-	-
N. uleana L.B.Sm.	?	-	-	-
N. wilsoniana M.B.Foster*	FOD, FES, RST	-	-	-
N. zaslawskyi E.Pereira & Leme*	FOD	-	-	-
N. zonata L.B.Sm.*	FOD	-	-	-
*Nidularium** – 45/45				
N. albiflorum (L.B.Sm.) Leme*	FOD	-	-	-
N. altimontanum Leme*	FOD	-	-	-
N. alvimii W.Weber*	?	-	-	-
N. amazonicum (Baker) Linden & E.Morren *ex* Lindm. *	FOD, FOM	-	-	-
N. amorimii Leme*	FOD	-	-	-
N. angustibracteatum Leme*	FOD	-	-	-
N. angustifolium Ule*	FOD	-	-	-
N. antoineanum Wawra*	FOD	-	-	-
N. apiculatum L.B.Sm. *	FOD	-	-	-
N. atalaiaense E.Pereira & Leme*	FOD, RST, AFL	-	VU	ANEXO II
N. azureum (L.B.Sm.) Leme*	FES	-	CR	ANEXO II
N. bicolor (E.Pereira) Leme*	FOD, FES	-	-	-
N. bocainense Leme*	FOD	-	VU	ANEXO I
N. campo-alegrense Leme*	FOD, FOM	-	-	-
N. campos-portoi (L.B.Sm.) Wand. & B.A.Moreira*	FOD, RST, MAN	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
N. cariacicaense (W.Weber) Leme*	FOD	-	-	-
N. catarinense Leme*	FOM	-	-	-
N. corallinum (Leme) Leme*	FOD	-	VU	ANEXO II
N. espiritosantense Leme*	FOD	-	-	-
N. ferdinando-coburgii Wawra*	FOD	-	-	-
N. ferrugineum Leme*	FOD	-	-	-
N. fradense Leme*	FOD	-	-	-
N. fulgens Lem. *	FOD	-	-	-
N. innocentii Lem.*	FOD, RST	-	-	-
N. itatiaiae L.B.Sm. *	FOD	-	VU	ANEXO II
N. jonesianum Leme*	FOD	-	-	-
N. kautskyanum Leme*	FOD	-	VU	ANEXO II
N. krisgreeniae Leme*	FOD	-	-	-
N. linehamii Leme*	FOM	-	-	-
N. longiflorum Ule*	FOD, FES	-	-	-
N. mangaratibense Leme*	FOD	-	CR	ANEXO II
N. marigoi Leme*	FOD, FES	-	-	-
N. meeanum Leme *et al.* *	FOD	-	-	-
N. minutum Mez*	FOD	-	-	-
N. organense Lem*	FOD	-	VU	ANEXO II
N. picinguabense Leme*	FOD	-	-	-
N. procerum Lindm. *	FOD, RST, MAN	-	-	-
N. purpureum Beer*	FOD, FES	-	-	-
N. rosulatum Ule*	RST	-	EN	ANEXO II
N. rubens Mez*	FOD	-	-	-
N. rutilans E.Morren*	FOD	-	-	-
N. scheremetiewii Regel*	FOD	-	-	-
N. serratum Leme*	FOD	-	-	-
N. utriculosum Ule*	FOD, RST	-	EW	ANEXO I
N. viridipetalum Leme*	FOD	-	-	-
Orthophytum – 32/51				
O. alvimii W.Weber	?	-	-	-
O. atalaiense J.A.Siqueira & Leme*	AFL	-	-	-
O. benzingii Leme & H.Luther*	AFL	-	-	-
O. boudetianum Leme & L.Kollmann	AFL	-	-	-
O. braunii Leme*	AFL	-	-	-
O. compactum L.B.Sm.*	AFL	-	-	-
O. disjunctum L.B.Sm.*	AFL	-	-	-
O. duartei L.B.Sm.*	AFL	-	EN	ANEXO II
O. estevesii (Rauh) Leme*	AFL	-	-	-
O. falconii Leme*	FES	-	-	-
O. foliosum L.B.Sm.*	AFL	-	-	-
O. fosterianum L.B.Sm.*	AFL	-	VU	ANEXO II
O. glabrum (Mez) Mez	AFL	-	-	-
O. grossiorum Leme & C.C.Paula*	AFL	-	EN	ANEXO II
O. gurkenii Hutchison*	?	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
O. horridum Leme*	AFL	-	-	-
O. itambense Versieux & Leme*	FCA	-	-	-
O. jabrense G.S.Baracho & J.A.Siqueira*	AFL	-	-	-
O. lanuginosum Leme & C.C.Paula*	AFL	-	-	-
O. leprosum (Mez) Mez*	FES, FED,AFL	-	-	-
O. lucidum Leme & H.Luther	AFL	-	-	-
O. magalhaesii L.B.Sm.*	AFL	-	-	-
O. maracasense L.B.Sm.*	AFL	-	-	-
O. pseudovagans Leme & L.Kollmann	FES	-	-	-
O. rubrum L.B.Sm.*	AFL	-	-	-
O. sanctum L.B.Sm.*	AFL	-	-	-
O. saxicolum Ule	AFL	-	-	-
O. striatifolium Leme & L.Kollmann	AFL	-	-	-
O. sucrei H.Luther	AFL	-	-	-
O. triunfense J.A.Siqueira & Leme*	AFL	-	-	-
O. vagans M.B.Foster*	?	-	-	-
O. zanonii Leme*	AFL	-	-	-
Pitcairnia – 16/350				
P. albiflos Herb.*	AFL	-	CR	ANEXO II
P. azouryi Martinelli & Forzza*	AFL	-	-	-
P. burle-marxii R.Braga & Sucre*	AFL	-	-	-
P. carinata Mez*	AFL	-	-	-
P. corcovadensis Wawra*	FOD	-	-	-
P. curvidens L.B.Sm. & R.W.Read	FCA	-	-	-
P. decidua L.B.Sm.*	FCA, AFL	-	-	-
P. encholirioides L.B.Sm.*	AFL	-	CR	ANEXO II
P. flammea Lindl.	FOD, FOM, FES, FCA, AFL	-	-	-
P. glaziovii Baker*	FCA, AFL	-	CR	ANEXO II
P. insularis Tatagiba & R.J.V.Alves*	FOD	-	-	-
P. lanuginosa Ruiz & Pav.	FCA	-	-	-
P. limae L.B.Sm.*	AFL	-	CR	ANEXO II
P. nortefluminensis Leme*	AFL	-	-	-
P. staminea Lodd.*	AFL	-	-	-
P. wendtiae Tatagiba & B.R.Silva*	FOD	-	-	-
*Portea** – 8/8				
P. alatisepala Philcox*	FOD, RST	-	VU	ANEXO II
P. filifera L.B.Sm. *	FOD	-	-	-
P. fosteriana L.B.Sm. *	FOD	-	-	-
P. grandiflora Philcox*	FES, RST	-	VU	ANEXO I
P. kermesina K.Koch*	RST	-	CR	ANEXO I
P. nana Leme & H.Luther*	FOD	-	CR	ANEXO II
P. petropolitana (Wawra) Mez*	FOD, FES, RST	-	-	-
P. silveirae Mez*	FOD, FES, RST	-	-	-
Pseudananas – 1/1				
P. sagenarius (Arruda) Camargo	FOD, FES, FED, RST	-	-	-
*Quesnelia** – 19/19				
Q. alvimii Leme*	FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Q. arvensis (Vell.) Mez*	FOD, RST, MAN	-	-	-
Q. augusto-coburgii Wawra*	FOD	-	-	-
Q. clavata Amorim & Leme*	FOD	-	-	-
Q. dubia Leme*	FOD	-	-	-
Q. edmundoi L.B.Sm. *	FOD	-	-	-
Q. humilis Mez*	FOD	-	VU	ANEXO II
Q. imbricata L.B.Sm. *	FCA, AFL, FOD	-	-	-
Q. indecora Mez*	FES	-	-	-
Q. kautsky C.Vieira*	FOD, FES	-	-	-
Q. koltesii Amorim & Leme*	FOD	-	-	-
Q. lateralis Wawra*	FOD	-	-	-
Q. liboniana (De Jongle) Mez*	FOD, FES	-	-	-
Q. marmorata (Lem.) R.W.Read*	FOD, RST, MAN	-	-	-
Q. quesneliana (Brongn.) L.B.Sm. *	FOD, FES, RST, MAN	-	-	-
Q. seideliana L.B.Sm. *	FOD	-	VU	ANEXO II
Q. strobilispica Wawra*	FOD	-	-	-
Q. testudo Lindm. *	FOD, RST	-	-	-
Q. violacea Wand. & S.L.Proença*	FOD	-	-	-
Racinaea – 3/61				
R. aerisincola (Mez) M.A.Spencer & L.B.Sm.*	FOD, FES	-	-	-
R. domingos-martinsis (Rauh) J.R.Grant*	FOD	-	-	-
R. spiculosa (Griseb.) M.A.Spencer & L.B.Sm.	FOD, FES, RST	-	-	-
Ronnbergia – 4/14				
R. brasiliensis E.Pereira & I.A.Penna*	FOD	-	-	-
R. carvalhoi Martinelli & Leme*	FOD	-	-	-
R. neoregelioides Leme*	FOD	-	-	-
R. silvana Leme*	FOD	-	-	-
Tillandsia – 53/560				
T. aeranthos (Loisel.) L.B.Sm.	FOD, FOM, RST	-	-	-
T. afonsoana T.Strehl	FES	-	VU	ANEXO I
T. araujei Mez*	AFL	-	-	-
T. arequitae (André) André *ex* Mez	?	-	-	-
T. bergeri Mez	FES	-	-	-
T. brachyphylla Baker*	AFL	-	CR	ANEXO II
T. bulbosa Hook.f.	FOD, FES, RST	-	-	-
T. carminea W.Till*	AFL	-	-	-
T. catimbauensis Leme *et al.**	FES	-	-	-
T. chapeuensis Rauh	FES, AFL	-	-	-
T. crocata (E.Morren) Baker	AFL	-	-	-
T. didisticha (E.Morren) Baker	FES, AFL	-	-	-
T. dura Baker*	FOD, AFL	-	-	-
T. eltoniana E.Pereira*	FOD	-	-	-
T. gardneri Lindl.	FOD, FOM, FES, FED, RST, AFL, MAN	-	-	-
T. geminiflora Brongn.	FOD, FOM, FES, FED, RST, AFL, MAN	-	-	-
T. globosa Wawra	FOD, FES, RST, MAN	-	-	-
T. grazielae D.Sucre & R.Braga*	AFL	-	CR	ANEXO II

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
T. heubergeri Ehlers*	FOD, AFL	-	VU	ANEXO II
T. itaubensis T.Strehl	FES	-	VU	ANEXO II
T. jonesii T.Strehl	FES	-	-	-
T. juncea (Ruiz & Pav.) Poir.	FOD, FES, AFL	-	-	-
T. kautskyi E.Pereira*	FOD	-	VU	ANEXO II
T. kegeliana Mez	FOD, FES	-	-	-
T. leonamiana E.Pereira	AFL	-	-	-
T. linearis Vell.*	FOD, FOM	-	-	-
T. loliacea Mart. *ex* Schult. & Schult.f.	FOD, FES, FED, AFL	-	-	-
T. lorentziana Griseb.	AFL	-	-	-
T. mallemontii Glaz. *ex* Mez	FOD, FOM, FES, FED, RST, AFL, MAN		-	- -
T. montana Reitz*	FOD	-	-	-
T. neglecta E.Pereira*	FOD, RST	-	VU	ANEXO II
T. nuptialis R.Braga & D.Sucre*	AFL	-	-	-
T. organensis Ehlers*	AFL	-	-	-
T. paraensis Mez	FOD, RST	-	-	-
T. pohliana Mez	FES, FED	-	-	-
T. polystachia (L.) L.	FOD, FES, FED, RST, AFL	-	-	-
T. pruinosa Sw.*	FOD, RST	-	-	-
T. reclinata E.Pereira & Martinelli*	AFL	-	VU	ANEXO II
T. recurvata (L.) L.	FOD, FOM, FES, FED, RST, AFL	-	-	-
T. recurvifolia Hook.*	AFL	-	-	-
T. rohdenardinii T.Strehl	FES	-	-	-
T. roseiflora Ehlers & W.Weber*	FOD	-	-	-
T. segregata E.Pereira*	FOD	-	-	-
T. seideliana E.Pereira*	FOD	-	-	-
T. sprengeliana Klotzsch *ex* Mez*	FOD, RST	-	-	-
T. streptocarpa Baker	AFL	-	-	-
T. stricta Sol.	FOD, FOM, FES, FED, RST, AFL, MAN		-	- -
T. sucrei E.Pereira*	AFL	-	CR	ANEXO II
T. tenuifolia L.	FOD, FOM, FES, FED, AFL, RST	-	-	-
T. toropiensis Rauh	?	-	-	-
T. tricholepis Baker	FOD, FOM, FES, FED, RST, AFL	-	-	-
T. usneoides (L.) L.	FOD, FOM, FES, FED, RST, MAN		-	- -
T. xiphioides Ker-Gawler	AFL	-	-	-
Vriesea – 165/250				
V. agostiniana E.Pereira*	FOD	-	-	-
V. altimontana E.Pereira & Martinelli*	FCA, AFL	-	CR	ANEXO II
V. altodaserrae L.B.Sm.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
V. altomacaensis A.Costa*	FOD	-	VU	ANEXO II
V. amadoi Leme*	AFL	-	-	-
V. amethystina E.Morren*	FOD,	-	VU	ANEXO II
V. appariciana E.Pereira & Reitz*	AFL	-	-	-
V. arachnoidea A.Costa*	FOD	-	VU	ANEXO II
V. atra Mez*	FOD, AFL, FCA	-	-	-
V. atrococcinea Rauh*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
V. atropurpurea Silveira	FCA	-	VU	ANEXO II
V. barbosae J.A.Siqueira & Leme*	FOD	-	-	-
V. barilletii E.Morren	?	-	-	-
V. belloi Leme*	AFL	-	-	-
V. biguassuensis Reitz*	FOD, FOM	-	-	-
V. billbergioides E.Morren *ex* Mez*	FOD, FES	-	-	-
V. bituminosa Wawra*	FOD, FES, FCA, AFL	-	VU	ANEXO II
V. blackburniana Leme*	FOD	-	-	-
V. bleherae Roth & W.Weber*	FOD	-	CR	ANEXO II
V. botafogensis Mez*	AFL	-	CR	ANEXO II
V. brassicoides (Baker) Mez*	AFL	-	CR	ANEXO II
V. breviscapa (E.Pereira & I.A.Penna) Leme*	FOD	-	-	-
V. brusquensis Reitz*	FOD, RST	-	-	-
V. cacuminis L.B.Sm.*	FCA	-	VU	ANEXO II
V. calimaniana Leme & W.Till*	FOD	-	-	-
V. capixabae Leme*	FOD	-	-	-
V. carinata Wawra*	FOD, FES, RST	-	-	-
V. cearensis L.B.Sm.*	FES	-	CR	ANEXO I
V. clausseniana (Baker) Mez*	FCA	-	-	-
V. colnagoi E.Pereira & I.A.Penna*	FOD	-	-	-
V. corcovadensis (Britten) Mez*	FOD, RST	-	-	-
V. correia-araujoi E.Pereira & I.A.Penna*	FOD	-	-	-
V. costae B.R.Silva & Leme*	AFL	-	CR	ANEXO II
V. crassa Mez	FCA,	-	-	-
V. croceana Leme & G.K.Brown*	AFL	-	-	-
V. debilis Leme*	FOD	-	-	-
V. declinata Leme*	FOD, FOM	-	-	-
V. delicatula L.B.Sm.*	FOD	-	EN	ANEXO II
V. dictyographa Leme*	FOD	-	-	-
V. drepanocarpa (Baker) Mez*	FOD	-	-	-
V. duvaliana E.Morren*	FOD, RST	-	VU	ANEXO II
V. eltoniana E.Pereira*	FOD	-	EN	ANEXO II
V. ensiformis (Vell.) Beer*	FOD, FES, RST	-	-	-
V. erythrodactylon E.Morren*	FOD, RST	-	-	-
V. fenestralis Linden & André*	FOD	-	-	-
V. fidelensis Leme*	FOD	-	-	-
V. flammea L.B.Sm.*	FOD, RST, AFL	-	-	-
V. flava A.Costa *et al.**	FOD	-	-	-
V. fluminensis E.Pereira*	FOD	-	-	-
V. fontellana Leme & G.K.Brown*	AFL	-	-	-
V. fontourae B.R.Silva*	FOD	-	-	-
V. fosteriana L.B.Sm.*	FOD, AFL	-	CR	ANEXO II
V. fradensis A.Costa*	FOD	-	-	-
V. freicanecana J.A.Siqueira & Leme*	AFL	-	-	-
V. friburgensis Mez	FOD, FOM, FES, FCA, RST	-	-	-
V. funebris L.B.Sm.*	AFL	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
V. garlippiana Leme*	FOD	-	-	-
V. gastiniana Leme & G.K.Brown*	AFL	-	-	-
V. gigantea Gaudich.*	FOD, FOM, FES, FED, RST,	-	-	-
V. goniorachis (Baker) Mez*	AFL	-	CR	ANEXO II
V. gracilior (L.B.Sm.) Leme*	FOD	-	-	-
V. gradata (Baker) Mez*	FOD, FES	-	-	-
V. grandiflora Leme*	FOD	-	-	-
V. guttata Linden & André*	FOD, FES, RST	-	-	-
V. harrylutheri Leme & G.K.Brown*	AFL	-	-	-
V. heterostachys (Baker) L.B.Sm.*	FOD, FES	-	-	-
V. hieroglyphica (Carriere) E.Morren*	FOD	-	CR	ANEXO II
V. hoehneana L.B.Sm.*	FOD, FOM, FES, FCA	-	-	-
V. hydrophora Ule*	FOD	-	-	-
V. incurvata Gaudich.*	FOD, RST	-	-	-
V. inflata (Wawra) Wawra*	FOD	-	-	-
V. interrogatoria L.B.Sm.*	FOD	-	-	-
V. itatiaiae Wawra*	FCA, FOD	-	-	-
V. jonesiana Leme*	FOD	-	-	-
V. jonghei (K.Koch) E.Morren	FOD, RST	-	-	-
V. joyae E.Pereira & I.A.Penna*	FOD	-	-	-
V. kautskyana E.Pereira & I.A.Penna*	FOD	-	-	-
V. lancifolia (Baker) L.B.Sm.*	AFL	-	-	-
V. languida L.B.Sm.*	FOD	-	-	-
V. leptantha Harms*	FOD	-	VU	ANEXO II
V. lidicensis Reitz*	FOD	-	-	-
V. limae L.B.Sm.*	AFL	-	-	-
V. linharesiae Leme & J.A.Siqueira*	FES, FED	-	-	-
V. longicaulis (Baker) Mez*	FOD, FES	-	-	-
V. longiscapa Ule*	FOD, RST	-	-	-
V. longistaminea C.C.Paula & leme*	FCA	-	CR	ANEXO II
V. lubbersii (Baker) E.Morren*	FOD, FES	-	-	-
V. menescalii E.Pereira & Leme*	FOD	-	-	-
V. michaelii W.Weber	?	-	-	-
V. minarum L.B.Sm.	FCA	-	VU	ANEXO II
V. minor (L.B.Sm.) Leme	FCA	-	-	-
V. minuta Leme*	FOD	-	-	-
V. modesta Mez*	FOD	-	-	-
V. mollis Leme*	FOD	-	-	-
V. monacorum L.B.Sm.	FCA	-	-	-
V. morrenii Wawra*	FOD	-	-	-
V. muelleri Mez*	FOD, RST	-	-	-
V. neoglutinosa Mez*	RST, AFL	-	-	-
V. noblickii Martinelli & Leme*	FOD, FED	-	-	-
V. oleosa Leme	FOD	-	-	-
V. pabstii McWilliams & L.B.Sm.*	FOD	-	-	-
V. paradoxa Mez	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
V. paraibica Wawra*	FOD	-	-	-
V. paratiensis E.Pereira*	FOD	-	-	-
V. pardalina Mez	FOD, FCA	-	-	-
V. parviflora L.B.Sm.*	FOD	-	-	-
V. parvula Rauh	?	-	-	-
V. pastuchoffiana Glaz. *ex* Mez*	FOD	-	CR	ANEXO II
V. pauciflora Mez*	FOD, FES	-	-	-
V. pauperrima E.Pereira*	FOD, RST, FES	-	-	-
V. penduliflora L.B.Sm.*	FOD, FCA	-	EN	ANEXO II
V. pereirae L.B.Sm.*	FOD	-	-	-
V. philippocoburgii Wawra*	FOD, FOM, RST, FCA	-	-	-
V. pinottii Reitz*	FOD, RST	-	-	-
V. platynema Gaudich.	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
V. platzmannii E.Morren*	FOD, RST	-	-	-
V. plurifolia Leme*	AFL	-	-	-
V. poenulata (Baker) E.Morren *ex* Mez*	FOD	-	-	-
V. procera (Mart. *ex* Schult. & Schult.f.) Wittm.	FOD, FES, FED, RST, AFL, MAN-		-	-
V. pseudoatra Leme*	AFL	-	-	-
V. psittacina (Hook.) Lindl.	FOD, FES, RST	-	VU	ANEXO II
V. punctulata E.Pereira & I.A.Penna*	FOD	-	-	-
V. racinae L.B.Sm.*	FOD	-	EN	ANEXO II
V. rafaelii Leme*	FES	-	-	-
V. rastrensis Leme*	FOD, FCA	-	-	-
V. rectifolia Rauh*	FES	-	-	-
V. recurvata Gaudich.*	FOD	-	VU	ANEXO II
V. regnellii Mez*	FOD, FES	-	-	-
V. reitzii Leme & A.Costa*	FOM	-	-	-
V. repandostachys Leme*	FOD	-	-	-
V. revoluta B.R.Silva*	FOD	-	-	-
V. rhodostachys L.B.Sm.*	FOD	-	-	-
V. roberto-seidelii W.Weber*	FOD	-	-	-
V. rodigasiana E.Morren*	FOD, RST, MAN	-	-	-
V. roethii W.Weber*	FOD	-	-	-
V. rubyae E.Pereira*	FOD	-	VU	ANEXO II
V. ruschii L.B.Sm.*	FOD, FES	-	-	-
V. saundersii (Carriere) E.Morren *ex* Mez*	AFL	-	CR	ANEXO II
V. saxicola L.B.Sm.	FCA	-	-	-
V. sazimae Leme*	FOD	-	-	-
V. scalaris E.Morren	FOD, FES	-	-	-
V. sceptrum Mez	FOD, FES	-	-	-
V. schunkii Leme*	FOD	-	-	-
V. schwackeana Mez*	FOD, FES	-	-	-
V. secundiflora Leme*	FOD	-	-	-
V. seideliana W.Weber*	FOD	-	-	-
V. serrana E.Pereira & I.A.Penna*	FOD	-	-	-
V. silvana Leme*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
V. simplex (Vell.) Beer	FOD, FES, RST	-	-	-
V. sparsifora L.B.Sm.*	FOD	-	EN	ANEXO II
V. sucrei L.B.Sm. & R.W.Read*	FOD, RST	-	CR	ANEXO II
V. taritubensis E.Pereira & I.A.Penna*	FOD	-	-	-
V. thyrsoidea Mez*	FOD	-	VU	ANEXO II
V. tijucana E.Pereira*	FOD	-	-	-
V. triangularis Reitz*	FOD	-	-	-
V. triligulata Mez*	FOD	-	VU	ANEXO II
V. unilateralis (Baker) Mez*	FOD	-	-	-
V. vagans (L.B.Sm.) L.B.Sm.	FOD, RST	-	-	-
V. vellozicola Leme & J.A.Siqueira*	AFL	-	-	-
V. vidalii L.B.Sm. & Handro*	FCA, AFL	-	VU	ANEXO II
V. vulpinoidea L.B.Sm.*	FOD	-	-	-
V. warmingii E.Morren*	FOD	-	CR	ANEXO II
V. wawranea Antoine*	FOD	-	VU	ANEXO II
V. weberi E.Pereira & I.A.Penna*	FOD	-	-	-
V. zonata Leme & J.A.Siqueira*	AFL	-	-	-
*Wittrockia** – 6/6				
W. cyathiformis (Vell.) Leme*	FOD, FOM, FES	-	-	-
W. gigantea (Baker) Leme*	FOD	-	-	-
W. paulistana Leme*	FOD	-	-	-
W. spiralipetala Leme*	FOD	-	-	-
W. superba Lindm. *	FOD, AFL	-	-	-
W. tenuisepala (Leme) Leme*	FOD, FES	-	-	-

Burmanniaceae

Paul J. M. Maas & Hiltje Maas - van de Kamer

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
BURMANNIACEAE – 13/98				
Apteria – 1/1				
A. aphylla (Nutt.) Barnh. *ex* Small	FOD, FES, FOM, RST	-	-	-
Burmannia – 7/60				
B. alba Mart.	FCA, FAQ	-	-	-
B. aprica (Malme) Jonker*	FOD, FCA	-	-	-
B. australis Malme	FCA, FOD, AFL	-	-	-
B. bicolor Mart.	FCA, FAQ	-	-	-
B. capitata (Walter *ex* J.F.Gmel.) Mart	RST, FCA, FAQ	-	-	-
B. flava Mart.	AFL, FCA, FAQ	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
B. tenera (Malme) Jonker	FCA, FES	-	-	-
Campylosiphon – 1/1				
C. purpurascens Benth.	FOD	-	-	-
Cymbocarpa – 1/3				
C. refracta Miers	FOD, FES	-	-	-
Dictyostega – 1/1				
D. orobanchoides (Hook.) Miers	FOD	-	-	-
Gymnosiphon – 1/25				
G. divaricatus (Benth.) Benth. & Hook.f.	FOD	-	-	-
Miersiella – 1/1				
M. umbellata (Miers) Urb.	FOD	-	-	-

Burseraceae

Douglas C. Daly

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
BURSERACEAE – 17/ca.550				
Crepidospermum – 1/8				
C. atlanticum Daly*	FOD, FES	-	-	-
Protium – 11/150				
P. aracouchini (Aubl.) Marchand	FOD	-	-	-
P. bahianum Daly*	FOD	-	VU	ANEXO II
P. brasiliense (Spreng.) Engl.	FOD, RST, FES	-	-	-
P. glaziovii Swart*	FOD	-	-	-
P. heptaphyllum (Aubl.) Marchand	FOD, FES, RST	-	-	-
P. icicariba (DC.) Marchand*	FOD, RST	-	-	-
P. kleinii Cuatrec.*	FOD	-	-	-
P. spruceanum (Benth.) Engl.	FES	-	-	-
P. tenuifolium (Engl.) Engl.	FOD	-	-	-
P. warmingianum Marchand	FOD, FES	-	-	-
P. widgrenii Engl.*	FOD, FES	-	-	-
Tetragastris – 3/9				
T. breviacuminata Swart*	FOD	-	-	-
T. catuaba Soares da Cunha*	FOD	-	-	-
T. occhionii (Rizzini) Daly*	RST	-	VU	ANEXO II
Trattinnickia – 2/16				
T. ferruginea Kuhlm.*	FES	-	CR	ANEXO I
T. mensalis Daly*	FOD, FES	-	EN	ANEXO I

Cabombaceae

Marco Otávio Pivari

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
CABOMBACEAE – 3/7				
Cabomba – 3/5				
C. aquatica Aubl.	FAQ	-	-	-
C. caroliniana A.Gray	FAQ	-	-	-
C. furcata Schult. & Schult.f.	FAQ	-	-	-

Cactaceae

Daniela Zappi

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
CACTACEAE – 89/1.500				
Arthrocereus – 2/4				
A. glaziovii (K.Schum.) N.P.Taylor & Zappi*	FCA	EN	EN	ANEXO II
A. melanurus (K.Schum.) L.Diers *et al.*	FCA	VU	VU	ANEXO II
Brasiliopuntia – 1/1				
B. brasiliensis (Willd.) A.Berger	FES, FED, AFL, RST	-	-	-
Cereus – 3/21				
C. fernambucensis (K.Schum.) Barthlott*	AFL	-	-	-
C. hildmannianus K.Schum.	FES, FED, AFL	-	-	-
C. insularis Hemsl.*	AFL, RST	-	-	-
Cipocereus – 2/6				
C. laniflorus N.P.Taylor & Zappi*	FCA, AFL	EN	EN	ANEXO I
C. minensis (Werd.) F.Ritter	FCA, AFL	-	EN	ANEXO II
Coleocephalocereus – 4/8				
C. braunii Diers & Est.-Pereira*	AFL	-	-	-
C. buxbaumianus Buin.*	AFL	-	-	-
C. fluminensis (Miq.) Backeb.*	AFL, RST	-	-	-
C. pluricostatus Buin. & Bred.*	AFL	-	-	-
Epiphyllum – 1/12				
E. phyllanthus (L.) Haw.	FOD, FOM, FES, FED, RST	-	-	-
Frailea – 2/11				
F. castanea Backeb.	FCA, AFL	-	-	-
F. curvispina Buin. & Bred.	FCA, AFL	-	-	-
Gymnocalycium – 2/42		-		
G. denudatum (Link & Otto) Mitt.	FCA, AFL	-	-	-
G. horstii Buin.	FCA, AFL	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Hatiora * – 6/6				
H. cylindrica Britton & Rose*	FOD	-	VU	ANEXO II
H. epiphylloides (Campos Porto & Werd.) Buxbaum*	FOM	-	-	-
H. gaertneri (Regel) Barthlott*	FOM	-	-	-
H. herminiae (Campos Porto & Castellanos) Barthlott*	FOM	-	-	-
H. rosea (Lagerh.) Barthlott*	FOM	-	VU	ANEXO II
H. salicornioides (Haw.) Britton & Rose *	FOD, FOM, FES, AFL	-	-	-
Hylocereus – 1/14				
H. setaceus (Salm-Dyck) Ralf Bauer	RST, AFL, FED	-	-	-
Lepismium – 4/6				
L. cruciforme (Vell.) Miq.	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
L. houlletianum (Lem.) Barthlott*	FOD, FOM	-	-	-
L. lumbricoides (Lem.) Barthlott	FOM, FES, FED	-	-	-
L. warmingianum (K.Schum.) Barthlott	FOM, FES, FED	-	-	-
Melocactus – 1/35				
M. violaceus Pfeiff.*	RST	VU	VU	ANEXO II
Opuntia – 1/60				
O. monacantha Haw.	RST, FCA	-	-	-
Parodia – 12/52				
P. alacriportana Backeb. & Voll.	AFL	-	-	-
P. carambeiensis Buin. & Bred.*	AFL	-	-	-
P. crassigibba (F.Ritter) N.P.Taylor*	?	-	-	-
P. erinacea (Haw.) N.P.Taylor	AFL	-	-	-
P. fusca (F.Ritter) Hofacker & Braun	FCA, AFL	-	-	-
P. haselbergii (Rumpl.) F.Brandt	?	-	-	-
P. horstii (F.Ritter) N.P.Taylor	AFL	-	-	-
P. leninghausii (K.Schum.) F.Brandt	FCA, AFL	-	-	-
P. linkii (Lehm.) Kies.	?	-	-	-
P. magnifica (Rigger) F.Brandt*	FCA, AFL	-	-	-
P. ottonis (Lehm.) N.P.Taylor	FCA, AFL	-	-	-
P. scopa (Spreng.) N.P.Taylor	FCA, AFL	-	-	-
Pereskia – 2/16				
P. aculeata Mill.	FOD, FOM, FES, FED, AFL, RST	-	-	-
P. grandifolia Haw.	FOD, FOM, FES, AFL	-	-	-
Pilosocereus – 5/39				
P. arrabidae (Lem.) Byles & Rowley*	RST	-	-	-
P. aurisetus (Werd.) Byles & Rowley	FCA, AFL	-	-	-
P. brasiliensis (Britton & Rose) Backeb.*	RST, AFL	-	VU	ANEXO I
P. catingicola (Guerke) Byles & Rowley	RST, FED	-	-	-
P. ulei (K.Schum.) Byles & Rowley*	RST, AFL	-	-	-
Praecereus – 1/2				
P. euchlorus (F.A.C.Weber) N.P.Taylor	AFL, FCA	-	-	-
Pseudoacanthocereus – 1/2				
P. brasiliensis (Britton & Rose) F.Ritter	AFL	VU	VU	ANEXO II

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Rhipsalis – 32/35				
R. agudoensis N.P.Taylor*	FOD	-	-	-
R. baccifera (J.M.Muell.) Stearn	FOM, FES	-	-	-
R. burchellii Britton & Rose*	FOM	-	-	-
R. campos-portoana Loefgr.*	FOM, FOD	-	-	-
R. cereoides (Backeb. & Voll) Backeb.*	AFL	VU	V U	ANEXO I
R. cereuscula Haw.	FOM, FES	-	-	-
R. clavata F.A.C.Weber*	FOM, FES	-	-	-
R. crispata (Haw.) Pfeiffer*	FOD, FES, RST	VU	VU	ANEXO II
R. dissimilis (G.Lindb.) K.Schum.*	FES, FCA, AFL	-	-	-
R. elliptica G.Lindb. *ex* K.Schum.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
R. ewaldiana Barthlott & N.P.Taylor*	FOD, FOM	-	-	-
R. floccosa (Lagerh.) Britton & Rose	FOD, FOM, FES	-	-	-
R. grandiflora Haw.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
R. hoelleri Barthlott & N.P.Taylor*	FOD, FOM	-	-	-
R. juengeri Barthlott & N.P.Taylor*	FOD, FOM, FES	-	-	-
R. lindbergiana K.Schum.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
R. mesembryanthemoides Haw.*	FOD, AFL	-	-	-
R. neves-armondii K.Schum.*	FOD, FOM	-	-	-
R. oblonga Loefgr.*	FOD, FOM	-	-	-
R. olivifera N.P.Taylor & Zappi*	FOD, FOM	-	-	-
R. ormindoi N.P.Taylor & Zappi*	FOD, FOM	-	-	-
R. pacheco-leonis Loefgr.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
R. pachyptera Pfeiff.*	FOD, FOM	-	-	-
R. paradoxa (Salm-Dyck *ex* Pfeiff.) Salm-Dyck*	FOD, FOM, FES	-	-	-
R. pentaptera A.Dietr.*	FOD, AFL	-	-	-
R. pilocarpa Loefgr.*	FOM, FES	VU	VU	ANEXO II
R. pulchra Loefgr.*	FOM	-	-	-
R. puniceo-discus G.Lindb.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
R. russellii Britton & Rose	FOD, FOM, AFL, FCA	VU	-	-
R. sulcata F.A.C.Weber*	FOD, FOM	-	-	-
R. teres (Vell.) Steud.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
R. trigona Pfeiff.*	FOM, FES	-	-	-
*Schlumbergera** – 6/6				
S. kautskyi (Horobin & McMillan) N.P.Taylor *	FOM	EN	EN	ANEXO II
S. microsphaerica (K.Schum.) Hoevel *	FOM, AFL, FCA	-	-	-
S. opuntioides (Loefgr. & ‘) D.Hunt. *	FOM, FCA	-	-	-
S. orssichiana Barthlott & McMillan *	FOD	-	-	-
S. russelliana (Hook.) Britton & Rose *	FOM	-	-	-
S. truncata (Haw.) Moran *	FOD, FOM	-	VU	ANEXO II

Calceolariaceae

Vinícius Castro Souza

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
CALCEOLARIACEAE – 1/250				
Calceolaria – 1/250				
C. tripartita Ruiz & Pav.	FOD, FES	-	-	

Calyceraceae

Rafaella Cardoso Ribeiro

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
CALYCERACEAE – 4/ca. 60				
Acicarpha – 3/5				
A. procumbens Less.	RST	-	-	-
A. spathulata R.Br.*	RST	-	-	-
A. tribuloides A.Juss.	FCA, RST	-	-	-
Boopis – 1/13				
B. bupleuroides (Less.) C.A.Müll.	FCA	-	-	-

Campanulaceae

Ana Odete Santos Vieira

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
CAMPANULACEAE – 14/2.300				
Centropogon – 1/231				
C. cornutus (L.) Druce	FOD, FES, RST	-	-	-
Lobelia – 5/400				
L. exaltata Pohl*	FAQ	-	-	-
L. fistulosa Vell.*	FAQ, FCA	-	-	-
L. hilaireana (Kanitz) E.Wimm.*	FCA, FES	-	VU	ANEXO II
L. langeana Dusén*	FOD	-	-	-
L. santos-limae Brade	FES	-	CR	ANEXO II
L. thapsoidea Schott*	FAQ, FCA	-	-	-
Siphocampylus – 8/223				
S. convolvulaceus (Cham.) G.Don *	FOD	-	-	-
S. duploserratus Pohl*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
S. fluminensis (Vell.) E.Wimm.*	FOD	-	-	-
S. lauroanus Handro & M.Kuhlm.*	FOD	-	-	-
S. longepedunculatus Pohl*	FOD, FCA	-	-	-
S. sulfureus E.Wimm*	FAQ	-	-	-
S. umbellatus (Kunth) G.Don*	FAQ	-	-	-
S. westinianus (Thunb.) Pohl*	FOD, FCA	-	-	-

Canellaceae

Rafaella Cardoso Ribeiro

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
CANELLACEAE – 4/ca. 20				
Cinnamodendron – 4/9				
C. axillare (Nees & Mart.) Endl. *ex* Walpers*	FOD	-	-	-
C. dinisii Schwacke *	FOD, FOM, FES	-	-	-
C. occhionianum F.Barros & J.Salazar*	FOD	-	-	-
C. sampaioanum Occhioni*	FOD	-	-	-

Cannabaceae

Maria Salete Marchioretto

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
CANNABACEAE – 4/170				
Celtis –2/70				
C. ehrenbergiana (Klotzsch) Liebm.	FOM	-	-	-
C. iguanea (Jacq.) Sarg.	FOD	-	-	-
Phyllostylon – 1/2				
P. brasiliense Capan. *ex* Benth. & Hook.f.	FOD	-	-	-
Trema – 1/ca. 10				
T. micrantha (L.) Blume	FES	-	-	-

Cannaceae

João Marcelo Alvarenga Braga

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
CANNACEAE – 8/ca. 20				
Canna – 8/ca. 20				
C. coccinea Mill.	FES	-	-	-
C. glauca L.	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
C. indica L.	FOD, FOM, FES, FED, AFL, RST	-	-	-
C. paniculata Ruiz & Pav.	FOD, FOM, FES	-	-	-
C. patens (Aiton) Roscoe	FOM	-	-	-
C. pedunculata Sims*	FOD	-	-	-
C. speciosa Roscoe *ex* Sims	FOM	-	-	-
C. stenantha N.Tanaka*	FES	-	-	-

Capparaceae

Maria Bernadete Costa-e-Silva e Juliana Souza Marques

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
CAPPARACEAE – 07/480				
Capparis – 6/250				
C. brasiliana DC.	FOM, RST	-	-	-
C. flexuosa (L.) L.	FES, RST	-	-	-
C. frondosa Jacq.	FES, RST	-	-	-
C. hastata Jacq.	FES, RST	-	-	-
C. lineata Dombey *ex* Pers.	RST, FED	-	-	-
C. nectaria Vell.	FOD	-	-	-
Crateva – 1/8				
C. tapia L.	RST, FED	-	-	-

Cardiopteridaceae

Caetano Troncoso Oliveira

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
CARDIOPTERIDACEAE – 3/50				
Citronella – 3/25				
C. engleriana (Loes.) R.A.Howard*	FOD, FOM	-	-	-
C. gongonha (Mart.) R.A.Horward	FOD, FES	-	-	-
C. paniculata (Mart.) R.A.Horward*	FOD, FES	-	-	-

Caricaceae

Caetano Troncoso Oliveira

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
CARICACEAE – 3/35				
Jacaratia – 2/5				
J. heptaphylla (Vell.) A.DC.	FES	-	-	-
J. spinosa (Aubl.) A.DC.	FES	-	-	-
Vasconcellea – 1/21				
V. quercifolia A.St.-Hil.	FOM, FES	-	-	-
V. pulchra (V.Badillo) V.Badillo	FES	-	-	-

Caryocaraceae

Luciana H. Yoshino Kamino

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
CARYOCARACEAE – 3/23				
Anthodiscus – 1/8				
A. amazonicus Gleason & A.C.Sm.	FOD	-	-	-
Caryocar – 2/15				
C. brasiliense Cambess.	FES	-	-	-
C. edule Casar.*	FOD	-	-	-

Caryophyllaceae

Marcos Sobral

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
CARYOPHYLLACEAE – 32/2300				
Cardionema – 2/6				
C. ramosissimum (Weinm.) A.Nelson & J.F.Macbr.	FCA	-	-	-
C. rosetta (Cambess.) A.Nelson & J.F.Macbr.	FCA	-	-	-
Cerastium – 9/100				
C. brachypodum (Engelm. *ex* A.Gray) B.L.Rob.	FCA	-	-	-
C. catharinense L.B.Sm. & Downs	FCA	-	-	-
C. commersonianum Séringe	FCA	-	-	-
C. dichrotrichum Fenzl *ex* Rohrb.	FCA	-	-	-
C. glomeratum Thuill.	FCA	-	-	-
C. humifusum Cambess.	FCA	-	-	-
C. mollissimum Poir.	FCA	-	-	-
C. rivulare Cambess.	FCA	-	-	-
C. rivulariastrum Möschl & Pedersen	FCA	-	-	-
Drymaria – 1/48				
D. cordata (L.) Willd.	FCA, RUD	-	-	-
Paronychia – 8/110				
P. brasiliana DC.	FCA	-	-	-
P. camphorosmoides Cambess.	FCA	-	-	-
P. chilensis DC.	FCA	-	-	-
P. communis Cambess.	FCA	-	-	-
P. fasciculata Chaudhri*	FCA	-	-	-
P. paranensis Chaudhri*	FCA	-	-	-
P. revoluta C.E.Carneiro & Furlan*	FCA	-	-	-
P. setigera (Gillies *ex* Hook. & Arn.) F.Herm.	FCA	-	-	-
Polycarpaea – 1/50				
P. corymbosa (L.) Lam.	FCA, RUD	-	-	-
Polycarpon – 1/16				
P. apurense Kunth	FCA, RUD	-	-	-
Sagina – 2/20				
S. chilensis Naudin	FCA, RUD	-	-	-
S. humifusa (Cambess.) Fenzl *ex* Rohrb.	FCA, RUD	-	-	-
Spergula – 6/6				
S. grandis Pers.	FCA	-	-	-
S. laevis (Cambess.) D.Dietr.	FCA	-	-	-
S. platensis (Cambess.) Shinners	FCA	-	-	-
S. ramosa (Cambess.) D.Dietr.	FCA	-	-	-
S. salina (J.Presl & C.Presl) D.Dietr.	FCA	-	-	-
S. villosa Pers.	FCA	-	-	-
Stellaria – 2/150				
S. media (L.) Vill.	FCA	-	-	-
S. parva Pedersen	FCA	-	-	-

Celastraceae

Julio Antonio Lombardi & Milton Groppo

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
CELASTRACEAE – 61/98				
Anthodon – 1/1				
A. decussatum Ruiz & Pav.	FES, FOD, FOM	-	-	-
Celastrus – 1/31				
C. liebmanii Standl.	FES, FOD	-	-	-
Cheiloclinium – 5/12				
C. anomalum Miers	FOM	-	-	-
C. belizense (Standl.) A.C.Sm.	FOM	-	-	-
C. cognatum (Miers) A.C.Sm.	FOD, FOM, FES	-	-	-
C. gleasonianum (A.C.Sm.) A.C.Sm.	FOD	-	-	-
C. serratum (Cambess.) A.C.Sm.	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
Elachyptera – 2/8				
E. festiva (Miers) A.C.Sm.	FOM, FES	-	-	-
E. micrantha (Cambess.) A.C.Sm.	FOD, FOM, FES	-	-	-
Hippocratea – 1/3				
H. volubilis L.	FOM, FOD, FES, RST	-	-	-
Maytenus – 28/ca. 200				
M. aquifolia Mart.	FES, FOD	-	-	-
M. ardisiifolia Reissek*	FOD	-	-	-
M. basidentata Reissek*	FOD	-	VU	ANEXO II
M. boaria Molina	FOD, FOM	-	-	-
M. brasiliensis Mart.*	FES, FOD	-	-	-
M. cassineformis Reissek*	FES, FOD	-	-	-
M. cestrifolia Reissek	FOD	-	-	-
M. communis Reissek*	FES, FOD	-	-	-
M. dasyclada Mart.*	FOD, FOM	-	-	-
M. distichophylla Mart. *ex* Reissek*	FOD	-	-	-
M. erythroxyla Reissek	FOD	-	-	-
M. evonymoides Reissek	FES, FOD	-	-	-
M. floribunda Reissek	FES, FED	-	-	-
M. glaucescens Reissek*	FOD, FOM	-	-	-
M. gonoclada Mart.	FES, FOD, FOM	-	-	-
M. ilicifolia Mart. *ex* Reissek	FES, FOD, FOM	-	-	-
M. imbricata Reissek	AFL	-	-	-
M. longifolia Reissek *ex* Loes.*	FOD	-	-	-
M. macrophylla Mart.*	FOD	-	-	-
M. obtusifolia Mart.*	FOD	-	-	-
M. officinalis Mabb.	FES, FOD, FOM	-	-	-
M. patens Reissek	FES, FOD	-	-	-
M. robusta Reissek	FES, FOD	-	-	-
M. salicifolia Reissek	FES, FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
M. samydiformis Reissek*	FOD	-	-	-
M. schumanniana Loes.*	FOD	-	-	-
M. subalata Reissek*	FOD	-	-	-
M. urbaniana Loes.	AFL	-	-	-
Peritassa – 7/19				
P. calypsoides (Cambess.) A.C.Sm.*	FOD, FOM	-	-	-
P. flaviflora A.C.Sm.*	FES, FOD, FOM	-	-	-
P. hatschbachii Lombardi*	FES, FOD, FOM, RST	-	-	-
P. laevigata (Hoffmanns. *ex* Link) A.C.Sm.	FOD, RST	-	-	-
P. longifolia Lombardi*	FOD, FOM	-	VU	ANEXO II
P. mexiae A.C.Sm.*	FES, FOM, FOD	-	-	-
P. sadleri Lombardi*	FOD, FOM	-	VU	ANEXO II
Plenckia – 1/4				
P. populnea Reissek	FES, FCA	-	-	-
Prionostemma – 1/5				
P. aspera (Lam.) Miers	FOD, FOM, FES	-	-	-
Pristimera – 2/25				
P. celastroides (Kunth) A.C.Sm.	FOD, FOM, FES	-	-	-
P. nervosa (Miers) A.C.Sm.	FOD, FOM, FES	-	-	-
Salacia – 6/> 200				
S. arborea (Schrank) Peyr.*	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
S. elliptica (Mart. *ex* Schult.) G.Don	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
S. grandifolia (Mart. *ex* Schult.) G.Don*	FOD, FOM	-	-	
S. mosenii A.C.Sm.*	RST	-	VU	ANEXO I
S. multiflora (Lam.) DC.	FOM	-		
S. nemorosa Lombardi*	FOD, FOM	-	-	-
Semialarium – 1/2				
S. paniculatum (Mart. *ex* Schult.) N.Hallé	FES, FOM	-	-	-
Tontelea – 9/17				
T. corcovadensis (Glaz.) A.C.Sm.*	FOM, FES	-	-	-
T. fluminensis (Peyr.) A.C.Sm.	FOD, FOM, FES	-	-	-
T. lanceolata (Miers) A.C.Sm.*	FOD, FOM	-	EN	ANEXO II
T. laxiflora (Benth.) A.C.Sm.	FOM	-	-	-
T. leptophylla A.C.Sm.*	FOM, FES	-	-	-
T. martiana (Miers) A.C.Sm.*	FOD	-	VU	ANEXO II
T. mauritioides (A.C.Sm.) A.C.Sm.	FOD	-	-	-
T. miersii (Peyr.) A.C.Sm.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
T. tenuicula (Miers) A.C.Sm.	FOD, FOM, FES	-	-	-

Ceratophyllaceae

Marco Otávio Pivari

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
CERATOPHYLLACEAE – 1/3				
Ceratophyllum – 1/3				
C. demersum L.	FAQ	-	-	-

Chloranthaceae

Marcos Sobral

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
CHLORANTHACEAE – 1/75				
Hedyosmum – 1/45				
H. brasiliense Miq.	FOD, FES	-	-	-

Chrysobalanaceae

Elsie Franklin Guimarães & Erika von Sohsten Medeiros

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
CHRYSOBALANACEAE – 65/500				
Chrysobalanus – 1/31				
C. icaco L.	RST	-	-	-
Couepia – 17/70				
C. belemii Prance*	FOD	-	-	-
C. bondarii Prance*	FOD	-	-	-
C. carautae Prance*	FOD	-	-	-
C. coarctata Prance*	RST	-	-	-
C. impressa Prance*	FOD	-	-	-
C. insignis Fritsch*	FOD	-	-	-
C. leitaofilhoi Prance*	FOD	-	-	-
C. longipetiolata Prance*	FOD	-	-	-
C. meridionalis Prance*	FOD	-	-	-
C. monteclarensis Prance*	FOD, FES	-	CR	ANEXO II
C. ovalifolia (Schott) Benth.*	RST, FOD	-	-	-
C. parvifolia Prance*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
C. pernambucensis Prance	FOD	-	-	-
C. rufa Ducke	FOD.FES	-	-	-
C. schottii Fritsch	RST	VU	-	-
C. uiti (Mart. & Zucc.) Benth. *ex* Hook.f.	FOD,FES, FED, FCA	-	-	-
C. venosa Prance	FOD, FES	-	-	-
Exellodendron – 1/5				
E. gracile (Kuhlm.) Prance*	FOD, FES	-	-	-
Hirtella – 17/78				
H. angustifolia Schott *ex* Spreng.	FOD	-	-	-
H. bahiensis Prance	FOD	-	-	-
H. barrosoi Prance*	FOD	-	-	-
H. ciliata Mart. & Zucc.	FOD, FCA, FES, FED	-	-	-
H. corymbosa Cham. & Schltdl.	FOD, FCA	-	-	-
H. floribunda Cham. & Schltdl.	FOD, FCA, FES	-	-	-
H. glandulosa Spreng.	FES, FED	-	-	-
H. glaziovii Taub.	FOD	-	-	-
H. gracilipes (Hook.f.) Prance	FOD, FES,FED	-	-	-
H. hebeclada Moric. *ex* DC.	FES	-	-	-
H. insignis Briq. *ex* Prance	FOD	-	-	-
H. martiana Hook.f.	FES, FED	-	-	-
H. parviunguis Prance*	FOD	-	-	-
H. racemosa Lam.	FOD	-	-	-
H. santosii Prance*	FOD	-	-	-
H. sprucei Benth. *ex* Hook.f.	FOD	-	-	-
H. triandra Sw.	FOD	-	-	-
Licania – 24/296				
L. apetala (E.Meyer) Fritsch	FOD, FCA	-	-	-
L. arianeae Prance*	FOD	-	-	-
L. bahiensis Prance*	FOD	-	-	-
L. belemii Prance*	FES	-	-	-
L. cymosa Fritsch	FOD	-	-	-
L. glazioviana Warm.*	RST, FOD	-	-	-
L. heteromorpha Benth.	FOD	-	-	-
L. hoehnei Pilg.	RST, FES	-	-	-
L. hypoleuca Benth.	RST, FOD	-	-	-
L. indurata Pilg.*	FOD	-	-	-
L. kunthiana Hook.f.	FES	-	-	-
L. lamentanda Prance*	FOD	-	-	-
L. littoralis Warm.	RST, FOD	-	-	-
L. micrantha Miq.	FOD	-	-	-
L. naviculistipula Prance*	FOD	-	-	-
L. nitida Hook.f.	FOD	-	-	-
L. octandra (Hoffmanns. *ex* Roem. & Schult.) Kuntze	FES, FED	-	-	-
L. riedelii Prance*	FOD, FES	-	-	-
L. salzmannii (Hook.f.) Fritsch*	FOD	-	-	-
L. santosii Prance*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
L. silvatica Prance*	FOD	-	-	-
L. spicata Hook.f.*	FES	-	-	-
L. tomentosa (Benth.) Fritsch	RST, FES	-	-	-
L. turbinata Benth.*	RST, FOD	-	-	-
Parinari – 5/145				
P. alvimii Prance*	FOD	-	-	-
P. brasiliensis (Schott) Hook.f.	FOD	-	-	-
P. excelsa Sabine	FES	-	-	-
P. leontopitheci Prance*	FOD	-	-	-
P. littoralis Prance*	RST, FOD	-	-	-

Cistaceae

Marcos Sobral

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
CISTACEAE – 1/175				
Helianthemum – 1/80-100				
H. brasiliense (Lam.) Pers.	FCA	-	-	-

Cleomaceae

Maria Bernadete Costa-e-Silva e Juliana Souza Marques

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
CLEOMACEAE – 12/300				
Cleome – 10/250				
C. aculeata L.	RST, FES	-	-	-
C. dendroidea Schult.f.	RST, FES	-	-	-
C. diffusa Banks *ex* DC.	RST	-	-	-
C. hassleriana Chodat	RST, FOD	-	-	-
C. horrida Mart. *ex* Roem. & Schult.	RST, FOD	-	-	-
C. parviflora Kunth	RST, FOD			
C. rosea Vahl *ex* DC.	RST, FOD	-	-	-
C. serrata Jacq.	FES	-	-	-
C. spinosa Jacq.	RST, FES, FED	-	-	-
C. viridiflora Schreb.	FOD	-	-	-
Dactylaena – 2/6				
D. micrantha Schreb. *ex* Schult.f.	FES	-	-	-
D. microphylla Eichler	RST	-	-	-

Clethraceae

Caetano Troncoso Oliveira

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
CLETHRACEAE – 2/80				
Clethra – 2/64				
C. scabra Pers.	FOD, FOM, FES	-	-	-
C. uleana Sleumer*	FOD	-	-	-

Clusiaceae

Volker Bittrich

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
CLUSIACEAE – 57/ca. 1000				
Calophyllum – 1/200				
C. brasiliense Cambess.	FOD, FOM, FES, MAN, RST	-	-	-
Caraipa - 1/30				
C. densifolia Mart.	FOD	-	-	-
Clusia – 18/300				
C. aemygdioi A.Gomes da Silva & B.Weinberg*	FOD	-	-	-
C. criuva Cambess.	FOD, FOM, FES, FCA, RST	-	-	-
C. dardanoi G.Mariz*	AFL, FOD	-	-	-
C. fluminensis Planch. & Triana*	FOD, RST	-	-	-
C. fragrans Gardner*	AFL, FCA	-	-	-
C. hilariana Schltdl.	FOD, RST	-	-	-
C. immersa C.Vieira*	AFL, FOD	-	-	-
C. lanceolata Cambess.*	FOD, RST	-	-	-
C. melchiorii Gleason	FOD, FCA	-	-	-
C. nemorosa G.Mey.	FCA, FOD, RST	-	-	-
C. organensis Planch. & Triana*	AFL, FOD, RST	-	-	-
C. palmicida L.C.Rich. *ex* Planch. & Triana	FOD	-	-	-
C. panapanari (Aubl.) Choisy	FOD, FCA	-	-	-
C. paralicola G.Mariz*	FOD	-	-	-
C. pernambucensis G.Mariz*	FOD	-	-	-
C. rosea Jacq.	FOD, RST	-	-	-
C. sellowiana Schltdl.*	RST	-	-	-
C. studartiana C.Vieira & A.Gomes da Silva*	FOD	-	-	-
Garcinia – 4/260				
G. brasiliensis Mart.	FOD, RST	-	-	-
G. calyptrata (Schltdl.) Planch. & Triana*	FOD	-	-	-
G. gardneriana (Planch. & Triana) Zappi	FES, FOD, RST	-	-	-
G. macrophylla Mart.	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Kielmeyera – 25/50		-	-	-
K. albopunctata Saddi*	FOD, RST	-	-	-
K. altissima Saddi*	FOD	-	-	-
K. argentea Choisy*	RST	-	-	-
K. bifaria Saddi	FCA, FOD	-	-	-
K. coriacea Mart. & Zucc.	FCA	-	-	-
K. decipiens Saddi*	FOD	-	-	-
K. divergens Saddi*	FOD	-	-	-
K. elata Saddi*	RST	-	-	-
K. excelsa Cambess.*	FOD	-	-	-
K. gracilis Wawra*	FOD	-	-	-
K. grandiflora (Wawra) Saddi	FCA	-	-	-
K. insignis Cambess.*	FOD	-	-	-
K. itacarensis Saddi*	RST	-	-	-
K. lathrophyton Saddi	FCA, FES, FOD	-	-	-
K. marauensis Saddi*	RST	-	-	-
K. membranacea Casar.*	FOD, RST	-	-	-
K. neglecta Saddi*	FOD, RST	-	-	-
K. occhioniana Saddi*	FOD	-	-	-
K. pumila Pohl	FCA	-	-	-
K. regalis Saddi	FCA	-	-	-
K. reticulata Saddi*	RST	-	-	-
K. rufotomentosa Saddi*	FOD	-	-	-
K. rugosa Choisy*	RST	-	-	-
K. rupestris A.P.Duarte*	AFL	-	-	-
K. sigillata Saddi*	FOD	-	-	-
Symphonia – 1/23				
S. globulifera L.f.	FOD, RST	-	-	-
Tovomita – 5/30				
T. bahiensis Engl.*	FOD	-	-	-
T. brasiliensis (Mart.) Walp.	FOD	-	-	-
T. brevistaminea Engl.	FOD	-	-	-
T. leucantha (Schltdl.) Planch. & Triana*	FOD	-	-	-
T. mangle G.Mariz*	FOD	-	-	-
Tovomitopsis – 2/2				
T. paniculata (Spreng.) Planch. & Triana	FES FOD	-	-	-
T. saldanhae Engl.*	FOD	-	-	-

Combretaceae

Nilda Marquete Ferreira da Silva

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
COMBRETACEAE – 28/500				
Buchenavia – 6/20				
B. hoehneana N.Mattos	FOD	-	-	-
B. iguaratensis N.Mattos*	FOD	VU	VU	ANEXO II
B. kleinii Exell	FOD, RST	-	-	-
B. pabstii Marquete & C.Valente*	FOD, FES	EN	EN	ANEXO I
B. rabelloana Mattos	FOD	EN	VU	ANEXO I
B. tetraphylla (Aubl.) R.A.Howard	FES, FOD, RST	-	-	-
Combretum – 10/255				
C. argenteum Bertol.	RST, FOD	-	-	-
C. assimile Eichler	FOD	-	-	-
C. duarteanum Cambess.	FED, FES	-	-	-
C. fruticosum (Loefl.) Stuntz	RST, FED, MAN, FOD	-	-	-
C. gracile Schott	FOD	-	-	-
C. lanceolatum Pohl *ex* Eichler	FOD, RST	-	-	-
C. laxum Jacq.	RST, FOD,	-	-	-
C. leprosum Mart.	RST ?	-	-	-
C. mellifluum Eichler	FOD	-	-	-
C. pisonioides Taub.	FOD	-	-	-
Conocarpus – 1/1				
C. erectus L.	RST, MAN	-	-	-
Laguncularia – 1/1				
L. racemosa (L.) C.F.Gaertn.	MAN	-	-	-
Terminalia – 10/190				
T. acuminata (Allemão) Eichler*	FOD	EW	EW	ANEXO I
T. australis Cambess.	FES	-	-	-
T. camuxa Pickel	FOD	-	-	-
T. glabrescens Mart.	FOD, FES	-	-	-
T. januariensis DC.	FOD	-	-	-
T. kuhlmannii Alwan & Stace*	FOD	VU	VU	ANEXO II
T. mameluco Pickel	FOD	-	-	-
T. reitzii Exell	FOD	VU	EN	ANEXO II
T. triflora (Griseb.) Lillo	FED, FES	-	-	-
T. uleana Engl. *ex* Alwan & Stace	FOD	-	-	-

Commelinaceae

Lidyanne Yuriko Saleme Aona

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
COMMELINACEAE – 18/655				
Dichorisandra – 15/54				
D. acaulis Cogn.*	FOD	-	EN	ANEXO II
D. albomarginata Linden *ex* Regel*	FOD, FES	-	-	-
D. fluminensis Brade*	RST	-	-	-
D. gaudichaudiana Kunth*	FOD, RST	-	-	-
D. glaziovii Taub.*	FCA, AFL	-	VU	ANEXO II
D. hirtella (Nees & Mart.) Mart. *ex* Schult. f.*	FOD	-	-	-
D. interrupta Mart. *ex* Schult. f.*	FOD, AFL	-	-	-
D. leucophthalmos Hook.*	FOD, FES	-	VU	ANEXO II
D. neglecta Brade*	RST	-	-	-
D. oxypetala Hook.*	FOD	-	-	-
D. paranaensis D.Corrêa da Maia *et al.**	FOD, FES	-	-	-
D. penduliflora Kunth*	FOD	-	-	-
D. puberula Nees & Mart.*	FOD	-	-	-
D. pubescens Mart. *ex* Schult.f*	FOD, FES	-	-	-
D. thyrsiflora J.C.Mikan*	RST	-	-	-
Siderasis – 1/3				
S. fuscata (Lodd.) H.E.Moore*	FOD	-	VU	ANEXO II
Tradescantia – 2/70				
T. blossfeldiana Mildbr.*	FCA, AFL	-	-	-
T. umbraculifera Hand.-Mazz.*	FOD	-	-	-

Connaraceae

Enrique Forero & Luciana H. Yoshino Kamino

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
CONNARACEAE – 27/300-350				
*Bernardinia** – 1/1				
B. fluminensis (Gardner) Planch.*	FCA	-	-	-
Connarus – 12/80				
C. beyrichii Planch.*	FOD, FES	-	-	-
C. blanchetii Planch.*	RST, FOD	-	-	-
C. cuneifolius Baker*	FOD	-	-	-
C. detersus Planch.	FOD, FCA	-	-	-
C. marginatus Planch.*	FCA, AFL	-	-	-
C. nodosus Baker*	RST, FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
C. ovatifolius (Mart.) G.Schellenb.*	RST	-	-	-
C. portosegurensis Forero*	FOD	-	-	-
C. regnellii G.Schellenb.*	FES, FOD	-	-	-
C. rostratus (Vell.) L.B.Sm.*	FOD, FOM	-	-	-
C. subpeltatus G.Schellenb.*	FOD	-	-	-
C. xylocarpus Vidal *et al.**	FOD	-	-	-
Rourea – 14/70				
R. bahiensis Forero*	FOD	-	-	-
R. blanchetiana (Progel) Kuhlm.*	FOD	-	-	-
R. carvalhoi Forero *et al.**	FCA	-	-	-
R. cnestidifolia G.Schellenb.*	RST, FOD	-	-	-
R. discolor Baker	FOD, FCA	-	-	-
R. gardneriana Planch.*	FOD	-	-	-
R. glabra Kunth	FOD, FCA, RST	-	-	-
R. glazioui G.Schellenb.*	FOD	-	-	-
R. gracilis G.Schellenb.*	FOD, RST	-	-	-
R. luizalbertoi Forero *et al.**	FOD	-	-	-
R. macrocalyx Carbonó *et al.**	FCA, RST	-	-	-
R. pseudogardneriana Forero *et al.**	FCA, FOD	-	-	-
R. pseudospadicea G.Schellenb.*	FES	-	VU	ANEXO I
R. tenuis G.Schellenb.*	FCA, FOD	-	-	-

Convolulaceae

Rosângela Simão-Bianchini

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
CONVOLVULACEAE – 136/ca. 1700				
Aniseia – 1/5				
A. martinicensis (Jacq.) Choisy	FOD	-	-	-
Bonamia – 3/45				
B. agrostopolis (Vell.) Hallier f.*	FES	-	-	-
B. burchellii (Choisy) Hallier f.*	FES, RST, FOD	-	-	-
B. maripoides Hallier f.	FOD	-	-	-
Convolvulus – 2/ca. 250				
C. crenatifolius Ruiz & Pav.*	FOD	-	-	-
C. hasslerianus (Chodat) O'Donell	FES	-	-	-
Cuscuta – 6/ca. 150				
C. boliviana Yunck.	FOM	-	-	-
C. globosa Ridley	FOD	-	-	-
C. obtusiflora Kunth*	FOD	-	-	-
C. parviflora Engelm.*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
C. platyloba Progel*	FOM	-	-	-
C. racemosa Mart.	FOD	-	-	-
Dichondra – 4/12				
D. carolinensis Michx.	FCA	-	-	-
D. macrocalyx Meisn.	FOD, FCA	-	-	-
D. parvifolia Meisn.*	FOD	-	-	-
D. sericea Sw.	FOD	-	-	-
Evolvulus – 28/100				
E. argyreus Choisy	FED	-	-	-
E. aurigenius Mart.	FCA	-	-	-
E. barbatus Meisn.	FCA	-	-	-
E. chrysotrichos Meisn.*	FOD	-	-	-
E. cordatus Moric.*	FES	-	-	-
E. cressoides Mart.	FCA	-	-	-
E. diosmoides Mart.*	RST	-	-	-
E. elegans Moric.	FCA	-	-	-
E. ericifolius Sch.Bip.	FOD	-	-	-
E. frankenioides Moric.	FCA	-	-	-
E. fuscus Meisn.	FES	-	-	-
E. genistoides Ooststr.	RST	-	-	-
E. glomeratus Nees & Mart.	FES, FCA	-	-	-
E. latifolius Ker Gawl.	FES, FOD	-	-	-
E. linarioides Meisn.	FCA	-	-	-
E. linoides Moric.	FED	-	-	-
E. macroblepharis Mart.	FCA, FOM	-	-	-
E. maximiliani Mart.*	RST	-	-	-
E. nummularius (L.) L.	FOD	-	-	-
E. pohlii Meisn.	FCA	-	-	-
E. pterocaulon Moric.	FCA, FES	-	-	-
E. pusillus Choisy*	RST, FOD	-	-	-
E. riedelii Meisn.	FCA	-	-	-
E. sericeus Sw.	FOD, FOM, FES, FCA	-	-	-
E. serpylloides Meisn.*	FCA	-	-	-
E. stellariifolius Ooststr.*	FCA	-	-	-
E. tenuis Mart. *ex* Choisy	FOD	-	-	-
E. thymiflorus Choisy*	RST	-	-	-
Ipomoea – 54/ca. 500				
I. acutisepala O'Donell	FOM, FCA	-	-	-
I. alba L.	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
I. aprica House	FCA	-	-	-
I. argentea Meisn.	FCA	-	-	-
I. aristolochiifolia G.Don	FOD, FES	-	-	-
I. asarifolia (Desr.) Roem. & Schult.	RST	-	-	-
I. bahiensis Willd. *ex* Roem. & Schult.	FOD, RST	-	-	-
I. batatoides Choisy	FOD, RST	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
I. bonariensis Hook.	FOD, FES	-	-	-
I. cairica (L.) Sw.	FOD, FOM, FES, FED, RST	-	-	-
I. campestris Meisn.	FCA	-	-	-
I. carnea Jacq.	FOD, RST, FOM	-	-	-
I. chondrosepala Hallier f.*	FES	-	-	-
I. daturiflora Meisn.*	FOD	-	EN	ANEXO II
I. delphinioides Choisy	FCA	-	-	-
I. echinocalyx Meisn.	FES	-	-	-
I. eriocalyx Meisn.*	FOD	-	-	-
I. fimbriosepala Choisy	FOD, RST	-	-	-
I. gigantea Choisy	FCA	-	-	-
I. grandifolia (Dammer) O'Donell	FOD, FOM, FES			
I. guaranitica Chodat & Hassl.	FOM	-	-	-
I. hederifolia L.	FOD, FOM, FES	-	-	-
I. hirsutissima Gardner	FES, FCA	-	-	-
I. imperati (Vahl) Griseb.*	RST	-	-	-
I. incarnata (Vahl) Choisy	RST	-	-	-
I. indica (Burm. f.) Merr.	FOM, FOD, FES	-	-	-
I. indivisa (Vell.) Hallier f.*	FOD, FOM	-	-	-
I. kunthiana Meisn.	FCA	-	-	-
I. malvaeoides Meisn.	FCA	-	-	-
I. megapotamica Choisy*	FOD	-	-	-
I. nil (L.) Roth	FOD, FOM, FES	-	-	-
I. pes-caprae (L.) R.Br.*	RST	-	-	-
I. phyllomega (Vell.) House	FOD	-	-	-
I. pintoi O'Donell	FED	-	-	-
I. piurensis O´Donell	FOD	-	-	-
I. procumbens Mart. *ex* Choisy	FCA, FES	-	-	-
I. procurrens Meisn.	FES, FCA	-	-	-
I. purpurea (L.) Roth	FOD, FOM, FES	-	-	-
I. quamoclit L.	FOD, FOM, FES	-	-	-
I. ramosissima (Poir.) Choisy	FOD, FOM, FES	-	-	-
I. regnellii Meisn.	FOD	-	-	-
I. rosea Choisy	FED	-	-	-
I. rubens Choisy*	FOD	-	-	-
I. saopaulista O'Donell	FOD, FES	-	-	-
I. sericophylla Meisn.	FOD	-	-	-
I. setifera Poir.	FES	-	-	-
I. setosa Ker Gawl.	FOD, FES	-	-	-
I. subalata Hassl.	FOD	-	-	-
I. subincana (Choisy) Meisn.	FED	-	-	-
I. subrevoluta Choisy	FES	-	-	-
I. syringifolia Meisn.	FOD, FES	-	-	-
I. tiliacea (Willd.) Choisy	FOD, RST	-	-	-
I. triloba L.	FOD, FES, FOM	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
I. tubata Nees	FES	-	-	-
Jacquemontia – 23/ca. 100				
J. bahiensis O'Donell	FOD	-	-	-
J. blanchetii Moric.	FOD, FES	-	-	-
J. bracteosa Meisn.	FOD	-	-	-
J. ciliata Sandwith	FOD, FES	-	-	-
J. densiflora (Meisn.) Hallier f.	FOD	-	-	-
J. evolvuloides (Moric.) Meisn.	FES	-	-	-
J. ferruginea Choisy*	FOD, FES	-	-	-
J. glaucescens Choisy*	FOD	-	-	-
J. gracillima (Choisy) Hallier f.	FOD	-	-	-
J. grandiflora Meisn.*	FES	-	-	-
J. heterantha (Nees & Mart.) Hallier f.*	FOD	-	-	-
J. holosericea (Weinm.) O'Donell*	RST, FOD	-	-	-
J. lasioclados (Choisy) O'Donell	FCA	-	-	-
J. martii Choisy	FOD	-	-	-
J. montana (Moric.) Meisn.	FOD, FES	-	-	-
J. mucronifera (Choisy) Hallier f.	FOD	-	-	-
J. rufa (Choisy) Hallier f.	FOD	-	-	-
J. sphaerostigma (Cav.) Rusby	FOD, FES	-	-	-
J. spiciflora (Choisy) Hallier. f.	FES, FCA	-	-	-
J. tamnifolia (L.) Griseb.	FES, FOD, RST	-	-	-
J. uleana Hallier f.*	RST	-	-	-
J. unilateralis (Roem. & Schult.) O'Donell	FOM, RST	-	-	-
J. velutina Choisy	FOD, FOM	-	-	-
Merremia – 9/60				
M. aegyptia (L.) Urb.	FOD, FES	-	-	-
M. cissoides (Lam.) Hallier f.	FOD, FES, RST	-	-	-
M. contorquens (Choisy) Hallier f.	FCA	-	-	-
M. digitata (Spreng.) Hallier f.	FCA	-	-	-
M. dissecta (Jacq.) Hallier f.	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
M. macrocalyx (Ruiz & Pav.) O'Donell	FOD, FOM, FES	-	-	-
M. tomentosa (Choisy) Hallier f.	FCA	-	-	-
M. tuberosa (L.) Rendle	FOD, FOM, FES	-	-	-
M. umbellata (L.) Hallier f.	FOD, FES, FCA	-	-	-
Odonellia – 1/2				
O. eriocephala (Moric.) K.R. Robertson	FOD	-	-	-
Operculina – 3/ca. 20				
O. alata (Ham.) Urb.	FOD, FES	-	-	-
O. macrocarpa (L.) Urb.	FOD, FES	-	-	-
O. sericantha (Miq.) Ooststr.	FOD	-	-	-
Turbina – 2/12				
T. cordata (Choisy) Austin & Staples	FES	-	-	-
T. corymbosa (L.) Raf.	FOD	-	-	-

Cordiaceae

Elsie Franklin Guimarães e Erika von Sohsten Medeiros

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
CORDIACEAE – 40/445				
Cordia – 29/320				
C. aberrans I.M.Johnst.	RST	-	-	-
C. acutifolia Fresen.	?	-	-	-
C. alliodora (Ruiz & Pav.) Oken	FES	-	-	-
C. americana L.	FES, FED	-	-	-
C. anabaptista Cham.	FOD	-	-	-
C. candida Vell.	FES	-	-	-
C. corchorifolia A.DC.	?	-	-	-
C. dichotoma G.Forst.	FOD, FOM	-	-	-
C. ecalyculata Vell.*	FOD, FES	-	-	-
C. gardneri I.M.Johnst.	?	-	-	-
C. glabrata Cham.	FES, FED	-	-	-
C. glazioviana (Taub.) Gottschling & J.S.Mill.	FOD	-	-	-
C. hatschbachii J.S.Mill.	FOD, FES	-	-	-
C. incognita Gottschling & J.S.Mill.	FED	-	-	-
C. latiloba I.M.Johnst.*	FOD	-	-	-
C. magnoliifolia Cham.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
C. nodosa Lam.	FOD, FES	-	-	-
C. ochnacea DC.	FOD, RST	-	-	-
C. rufescens A.DC.	FOD, FES	-	-	-
C. sagotii I.M.Johnst.	FOD	-	-	-
C. sellowiana Cham.	FOD	-	-	-
C. sericicalyx A.DC.	FOD	-	-	-
C. silvestris Fresen.*	FOD	-	-	-
C. superba Cham.	FOD, FES	-	-	-
C. taguahyensis Vell.	FOD	-	-	-
C. toqueve Aubl.	FOD	-	-	-
C. trachyphylla Cham.	FOD, FCA	-	-	-
C. trichoclada DC.	FOD, FES	-	-	-
C. trichotoma (Vell.) Arráb. *ex* Steud.	FES, FED	-	-	-
Varronia – 11/90				
V. curassavica Jacq.	FOD	-	-	-
V. discolor Cham.	FOD, RST	-	-	-
V. guaranitica (Chodat & Hassl.) J.S.Mill.	?	-	-	-
V. guazumifolia Desv.	FOD	-	-	-
V. leucomalla Taub.*	FOD	-	-	-
V. longifolia A.DC.*	FOD	-	-	-
V. multispicata Cham.	FOD	-	-	-
V. paucidentata Fresen.	FOD	-	-	-
V. poliophylla Fresen.*	FOD	-	-	-
V. polycephala (Lam.) I.M.Johnst.	FOD, RUD	-	-	-
V. urticifolia (Cham.) J.S.Mill.	FOD	-	-	-

Costaceae

João Marcelo Alvarenga Braga

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
COSTACEAE –5/ca. 80				
Chamaecostus – 2/7				
C. cuspidatus (Nees & Mart.) C.Specht & D.W.Stev.	FOD, FES	-	EN	ANEXO I
C. subsessilis (Nees & Mart.) C.Specht & D.W.Stev.	FOD, FES	-	-	-
Costus – 3/ca. 55				
C. arabicus L.	FOD, FES, RST	-	-	-
C. scaber Ruiz & Pav.	FOD, FES	-	-	-
C. spiralis (Jacq.) Roscoe	FOD, FES, RST	-	-	-

Crassulaceae

Marcos Sobral

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
CRASSULACEAE – 3/1370				
Crassula – 1/195				
C. peduncularis (Sm.) Meigen	FCA, RST	-	-	-
Kalanchoe – 2/145				
K. delagoensis Eckl. & Zeyh.	FCA, RST, RUD	-	-	-
K. pinnata (Lam.) Pers.	FCA, RST, RUD	-	-	-

Cucurbitaceae

Vera Lúcia Gomes Klein & Jarênio Rafael Ozeas de Santana

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
CUCURBITACEAE – 80/ca. 850				
Apodanthera – 9/15				
A. argentea Cogn.*	FOD, FES	-	-	-
A. catharinensis Mart.Crov.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
A. congestiflora Cogn.*	FOD, FES	-	-	-
A. fasciculata Cogn.*	FOD, FES	-	-	-
A. glaziovii Cogn.*	FOD, FES	-	-	-
A. hatschbachii C.Jeffrey*	FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
A. laciniosa Cogn.	FOD, FOM, FES	-	-	-
A. sagittifolia (Griseb.) Mart.Crov.	FOM, FES	-	-	-
A. ulei (Cogn.) Mart.Crov.*	FOM, FES	-	-	-
Cayaponia – 27/60				
C. alarici M.L.Porto*	FOD, FOM, FES	-	-	-
C. bonariensis (Mill.) Mart.Crov.	FOM, FES	-	-	-
C. cabocla Mart.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
C. cogniauxiana Gomes-Klein*	FOD, FES	-	-	-
C. diversifolia (Cogn.) Cogn.	FOD, FES, FED	-	-	-
C. espelina (Silva Manso) Cogn.	FOD, FES, FED	-	-	-
C. floribunda (Cogn.) Cogn.*	FOD, FES, FED	-	-	-
C. fluminensis (Vell.) Cogn.*	FOD, FES, FED	-	-	-
C. glandulosa (Poepp. & Endl.) Cogn.	FES, FED	-	-	-
C. jenmanii C.Jeffrey	FOD, FES	-	-	-
C. latiloba (Cogn.) Gomes-Klein*	FOD	-	-	-
C. longifolia Cogn.*	FOD, FES	-	-	-
C. martiana (Cogn.) Cogn.	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
C. membranacea Gomes-Klein*	FOD, FOM	-	-	-
C. nitida Gomes-Klein*	FOD	-	-	-
C. palmata Cogn.*	FOM, FES	-	-	-
C. pedata Cogn.*	FOD, FES	-	-	-
C. petiolulata Cogn.*	FOD	-	-	-
C. pilosa (Vell.) Cogn.	FOD, FOM, FES	-	-	-
C. podantha Cogn.	FOM, FES, FED	-	-	-
C. tayuya (Vell.) Cogn.	FOD, FES, FED	-	-	-
C. ternata (Vell.) Cogn.*	FOD, FES	-	-	-
C. trifoliolata (Cogn.) Cogn.*	FOD, FES	-	-	-
C. trilobata (Cogn.) Cogn.	FOD, FOM, FES	-	-	-
C. tubulosa Cogn.	FOD	-	-	-
C. villosissima Cogn.*	FOD, FES	-	-	-
C. weddellii (Naudin) Gomes-Klein	FES, FED	-	-	-
Ceratosanthes – 4/4				
C. hilariana Cogn.	FES, FED	-	-	-
C. multiloba Cogn.	FOD, FES, FED	-	-	-
C. tomentosa Cogn.	FOD, FES, FED	-	-	-
C. warmingii Cogn.	FOD, FES, FED	-	-	-
Cyclanthera – 8/25				
C. brasiliensis Cogn.*	FOD, FES, FED	-	-	-
C. eichleri Cogn.*	FOD, FES	-	-	-
C. elegans Cogn.	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
C. kuhlmanniana Toledo*	FOD	-	-	-
C. pedata (L.) Schrad.	FES	-	-	-
C. tenuisepala Cogn.	FOM	-	-	-
C. ternuifolia Cogn.*	FOM	-	-	-
C. trigonoloba Toledo*	FOD, FES	-	-	-
Echinopepon – 1/18				

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
E. racemosus (Steud.) C.Jeffrey	FOD, FES, FED	-	-	-
Fevillea – 3/7				
F. bahiensis G.Robinson & Wunderlin*	FOD	-	-	-
F. passiflora Vell.	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
F. trilobata L.	FOD, FES, FED	-	-	-
Gurania – 7/35				
G. acuminata Cogn.	FOD	-	-	-
G. malacophylla Barb.Rodr.	FOD, FES	-	-	-
G. multiflora (Miq.) Cogn.	FOD, FES	-	-	-
G. ovata Cogn.*	FOD	-	-	-
G. speciosa (Poepp. & Endl.) Cogn.	FOD	-	-	-
G. subumbellata (Miq.) Cogn.	FOD	-	-	-
G. tricuspidata Cogn.	FOD	-	-	-
Lagenaria – 2/6				
L. siceraria (Molina) Standl.	FOD, FES	-	-	-
L. sphaerica (Sond.) Naud.	FOD	-	-	-
Luffa – 2/7				
L. cylindrica (L.) Roem.	FOD, FES, FED	-	-	-
L. operculata (L.) Cogn.	FOD, FES, FED	-	-	-
Melancium – 1/1				
M. campestre Naudin	FES	-	-	-
Melothria – 5/10				
M. cucumis Vell.	FOD, FOM, FES	-	-	-
M. hirsuta Cogn.	FES	-	-	-
M. pendula L.	FOD, FOM, FES	-	-	
M. uliginosa Cogn.	FOM, FES	-	-	-
M. warmingii Cogn.	FOD, FES	-	-	-
Melothrianthus – 1/1				
M. smilacifolius (Cogn.) Mart.Crov.	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
Momordica – 1/47				
M. charantia L.	FOD, FES, FED	-	-	-
Psiguria – 1/12				
P. ternata (M.Roem.) C.Jeffrey	FOD, FES, FED	-	-	-
Rytidostylis – 1/5				
R. amazonica (Mart. *ex* Cogn.) Kuntze	FOD	-	-	-
Sicydium – 1/6				
S. gracile Cogn.	FOD, FES	-	-	-
Sicyos – 1/40				
S. polyacanthos Cogn.	FOD, FES, FED	-	-	-
Siolmatra – 1/2				
S. brasiliensis (Cogn.) Baill.	FES, FED	-	-	-
Wilbrandia – 4/4				
W. ebracteata Cogn.	FOD, FOM, FES	-	-	-
W. hibiscoides Silva Manso	FOD, FOM, FES	-	-	-
W. longisepala Cogn.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
W. verticillata (Vell.) Cogn.	FOD, FES	-	-	-

Cunoniaceae

Carmen Sílvia Zickel

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
CUNONIACEAE – 9/350				
Lamanonia – 4/5				
L. brasiliensis Zickel & Leitão Filho	FES	-	-	-
L. chabertii (Pamp.) L.B.Sm.*	FOD	-	-	-
L. cuneata (Cambess.) Kuntze*	FOD, FES	-	-	-
L. ternata Vell.	FOD, FES,FED, RST	-	-	-
Weinmannia – 5/6				
W. discolor Gardner*	FOD	-	-	-
W. humilis Engl.*	AFL, FOD	-	-	-
W. organensis Gardner*	FOD	-	-	-
W. paulliniifolia Pohl *ex* Seringe*	FOD, RST	-	-	-
W. pinnata L.*	FOD, RST	-	-	-

Cyclanthaceae

Paula Moraes Leitman & Eduardo da Silva Leal

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
CYCLANTHACEAE – 10/235				
Asplundia – 7/105				
A. brachypus (Drude) Harling*	FOD	-	-	-
A. gardneri (Hook.) Harling	FOD, FES	-	-	-
A. glaucophylla Harling*	FOD	-	-	-
A. maximiliani Harling*	FOD	-	-	-
A. polymera (Hand.-Mazz.) Harling*	FOD	-	-	-
A. rivularis (Lindm.) Harling*	FOD	-	-	-
A. tetragonopus (Mart. *ex* Drude) Harling*	FOD	-	-	-
Evodianthus – 1/1				
E. funifer (Poit.) Lindm.	FOD	-	-	-
Stelestylis – 1/4				
S. coriacea Drude*	FOD	-	-	-
Thoracocarpus – 1/1				
T. bissectus (Vell.) Harling	FOD, RST	-	-	-

Cymodoceaceae

Flávio Dayrell Gontijo

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
CYMODOCEACEAE – 1/16				
Halodule – 1/7				
H. emarginata Hartog	FAQ	-	-	-

Cyperaceae

Marccus Alves & Ana Cláudia Araújo

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
CYPERACEAE – 156/4000				
Abildgaardia – 1/15				
A. baeothryon A.St.-Hil.	FOD, FOM, RST	-	-	-
Becquerelia – 4/8				
B. clarkei T.Koyama*	FOD, FOM	-	-	-
B. cymosa Brongn.	FOD, FOM	-	-	-
B. merkeliana Nees	FOD, FOM	-	-	-
B. muricata Nees	FOD, FOM	-	-	-
Bulbostylis – 5/203				
B. capillaris (L.) C.B.Clarke	AFL, FOD, FOM	-	-	-
B. lanata (Kunth) Lindm.	FOD, FOM	-	-	-
B. scabra (J. Presl & C. Presl) C.B.Clarke	FOD, FOM	-	-	-
B. truncata (Nees) M.Strong	FOD, FOM	-	-	-
B. vestita (Kunth) C.B.Clarke	AFL, FOD, FOM	-	-	-
Calyptrocarya – 1/8				
C. glomerulata (Brongn.) Urb.	FOD, FOM	-	-	-
Carex – 7/1800				
C. albolutescens Schwein.	FOD, FOM	-	-	-
C. bonariensis Desf. *ex* Poir.	FOD, FOM	-	-	-
C. brasiliensis A.St.-Hil.	FCA, FOM	-	-	-
C. fuscula d'Urv.	FOD, FOM	-	-	-
C. longhi Mackenz.	FOD, FOM	-	-	-
C. pseudocyperus L.	FCA, FOD, FOM	-	-	-
C. vixdentata (Kük. *ex* Osten) G.A.Wheeler	FOD, FOM	-	-	-
Cryptangium – 2/25				
C. polyphyllum (Nees) Boeckeler*	AFL, FOD, FOM	-	-	-
C. triquetum Boeckeler	AFL, FOD, FOM	-	-	-
Cyperus – 20/700				
C. aggregatus (Willd.) Endl.	FOM	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
C. andreanus Maury*	FOD, FOM	-	-	-
C. articulatus L.	FCA, FOM	-	-	-
C. burkartii Guaglianone	FOD, FOM	-	-	-
C. chalaranthus J.Presl & C.Presl	FOD, FOM	-	-	-
C. consors C.B.Clarke	FOD, FOM	-	-	-
C. coriifolius Boeckeler	FOD, FOM	-	-	-
C. dichromeniformis Kunth*	FOD, FOM	-	-	-
C. difformis L.	FOM	-	-	-
C. entrerianus Boeckeler	FOD, FOM	-	-	-
C. friburgensis Boeckeler*	FOD, FOM	-	-	-
C. haspan L.	FCA, FOM	-	-	-
C. laxus Lam.	FOM	-	-	-
C. ligularis L.	FOM, RST	-	-	-
C. luzulae (L.) Retz.	FOM, RST	-	-	-
C. meyenianus Kunth	FOD, FOM	-	-	-
C. muniziae G.C.Tucker	FOD, FOM	-	-	-
C. odoratus L.	FOM	-	-	-
C. simplex Kunth	FOD, FOM	-	-	-
C. virens Michx.	FOD, FOM	-	-	-
Diplacrum – 1/8				
D. capitatum (Willd.) Boeckeler	FOD, FOM	-	-	-
Eleocharis – 7/260				
E. acutangula (Roxb.) Schult.	FOD, FOM	-	-	-
E. confervoides (Poir.) Miq.	FOM	-	-	-
E. elegans (Kunth) Roem. & Schult.	FOM	-	-	-
E. filiculmis Kunth	FOM	-	-	-
E. flavescens (Poir.) Urb.	FOM	-	-	-
E. geniculata (L.) Roem. & Schult.	FCA, FOM	-	-	-
E. mutata (L.) Roem. & Schult.	FOM	-	-	-
Fimbristylis – 5/303				
F. autumnalis (L.) Roem. & Schult.	FCA, FOM	-	-	-
F. cymosa R.Br.	AFL, FCA, FOM, RST	-	-	-
F. dichotoma (L.) Vahl	FCA, FOM, RST	-	-	-
F. miliacea (L.) Vahl	FCA, FOM	-	-	-
F. spadicea (L.) Vahl	FCA, FOM	-	-	-
Fuirena – 3/60				
F. incompleta Nees	FCA	-	-	-
F. robusta Kunth	FCA, FOM	-	-	-
F. umbellata Rottb.	FCA, FOM	-	-	-
Hypolytrum – 11/60				
H. amorimii M.Alves & W.W.Thomas*	FOD, FOM	-	VU	ANEXO II
H. bahiense M.Alves & W.W.Thomas*	FOD, FOM	-	VU	ANEXO II
H. bullatum C.B.Clarke*	FOD, FOM	-	-	-
H. espiritosantense M.Alves & W.W.Thomas*	FOD, FOM	-	-	-
H. glaziovii Boeckeler*	FOD, FOM	-	-	-
H. glomeratum M.Alves & W.W.Thomas	FOD, FOM	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
H. jardimii M.Alves & W.W.Thomas	FOD, FOM	-	-	-
H. lucennoi M.Alves & W.W.Thomas	FOD, FOM	-	EN	ANEXO II
H. pulchrum (Rudge) H. Pfeiff.	RST	-	-	-
H. schraderianum Nees	FOD, FOM	-	-	-
H. verticillatum T.Koyama	FOD, FOM	-	-	-
Kyllinga – 1/75				
K. vaginata Lam.	FCA, FOM	-	-	-
Lagenocarpus – 4/20				
L. guianensis Lindl. *ex* Nees	FOM	-	-	-
L. rigidus Nees	AFL, FOM, RST	-	-	-
L. subaphyllus T.Koyama*	AFL, FOD, FOM	-	-	-
L. verticillatus (Spreng.) T. Koyama & Maguire	FOM, RST	-	-	-
Lipocarpha – 1/36				
L. micrantha (Vahl) G.C.Tucker	FCA, FOM, RST	-	-	-
Machaerina – 3/50				
M. austrobrasiliensis M.T.Strong*	FOD, FOM	-	-	-
M. ensifolia (Boeckeler) T.Koyama*	FOD, FOM	-	-	-
M. ficticia (Hemsley) T.Koyama*	FCA, FOD, FOM	-	-	-
Oxycaryum – 1/1				
O. cubense (Poepp. & Kunth) Lye	FOM	-	-	-
Pleurostachys – 13/30				
P. angustifolia Boeckeler*	FOD, FOM	-	VU	ANEXO I
P. beyrichii (Nees) Steud.*	FOD, FOM	-	-	-
P. distichophylla (Boeckeler) C.B.Clarke*	FOD, FOM	-	-	-
P. foliosa Kunth*	FOD, FOM	-	-	-
P. gaudichaudii Brongn.*	FOD, FOM	-	-	-
P. graminifolia Brongn.*	FOD, FOM	-	-	-
P. macrantha Kunth*	FOD, FOM	-	-	-
P. orbignyana Brongn.*	FOD, FOM	-	-	-
P. puberula Boeckeler	FOD, FOM	-	-	-
P. regnellii C.B.Clarke*	FOD, FOM	-	-	-
P. stricta Kunth*	FOD, FOM	-	-	-
P. tenuiflora Brongn.*	FOD, FOM	-	-	-
P. urvillei Brongn.*	FOD, FOM	-	-	-
Pycreus – 4/120				
P. decumbens T.Koyama	FOM	-	-	-
P. lanceolatus (Poir.) C.B.Clarke	FOM	-	-	-
P. niger (Ruiz & Pav.) Cufod.	FOD, FOM	-	-	-
P. piceus Liebm.	FOD, FOM	-	-	-
Rhynchospora – 29/360				
R. asperula (Nees) Steud.	FOD, FOM	-	-	-
R. barrosiana Guaglianone	FOD, FOM	-	-	-
R. biflora Boeckeler	FOD, FOM	-	-	-
R. breviuscula H.Pfeiff.	FOD, FOM	-	-	-
R. brittonii Gale	FOD, FOM	-	-	-
R. cephalotes (L.) Vahl	FOD, FOM	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
R. ciliata Kük.	FOD, FOM	-	-	-
R. coriifolia Boeckeler	FOD, FOM	-	-	-
R. comata (Link) Roem. & Schult.	FOD, FOM	-	-	-
R. contracta (Nees) Raynal	FCA, FOD, FOM	-	-	-
R. corymbosa (L.) Britt.	FOD, FOM	-	-	-
R. cryptantha C.B.Clarke	FOD, FOM	-	-	-
R. exaltata Kunth	FOD, FOM	-	-	-
R. floribunda Boeckeler	FOD, FOM	-	-	-
R. gigantea Link	FOD, FOM	-	-	-
R. holoschoenoides (L.C.Rich.) Herter	FCA, FOD, FOM	-	-	-
R. microcarpa Baldw.	FOD, FOM	-	-	-
R. nervosa (Vahl) Boeckeler	FOM	-	-	-
R. polyantha Steud.	FOD, FOM	-	-	-
R. pubera (Vahl) Boeckeler	FOD, FOM	-	-	-
R. radicans (Schlech. & Cham.) H.Pfeiff.	FOD, FOM	-	-	-
R. sampaioana Gross	FOD, FOM	-	-	-
R. setigera Griseb.	AFL, FOD, FOM	-	-	-
R. splendens Lindm.	FOD, FOM	-	-	-
R. stenocarpa Kunth	FOD, FOM	-	-	-
R. subsetosa C.B.Clarke	FOD, FOM	-	-	-
R. tenuis Link	FOD, FOM	-	-	-
R. uniflora Boeckeler	FOD, FOM	-	-	-
R. velutina (Kunth) Boeckeler*	FOD, FOM	-	-	-
Schoenoplectus – 4/77				
S. americanus (Pers.) Volkart *ex* Schinz & R.Keller	RST	-	-	-
S. californicus (C.A.Mey.) Soják	RST	-	-	-
S. supinus (L.) Palla	RST	-	-	-
S. tabernaemontani (C.C.Gmel.) Palla	RST	-	-	-
Schoenus – 1/110				
S. lymansmithii M.T.Strong*	FOD, FOM, FCA	-	-	-
Scleria – 30/270				
S. acanthocarpa Boeckeler*	FOD, FOM	-	-	-
S. alpina Core*	FOD, FOM	-	-	-
S. bracteata Cav.	FOM, RST	-	-	-
S. bradei Pilg.*	FOD, FOM	-	-	-
S. castanea Core*	FOD, FOM	-	-	-
S. cyperina Wild. *ex* Kunth	FOD, FOM	-	-	-
S. distans Poir.	FCA, FOD, FOM	-	-	-
S. filiculmis Boeckeler	FOD, FOM	-	-	-
S. georgiana Core*	FOD	-	-	-
S. hirtella Sw.	FCA, FOM	-	-	-
S. latifolia Sw.	FOM	-	-	-
S. leptostachya Kunth	FOM	-	-	-
S. macrophylla J. Presl & C. Presl	FOD, FOM	-	-	-
S. melaleuca Rchb. *ex* Schltdl. & Cham.	FOD, FOM	-	-	-
S. mexicana (Liebm.) Boeckeler	FOD, FOM	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
S. microcarpa Nees *ex* Kunth	FOD, FOM	-	-	-
S. millespicula T.Koyama*	FOD, FOM	-	-	-
S. mitis P.J.Bergius	FOD, FOM	-	-	-
S. myricocarpa Kunth*	FOD, FOM	-	-	-
S. panicoides Kunth	AFL, FOD, FOM, RST	-	-	-
S. pernambucana Luceño & M.Alves*	FOD, FOM	-	-	-
S. plusiophylla Steud.	FOD	-	-	-
S. reticularis Michx. *ex* Willd.*	FOD, FOM	-	-	-
S. scabra Willd.	FOD	-	-	-
S. secans (L.) Urb.	FOD, FOM	-	-	-
S. spicata (Spreng.) J.F.Macbr.	FOD, FOM	-	-	-
S. uleana Boeckeler *ex* C.B.Clarke*	FOD, FOM	-	-	-
S. vaginata Steud.*	FOD, FOM	-	-	-
S. variegata (Nees) Steud.*	FOD, FOM	-	-	-
S. virgata (Nees) Steud.*	FOD, FOM	-	-	-
Trilepis – 4/7				
T. ciliatifolia T.Koyama*	AFL	-	-	-
T. lhotzkiana Nees *ex* Arn.	AFL	-	-	-
T. microstachya (C.B.Clarke) H.Pfeiff.*	AFL	-	-	-
T. tenuis Vitta*	AFL	-	VU	ANEXO II

Dichapetalaceae

Flávio Dayrell Gontijo

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
DICHAPETALACEAE – 8/50				
Stephanopodium – 6/10				
S. blanchetianum Baill.*	FOD	-	-	-
S. engleri Baill.*	FES	-	-	-
S. estrellense Baill.*	FOD	-	-	-
S. magnifolium Prance*	FOD	VU	-	-
S. organense Prance*	FOD	-	-	-
S. sessile Rizzini*	FOD	-	-	-
Tapura – 2/25				
T. follii Prance*	FOD	-	-	-
T. wurdackiana Prance*	FOD	-	-	-

Dilleniaceae

Claudio Nicoletti de Fraga

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
DILLENIACEAE – 35/123				
Curatella – 1/1				
C. americana L.	FOM, RST	-	-	-
Davilla – 17/30				
D. angustifolia A.St.-Hil.	FES	-	-	-
D. bahiana Aymard*	FOD	-	-	-
D. bilobata Aymard*	FOM	-	-	-
D. cearensis J.Huber	FOD, RST	-	-	-
D. flexuosa A.St.-Hil.*	FOD, RST	-	-	-
D. glabrata Mart. *ex* Eichler*	FES	-	-	-
D. glaziovii Eichler*	FOD	-	CR	ANEXO I
D. grandifolia Moric. *ex* Eichler*	FOD	-	-	-
D. kunthii A.St.-Hil.	FOD, FOM, FES	-	-	-
D. latifolia Casar*	FES	-	-	-
D. macrocarpa Eichler*	FOM, RST	-	-	-
D. morii Aymard*	FOM	-	VU	ANEXO II
D. nitida (Vauh) Kubitzki	FOD, FOM, FES	-	-	-
D. papyracea Aymard*	FES	-	-	-
D. rugosa Poir.	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
D. sellowiana Schltdl.*	FOD	-	-	-
D. sessilifolia Fraga*	FOM, RST	-	-	-
Doliocarpus – 10/48				
D. dentatus Standl.	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
D. glomeratus Eichler*	FOM	-	-	-
D. grandiflorus Eichler*	FOM	-	-	-
D. lancifolius Kubitzki*	FOM	-	-	-
D. lombardii Aymard*	FOM	-	-	-
D. major J.F.Gmel.	RST	-	-	-
D. schottianus Eichler*	FES	-	-	-
D. sellowianus Eichler*	FOM, RST	-	-	-
D. sessiliflorus Mart.*	RST	-	-	-
D. validus Kubitzki*	FOM, RST	-	-	-
Tetracera –7/44				
T. boomii Aymard*	FOM, RST	-	-	-
T. breyniana Schltdl.*	RST	-	-	-
T. forzzae Fraga & Aymard*	FES	-	-	-
T. lasiocarpa Eichler*	FOD, RST	-	-	-
T. oblongata DC.*	RST	-	-	-
T. sellowiana Schltdl.*	RST	-	-	-
T. willdenowiana Steud.	RST	-	-	-

Dioscoreaceae

Mizué Kirizawa & Cecília Carmen Xifreda

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
DIOSCOREACEAE – 49/ca. 900				
Dioscorea – 49/ca. 630				
D. altissima Lam.	FOD, RST	-	-	-
D. amaranthoides C.Presl	FOD, FES	-	-	-
D. bradei R.Knuth*	FOD	-	-	-
D. bulbotricha Hand.-Mazz.	FOD	-	-	-
D. campestris Griseb.	FOD, FES	-	-	-
D. ceratandra R.Knuth	FOD, RST	-	-	-
D. cinnamomifolia Hook.	RST	-	-	-
D. coronata Hauman	FOD	-	-	-
D. debilis Uline *ex* R.Knuth*	FOD, FCA	-	-	-
D. demourae Uline *ex* R.Knuth	FOD	-	-	-
D. dodecaneura Vell.	FOD	-	-	-
D. fodinarum Kunth	FOD, RST	-	-	-
D. furcata Griseb.	FOD, FCA	-	-	-
D. glandulosa (Griseb.) Klotzsch *ex* Kunth	FOD, AFL, RST	-	-	-
D. grandiflora Mart. *ex* Griseb.	FES	-	-	-
D. grisebachii Kunth	FOD	-	-	-
D. hassleriana Chodat & Hassl.	FED, FES	-	-	-
D. kunthiana Uline *ex* R.Knuth	FOD	-	-	-
D. laxiflora Mart. *ex* Griseb.	FOD, FES	-	-	-
D. leptostachya Gardner	FOD, FES RST	-	-	-
D. loefgrenii R.Knuth	FES	-	-	-
D. mantiqueirensis R.Knuth	FOD	-	-	-
D. margarethia G.Barroso *et al.**	FOD	-	-	-
D. marginata Griseb.	FOD, FES	-	-	-
D. martiana Griseb.	FOD, RST	-	-	-
D. mollis Kunth	FOD, RST	-	-	-
D. monadelpha (Kunth) Griseb.	FOD	-	-	-
D. multiflora Mart. *ex* Griseb.	FOD, FES	-	-	-
D. multispicata R.Knuth	FOD FES	-	-	-
D. olfersiana Klotzsch *ex* Griseb.	FOD, RST	-	-	-
D. ovata Vell.	FOD	-	-	-
D. perdicum Taub.*	FOD	-	-	-
D. piperifolia Humb. & Bonpl. *ex* Willd.	FOD, FED	-	-	-
D. planistipulosa Uline *ex* R.Knuth	FOD	-	-	-
D. plantaginifolia R.Knuth*	FOD	-	-	-
D. polygonoides Humb. & Bonpl. *ex* Willd.	FOD	-	-	-
D. pseudomacrocapsa G.Barroso *et al.*	FOD	-	-	-
D. pumilio Griseb.	FOD	-	-	-
D. regnellii Uline *ex* R.Knuth	FOD	-	-	-
D. rumicoides Griseb.*	FOD, FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
D. sanpaulensis R.Knuth	FOD	-	-	-
D. sinuata Vell.	FOD	-	-	-
D. stegelmanniana R.Knuth	FOD	-	-	-
D. subhastata Vell.	FOD, FED	-	-	-
D. tauriglossum R.Knuth	FOD FED	-	-	-
D. therezopolensis Uline *ex* R.Knuth	FOD	-	-	-
D. torticaulis R.Knuth*	FOD	-	-	-
D. trilinguis Griseb.	FOD	-	-	-
D. trisecta Griseb.	FOD	-	-	-

Droseraceae

Tania Regina dos Santos Silva

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
DROSERACEAE – 8/ca. 120				
Drosera – 8/120				
D. brevifolia Pursh	RST	-	-	-
D. capillaris Poir.	RST	-	-	-
D. chrysolepis Taub.	RST	-	-	-
D. communis A.St.-Hil.	FOD	-	-	-
D. intermedia Dreves & Hayne	RST	-	-	-
D. montana A.St.-Hil.	FOD	-	-	-
D. villosa A.St.-Hil.	FOD	-	-	-
D. viridis F.Rivadavia*	FOD	-	-	-

Ebenaceae

Matheus Fortes Santos & Paulo Takeo Sano

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
EBENACEAE – 14/548				
Diospyros – 14/>500				
D. amabi B.Walln.*	FOD	-	-	-
D. apeibacarpus Raddi*	FOD, RST	-	-	-
D. brasiliensis Mart.*	FOD	-	-	-
D. capraeifolia Mart.	FOD	-	-	-
D. duartei Cavalcante*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
D. gaultheriifolia Mart.*	FES, RST	-	-	-
D. hispida A.DC.	FES, FED, FCA	-	-	-
D. inconstans Jacq.	FES, FED, FCA, RST	-	-	-
D. ketun B.Walln.	FES	-	-	-
D. mexiae Standl.*	FES	-	-	-
D. riedelii (Hiern) B.Walln.*	FOD	-	-	-
D. scott-morii B.Walln.*	FOD	-	-	-
D. serrana Sothers*	FES	-	-	-
D. ubaita B.Walln.*	FOD	-	-	-

Elaeocarpaceae

Marcus Alberto Nadruz Coelho & Daniela Sampaio

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
ELAEOCARPACEAE – 11/ca. 500				
Crinodendron – 1/1				
C. brasiliense Reitz & L.B.Sm.	FOM	-	-	-
Sloanea –10/120				
S. eichleri K.Schum.	FOD	-	-	-
S. garckeana K.Schum.	FOD, FES	-	-	-
S. guianensis (Aubl.) Benth.	FOD, FES, RST	-	-	-
S. hirsuta (Schott) Planch *ex* Benth.	FOD, FES, RST, FED	-	-	-
S. lasiocoma K.Schum	FES, FOM, FOD	-	-	-
S. obtusa (Splitg.) K.Schum.	MAN	-	-	-
S. obtusifolia (Moric.) K.Schum.*	FOD, FES	-	-	-
S. pubescens Benth.	FOD, FES	-	-	-
S. retusa (Schum.) Uitt.*	FOD, FES	-	-	-
S. stipitata Spruce *ex* Benth.	FOD, FES	-	-	-

Elatinaceae

Marcos Sobral

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
ELATINACEAE – 2/35				
Elatine – 2/10				
E. lindbergii Rohrb.	FAQ	-	-	-
E. triandra Schkur	FAQ	-	-	-

Ericaceae

Gerson Oliveira Romão

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
ERICACEAE – 48/ca.4000				
Agarista – 15/29				
A. chlorantha (Cham.) G.Don	AFL	-	-	-
A. coriifolia (Thunb.) Hook. *ex* Nied.	AFL	-	-	-
A. eucalyptoides (Cham. & Schltdl.) G.Don	AFL	-	-	-
A. hispidula (DC.) J.D.Hook. *ex* Nied.	AFL	-	-	-
A. minensis (Glaz. *ex* Sleumer) Judd*	AFL	-	-	-
A. nierdeleinii (Sleumer) Judd*	AFL	-	-	-
A. nummularia (Cham. & Schltdl.) G.Don*	AFL	-	-	-
A. oleifolia (Cham.) G.Don	AFL	-	-	-
A. organensis (Gardner) Hook. *ex* Nied.*	AFL	-	-	-
A. paraguayensis (Sleumer) Judd*	AFL	-	-	-
A. pulchella Cham. *ex* G.Don*	AFL	-	-	-
A. pulchra (Cham. & Schltdl.) G.Don	AFL	-	-	-
A. revoluta (Spreng.) Hook. *ex* Nied.*	RST	-	-	-
A. subrotunda (Pohl) G.Don*	AFL	-	-	-
A. uleana (Sleumer) Judd*	AFL, RST	-	-	-
Gaultheria – 7/37				
G. bradeana Sleumer*	AFL	-	-	-
G. eriophylla (Pers.) Sleumer *ex* Burtt	AFL	-	-	-
G. itatiaiea Wawra*	AFL	-	-	-
G. myrtilloides Cham. & Schltdl.*	AFL	-	-	-
G. serrata (Vell.) Sleumer *ex* Kin.-Gouv.*	AFL	-	-	-
G. sleumeriana Kin.-Gouv.*	AFL	-	-	-
G. ulei Sleumer*	AFL	-	-	-
Gaylussacia – 26/52				
G. amoena Cham.*	AFL	-	-	-
G. angulata Gardner*	AFL	-	VU	ANEXO II
G. angustifolia Cham.*	AFL	-	-	-
G. arassatubensis R.R.Silva & Cervi*	AFL	-	-	-
G. brasiliensis (Spreng.) Meisn.	AFL, RST	-	-	-
G. caparoensis Sleumer*	AFL	-	VU	ANEXO II
G. caratuvensis R.R.Silva & Cervi*	AFL	-	-	-
G. chamissonis Meisn.	AFL, FCA	-	-	-
G. corvensis R.R.Silva & Cervi*	AFL	-	-	-
G. decipiens Cham.*	AFL	-	-	-
G. densa Cham.	AFL	-	-	-
G. fasciculata Gardner*	AFL	-	-	-
G. incana Cham.	AFL	-	-	-
G. jordanensis Sleumer*	AFL	-	-	-
G. montana (Pohl) Sleumer	AFL	-	-	-
G. pallida Cham.	AFL	-	-	-
G. pinifolia Cham.	AFL	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
G. pruinosa Loes.*	AFL	-	VU	ANEXO II
G. pseudogaultheria Cham. & Schltdl.*	FCA	-	-	-
G. pulchra Pohl	AFL	-	-	-
G. reticulata Mart. *ex* Meisn.	AFL	-	-	-
G. rhododendron Cham. & Schltdl.*	FOM, FCA	-	-	-
G. rigida Casaretto*	AFL	-	-	-
G. rugosa Cham. & Schltdl.	AFL	-	-	-
G. salicifolia Sleumer	AFL	-	-	-
G. setosa Kin.-Gouv.*	AFL	-	VU	ANEXO II

Eriocaulaceae

Paulo Takeo Sano, Lívia Echternacht, Marcelo Trovó & Ana Maria Giulietti Harley

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
ERIOCAULACEAE – 169/ca. 1010				
Actinocephalus – 5/31				
A. bongardii (A.St-Hil.) Sano	FCA	-	-	-
A. callophyllus (Silveira) Sano*	FCA	-	-	-
A. falcifolius (Körn.) Sano*	FCA	-	-	-
A. ithyphyllus (Mart.) Sano*	FCA	-	-	-
A. ochrocephalus (Körn.) Sano	FCA, RST	-	-	-
Blastocaulon – 2/5				
B. prostratum (Körn.) Ruhland	FCA	-	-	-
B. scirpeum (Mart.) Giul.	FCA	-	-	-
Eriocaulon – 24/ca. 400				
E. arechevaletae Herter	FCA	-	-	-
E. argentinum Castell*	FCA	-	-	-
E. beauverdii Moldenke*	FCA	-	-	-
E. crassiscapum Bong.	FCA	-	-	-
E. dictyophyllum Körn.*	FCA	-	-	-
E. elychrysoides Bong.	FCA	-	-	-
E. gomphrenoides Kunth	FCA	-	-	-
E. kunthii Kunth	FCA	-	-	-
E. leptophyllum Kunth*	FCA	-	-	-
E. ligulatum (Vell.) L.B.Sm.	FCA, RST	-	-	-
E. longirostrum Silveira	FCA	-	-	-
E. magnificum Ruhland*	FCA	-	-	-
E. majusculum Ruhland*	FCA, AFL	-	-	-
E. melanocephalum Kunth	FCA	-	-	-
E. missionum A.Cast.	FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
E. modestum Kunth	FCA, RST	-	-	-
E. obtusum Ruhland*	FCA	-	-	-
E. palustre Salzm.*	FCA	-	-	-
E. reitzii Moldenke & L.B.Sm.*	FCA	-	-	-
E. sellowianum Kunth.	FCA	-	-	-
E. setaceum L.	FCA	-	-	-
E. spongiosifolium Silveira*	FCA	-	-	-
E. ulaei Ruhland*	FCA	-	-	-
E. vaginatum Körn.	FCA	-	-	-
Leiothrix – 16/ca. 50				
L. argyroderma Ruhland*	AFL	-	-	-
L. arrecta Ruhland	FCA	-	-	-
L. beckii (Szysz.) Ruhland*	AFL	-	-	-
L. crassifolia (Bong.) Ruhland	FCA	-	-	-
L. curvifolia (Bong.) Ruhland	FCA	-	-	-
L. flagellaris (Guillemin) Ruhland	FCA	-	-	-
L. flavescens (Bong.) Ruhland	FCA	-	-	-
L. fluitans (Mart.) Ruhland	FCA	-	-	-
L. gomesii Silveira*	FCA	-	-	-
L. hirsuta (Wikstr.) Ruhland	RST	-	-	-
L. pilulifera (Körn.) Ruhland*	RST	-	-	-
L. prolifera (Bong.) Ruhland	FCA	-	-	-
L. propinqua (Körn.) Ruhland	FCA	-	-	-
L. rufula (A.St.-Hil.) Ruhland	RST	-	-	-
L. subulata Silveira	FCA	-	-	-
L. vivipara (Bong.) Ruhland	FCA	-	-	-
Paepalanthus – 91/ca. 500				
P. acantholimon Ruhland*	FCA	-	-	-
P. aequalis (Vell.) J.F.Macbr.	FCA	-	-	-
P. albo-ciliatus Silveira	FCA	-	-	-
P. albo-vaginatus Silveira*	FCA	-	-	-
P. amoenus (Bong.) Körn.*	FCA	-	-	-
P. argillicola Silveira*	FCA	-	-	-
P. balansae Ruhland*	FCA	-	-	-
P. batatalensis Silveira*	FCA	-	-	-
P. benedictii Silveira*	FCA	-	-	-
P. bifidus (Schrad.) Kunth	FCA, RST	-	-	-
P. blepharocnemis Mart. *ex* Körn.	FCA	-	-	-
P. bongardii Kunth	FCA	-	-	-
P. brachyphyllus Ruhland	FCA	-	-	-
P. brevicaulis Silveira*	FCA	-	-	-
P. cachambuensis Silveira*	FCA	-	-	-
P. caldensis Malme*	FCA	-	-	-
P. calvoides Ruhland*	FCA	-	-	-
P. calvus Körn.*	FCA	-	-	-
P. camptophyllus Ruhland*	FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
P. caparoensis Ruhland*	FCA	-	-	-
P. catharinae Ruhland*	FCA	-	-	-
P. cephalopus Silveira & Ruhland*	FCA	-	-	-
P. chloroblepharus Ruhland*	FCA	-	-	-
P. chloropus Silveira*	FCA	-	-	-
P. ciliolatus Ruhland*	FCA	-	-	-
P. conduplicatus Körn.*	FCA	-	-	-
P. corymbosus (Bong.) Kunth*	FCA	-	-	-
P. dianthoides Mart. *ex* Körn.	FCA	-	-	-
P. diplobetor Ruhland*	FCA	-	-	-
P. diversifolius Silveira*	FCA	-	-	-
P. dupatya Mart. *ex* Körn.*	FCA	-	-	-
P. elongatulus Ruhland	FCA	-	-	-
P. elongatus (Bong.) Körn.	FCA	-	-	-
P. euryphyllus Ruhland*	FCA	-	-	-
P. exiguus (Bong.) Körn.	FCA	-	-	-
P. fastigiatus (Bong.) Körn.*	FCA	-	-	-
P. flaccidus (Bong.) Kunth	FCA	-	-	-
P. freyreissii (Thunb.) Körn.*	FCA	-	-	-
P. garimpensis Silveira*	FCA	-	-	-
P. glabrifolius Ruhland*	FCA	-	-	-
P. globosus Ruhland	FCA	-	-	-
P. gomesii Silveira*	FCA	-	-	-
P. gracilipes Silveira*	FCA	-	-	-
P. henriquei Silveira & Ruhland*	FCA	-	-	-
P. heteropus Silveira*	FCA	-	-	-
P. hydra Ruhland	FCA	-	VU	ANEXO I
P. ibitipocencis Silveira*	FCA	-	-	-
P. itatiaiensis Ruhland*	FCA	-	-	-
P. jordanensis Silveira*	FCA	-	-	-
P. klotzschianus Körn.*	FCA, RST	-	-	-
P. lamarckii Kunth	FCA, RST	-	-	-
P. langsdorffii (Bong.) Körn.*	FCA	-	-	-
P. leiseringii Ruhland*	FCA	-	-	-
P. leucoblepharus Körn.*	FCA	-	-	-
P. linearifolius Silveira*	FCA	-	-	-
P. lundii Körn.	FCA	-	-	-
P. macahensis Körn.*	FCA	-	-	-
P. manicatus Pouls. *ex* Malme	FCA	-	-	-
P. melaleucus (Bong.) Kunth*	FCA	-	-	-
P. michaelii Silveira*	FCA	-	-	-
P. miser Ruhland*	FCA	-	-	-
P. moedensis Silveira*	FCA	-	-	-
P. mollis Kunth*	FCA	-	-	-
P. multicostatus Ruhland*	FCA	-	-	-
P. myocephalus (Mart.) Körn.	RST	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
P. oerstedianus Körn.*	FOD	-	-	-
P. orthoblepharus Silveira*	FCA	-	-	-
P. ovatus Körn.	FCA	-	-	-
P. pallidus Silveira*	FCA	-	-	-
P. paulensis Ruhland*	FCA	-	-	-
P. planifolius (Bong.) Körn.	FCA	-	-	-
P. plantagineus (Bong.) Körn.	FCA	-	-	-
P. pruinosus Ruhland*	FCA	-	-	-
P. pseudotortilis Ruhland*	FCA	-	-	-
P. pubescens Körn.	FCA	-	-	-
P. pulchellus Herzog	FCA, RST	-	-	-
P. saxatilis (Bong.) Körn.*	FCA	-	-	-
P. scleranthus Ruhland	FCA	-	-	-
P. silveirae Ruhland*	FCA	-	-	-
P. spixianus Mart.*	FCA	-	-	-
P. striatus Ruhland*	FCA	-	-	-
P. suffruticans Ruhland*	FCA	-	-	-
P. tessmannii Moldenke*	FCA	-	-	-
P. tortilis (Bong.) Mart.	FCA, RST	-	-	-
P. trichophyllus (Bong.) Körn.	FCA	-	-	-
P. uleanus Ruhland*	FCA	-	-	-
P. usterii Beauv.*	FCA	-	-	-
P. vaginatus Körn.	FCA	-	-	-
P. variabilis Silveira*	FCA	-	-	-
P. vellozioides Körn.	FCA	-	-	-
P. viridulus Ruhland*	FCA	-	-	-
Syngonanthus – 27/ca. 200				
S. auripes Silveira*	RST	-	-	-
S. brasiliana Giul.*	FCA	-	CR	ANEXO I
S. candidus Silveira*	FCA	-	-	-
S. caracensis Silveira*	FCA	-	-	-
S. caulescens (Poir.) Ruhland	FCA	-	-	-
S. chrysanthus (Bong.) Ruhland*	RST	-	-	-
S. costatus Ruhland*	FCA	-	-	-
S. densiflorus Ruhland	FCA	-	-	-
S. elegantulus Ruhland	FCA	-	-	-
S. fischerianus (Bong.) Ruhland	FCA	-	-	-
S. garimpensis Silveira*	FCA	-	-	-
S. gracilis (Körn.) Ruhland	FCA	-	-	-
S. hirtellus Ruhland*	FCA	-	-	-
S. imbricatus (Körn.) Ruhland*	RST	-	-	-
S. itambeensis Silveira	FCA	-	-	-
S. linearis Ruhland*	RST	-	-	-
S. magnificus Giul.*	FCA	-	CR	ANEXO I
S. nitens Ruhland	RST	-	-	-
S. niveus (Bong.) Ruhland*	FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
S. paepalophyllus Silveira	RST	-	-	-
S. planus Ruhland*	FCA	-	-	-
S. prolifer Silveira*	FCA	-	-	-
S. suberosus Giul.*	FCA	-	CR	ANEXO I
S. umbellatus (Lam.) Ruhland	FCA	-	-	-
S. vernonioides (Kunth.) Ruhland	FCA	-	EN	ANEXO II
S. widgrenianus (Körn.) Ruhland	FCA	-	-	-
S. xeranthemoides (Bong.) Ruhland	FCA	-	-	-
Tonina – 1/1				
T. fluviatilis Aubl.	RST	-	-	-

Erythroxylaceae

Maria Iracema Bezerra Loiola,
Ana Claudia Pereira de Oliveira
& Antonieta Morais Marinho

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
ERYTHROXYLACEAE – 53/250				
Erythroxylum – 53/240				
E. affine A.St.-Hil.*	RST, AFL, FOD	-	-	-
E. ambiguum Peyr.*	FOM	-	-	-
E. amplifolium (Mart.) O.E.Schulz	FOD, FOM, FCA	-	-	-
E. andrei Plowman*	RST	-	-	-
E. argentinum O.E.Schulz*	FOD	-	-	-
E. bradeanum O.E.Schulz*	FOD, FCA	-	-	-
E. catharinense Amaral*	FOD, FOM	-	VU	ANEXO I
E. cincinnatum Mart.*	FOD	-	-	-
E. citrifolium A.St.-Hil.	FOD	-	-	-
E. coelophlebium Mart.*	FOD	-	-	-
E. columbinum Mart.	RST, AFL, FOD	-	-	-
E. compressum Peyr.*	FOD	-	VU	ANEXO I
E. cryptanthum O.E.Schulz*	FOD	-	-	-
E. cuneifolium (Mart.) O.E.Schulz	FOM, FCA, AFL	-	-	-
E. cuspidifolium Mart.*	RST	-	-	-
E. cyclophyllum O.E.Schulz*	FOD	-	-	-
E. daphnites Mart.	FOD	-	-	-
E. deciduum A.St.-Hil.	RST, FES, FCA, FOD	-	-	-
E. distortum Mart.*	RST	-	VU	ANEXO I
E. flaccidum Salzm. *ex* Peyr.*	RST	-	-	-
E. frangulifolium A.St.-Hil.*	FOD	-	-	-
E. gaudichaudii Peyr.*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
E. glazioui O.E.Schulz*	RST	-	-	-
E. gonocladum (Mart.) O.E.Schulz*	FOD	-	-	-
E. hamigerum O.E.Schulz*	FOD	-	-	-
E. lancifolium Peyr.*	FOD	-	-	-
E. leal-costae Plowman*	RST	-	EN	ANEXO I
E. lygoides O.E.Schulz*	RST	-	-	-
E. macrocalyx Mart.*	RST	-	-	-
E. magnoliifolium A.St.-Hil.*	FOD	-	-	-
E. martii Peyr.*	FOD	-	-	-
E. mattos-silvae Plowman*	RST, FOD	-	EN	ANEXO I
E. membranaceum Plowman*	FOD	-	EN	ANEXO I
E. microphyllum A.St.-Hil.*	FCA	-	-	-
E. mikanii Peyr.*	FOD, RST	-	-	-
E. mucronatum Benth.	FOD	-	-	-
E. myrsinites Mart.	FOM, FCA	-	-	-
E. nitidum Spreng.*	FOD	-	-	-
E. nobile O.E.Schulz*	FOD	-	-	-
E. occultum Plowman*	FOD	-	-	-
E. ochranthum Mart.*	FOD	-	-	-
E. ovalifolium Peyr.	RST	-	-	-
E. oxypetalum O.E.Schulz*	FOD, FCA	-	-	-
E. passerinum Mart.*	RST	-	-	-
E. pauferrense Plowman*	FOD	-	CR	ANEXO I
E. petrae-caballi Plowman*	FED, RST	-	VU	ANEXO II
E. plowmanii Amaral*	RST, FES	-	-	-
E. pulchrum A.St.-Hil.	RST, FCA	-	-	-
E. santosii Plowman*	RST	-	-	-
E. simonis Plowman	FOD	-	-	-
E. splendidum Plowman	RST	-	-	-
E. squamatum Sw.	FOD	-	-	-
E. tenue Plowman*	FOD	-	-	-

Escalloniaceae

Viviane Renata Scalon

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
ESCALLONIACEAE – 9/70				
Escallonia – 9/40				
E. bifida Link & Otto*	FOD, FOM	-	-	-
E. chlorophylla Cham. & Schltdl.	FCA	-	-	-
E. farinacea A.St.-Hil.	FOD, FCA	-	-	-
E. hispida (Vell.) Sleumer	FOD, FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
E. laevis (Vell.) Sleumer*	FOD, FCA	-	-	-
E. ledifolia Sleumer*	FCA	-	-	-
E. megapotamica Spreng.	FOD, FOM	-	-	-
E. obtusissima A.St.-Hil.*	FCA	-	-	-
E. petrophila Rambo & Sleumer*	FOD	-	-	-

Euphorbiaceae

Marcos Sobral, Luciana H. Yoshino Kamino & Caetano Troncoso Oliveira

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
EUPHORBIACEAE – 473/8100				
Acalypha – 27/430				
A. accedens Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
A. amblyodonta Müll.Arg.	FES	-	-	-
A. ampliata Pax & K.Hoffm.	FOD	-	-	-
A. apetiolata Allem & J.L.Waecht.*	FCA	-	-	-
A. arciana (Baill.) Müll.Arg.*	FCA	-	-	-
A. aspericocca Pax & K.Hoffm.*	FCA	-	-	-
A. brasiliensis Müll.Arg.	FES	-	-	-
A. chorisandra Baill.	FCA	-	-	-
A. claussenii (Turcz.) Müll.Arg.*	FCA	-	-	-
A. communis Müll.Arg.	FES	-	-	-
A. digynostachya Baill.	FCA	-	-	-
A. dimorpha Müll.Arg.	FCA	-	-	-
A. gracilis Spreng.	FES	-	-	-
A. hassleriana Chodat	FES	-	-	-
A. macularis Pax & K.Hoffm.*	FOD	-	-	-
A. martiana Müll.Arg.	FES	-	-	-
A. multicaulis Müll.Arg.	FES	-	-	-
A. nitschkeana Pax & K.Hoffm.	FES	-	-	-
A. oxyodonta (Müll.Arg.) Müll.Arg.*	FCA	-	-	-
A. peckoltii Müll.Arg.*	FCA	-	-	-
A. pohliana Müll.Arg.	FCA	-	-	-
A. poiretii Spreng.	FCA	-	-	-
A. prunifolia Nees & Mart.*	FES	-	-	-
A. pruriens Nees & Mart.*	FOD	-	-	-
A. uleana L.B.Sm. & Downs*	FOD	-	-	-
A. villosa Jacq.	FOD	-	-	-
A. weddelliana Baill.	FOD	-	-	-
Actinostemon – 14/40				
A. concolor (Spreng.) Müll.Arg.	FES, FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
A. echinatus Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
A. glaziovii Pax & K.Hoffm.*	FOD	-	-	-
A. klotzschii (Didr.) Pax	FOD	-	-	-
A. lagoensis (Müll.Arg.) Pax	FES	-	-	-
A. lasiocarpus (Müll.Arg.) Baill.*	FOD	-	-	-
A. leptopus (Müll.Arg.) Pax*	FOD	-	-	-
A. macrocarpus Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
A. mandiocanus (Müll.Arg.) Pax*	FOD	-	-	-
A. multiflorus Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
A. oligandrus (Müll.Arg.) Baill.	FES	-	-	-
A. sparsifolius (Müll.Arg.) Pax	FOD	-	-	-
A. unciformis Jabl.*	FOD	-	-	-
A. verticillatus (Klotzsch) Baill.	FOD	-	-	-
Adelia – 1/15				
A. membranifolia (Müll.Arg.) Chodat & Hassl.	FOD	-	-	-
Adenophaedra – 1/00				
A. megalophylla (Müll.Arg.) Müll.Arg.	FOD	-	-	-
Alchornea – 3/70				
A. glandulosa Pöpp.	FES, FOD	-	-	-
A. sidifolia Müll.Arg.	FES, FOD	-	-	-
A. triplinervia (Spreng.) Müll.Arg.	FES, FOD	-	-	-
Algernonia – 11/12				
A. bahiensis (Emmerich) G.L.Webster*	FOD	-	-	-
A. brasiliensis Baill.*	FOD	-	-	-
A. dimitrii (Emmerich) G.L.Webster*	FOD	-	-	-
A. gibbosa (Pax & K.Hoffm.) Emmerich*	FOD	-	-	-
A. glazioui Emmerich*	FOD	-	-	-
A. kuhlmannii (Emmerich) G.L.Webster*	FOD	-	-	-
A. leandrii (Baill.) G.L.Webster*	FOD	-	-	-
A. obovata (Müll.Arg.) Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
A. pardina Croizat*	FOD	-	-	-
A. paulae Emmerich*	FOD	-	-	-
A. riedelii (Müll.Arg.) G.L.Webster*	FOD	-	-	-
Aparisthmium – 1/1				
A. cordatum (A.Juss.) Baill.	FOD	-	-	-
Astraea – 2/5				
A. lobata (L.) Klotzsch	FCA	-	-	-
A. praetervisa (Müll.Arg.) P.E.Berry*	FOD	-	-	-
Bernardia – 16/20				
B. alaricii Allem & Irgang	FCA	-	-	-
B. axillaris (Spreng.) Müll.Arg.*	FES	-	-	-
B. brevipes Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
B. celastrinea (Baill.) Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
B. confertifolia Müll.Arg.	FES	-	-	-
B. crassifolia (Baill.) Müll.Arg.	FCA	-	VU	ANEXO II
B. flexuosa Pax & K.Hoffm.	FCA	-	-	-
B. gambosa Müll.Arg.	FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
B. geniculata Allem & J.L.Waecht.*	FCA	-	-	-
B. hagelundii Allem & Irgang	FCA	-	-	-
B. micrantha Pax & K.Hoffm.	FCA	-	-	-
B. multicaulis Müll.Arg.	FES	-	-	-
B. odonellii Villa	FES	-	-	-
B. pulchella (Baill.) Müll.Arg.	FES	-	-	-
B. scabra Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
B. tamanduana (Baill.) Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
Bia – 1/5				
B. alienata Didr.	FES	-	-	-
*Brasiliocroton** – 1/1				
B. mamoninha P.E.Berry & Cordeiro*	FOD	-	-	-
Caperonia – 9/40				
C. aculeolata Müll.Arg.	FCA	-	-	-
C. buettneriacea Müll.Arg.	FCA	-	-	-
C. castaneifolia (L.) A.St.-Hil.	FCA	-	-	-
C. cordata A.St.-Hil.	FCA	-	-	-
C. heteropetala Didr.	FCA	-	-	-
C. linearifolia A.St.-Hil.	FCA	-	-	-
C. palustris (L.) A.St.-Hil.	FCA	-	-	-
C. stenophylla Müll.Arg.	FCA	-	-	-
C. velloziana Müll.Arg.	FOD	-	-	-
Caryodendron – 1/3				
C. janeirense Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
Chiropetalum – 8/17				
C. anisotrichum (Müll.Arg.) Pax & K.Hoffm.	FCA	-	-	-
C. foliosum (Müll.Arg.) Pax & K.Hoffm.*	FCA	-	-	-
C. gymnadenium (Müll.Arg.) Pax & K.Hoffm.	FES	-	-	-
C. molle (Baill.) Pax & K.Hoffm.*	FCA	-	-	-
C. phalacradenium (J.W.Ingram) L.B.Sm. & Downs*	FCA	-	-	-
C. pilosistylum (Allem & Irgang) Radcl.-Sm. & Govaerts	?	-	-	-
C. ramboi (Allem & Irgang) Radcl.-Sm. & Govaerts	?	-	-	-
C. tricoccum (Vell.) Chodat & Hassl.	FCA	-	-	-
Cleidion – 1/25				
C. tricoccum (Casar.) Baill.	FOD	-	-	-
Cnidoscolus – 7/75				
C. aculeatissimus (Mart.) Fern.Casas	FOD	-	-	-
C. albomaculatus (Pax) I.M.Johnst.	FES	-	-	-
C. loasoides (Pax) I.M.Johnst.	FES	-	-	-
C. loefgrenii (Pax & K.Hoffm.) Pax & K.Hoffm.	FOD	-	-	-
C. oligandrus (Müll.Arg.) Pax	FOD	-	-	-
C. urens (L.) Arthur	FES	-	-	-
C. urentissimus Fern.Casas*	FCA	-	-	-
Colliguaja – 1/3				
C. brasiliensis Klotzsch *ex* Baill.	FOD, FES	-	-	-
Croton – 172/750				
C. aberrans Müll.Arg.	FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
C. ackermannianus (Müll.Arg.) G.L.Webster	FCA	-	-	-
C. adamantinus Müll.Arg.	FCA, RST	-	-	-
C. adenodontus (Müll.Arg.) Müll.Arg.	FCA, RST	-	-	-
C. agrestis (Pax & K.Hoffm.) Radcl.-Sm. & Govaerts	FCA	-	-	-
C. agrophilus Müll.Arg.	FCA	-	-	-
C. alagoensis Müll.Arg.	RST	-	-	-
C. albellus Müll.Arg.	FCA	-	-	-
C. alchorneicarpus Croizat*	FOD	-	-	-
C. alegrensis Glaz.	FCA	-	-	-
C. allemii G.L.Webster*	FES	-	-	-
C. antisyphiliticus Mart.	FCA	-	-	-
C. apostolon Radcl.-Sm. & Govaerts	FCA	-	-	-
C. argenteus L.	FCA	-	-	-
C. arlineae D.Medeiros *et al.**	FCA	-	-	-
C. astrogynus Baill.	FCA	-	-	-
C. betaceus Baill.	FCA	-	-	-
C. bidentatus Müll.Arg.*	FCA	-	-	-
C. bresolinii L.B.Sm. & Downs*	FCA	-	-	-
C. buxifolius (Baill.) Müll.Arg.	FCA	-	-	-
C. caldensis Müll.Arg.*	FCA	-	-	-
C. calonervosus G.L.Webster	FCA	-	-	-
C. calycireduplicatus Allem*	FCA	-	-	-
C. campanulatus Caruzo & Cordeiro*	FOD	-	-	-
C. campestris Müll.Arg.	FCA	-	-	-
C. caperoniifolius Müll.Arg.	FCA	-	-	-
C. catarinensis L.B.Sm. & Downs*	FCA	-	-	-
C. ceanothifolius Baill.	FCA	-	-	-
C. celtidifolius Baill.*	FES, FOD	-	-	-
C. chaetophorus Müll.Arg.	FCA	-	-	-
C. chloroleucus Müll.Arg.*	FCA	-	-	-
C. cinctus Müll.Arg.	FCA	-	-	-
C. claussenianus Baill.	FCA	-	-	-
C. comatus Vell.	FCA	-	-	-
C. comosus Müll.Arg.	FCA	-	-	-
C. compressus Lam.*	RST	-	-	-
C. confinis L.B.Sm. & Downs*	FCA	-	-	-
C. cordeiroae G.L.Webster	FCA	-	-	-
C. corrientesianus Baill.	FCA	-	-	-
C. crustulifer Croizat	FCA	-	-	-
C. desertorum Müll.Arg.	FCA	-	-	-
C. dichrous Müll.Arg.*	FCA	-	-	-
C. didrichsenii G.L.Webster	FCA	-	-	-
C. doratophylloides (Croizat) G.L.Webster	FCA	-	-	-
C. doratophyllus Baill.	FCA	-	-	-
C. dracunculoides Baill.	FCA	-	-	-
C. dusenii Croizat*	FCA	-	-	-
C. eichleri Müll.Arg.	FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
C. ericoides Baill.	FCA	-	-	-
C. erythroxyloides Baill.*	FCA	-	-	-
C. exuberans Müll.Arg.	FES	-	-	-
C. floribundus Spreng.	FES	-	-	-
C. fluminensis K.Schum.	FCA	-	-	-
C. fuscescens Spreng.	FOD	-	-	-
C. glandulosus L.	FCA	-	-	-
C. glaziovii Müll.Arg.	FCA	-	-	-
C. glechomifolius Müll.Arg.	FCA	-	-	-
C. gnaphalii Baill.	FCA	-	-	-
C. gnaphaloides Schrad.	FCA	-	-	-
C. gnidiaceus Baill.	FCA	-	-	-
C. gracilipes Baill.	FES	-	-	-
C. hecatonandrus Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
C. helichrysum Baill.	FCA	-	-	-
C. heliotropiifolius Kunth	RST	-	-	-
C. hemiargyreus Müll.Arg.*	FCA	-	-	-
C. heterodoxus Baill.*	FCA	-	-	-
C. hirtus L'Hér.	FCA	-	-	-
C. ichthygaster L.B.Sm. & Downs*	FCA	-	-	-
C. indivisus Vell.	FOD	-	-	-
C. isabellei Baill.	FCA	-	-	-
C. itacolumi Müll.Arg.*	FCA	-	-	-
C. janeirensis Radcl.-Sm. & Govaerts	FOD	-	-	-
C. josephinus Müll.Arg.*	FCA	-	-	-
C. julopsidium Baill.	FCA	-	-	-
C. klaenzei Müll.Arg.	FOD?	-	-	-
C. kleinii L.B.Sm. & Downs*	FCA	-	-	-
C. lachnocladus Mart. *ex* Müll.Arg.	RST	-	-	-
C. lachnostachyus Baill.	RST	-	-	-
C. lagoensis Müll.Arg.	FCA	-	-	-
C. lanatus Lam.	FCA	-	-	-
C. lapanus Müll.Arg.	FCA	-	-	-
C. laseguei Müll.Arg.	FCA	-	-	-
C. leptobotryus Müll.Arg.	FES	-	-	-
C. leptophyllus Müll.Arg.	FCA	-	-	-
C. linearifolius Müll.Arg.	FCA	-	-	-
C. lundianus (Didr.) Müll.Arg.	FCA	-	-	-
C. macrobotrys Baill.*	FOD	-	-	-
C. macrolepis Radcl.-Sm. & Govaerts	FOD	-	-	-
C. medusae Müll.Arg.	?	-	-	-
C. melanoleucus Müll.Arg.	FCA	-	-	-
C. microcalyx (Müll.Arg.) G.L.Webster	FCA	-	-	-
C. microgyne Croizat	FOD	-	-	-
C. microstachys Baill.	FCA	-	-	-
C. migrans Casar.	FCA	-	-	-
C. missionum Croizat	FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
C. montevidensis Spreng.	FCA	-	-	-
C. muellerianus L.R.Lima*	FCA	-	-	-
C. myrianthus Müll.Arg.	FCA	-	-	-
C. neuwiedii Müll.Arg.	FCA	-	-	-
C. nitrariifolius Baill.	FCA	-	-	-
C. novifriburgi Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
C. odontadenius Müll.Arg.	FCA	-	-	-
C. oleoides Müll.Arg.	FCA	-	-	-
C. oliganthus Müll.Arg.	?	-	-	-
C. organensis Baill.*	FOD	-	-	-
C. oxyphyllus Müll.Arg.	FOD	-	-	-
C. pallidulus Baill.*	FCA	-	-	-
C. pannosus Thunb.	FCA?	-	-	-
C. parvifolius Müll.Arg.	FES	-	-	-
C. patrum L.B.Sm. & Downs*	FCA	-	-	-
C. paulinianus Müll.Arg.	FCA	-	-	-
C. paulinus (Didr.) Müll.Arg.	RST	-	-	-
C. pedunculatus Vell.	?	-	-	-
C. peraffinis Müll.Arg.	FCA	-	-	-
C. piptocalyx Müll.Arg.	FES	-	-	-
C. plagiograptus Müll.Arg.	FOD	-	-	-
C. polyandrus Spreng.	RST	-	-	-
C. polygonoides L.B.Sm. & Downs*	FCA	-	-	-
C. priscus Croizat*	FOD	-	-	-
C. pseudoadipatus Croizat	FCA	-	-	-
C. pulegiodorus Baill.	?	-	-	-
C. pulegioides Müll.Arg.	FOD	-	-	-
C. puncticulatus Müll.Arg.	FOD	-	-	-
C. pycnocephalus Baill.	FCA	-	-	-
C. pycnophyllus Salzm. *ex* Schltdl.	RST?	-	-	-
C. quintasii Allem	FCA	-	-	-
C. ramboi Allem*	FCA	-	-	-
C. refractus Müll.Arg.	FCA	-	-	-
C. reitzii L.B.Sm. & Downs*	FCA	-	-	-
C. robustior (L.B.Sm. & Downs) Radcl.-Sm. & Govaerts*	FCA	-	-	-
C. rottlerifolius Baill.	FES	-	-	-
C. salutaris Casar.*	FOD	-	-	-
C. salzmannii (Baill.) G.L.Webster	FOD	-	-	-
C. sclerocalyx (Didr.) Müll.Arg.	FCA	-	-	-
C. sellowii Baill.	FOD, RST	-	-	-
C. seminudus Müll.Arg.	RST	-	-	-
C. serpyllifolius Baill.*	RST	-	-	-
C. serratifolius Baill.	FCA	-	-	-
C. serratoideus Radcl.-Sm. & Govaerts	FCA	-	-	-
C. serratus (Klotzsch) Müll.Arg.	FCA	-	-	-
C. siderophilus Baill.	FCA	-	-	-
C. sincorensis Mart. *ex* Müll.Arg.	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
C. sphaerogynus Baill.	FES, RST	-	-	-
C. spissirameus Radcl.-Sm. & Govaerts	FCA	-	-	-
C. splendidus Mart. *ex* Colla	FCA	-	-	-
C. stenotrichus Müll.Arg.	FCA	-	-	-
C. stipularis (Müll.Arg.) G.L.Webster	FCA	-	-	-
C. subferrugineus Müll.Arg.	FCA	-	-	-
C. subpannosus Müll.Arg. *ex* Griseb.	FCA	-	-	-
C. tenellus Müll.Arg.	FCA	-	-	-
C. terminalis Vell.	?	-	-	-
C. tetradenius Baill.	FCA	-	-	-
C. teucridium Baill.	?	-	-	-
C. thymelinus Baill.	FCA	-	-	-
C. timandroides (Didr.) Müll.Arg.	FCA	-	-	-
C. trichophilus (Pax & K.Hoffm.) Radcl.-Sm. & Govaerts	?	-	-	-
C. tricolor Klotzsch *ex* Baill.	FCA	-	-	-
C. triglandulatus Vell.	FOD	-	-	-
C. trinitatis Millsp.	FCA	-	-	-
C. triqueter Lam.	FCA	-	-	-
C. urticifolius Lam.	FCA	-	-	-
C. urucurana Baill.	FES, FOD	-	-	-
C. uruguayensis Baill.	FCA	-	-	-
C. velame Müll.Arg.	FCA	-	-	-
C. verbascoides G.L.Webster	FCA	-	-	-
C. verbenifolius Müll.Arg.	FCA	-	-	-
C. verrucosus Radcl.-Sm. & Govaerts	FES, FOD	-	-	-
C. vestitus Spreng.	FCA	-	-	-
C. viridulus (Croizat) Radcl.-Sm. & Govaerts	FCA	-	-	-
C. vulnerarius Baill.*	FCA, FOD	-	-	-
C. warmingii Müll.Arg.	FCA	-	-	-
C. widgrenianus Müll.Arg.	FCA	-	-	-
Dalechampia – 39/115				
D. affinis Müll.Arg.	FOD	-	-	-
D. alata Klotzsch *ex* Baill.*	FOD, FES	-	-	-
D. allemii G.L.Webster*	FOD	-	-	-
D. anomala Pax & K.Hoffm.*	FES	-	-	-
D. arciana Baill.*	FOD	-	-	-
D. armbrusteri G.L.Webster	FOD	-	-	-
D. brasiliensis Lam.	RST, FOD, FES	-	-	-
D. brevipes Müll.Arg.	FCA	-	-	-
D. clausseniana Baill.*	FOD, FES	-	-	-
D. convolvuloides Lam.	RST, FOD	-	-	-
D. coriacea Klotzsch *ex* Müll.Arg.	FES, FOD	-	-	-
D. fernandesii G.L.Webster*	FOD	-	-	-
D. ficifolia Lam.	FOD	-	-	-
D. glechomifolia Baill.*	FCA	-	-	-
D. grandilla Baill.*	FOD	-	-	-
D. hassleriana Chodat*	FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
D. ilheotica Wawra*	FOD, RST	-	-	-
D. leandrii Baill.*	FOD	-	-	-
D. luetzelburgii Pax & K.Hoffm.*	FOD	-	-	-
D. martiana Klotzsch *ex* Pax & K.Hoffm.	RST	-	-	-
D. meridionalis Müll.Arg.*	FES, FOD	-	-	-
D. micromeria Baill.	FCA, RST	-	-	-
D. olfersiana Müll.Arg.*	FES	-	-	-
D. peckoltiana Müll.Arg.	FOD	-	-	-
D. pentaphylla Lam.	FES, FED, FOD	-	-	-
D. pernambucensis Baill.*	FOD, FES	-	-	-
D. purpurata Cordeiro*	FED	-	VU	ANEXO II
D. regnellii Müll.Arg.	FOD, FES	-	-	-
D. reitzkleinii L.B.Sm. & Downs*	FOD	-	-	-
D. riparia L.B.Sm. & Downs	FOM, FOD	-	CR	ANEXO I
D. scandens L.	FOD, FOM, FES	-	-	-
D. stenosepala Müll.Arg.	FOD, FOM, FES	-	-	-
D. stipulacea Müll.Arg.*	FOM	-	-	-
D. subintegra (Müll.Arg.) Müll.Arg.	FOD, FES	-	-	-
D. sylvestris S.Moore	FES	-	-	-
D. tiliifolia Lam.*	FOD	-	-	-
D. triphylla Lam.	FES, FOD	-	-	-
D. variifolia Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
D. viridissima G.L.Webster	FOD	-	-	-
Ditaxis – 1/50				
D. malmeana Pax & K.Hoffm.	?	-	-	-
Euphorbia – 31/2000				
E. alsinifolia Boiss.	FOD, FCA	-	-	-
E. attastoma Rizzini	FCA	-	VU	ANEXO II
E. caecorum Mart. *ex* Boiss.	FCA	-	-	-
E. caespitosa Lam.	RST	-	-	-
E. chamaeclada Ule	FCA	-	-	-
E. comosa Vell.	FCA, AFL, FED, FES, RST, FOD	-	-	-
E. elodes Boiss.	FCA	-	-	-
E. estevesii N.Zimm. & P.J.Braun*		-	-	-
E. foliolosa Boiss.	FOD	-	-	-
E. gymnoclada Boiss.	RST, FCA	-	VU	ANEXO II
E. heterophylla L.	FCA, FED, RST, FES, FOD	-	-	-
E. hirta L.	RUD	-	-	-
E. hirtella Boiss.	FCA	-	-	-
E. holochlorina Rizzini		-	-	-
E. hyssopifolia L.	RUD	-	-	-
E. insulana Vell.	RST, FOD	-	-	-
E. machrisiae Steyerm.	?	-	-	-
E. mesembryanthemifolia Jacq.*		-	-	-
E. papillosa A.St.-Hil.*	FCA	-	-	-
E. paranensis Dusén*	FCA, FOM	-	-	-
E. peperomioides Boiss.	FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
E. portulacoides L.	AFL	-	-	-
E. prostrata Aiton	RUD	-	-	-
E. rhabdodes Boiss.*	RST	-	-	-
E. sabulicola Boiss.	AFL	-	-	-
E. sciadophila Boiss.	FES, FCA, RUD	-	-	-
E. serpens Kunth	RUD	-	-	-
E. spathulata Lam.	RUD	-	-	-
E. stenophylla (Klotzsch & Garcke) Boiss.	RUD	-	-	-
E. thymifolia L.	FCA	-	-	-
Glycydendron – 1/1				
G. espiritosantense Kuhlm.	FOD	-	-	-
Gymnanthes – 6/15				
G. discolor (Spreng.) Müll.Arg.	FCA, FOD	-	-	-
G. gaudichaudii Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
G. glabrata (Mart.) Govaerts	FOD	-	-	-
G. hypoleuca Benth.	FES	-	-	-
G. nervosa Müll.Arg.	FOD	-	-	-
G. widgrenii Müll.Arg.	FOD	-	-	-
Hura – 1/2				
H. crepitans L.	FOD, FES	-	-	-
Jatropha – 11/175				
J. bornmuelleri Pax	FCA	-	-	-
J. breviloba (Morong) Pax & K.Hoffm.	FES	-	-	-
J. curcas L.		-	-	-
J. elliptica (Pohl) Müll.Arg.	FCA, FES	-	-	-
J. gossypiifolia L.*	RUD	-	-	-
J. intermedia (Chodat & Hassler) Paxton	FCA	-	-	-
J. isabellei Müll.Arg.	FCA	-	-	-
J. malmeana Pax & K.Hoffm.	RST	-	-	-
J. mollissima (Pohl) Baill.	FED	-	-	-
J. multifida L.	?	-	-	-
J. stigmatosa Pax & K.Hoffm.*	?	-	-	-
Joannesia – 1/2				
J. princeps Vell.*	?	-	-	-
Mabea – 6/50				
M. angustifolia Spruce *ex* Benth.	FES	-	-	-
M. fistulifera Mart.	FOD, FES	-	-	-
M. gaudichaudiana Baill.	?	-	-	-
M. glaziovii Pax & K.Hoffm.*	FES	-	-	-
M. occidentalis Benth.	FED, FES, FCA	-	-	-
M. piriri Aubl.	FCA, FOD	-	-	-
Manihot – 22/98				
M. affinis Pax & K.Hoffm.*	FES	-	-	-
M. anomala Pohl	FES	-	-	-
M. caerulescens Pohl	FED	-	-	-
M. corymbiflora Pax & K.Hoffm.*	FOD	-	-	-
M. esculenta Crantz	RUD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
M. glaziovii Müll.Arg.	FES	-	-	-
M. gracilis Pohl	FES	-	-	-
M. grahamii Hook.	FOD, FOM, FES	-	-	-
M. handroana Cruz*	FOD	-	-	-
M. hunzikeriana Mart.Crov.*	FCA	-	-	-
M. inflata Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
M. janiphoides Müll.Arg.	FES	-	-	-
M. jolyana Cruz*	FOD	-	-	-
M. leptopoda (Müll.Arg.) D.J.Rogers & Appan*	AFL	-	-	-
M. neusana Nassar*	FCA	-	-	-
M. pilosa Pohl	FOD, FES	-	-	-
M. pohlii Wawra*	FOD	-	-	-
M. procumbens Müll.Arg.	FES	-	-	-
M. tenella Müll.Arg.	FES	-	-	-
M. tripartita Müll.Arg.	FOD, FES, AFL	-	-	-
M. violacea Pohl	FES	-	-	-
M. warmingii Müll.Arg.*	FES	-	-	-
Maprounea – 2/4				
M. brasiliensis A.St.-Hil.	FES	-	-	-
M. guianensis Aubl.	FES	-	-	-
Microstachys – 4/15				
M. corniculata (Vahl) Griseb.	FES, RST	-	-	-
M. daphnoides (Mart.) Müll.Arg.	FES	-	-	-
M. heterodoxa (Müll.Arg.) Esser	FCA, FOD	-	-	-
M. hispida (Mart.) Govaerts	RUD	-	-	-
Omphalea – 1/20				
O. brasiliensis Müll.Arg.*	FES	-	-	-
Ophthalmoblapton * – 4/4				
O. crassipes Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
O. macrophyllum Allemão*	FOD	-	-	-
O. parviflorum Emmerich*	FOD	-	-	-
O. pedunculare Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
*Pachystroma** – 1/1				
P. longifolium (Nees) I.M.Johnst.*	FOD, FES	-	-	-
Pausandra – 4/12				
P. macropetala Ducke	FOD	-	-	-
P. macrostachya Ducke	FOD	-	-	-
P. megalophylla Müll.Arg.	FOD	-	-	-
P. morisiana (Casar.) Radlk.	FOD, FES	-	-	-
Philyra – 1/1				
P. brasiliensis Klotzsch	FES	-	-	-
Plukenetia – 1/16				
P. serrata (Vell.) L.J.Gillespie*	FOD, FES	-	-	-
Romanoa – 1/1				
R. tamnoides (A.Juss.) Radcl.-Sm.	FOD, FES, AFL, RST	-	-	-
Sapium – 4/100				
S. glandulosum (L.) Morong	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
S. haematospermum Müll.Arg.	FES	-	-	-
S. marginatum Müll.Arg.	AFL	-	-	-
S. sellowianum (Müll.Arg.) Klotzsch *ex* Baill.	FES	-	-	-
Sebastiania – 32/100				
S. anisodonta Müll.Arg.	?	-	-	-
S. argutidens Pax & K.Hoffm.*	FOD, FOM	-	-	-
S. bahiensis (Müll.Arg.) Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
S. brasiliensis Spreng.	FES	-	-	-
S. brevifolia (Müll.Arg.) Müll.Arg.	FED, AFL	-	-	-
S. chaetodonta Müll.Arg.*	FES	-	-	-
S. commersoniana (Baill.) L.B.Sm. & Downs	FES, FOD, FOM	-	-	-
S. daphniphylla (Baill.) Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
S. edwalliana Pax & K.Hoffm.	FES	-	-	-
S. eglandulata (Vell.) Pax*	FOD	-	-	-
S. glabrescens Pax & K.Hoffm.*	FOD	-	-	-
S. glaucophylla Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
S. gracilis Pax & K.Hoffm.*	FOD	-	-	-
S. heteroica Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
S. jacobinensis (Müll.Arg.) Müll.Arg.	FED	-	-	-
S. laureola (Baill.) Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
S. mosenii Pax & K.Hoffm.*	FES	-	-	-
S. pteroclada (Müll.Arg.) Müll.Arg.*	RST, AFL	-	-	-
S. pubescens Pax & K.Hoffm.	?	-	-	-
S. ramulosa Pax & K.Hoffm.*	FES	-	-	-
S. riedelii Müll.Arg.	FES	-	-	-
S. rigida (Müll.Arg.) Müll.Arg.*	FES	-	-	-
S. riparia Schrad.	FOD, FES	-	-	-
S. rotundifolia Pax & K.Hoffm.	?	-	-	-
S. rupicola Pax & K.Hoffm.*	FCA	-	-	-
S. schottiana (Müll.Arg.) Müll.Arg.	FOD, FES	-	-	-
S. serrata (Baill. *ex* Müll.Arg.) Müll.Arg.	FOD, FES	-	-	-
S. stipulacea (Müll.Arg.) Müll.Arg.	?	-	-	-
S. subsessilis (Müll.Arg.) Pax*	FOD, FES	-	-	-
S. trichogyne Pax & K.Hoffm.*	FES	-	-	-
S. vestita Müll.Arg.	FES	-	-	-
S. ypanemensis (Müll.Arg.) Müll.Arg.	FES	-	-	-
Senefeldera – 1/10				
S. verticillata (Vell.) Croizat*	FOD, FES	-	-	-
Stillingia – 6/30				
S. dichotoma Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
S. dusenii Pax & K.Hoffm.*	FCA	-	-	-
S. oppositifolia Baill. *ex* Müll.Arg.	FOM, FCA	-	-	-
S. saxatilis Müll.Arg.	AFL	-	-	-
S. scutellifera D.J.Rogers*	FCA	-	-	-
S. uleana Pax & K.Hoffm.	FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Tetrorchidium – 3/20				
T. dusenii Pax & K.Hoffm.	FOD, FES	-	-	-
T. parvulum Müll.Arg.*	FOD, FES	-	-	-
T. rubrivenium Poepp.	FOD	-	-	-
Tragia – 13/100				
T. alienata (Didr.) Múlgura & M.M.Gut.	FES	-	-	-
T. bahiensis Müll.Arg.	FOD, FES,	-	-	-
T. cearensis Pax & K.Hoffm.*	FES	-	-	-
T. cuneata Müll.Arg.*	FES, FOD	-	-	-
T. giardelliae M.M.Gut & Múlgura*	FCA, FES	-	-	-
T. leucandra Pax & K.Hoffm.	FES	-	-	-
T. melochioides Griseb.	FES	-	-	-
T. paxii Lourteig & O'Donnell	FOD, FES	-	-	-
T. peltata Vell.*	FOD	-	-	-
T. polyandra Vell.*	FES	-	-	-
T. tristis Müll.Arg.	FOD	-	-	-
T. uberabana Müll.Arg.	FES, FCA	-	-	-
T. volubilis L.	FES, RST	-	-	-

Fabaceae (Leguminosae)

Haroldo C. de Lima (coordenador), Ana Maria G. A. Tozzi, Ana Paula Fortuna-Perez, Andreia S. Flores, Angela Maria Studart F. Vaz, Bente B. Klitgaard, Domingos B. O. S. Cardoso, Fabiana R. Filardi, Flavia Cristina P. Garcia, Gwilym P. Lewis, João R. V. Iganci, José Eduardo Meireles, José F. M. Valls, Laura C.P. Lima, Luciano Paganucci de Queiroz, Marcos José da Silva, Marli P. Morim, Michel J. F. Barros, Rubens T. Queiroz, Renée H. Fortunato, R. Toby Pennington, Silvia T. Miotto, Tania M. Moura, Valquíria F. Dutra, Vidal F. Mansano, Vinicius C. Souza & Viviane R. Scalon

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
FABACEAE – 945/ca. 19.000				
Abarema – 10/49				
A. barnebyana Iganci & M.P.Morim*	FES, RST	-	-	-
A. brachystachya (DC.) Barneby & J.W.Grimes *	FOD, RST, FCA	-	-	-
A. cochliacarpos (Gomes) Barneby & J.W.Grimes	FOD, FES, RST	VU	-	-
A. filamentosa (Benth.) Pittier*	RST	VU	-	-
A. jupunba (Willd.) Britton & Killip	FOD, RST	-	-	-
A. langsdorffii (Benth.) Barneby & J.W.Grimes	FOD, RST, FCA	-	-	-
A. limae Iganci & M.P.Morim*	FOD, FES	-	-	-
A. obovata (Benth.) Barneby & J.W.Grimes	FOD, FCA	VU	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
A. turbinata (Benth.) Barneby & J.W.Grimes *	RST	-	-	-
A. villosa Iganci & M.P.Morim*	FOD, FES	-	-	-
Acosmium – 2/3				
A. diffusissimum (Mohlenbr.) Yakovlev	FES	-	-	-
A. lentiscifolium (Schott) Spreng.*	FOD, FES, RST	-	-	-
Adesmia – 13/240				
A. araujoi Burkart	FCA	-	-	-
A. arillata Miotto*	FCA	-	-	-
A. ciliata Vogel*	FCA	-	-	-
A. incana Vogel	FCA	-	-	-
A. latifolia (Spreng.) Vogel	FCA	-	-	-
A. paranensis Burkart*	FCA	-	-	-
A. psoraleoides Vogel*	FCA	-	-	-
A. punctata (Poir.) DC.	FCA	-	-	-
A. reitziana Burkart*	FCA	-	-	-
A. rocinhencis Burkart*	FCA	-	-	-
A. sulina Miotto*	FCA	-	-	-
A. tristis Vogel*	FCA	-	-	-
A. vallsii Miotto*	FCA	-	-	-
Aeschynomene – 22/ca. 180				
A. americana L.	FCA, RST	-	-	-
A. bradei Rudd*	FCA	-	-	-
A. brasiliana (Poir.) DC.	FCA, RST	-	-	-
A. ciliata Vogel	RST	-	-	-
A. denticulata Rudd	FES, FED, FCA	-	-	-
A. echinus Vogel	FCA	-	-	-
A. elegans Schltdl. & Cham.	FCA, RST	-	-	-
A. evenia C.Wright	FCA, RST	-	-	-
A. falcata (Poir.) DC.	FCA, RST	-	-	-
A. filosa Mart. *ex* Benth.	FCA	-	-	-
A. fluminensis Vell.	FCA, RST	-	-	-
A. fructipendula A.Oliveira*	FOD, FCA, RST	-	VU	ANEXO I
A. histrix Poir.	FES, FED, FCA	-	-	-
A. mollicula Kunth	FES, FCA	-	-	-
A. montevidensis Vogel	FCA	-	-	-
A. paniculata Willd. *ex* Vogel	FES, FED, FCA	-	-	-
A. parviflora Micheli	FCA	-	-	-
A. paucifolia Vogel	FED, FCA	-	-	-
A. podocarpa Vogel*	FCA	-	-	-
A. rudis Benth.	FCA	-	-	-
A. selloi Vogel*	FCA	-	-	-
A. sensitiva Sw.	FCA, RST	-	-	-
Albizia – 6/ca. 140				
A. burkartiana Barneby & J.W.Grimes	FOD, FOM	VU	-	-
A. edwallii (Hoehne) Barneby & J.W.Grimes*	FOD	VU	-	-
A. inundata (Mart.) Barneby & J.W.Grimes	FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
A. niopoides (Benth.) Burkart	FOD, FES	-	-	-
A. pedicellaris (DC.) L.Rico	FOD, FES	-	-	-
A. polycephala (Benth.) Killip *ex* Record	FOD, FES, RST	-	-	-
Amburana – 1/2				
A. cearensis (Allemão) A.C.Sm.	FOD, FES, FED	EN	-	-
Anadenanthera – 2/2				
A. colubrina (Vell.) Brenan	FOD, FES, FED	-	-	-
A. peregrina (L.) Speg.	FOD, FES, FED	-	-	-
Andira – 10/29				
A. anthelmia (Vell.) Benth.*	FOD, RST	-	-	-
A. carvalhoi R.T.Penn. & H.C.Lima*	RST	-	-	-
A. fraxinifolia Benth.	FOD, FES, RST, FCA	-	-	-
A. humilis Mart. *ex* Benth.	FED, FES, RST	-	-	-
A. inermis (W.Wright) DC.	FOD, FED	-	-	-
A. legalis (Vell.) Toledo*	FOD, FES, RST	-	-	-
A. marauensis N.Mattos*	FOD, RST	-	-	-
A. nitida Mart. *ex* Benth.*	FOD, RST	-	-	-
A. ormosioides Benth.*	FOD, FES, RST	-	-	-
A. vermifuga (Mart.) Benth.	FED	-	-	-
Apuleia – 2/2-3				
A. grazielana Afr.Fern.*	FES	-	-	-
A. leiocarpa (Vogel) J.F.Macbr.	FOD, FES, FED	-	-	-
Arachis – 5/69				
A. burkartii Handro	FCA, RST	-	-	-
A. dardani Krapov. & W.C.Greg.	FCA, FED	-	-	-
A. glabrata Benth.	FCA, FOM	-	-	-
A. macedoi Krapov. & W.C.Greg.	FCA, FES	-	-	-
A. pintoi Krapov. & W.C.Greg.	FCA, RST, FES	-	-	-
*Arapatiella** – 2/2				
A. emarginata R.S.Cowan*	FOD	-	-	-
A. psilophylla (Harms) R.S.Cowan*	FOD	VU	-	-
Ateleia – 2/20				
A. glazioviana Baill.*	FOD, FOM	-	-	-
A. ovata Mohlenbr.	FES	-	-	-
Barbieria – 1/1				
B. pinnata (Pers.) Baill.	FES, FCA	-	-	-
Barnebydendron – 1/1				
B. riedelii (Tul.) J.H.Kirkbr.	FOD, FES	-	-	-
Bauhinia – 17/ca. 160				
B. affinis Vogel	FOD, RST	-	-	-
B. albicans Vogel*	FED, RST	-	-	-
B. angulosa Hoehne*	FOD	-	-	-
B. carvalhoi Vaz*	FOD	-	-	-
B. forficata Link	FOD, FOM, FED	-	-	-
B. fusconervis (Bong.) Steud.*	FES	-	-	-
B. grazielae Vaz*	FOD, FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
B. integerrima Mart. *ex* Benth.*	FES	EN	-	-
B. leiopetala Benth.*	FES	-	-	-
B. longifolia (Bong.) Steud.	FOD FES	-	-	-
B. maximilianii Benth.*	FOD	-	-	-
B. microstachya (Raddi) J.F.Macbr.	FOD, FOM	-	-	-
B. outimouta Aubl.*	FOD	-	-	-
B. ovata (Bong.) Vogel	FOD, FES	-	-	-
B. rufa (Bong.) Steud.	FCA	-	-	-
B. ungulata L.	FES	-	-	-
B. uruguayensis Benth.	FED, FOM	-	-	-
Bionia – 4/5				
B. bella Mart. *ex* Benth.*	FOD	-	-	-
B. coccinea Mart. *ex* Benth.	FCA	-	-	-
B. coriacea (Nees & Mart.) Benth.	FCA	-	-	-
B. tomentosa (Benth.) L.P.Queiroz	FCA	-	-	-
Blanchetiodendron – 1/1				
B. blanchetii (Benth.) Barneby & J.W.Grimes	FED	-	-	-
Bowdichia – 1/2				
B. virgilioides Kunth	FOD, FES, FED, FCA	-	-	-
*Brodriguesia** – 1/1				
B. santosii R.S.Cowan*	FOD, RST	-	-	-
Caesalpinia – 3/ca. 94				
C. echinata Lam.*	FOD, FES, RST	EN	EN	ANEXO I
C. ferrea Mart.	FOD, FES, RST	-	-	-
C. pluviosa DC.	FOD, FES, RST	-	-	-
Calliandra – 6/135				
C. bella Benth.*	FOD, RST, FES	-	-	-
C. brevipes Benth.	FOD, FED	-	-	-
C. foliolosa Benth.	FOD, FES	-	-	-
C. harrisii (Lindl.) Benth.	FOD, FES, FED, RST	-	-	-
C. parvifolia (Hook. & Arn.) Speg.	FOD, FES, FED	-	-	-
C. tweediei Benth.	FOD, FOM, RST	-	-	-
Calopogonium – 3/6				
C. caeruleum (Benth.) Sauv.	FES, FCA	-	-	-
C. mucunoides Desv.	FOD, FES, FED, FCA	-	-	-
C. sericeum (Benth.) Chod. & Hassl.	FES, FCA	-	-	-
Camptosema – 4/5				
C. isopetalum (Lam.) Taub.*	FOD	-	-	-
C. rubicundum Hook. & Arn.	FOM	-	-	-
C. scarlatinum (Benth.) Burkart	FOM, AFL	-	-	-
C. spectabile (Tul.) Burkart*	FOM, FES, FED	-	-	-
Canavalia – 10/ca. 60				
C. bonariensis Lindl.	FOD	-	-	-
C. brasiliensis Mart. *ex* Benth.	FES, FOD, FED	-	-	-
C. cassidea G.P.Lewis*	FOD	-	-	-
C. dictyota Pilg.	FES, FOD, FED	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
C. dolichothyrsa G.P.Lewis*	?	-	-	-
C. ensiformis (L.) DC.	?	-	-	-
C. mattogrossensis (Barb.Rodr.) Malme	FES	-	-	-
C. parviflora Benth.*	FES	-	-	-
C. picta Mart. *ex* Benth.*	FES	-	-	-
C. rosea (Sw.) DC.	RST	-	-	-
Cassia – 2/30				
C. ferruginea (Schrad.) DC.	FOD, FES	-	-	-
C. leptophylla Vogel*	FOD, FES	-	-	-
Centrolobium – 4/7				
C. microchaete (Benth.) H.C.Lima*	FOD, FES	-	-	-
C. robustum (Vell.) Mart. *ex* Benth.*	FOD	-	-	-
C. sclerophyllum H.C.Lima*	FOD, FES	-	-	-
C. tomentosum Guillem. *ex* Benth.	FOD, FES, RST	-	-	-
Centrosema – 15/ca. 36				
C. arenarium Benth.	FOD, FES, FCA, RST	-	-	-
C. brasilianum (L.) Benth.	FOD, FES, FED, FCA, RST	-	-	-
C. coriaceum Benth.	FOD, FES, FED, FCA, RST	-	-	-
C. dasyanthum Benth.*	FOD, FES, FCA	-	-	-
C. grandiflorum Benth.*	FOD, FES, FED, FCA	-	-	-
C. grazielae Barbosa*	FES, FCA	-	-	-
C. jaraguense Hoehne*	FOD, FCA	-	-	-
C. macrocarpum Benth.	FOD, FES, FCA	-	-	-
C. pascuorum Mart. *ex* Benth.	FOD, FES, FED, FCA	-	-	-
C. plumieri (Pers.) Benth.	FOD, FES, FED, FCA, RST	-	-	-
C. pubescens Benth.*	FOD, FES, FCA	-	-	-
C. rotundifolium Mart. *ex* Benth.*	FOD, FES, FCA	-	-	-
C. sagittatum (Kunth) Brandegee	FOD, FES, FED, FCA, RST	-	-	-
C. vetulum Mart. *ex* Benth.*	FES, FCA	-	-	-
C. virginianum (L.) Benth.	FOD, FOM, FES, FED, FCA, RST	-	-	-
Chaetocalyx – 7/13				
C. acutifolia (Vogel) Benth.*	FOD	-	-	-
C. blanchetiana (Benth.) Rudd*	FES, FED	-	-	-
C. brasiliensis (Vogel) Benth.	FOD	-	-	-
C. longiflora A.Gray	FOD, FES, FED	-	-	-
C. nigricans Burkart	FOD, FCA	-	-	-
C. scandens (L.) Urb.	FOD, FES, FED, FCA, RST	-	-	-
C. tomentosa (Gardner) Rudd*	FOD	-	-	-
Chamaecrista – 33/ca. 330				
C. amabilis H.S.Irwin & Barneby*	FOD	-	-	-
C. amorimii Barneby*	FOD	-	-	-
C. amphibola (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby*	FCA	-	-	-
C. arboae Barneby*	FOD	-	-	-
C. aspleniifolia (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby		FOD	-	- -
C. atroglandulosa (Taubert *ex* Harms) H.S.Irwin & Barneby*		FCA	-	- -
C. bahiae (H.S.Irwin) H.S.Irwin & Barneby	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
C. blancheti (Benth.) Conc., L.P.Queiroz & G.P.Lewis	RST	-	-	-
C. calycioides (DC. *ex* Collad.) Greene	FCA, FOD	-	-	-
C. compitalis (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby*	FES	-	-	-
C. cytisoides (DC. *ex* Collad.) H.S.Irwin & Barneby	RST	-	-	-
C. desvauxii (Collad.) Killip	FCA, RST	-	-	-
C. duartei (H.S.Irwin) H.S.Irwin & Barneby*	FOD	-	-	-
C. ensiformis (Vell.) H.S.Irwin & Barneby	FOD, RST	-	-	-
C. fagonioides (Vogel) H.S.Irwin & Barneby	FCA, RST	-	-	-
C. flexuosa (L.) Greene	FCA, RST	-	-	-
C. glandulosa (L.) Greene	RST, FCA	-	-	-
C. hispidula (Vahl) H.S.Irwin & Barneby	RST	-	-	-
C. linearifolia (G.Don) H.S.Irwin & Barneby	FCA	-	-	-
C. nictitans (L.) Moench	FCA, RST	-	-	-
C. onusta H.S.Irwin & Barneby*	RST	-	-	-
C. pteropoda Barneby*	FOD	-	-	-
C. punctata (Vogel) H.S.Irwin & Barneby	FCA	-	-	-
C. ramosa (Vogel) H.S.Irwin & Barneby	FCA, RST	-	-	-
C. repens (Vogel) H.S.Irwin & Barneby	FCA	-	-	-
C. rotundifolia (Pers.) Greene	FCA	-	-	-
C. salvatoris (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby*	FOD, RST	-	-	-
C. serpens (L.) Greene	FCA, RST	-	-	-
C. setosa (Vogel) H.S.Irwin & Barneby	FCA	-	-	-
C. supplex (Mart. *ex* Benth.) Britton & Rose *ex* Britton & Killip		FCA	-	- -
C. swainsonii (Benth.) H.S.Irwin & Barneby	RST	-	-	-
C. trachycarpa (Vogel) H.S.Irwin & Barneby	FCA	-	-	-
C. vestita (Vogel) H.S.Irwin & Barneby	RST	-	-	-
Chloroleucon – 4/10				
C. dumosum (Benth.) G.P.Lewis	FED	-	-	-
C. extortum Barneby & J.W.Grimes	FES, FED	VU	VU	ANEXO II
C. foliolosum (Benth.) G.P.Lewis	FES, FED	-	-	-
C. tortum (Mart.) Pittier*	RST	CR	-	-
Cleobulia – 1/3				
C. multiflora Mart.*	FOD, FES	-	-	-
Clitoria – 4/ca. 62				
C. falcata Lam.	FOD, FOM, FES, FED, FCA, RST	-	-	-
C. laurifolia Poir.	FOD, FES, FED, FCA, RST	-	-	-
C. nana Benth.	FOD, FCA	-	-	-
C. selloi Benth.*	FOD	-	-	-
Collaea – 3/7				
C. cipoensis Fortunato*	FES, FCA	-	-	-
C. speciosa (Loisel.) DC.	FOM	-	-	-
C. stenophylla (Hook. & Arn.) Benth.	FOD, FCA	-	-	-
Copaifera – 6/ca. 35				
C. cearensis Ducke*	FOD, FES	-	-	-
C. duckei Dwyer	FOD, FES	-	-	-
C. langsdorffii Desf.	FOD, FES, FED, FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
C. lucens Dwyer*	FOD, FES, RST	-	-	-
C. majorina Dwyer*	FOD	-	-	-
C. trapezifolia Hayne*	FOD	-	-	-
Coursetia – 2/ca. 35				
C. rostrata Benth.	FED	-	-	-
C. vicioides (Nees & Mart.) Benth.	FED	-	-	-
Cranocarpus – 3/3				
C. gracilis Afr.Fern. & P.Bezerra*	FED	-	-	-
C. martii Benth.	FOD, RST	-	-	-
C. mezii Taub.*	FOD, RST	-	-	-
Cratylia – 3/7				
C. bahiensis L.P.Queiroz	FES, FED	VU	-	-
C. hypargyrea Mart. *ex* Benth.*	FOM, FES	-	-	-
C. intermedia (Hassl.) L.P.Queiroz & R.Monteiro*	FES	-	-	-
Crotalaria – 21/42				
C. balansae Micheli	FES, FOD, FOM, FCA, RST	-	-	-
C. breviflora DC.	FES, FOD, FOM, FCA, RST	-	-	-
C. claussenii Benth.	FOD, FCA	-	-	-
C. flavicoma Benth.	FCA	-	-	-
C. hilariana Benth.	FCA	-	-	-
C. holosericea Nees & Mart.	FES, FED, FCA	-	-	-
C. incana L.	FOD, FES, FCA	-	-	-
C. laeta Mart. *ex* Benth.	FES, FED, FCA	-	-	-
C. martiana Benth.	FES, FED, FCA	-	-	-
C. maypurensis Benth.	FOD, FES, FED, FCA	-	-	-
C. micans Link	FOD, FES, FED, FCA	-	-	-
C. miottae A.S. Flores & A.M.G. Azevedo	FOD, FES, FCA	-	-	-
C. otoptera Benth.	FCA	-	-	-
C. paulina Schrank	FOD, FCA	-	-	-
C. rufipila Benth.	FCA	-	-	-
C. stipularia Desv.	FOD, FES, FCA, RST	-	-	-
C. tweediana Benth.	FCA	-	-	-
C. unifoliolata Benth.	FCA	-	-	-
C. velutina Benth.	FCA	-	-	-
C. vespertilio Benth.	FOD, FES, FED, FCA	-	-	-
C. vitellina Ker Gawl.	FOD, FES, FCA, RST	-	-	-
*Cyclolobium** – 1/1				
C. brasiliense Benth.*	FOD, FES	-	-	-
Dahlstedtia – 2/2				
D. pentaphylla (Taub.) Burk.	FOD	-	-	-
D. pinnata (Benth.) Malme*	FOD	-	-	-
Dalbergia – 15/ca. 250				
D. brasiliensis Vogel*	FOD, FOM, FES	-	-	-
D. cearensis Ducke*	FES, FED, FCA	-	-	-
D. decipularis Rizzini & A.Mattos	FOD, FES	-	-	-
D. ecastaphyllum (L.) Taub.	MAN, RST	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
D. elegans A.M.Carvalho*	FOD	-	VU	ANEXO I
D. ernest-ulei Hoehne*	FOD	-	-	-
D. foliolosa Benth.*	FOD	-	-	-
D. frutescens (Vell.) Britton	FOD, FES, FED, FCA, RST	-	-	-
D. glaucescens (Mart. *ex* Benth.) Benth.	FES, FED, FCA	-	-	-
D. glaziovii Harms*	FOD	-	-	-
D. hortensis Heringer, Rizzini & A.Mattos	FES, FED	-	-	-
D. lateriflora Benth.*	FOD	-	-	-
D. nigra (Vell.) Allemão *ex* Benth.*	FOD, FES	VU	VU	ANEXO I
D. sampaioana Kuhlm. & Hoehne*	FOD	-	-	-
D. villosa (Benth.) Benth.	FES	-	-	-
Deguelia – 4/ca. 17				
D. costata (Benth.) A.M.G.Azevedo*	FES, FED	-	-	-
D. dasycalyx (Harms) A.M.G.Azevedo*	FOD	-	-	-
D. hatschbachii A.M.G.Azevedo*	FES, FOD	-	-	-
D. longeracemosa (Benth.) A.M.G.Azevedo*	FES, FED	-	-	-
Desmanthus – 4/ca. 24				
D. paspalaceus (Lindm.) Burkart	FCA	-	-	-
D. pernambucanus (L.) Thell.	FCA	-	-	-
D. tatuhyensis Hoehne	FCA	-	-	-
D. virgatus (L.) Willd.	FCA, FED	-	-	-
Desmodium – 26/ca. 275				
D. adscendens (Sw.) DC.	RST, FSL, FCA	-	-	-
D. affine Schltdl.	FOD, FES, FCA	-	-	-
D. arechavaletae Burkart	FCA	-	-	-
D. axillare (Sw.) DC.	FOD, FOM, FES	-	-	-
D. barbatum (L.) Benth.	FCA	-	-	-
D. craspediferum A.M.G.Azevedo & M.L.A.A.Oliveira*	FCA	-	-	-
D. cuneatum Hook. & Arn.	FCA, FES	-	-	-
D. discolor Vogel	FCA, FES	-	-	-
D. distortum (Aubl.) J.F.Macbr.	FCA, FES	-	-	-
D. glabrum (Mill.) DC.	FCA	-	-	-
D. guaraniticum (Chodat & Hassl.) Malme	FCA, FES	-	-	-
D. hassleri (Schindl.) Burkart	FCA, RST	-	-	-
D. incanum DC.	FCA,FES, RST	-	-	-
D. leiocarpum (Spreng.) G.Don	FCA,FES	-	-	-
D. pachyrhizum Vogel	FCA	-	-	-
D. platycarpum Benth.	FCA	-	-	-
D. polygaloides Chodat & Hassl.	FCA	-	-	-
D. procumbens (Mill.) Hitch.	FCA	-	-	-
D. sclerophyllum Benth.	FCA, FES	-	-	-
D. scorpiurus (Sw.) Desv.	FCA	-	-	-
D. subsericeum Malme	FOM,FES	-	-	-
D. tortuosum (Sw.) DC.	FCA, FES	-	-	-
D. triarticulatum Malme	FOM,FES	-	-	-
D. triflorum (L.) DC.	FCA, RST	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
D. uncinatum (Jacq.) DC.	FOM,FES	-	-	-
D. venosum Vogel	FCA	-	-	-
Dialium – 1/1				
D. guianense (Aubl.) Sandwith	FOD, FES	-	-	-
Dimorphandra – 3/26				
D. exaltata Schott*	FOD, FES	-	-	-
D. jorgei M.F.Silva*	FOD, FES	-	-	-
D. wilsonii Rizzini*	FES	CR	CR	ANEXO I
Dioclea – 12/ca. 40				
D. burkartii R.H.Maxwell	FES, FCA	-	-	-
D. coriacea Benth.	FCA	-	-	-
D. edulis Kuhlm.*	FOD	-	-	-
D. glabra Benth.	FES	-	-	-
D. grandiflora Benth.	FED	-	-	-
D. grandistipula L.P.Queiroz*	FOD	-	-	-
D. latifolia Benth.	FCA	-	-	-
D. rufescens Benth.	FES	-	-	-
D. schottii Benth.*	FOD	-	-	-
D. violacea Benth.	FES, FED	-	-	-
D. virgata (Rich.) Amsh.	FOD, RST	-	-	-
D. wilsonii Standl.	FOD, RST	-	-	-
Diplotropis – 2/12				
D. ferruginea Benth.*	FES, FED, RFA	-	-	-
D. incexis Rizzini & A.Mattos	FOD, FES	-	-	-
Dipteryx – 1/12				
D. odorata Aubl.	FOD	-	-	-
Diptychandra – 1/1				
D. aurantiaca Tul.	FED	-	-	-
Enterolobium – 4/11				
E. contortisiliquum (Vell.) Morong	FOD, FES	-	-	-
E. glaziovii (Benth.) Mesquita*	FOD, FES	-	-	-
E. monjollo (Vell.) Benth.*	FOD, FES	-	-	-
E. timbouva Mart.	FOD, FES	-	-	-
Eriosema – 9/ca. 150				
E. campestre Benth.	FOM, FCA	-	-	-
E. crinitum (Kunth) G.Don*	FCA, FOM, FES	-	-	-
E. glabrum Mart. *ex* Benth.	FOM, FCA	-	-	-
E. heterophyllum Benth.*	FES, FOM	-	-	-
E. longifolium Benth.	FCA, FOM, FES	-	-	-
E. obovatum Benth.	FCA, FOM	-	-	-
E. platycarpon Micheli	FCA, FES	-	-	-
E. rufum (Kunth) G.Don	FCA, FOD	-	-	-
E. tacuaremboense Arechav.	FED, FCA	-	-	-
Erythrina – 7/ca. 120				
E. cristagalli L.	FOD	-	-	-
E. dominguezii Hassl.	FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
E. falcata Benth.	FOD, FES	-	-	-
E. fusca Lour.	FOD	-	-	-
E. speciosa Andr.	FOD, FES	-	-	-
E. velutina Willd.	FED	-	-	-
E. verna Vell.	FOD, FES	-	-	-
Exostyles – 3/4				
E. glabra Vogel*	FOD	-	-	-
E. godoyensis Soares-Silva & Mansano*	FOD	-	-	-
E. venusta Schott*	FOD, RST	-	-	-
Galactia – 13/ca. 60				
G. benthamiana Micheli	FCA	-	-	-
G. boavista (Vell.) Burkart	FES, FCA	-	-	-
G. decumbens (Benth.) Hoehne	FES, FCA	-	-	-
G. dimorpha Burkart*	FES, FCA	-	-	-
G. glaucescens Kunth	FES, FCA	-	-	-
G. gracillima Benth.	FOM, FCA	-	-	-
G. marginalis Benth.	FES, FCA	-	-	-
G. martii DC.	FES,FCA	-	-	-
G. martioides Burkart	FES, FCA	-	-	-
G. neesii DC.	FCA	-	-	-
G. paraguariensis Chodat & Hassl.	FCA	-	-	-
G. pretiosa Burkart	FCA	-	-	-
G. striata (Jacq.) Urb.	FOM, FES	-	-	-
Geoffroea – 1/2				
G. spinosa Jacq.	FED	-	-	-
Gleditsia – 1/ca. 16				
G. amorphoides (Griseb.) Taub.	FED	-	EN	ANEXO II
*Goniorrhachis** – 1/1				
G. marginata Taub.*	FOD, FES	-	-	-
*Grazielodendron** – 1/1				
G. riodocense H.C.Lima*	FOD, FES	-	VU	ANEXO I
Guibourtia – 16/ca. 141				
G. hymenaeifolia (Moric.) J.Leonard	FES	-	-	-
Guilandina – 1/ca. 7				
G. bonduc L.	MAN, RST	-	-	-
*Harleyodendron** – 1/1				
H. unifoliolatum R.S.Cowan*	FOD	-	-	-
Harpalyce – 1/24				
H. brasiliana Benth.	FES, FCA	-	-	-
Holocalyx – 1/1				
H. balansae Micheli	FOD, FOM, FES	-	-	-
Hymenaea – 7/14				
H. aurea Y.T.Lee & Langenh.*	FOD, FES	-	-	-
H. courbaril L.	FOD, FES, FED	-	-	-
H. eriogyne Benth.	FED	-	-	-
H. martiana Hayne	FES, FED	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
H. oblongifolia Huber	FOD	-	-	-
H. rubriflora Ducke	FOD, FES	-	-	-
H. stigonocarpa Mart. *ex* Hayne	FED	-	-	-
Hymenolobium – 3/17				
H. alagoanum Ducke*	FOD, FES, RST	-	-	-
H. heringerianum Rizzini*	FES	-	-	-
H. janeirense Kuhlm.*	FOD, FES	-	-	-
Indigofera – 7/ca. 700				
I. asperifolia Bong. *ex* Benth.	FOD, FCA	-	-	-
I. bongardiana (Kuntze) Burkart	FES, FCA	-	-	-
I. campestris Bong. *ex* Benth.	FOD, FES, FCA	-	-	-
I. lespedezioides Kunth.	FES, FCA, RST	-	-	-
I. microcarpa Desv.	FES, FCA, RST	-	-	-
I. sabulicola Benth.	FE, FCA, RST	-	-	-
I. suffruticosa Mill.	FOD, FES, FCA, RST	-	-	-
Inga – 47/300				
I. aptera (Vinha) T.D.Penn.*	FOD	VU	-	-
I. arenicola T.D.Penn.*	RST	EN	-	-
I. barbata Benth.*	FOD, FES	-	-	-
I. blanchetiana Benth.*	FOD, RST	-	-	-
I. bollandii Sprague & Sandwith*	FOD	VU	-	-
I. bullata Benth.*	FOD	VU	-	-
I. cabelo T.D.Penn.*	FOD, FES	EN	-	-
I. capitata Desv.	FOD, FES	-	-	-
I. cayennensis Sagot *ex* Benth.	FOD	-	-	-
I. ciliata C.Presl	FOD, FES, RST	-	-	-
I. conchifolia L.P.Queiroz*	FOD, FES	-	-	-
I. congesta T.D.Penn.*	FOD	-	-	-
I. cordistipula Mart.*	FOD	-	-	-
I. cylindrica (Vell.) Mart.	FOD, FES	-	-	-
I. edulis Mart.	FOD, FES	-	-	-
I. edwallii (Harms) T.D.Penn.*	FOD	-	-	-
I. enterolobioides T.D.Penn.*	RST	CR	-	-
I. exfoliata T.D.Penn. & F.C.P.Garcia*	FOD	EN	-	-
I. flagelliformis (Vell.) Mart.	FOD, FES	-	-	-
I. globularis T.D.Penn.*	FOD	-	-	-
I. grazielae (Vinha) T.D.Penn.*	FOD	VU	-	-
I. hispida Schott *ex* Benth.*	FOD, FES	VU	-	-
I. ingoides (Rich.) Willd.	FOD, FES	-	-	-
I. lanceifolia Benth.*	FOD	EN	-	-
I. laurina Willd.	FOD, FES, RST, FCA	-	-	-
I. lenticellata Benth.*	FOD	VU	-	-
I. lentiscifolia Benth.*	FOD, FOM	VU	-	-
I. leptantha Benth.*	FOD, FES	VU	-	-
I. marginata Willd.	FOD, FES, FOM	-	-	-
I. maritima Benth.*	RST	EN	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
I. mendoncaei Harms*	FOD	EN	-	-
I. pedunculata (Vinha) T.D.Penn.*	FOD, RST	-	-	-
I. platyptera Benth.*	FOD	EN	-	-
I. pleiogyna T.D.Penn.*	FOD, RST	VU	-	-
I. praegnans T.D.Penn.*	FOD	VU	-	-
I. schinifolia Benth.*	FOD, FES	-	-	-
I. sellowiana Benth.*	FOD, FOM	EN	-	-
I. sessilis (Vell.) Mart.*	FOD, FES, FOM	-	-	-
I. striata Benth.	FOD, FES	-	-	-
I. subnuda Salzm. *ex* Benth.*	FOD, RST	-	-	-
I. suborbicularis T.D.Penn.*	FOD	VU	-	-
I. tenuis (Vell.) Mart.*	FOD	-	-	-
I. thibaudiana DC.	FOD, FES	-	-	-
I. unica Barneby & J.W.Grimes*	FOD	VU	-	-
I. vera Willd.	FOD, FES, FED, RST	-	-	-
I. virescens Benth.*	FOD, FOM, FED	-	-	-
I. vulpina Mart. *ex* Benth.	FOD, FCA, FES	-	-	-
Lathyrus – 13/ca. 160				
L. acutifolius Vogel	FCA	-	CR	ANEXO II
L. crassipes Gill. *ex* Hook. & Arn.	FCA	-	-	-
L. elegans Vogel*	FCA	-	-	-
L. hasslerianus Burkart*	FCA, FES	-	-	-
L. hookeri G.Don	FCA	-	-	-
L. linearifolius Vogel*	FCA	-	-	-
L. macrostachys Vogel	FCA	-	-	-
L. nervosus Lam.	FCA	-	-	-
L. nitens Vogel	FCA	-	-	-
L. paraguariensis Hassl.	FCA, FES	-	-	-
L. paranensis Burkart	FCA	-	-	-
L. parodii Burkart	FCA	-	VU	ANEXO II
L. pubescens Hook. & Arn.	FCA, FES	-	-	-
Leptolobium – 6/11				
L. bijugum (Spreng.) Vogel*	FOD, FES, RST	-	-	-
L. brachystachyum (Benth.) Sch.Rodr. & A.M.G.Azevedo	FED, FCA	-	-	-
L. dasycarpum Vogel	FED, FCA	-	-	-
L. elegans Vogel*	FES, FED, RFA	-	-	-
L. glaziovianum (Harms) Sch.Rodr. & A.M.G.Azevedo*	FES, FCA	-	-	-
L. tenuifolium Vogel*	FOD, FES	-	-	-
Leucochloron – 2/4-5				
L. incuriale (Vell.) Barneby & J.W.Grimes	FOD, FOM	-	-	-
L. limae Barneby & J.W.Grimes	FED	-	VU	ANEXO II
Lonchocarpus – 17/ca. 120				
L. bahianus A.M.G.Azevedo*	FES	-	-	-
L. campestris Mart. *ex* Benth.	FES, FED, FCA	-	-	-
L. cultratus (Vell.) A.M.G.Azevedo & H.C.Lima	FOD, FES, FED	-	-	-
L. filipes Benth.*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
L. glazioui Taub.*	FOD	-	-	-
L. grandiflorus A.M.G.Azevedo*	FOD	-	-	-
L. grazielae M.J.Silva & A.M.G.Azevedo*	RST, FES	-	-	-
L. latifolius (Willd.) DC.	FOD	-	-	-
L. longiunguiculatus M.J.Silva & A.M.G.Azevedo	FOD	-	-	-
L. muehlbergianus Hassl.	FOD, FES	-	-	-
L. nitidus (Vogel) Benth.	FOD	-	-	-
L. peckoltii Wawra*	FOM	-	-	-
L. punctatus Kunth	FOD	-	-	-
L. sericeus (Poir) DC.	FES, MAN	-	-	-
L. subglaucescens Mart. *ex* Benth.*	FOM, FES	-	-	-
L. torrensis N.Mattos*	FOM	-	VU	ANEXO II
L. virgilioides (Vogel) Benth.*	RST, FES	-	-	-
Luetzelburgia – 3/11				
L. guaissara Toledo*	FOD	-	-	-
L. purpurea D.Cardoso, L.P.Queiroz & H.C.Lima	FED	-	-	-
L. trialata (Ducke) Ducke*	FOD	-	-	-
Lupinus – 25/ca. 230				
L. albescens Hook. & Arn.	FCA, RST	-	-	-
L. arenarius Gardner	FCA	-	-	-
L. bracteolaris Desr.	FCA	-	-	-
L. comptus Mart. *ex* Benth.	?	-	-	-
L. coriaceus Benth.	FCA	-	-	-
L. crotalarioides Mart. *ex* Benth.	FCA	-	-	-
L. dusenianus C.P.Sm.	?	-	-	-
L. gibertianus C.P.Sm.	FCA	-	-	-
L. guaraniticus (Hassl.) C.P.Sm.	FCA	-	-	-
L. laevigatus Benth.*	FCA	-	-	-
L. lanatus Benth.	FCA	-	-	-
L. linearis Desr.	FCA	-	-	-
L. magnistipulatus Burkart *ex* Planchuelo & D.B.Dunn*	FCA	-	-	-
L. multiflorus Desr.	FCA, RST	-	-	-
L. ovalifolius Benth.	FCA	-	-	-
L. paraguariensis Chodat & Hassl.	FCA	-	-	-
L. paranensis C.P.Sm.*	FCA	-	-	-
L. prouvensalanus C.P.Sm.	FCA	-	-	-
L. regnellianus C.P.Sm.	FCA	-	-	-
L. reitzii Burkart *ex* M.Pinheiro & Miotto*	FCA	-	-	-
L. rubriflorus Planchuelo*	FCA	-	-	-
L. russellianus C.P.Sm.*	?	-	-	-
L. sellowianus Harms.*	FCA	-	-	-
L. uleanus C.P.Sm.*	FCA	-	-	-
L. velutinus Benth.	FCA	-	-	-
Machaerium – 39/ca. 130				
M. aculeatum Raddi*	FOD, FES, FCA	-	-	-
M. acutifolium Vogel	FES, FED, FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
M. amplum Benth.	FES, FCA	-	-	-
M. brasiliense Vogel*	FOD, FES, FCA	-	-	-
M. cantarellianum Hoehne*	FOD, FES	-	-	-
M. caratinganum Kuhlm. & Hoehne*	FES	-	-	-
M. condensatum Kuhlm. & Hoehne*	FES	-	-	-
M. declinatum (Vell.) Stellfeld*	FOD, FES	-	-	-
M. dimorphandrum Vogel*	FOD, FES	-	-	-
M. firmum (Vell.) Benth.*	FOD, FES, RST	-	-	-
M. fluminense Rudd*	FES	-	-	-
M. fulvovenosum H.C.Lima*	FES	-	-	-
M. glabrum Vogel*	FES	-	-	-
M. gracile Benth.*	FOD, FES	-	-	-
M. hatschbachii Rudd*	FOM, FES	-	-	-
M. hirtum (Vell.) Stellfeld	FOD, FES, FED, FCA	-	-	-
M. incorruptibile (Vell.) Benth.*	FES	-	-	-
M. lanceolatum (Vell.) J.F.Macbr.*	FOD, FES, RST	-	-	-
M. legale (Vell.) Benth.*	FES	-	-	-
M. leucopterum Vogel*	FES, FED	-	-	-
M. nigrum Vogel*	FES, FED	-	-	-
M. nyctitans (Vell.) Benth.*	FOM, FES	-	-	-
M. oblongifolium Vogel*	FOD, FES, RST	-	-	-
M. obovatum Kuhlm. & Hoehne	FED	-	VU	ANEXO I
M. ovalifolium Glaz. *ex* Rudd*	FOD, FES, FED	-	-	-
M. paraguariense Hassl.	FOD, FES	-	-	-
M. pedicellatum Vogel*	FOD, FES, RST	-	-	-
M. punctatum (Poir.) Pers.*	FES, FED	-	-	-
M. reticulatum (Poir.) Pers.*	FOD, FES	-	-	-
M. ruddianum C.V.Mendonça & A.M.G.Azevedo*	FES	-	-	-
M. salzmannii Benth.*	FES	-	-	-
M. scleroxylon Tul.	FES, FED, FCA	-	-	-
M. stipitatum (DC.) Vogel*	FOD, FES	-	-	-
M. ternatum Kuhlm. & Hoehne*	FOD, FES	-	-	-
M. triste Vogel*	FES, FED	-	-	-
M. uncinatum (Vell.) Benth.*	FOD, FES, RST	-	-	-
M. vestitum Vogel*	FOD, FES	-	-	-
M. villosum Vogel	FES	VU	-	-
M. violaceum Vogel*	FOD, FES	-	-	-
Macrolobium – 2/ca. 80				
M. latifolium Vogel*	FOD, FES, RST	-	-	-
M. rigidum R.S.Cowan*	FOD, FES, RST	-	-	-
Macroptilium – 11/ca. 17				
M. bracteatum (Nees & Mart.) Maréchal & Baudet	FOD, FES, FED, FCA, RST	-	-	-
M. erythroloma (Mart. *ex* Benth.) Urb.	FOD, FOM, FES, FCA	-	-	-
M. gracile (Poepp. *ex* Benth.) Urb.	FOD, FES, FED, FCA, RST	-	-	-
M. heterophyllum (Willd.) Maréchal & Baudet	FCA, RST	-	-	-
M. lathyroides (L.) Urb.	FOD, FES, FED, FCA, RST	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
M. martii (Benth.) Maréchal & Baudet	FED, FCA, RST	-	-	-
M. monophyllum (Benth.) Maréchal & Baudet	FED, FCA	-	-	-
M. panduratum (Mart. *ex* Benth.) Maréchal & Baudet	FES, FED, RST	-	-	-
M. prostratum (Benth.) Urb.	FOD, FOM, FCA	-	-	-
M. psammodes (Lindm.) S.I.Drewes & R.A.Palacios	FCA	-	-	-
M. sabaraense (Hoehne) V.P.Barbosa	FES, FCA	-	-	-
Martiodendron – 2/4				
M. fluminense Lombardi*	FOD	-	-	-
M. mediteraneum (Mart. *ex* Benth.) Koeppen	FOD, FES, FED	-	-	-
*Melanoxylon** – 1/1				
M. brauna Schott*	FOD, FES	-	VU	ANEXO I
Mimosa – 105/ca. 500				
M. artemisiana E.P.Heringer & J.E.de Paula	FOD, FES, FED	-	-	-
M. atlantica Barneby*	FED	-	-	-
M. aurivillus Mart.	FCA	-	-	-
M. axillaris Benth.	FCA	-	-	-
M. balduinii Burkart*	FOD	-	CR	ANEXO I
M. bathyrrhena Barneby*	FCA	-	-	-
M. bifurca Benth.	FCA, RST	-	-	-
M. bimucronata (DC.) Kuntze	FES	-	-	-
M. bocainae Barneby*	FOD	-	-	-
M. callidryas Barneby*	FOD	-	-	-
M. calodendron Mart. *ex* Benth.*	FCA	-	-	-
M. carvalhoi Barneby*	RST	-	-	-
M. catharinensis Burkart*	RST	-	CR	ANEXO I
M. ceratonia L.	FOD, FES, RST	-	-	-
M. chaetosphaera Barneby*	FOD	-	-	-
M. congestifolia Burkart*	FOD	-	-	-
M. coniflora Burkart*	FOD	-	-	-
M. cubatanensis Hoehne	FOD	-	-	-
M. daleoides Benth.	FCA	-	-	-
M. deceptrix Barneby*	FOD	-	-	-
M. diplotricha C.Wright *ex* Sauvalle	FES	-	-	-
M. dolens Vell.	FCA	-	-	-
M. dryandroides Taub.*	AFL	-	-	-
M. dutrae Malme*	AFL	-	-	-
M. elliptica Benth.	RST	-	-	-
M. eriocarpa Benth.	FCA	-	-	-
M. ernestii Harms*	AFL	-	-	-
M. extensa Benth.*	FOD	-	-	-
M. fachinalensis Burkart*	FOD, AFL	-	-	-
M. filipetiola Burkart*	FCA	-	-	-
M. flagellaris Benth.	?	-	-	-
M. flocculosa Burkart	?	-	-	-
M. furfuracea Benth.*	AFL, FED	-	-	-
M. glabra Benth.	FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
M. glazioui Benth.*	AFL	-	-	-
M. glycyrrhizoides Barneby*	FOD	-	-	-
M. gracilis Benth.	FCA	-	-	-
M. gymnas Barneby*	AFL, FCA	-	-	-
M. hatschbachii Barneby*	AFL	-	-	-
M. hilariana Barneby*	FCA	-	-	-
M. hirsutissima Mart.	RST	-	-	-
M. incana Benth.	FCA	-	-	-
M. insidiosa Benth.	FCA	-	-	-
M. invisa Mart. *ex* Collad.	?	-	-	-
M. involucrata Benth.*	FOD, FCA	-	-	-
M. iperoensis Hoehne	FCA	-	-	-
M. itatiaiensis Dusén*	FCA	-	-	-
M. kermesina Otto & A.Dietr.	?	-	-	-
M. kuhnisteroides Barneby*	FCA	-	-	-
M. lanata Benth.*	FCA, FES	-	-	-
M. lepidorepens Burkart*	FCA	-	-	-
M. lewisii Barneby	RST	-	-	-
M. lundiana Benth.*	FOD	-	-	-
M. maracayuensis Chodat & Hassl.	FCA	-	-	-
M. medioxima Barneby*	FOD	-	-	-
M. micropteris Benth.	FCA	-	-	-
M. miranda Barneby*	?	-	-	-
M. monticola Dusén*	FCA	-	-	-
M. multiplex Benth.*	AFL	-	-	-
M. murex Barneby*	FCA	-	-	-
M. myriophylla Bong. *ex* Benth.	FCA	-	-	-
M. myuros Barneby*	FOD	-	-	-
M. niederleinii Burkart*	FOD, FCA	-	-	-
M. oblonga Benth.*	AFL, FCA	-	-	-
M. orthacantha Benth.	FCA	-	-	-
M. ourobrancoensis Burkart*	AFL, FCA	-	-	-
M. pabstiana Barneby*	FOD	-	EN	ANEXO I
M. paraguariae M.Micheli	FCA	-	-	-
M. paranapiacabae Barneby*	AFL	-	-	-
M. pedersenii Barneby	?	-	-	-
M. per-dusenii Burkart*	FCA	-	-	-
M. pigra L.	FES	-	-	-
M. pilulifera Benth.	FOD	-	-	-
M. pithecolobioides Benth.	FES	-	-	-
M. polydactyla Humb. & Bonpl. *ex* Willd.	FOD, RST	-	-	-
M. prionopus Barneby*	FOD, FCA	-	-	-
M. pseudocallosa Burkart*	FOD	-	-	-
M. pseudolepidota (Burkart) Barneby*	FCA	-	-	-
M. pseudotrachyhcarpa Barneby	AFL, FES	-	-	-
M. psittacina Barneby*	?	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
M. pudica L.	RST	-	-	-
M. quadrivalvis L.	RST	-	-	-
M. ramentacea Burkart*	FCA, FOD	-	-	-
M. ramosissima Benth.*	FOD, FCA	-	-	-
M. ramulosa Benth.	AFL	-	-	-
M. regnellii Benth.*	AFL	-	-	-
M. rupestris Benth.	?	-	-	-
M. sanguinolenta Barneby	FCA, AFL	-	-	-
M. scabrella Benth.*	FOD	-	-	-
M. schleidenii Herter	AFL	-	-	-
M. selloi Benth.*	FCA, FOD, FES	-	-	-
M. sensitiva L.	RST	-	-	-
M. serra Burkart*	FCA, FOD	-	-	-
M. setosa Benth.	FES	-	-	-
M. somnians Humb. & Bonpl. *ex* Willd.	?	-	-	-
M. sparsiformis Barneby*	?	-	-	-
M. strobiliflora Burkart*	FOD	-	-	-
M. taimbensis Burkart*	FOD	-	-	-
M. tarda Barneby	RST	-	-	-
M. trichocephala Benth.*	FES, FOD	-	-	-
M. uliginosa Chodat & Hassl.*	FCA	-	-	-
M. urticaria Barneby*	?	-	-	-
M. velloziana Mart.	?	-	-	-
M. widgrenii Harms*	FCA	-	-	-
M. xanthocentra Mart.	FCA	-	-	-
Moldenhawera – 6/9				
M. blanchetiana Tul.*	FOD, RST	-	-	-
M. floribunda Schrad.*	FOD	-	-	-
M. luschnathiana Yakovlev*	RST	-	-	-
M. nutans L.P.Queiroz, G.P.Lewis & R.Allkin*	RST	-	-	-
M. papillanthera L.P.Queiroz, G.P.Lewis & R.Allkin*	FOD	-	-	-
M. polysperma (Vell.) Stellfeld*	FOD	-	-	-
Mucuna – 4/ca. 100				
M. japira A.M.G.Azevedo , K.Agostini & Sazima*	RST	-	-	-
M. pruriens (L.) DC.	FES, RST	-	-	-
M. sloanei Fawc. & Rendle	FOM, RST	-	-	-
M. urens (L.) Medik.	FOD, FOM, RST	-	-	-
Myrocarpus – 3/5				
M. fastigiatus All.*	FOD	-	-	-
M. frondosus All.	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
M. leprosus Pickel*	FOD	-	-	-
Myroxylon – 1/2				
M. peruiferum L.f.	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
Mysanthus – 1/1				
M. uleanus (Harms) G.P.Lewis & A.Delgado	FOD, FES	-	-	-
Neptunia – 3/12				

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
N. oleracea Lour.	FCA	-	-	-
N. plena (L.) Benth.	FCA	-	-	-
N. pubescens Benth.	FCA	-	-	-
Ormosia – 10/ca. 130				
O. arborea (Vell.) Harms*	RST, FOD	-	-	-
O. bahiensis Monach.*	FES	-	-	-
O. costulata (Miq.) Kleinh.	RST	-	-	-
O. fastigiata Tul.	FOD	-	-	-
O. friburgensis Taub. *ex* Glaz.*	FOD	-	-	-
O. minor Vogel*	FOD	-	-	-
O. nitida Vogel*	RST	-	-	-
O. ruddiana Yakovlev*	FES	-	-	-
O. timboënsis D.Cardoso, Meireles & H.C.Lima*	FOD	-	-	-
O. vicosana Rudd*	FES	-	-	-
Oryxis – 1/1				
O. monticola (Mart. *ex* Benth.) A.Delgado & G.P.Lewis	FES, FCA	-	-	-
Parapiptadenia – 5/6				
P. blanchetii (Benth.) Vaz & M.P.Lima	FES, FED	-	-	-
P. ilheusana G.P.Lewis*	FOD	-	-	-
P. pterosperma (Benth.) Brenan*	FOD, FES, RST	-	-	-
P. rigida (Benth.) Brenan	FOD, FES	-	-	-
P. zehntneri (Harms) M.P.Lima & H.C.Lima	FES, FED	-	-	-
Parkia – 3/34				
P. bahiae H.C.Hopkins*	FOD, RST	-	-	-
P. pendula (Willd.) Benth.	FOD, FES	-	-	-
P. platycephala Benth.	FES	-	-	-
Peltogyne – 7/25				
P. angustiflora Ducke*	FOD	-	-	-
P. chrysopis Barneby*	FOD	-	-	-
P. confertiflora (Mart. *ex* Hayne) Benth.	FOD, FES	-	-	-
P. discolor Vogel*	FOD, FES	-	-	-
P. mattosiana Rizzini*	FOD	-	-	-
P. pauciflora Ducke	FES, FED	-	-	-
P. recifensis Ducke*	FOD	-	-	-
Peltophorum – 1/5-7				
P. dubium (Spreng.) Taub.	FOD, FES, FED	-	-	-
Periandra – 3/6				
P. coccinea (Schrad.) Benth.	FES, FCA	-	-	-
P. densiflora Benth.	FES, FCA	-	-	-
P. mediterranea (Vell.) Taub.	FCA, RST	-	-	-
Phaseolus – 1/ca. 65				
P. lunatus L.	FCA, RST	-	-	-
Piptadenia – 14/ca. 24				
P. adiantoides (Spreng.) J.F.Macbr.	FOD, FES, RST	-	-	-
P. affinis Burkart*	FOD	-	-	-
P. gonoacantha (Mart.) J.F.Macbr.	FOD, FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
P. irwinii G.P.Lewis	FES	-	-	-
P. killipii J.F.Macbr.*	FOD	-	-	-
P. latifolia Benth.*	RST, FOD	-	-	-
P. laxipinna G.Barroso*	FOD	-	-	-
P. micracantha Benth.*	FOD, FES	-	-	-
P. paniculata Benth.*	FOD	-	-	-
P. polyptera Benth.	?	-	-	-
P. ramosissima Benth.*	FOD	-	-	-
P. santosii Barneby *ex* G.P.Lewis*	FOD	-	-	-
P. trisperma (Vell.) Benth.*	RST	-	-	-
P. viridiflora (Kunth) Benth.	FED	-	-	-
Pityrocarpa – 1/3				
P. moniliformis (Benth.) Luckow & Jobson	FED	-	-	-
Plathymenia – 1/1				
P. reticulata Benth.	FOD, FES, FED	-	-	-
Platycyamus – 1/1				
P. regnellii Benth.	FOD, FES	-	-	-
Platymiscium – 3/19				
P. floribundum Vogel	FOD, FES, FED, FCA, RST	-	-	-
P. pubescens Micheli	FOD, FES, FED	-	-	-
P. speciosum Vogel*	FOD, RST	-	-	-
Platypodium – 1/2				
P. elegans Vogel	FOD, FES, FED	-	-	-
Poecilanthe – 5/ca. 12				
P. falcata (Vell.) Heringer*	FES, FOD	-	-	-
P. grandiflora Benth.*	FES, FED	-	-	-
P. itapuana G.P.Lewis*	RST	-	-	-
P. parviflora Benth.*	FES, FOD	-	-	-
P. ulei (Harms) Arroyo & Rudd	FOD	-	-	-
Poeppigia – 1/1				
P. procera C.Presl	FOD, FES, FED	-	-	-
Poiretia – 4/11				
P. angustifolia Vogel	FOD, FES, FCA	-	-	-
P. latifolia Vogel	FOM, FCA	-	-	-
P. punctata (Willd.) Desv.	FOD, FES, FCA	-	-	-
P. tretraphylla (Poir.) Burkart	FOD, FCA	-	-	-
Pomaria – 4/16				
P. parviflora (Micheli) B.B.Simpson & G.P.Lewis	FES	-	-	-
P. pilosa (Vogel) B.B.Simpson & G.P.Lewis	FOD, FCA	-	-	-
P. rubicunda (Vogel) B.B.Simpson & G.P.Lewis	FCA, FES	-	-	-
P. stipularis (Vogel) B.B.Simpson & G.P.Lewis*	FOD	-	-	-
Pseudopiptadenia – 7/11				
P. bahiana G.P.Lewis & M.P.Lima	FES, FED	-	-	-
P. contorta (DC.) G.P.Lewis & M.P.Lima	FOD, FES, RST	-	-	-
P. inaequalis (Benth.) Rauschert*	FOD	-	-	-
P. leptostachya (Benth.) Rauschert*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
P. psilostachya (DC.) G.P.Lewis & M.P.Lima*	FOD	-	-	-
P. schumanniana (Taub.) G.P.Lewis & M.P.Lima*	FOD, FES	-	-	-
P. warmingii (Benth.) G.P.Lewis & M.P.Lima*	FOD, FES	-	-	-
Pterocarpus – 1/ca. 40				
P. rohrii Vahl	FOD, FES, RST	-	-	-
Pterodon – 1/3				
P. emarginatus Vogel	FES, FED	-	-	-
Pterogyne – 1/1				
P. nitens Tul.	FOD, FES, FED	-	-	-
Rhynchosia – 15/ca. 230				
R. arenicola Hassl.	FES, FCA	-	-	-
R. corylifolia Mart. *ex* Benth.	FES, FCA	-	-	-
R. diversifolia Micheli	FOM, FCA	-	-	-
R. edulis Griseb.	FOM, FCA	-	-	-
R. hauthalii Harms *ex* Kuntze	FOM, FCA	-	-	-
R. lateritia Burkart	FED, FCA	-	-	-
R. leucophylla Benth.	FED, FCA	-	-	-
R. lineata Benth.	FED, FCA	-	-	-
R. melanocarpa Grear	FES, FED, FCA	-	-	-
R. minima (L.) DC.	FOD, FES	-	-	-
R. naineckensis Fortunato	FES	-	-	-
R. phaseoloides (Sw.) DC.	FES	-	-	-
R. reticulata (Sw.) DC.	FCA	-	-	-
R. rojasii Hassl.	FCA	-	-	-
R. senna Gill. *ex* Hook.	FCA	-	-	-
Riedeliella – 1/2				
R. sessiliflora Kuhlm.*	FES	-	-	-
Samanea – 3/3				
S. inopinata (Harms) Barneby & W.J. Grimes	FES, FED	-	-	-
S. saman (Jacq.) Merr.	FES, FED	-	-	-
S. tubulosa (Benth.) Barneby & J.W. Grimes	FES, FED	-	-	-
Schizolobium – 1/1				
S. parahyba (Vell.) Blake	FOD, FES	-	-	-
Senegalia – 26/ca. 207				
S. bahiensis (Benth.) Seigler & Ebinger	?	-	-	-
S. catharinensis (Burkart) Seigler & Ebinger*	FOD	-	-	-
S. giganticarpa (G.P.Lewis) Seigler & Ebinger*	FOD	-	-	-
S. grandistipula (Benth.) Seigler & Ebinger*	FOD	-	-	-
S. kallunkiae (Grimes & Barneby) Seigler & Ebinger*	FOD	-	-	-
S. lacerans (Benth.) Seigler & Ebinger*	FOD	-	-	-
S. langsdorfii (Benth.) Seigler & Ebinger	FED	-	-	-
S. lasiophylla (Benth.) Seigler & Ebinger	?	-	-	-
S. magnibracteosa (Burkart) Seigler & Ebinger*	FOM	-	-	-
S. martii (Benth.) Seigler & Ebinger	?	-	-	-
S. martiusiana (Steud.) Seigler & Ebinger*	FOD	-	-	-
S. miersii (Benth.) Seigler & Ebinger*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
S. mikanii (Benth.) Seigler & Ebinger*	RST	-	-	-
S. monacantha (Willd.) Seigler & Ebinger	?	-	-	-
S. nitidifolia (Speg.) Seigler & Ebinger*	FOD	-	-	-
S. olivensana (G.P.Lewis) Seigler & Ebinger*	FCA, RST	-	-	-
S. pedicellata (Benth.) Seigler & Ebinger*	FOD	-	-	-
S. piptadenioides (G.P.Lewis) Seigler & Ebinger*	FOD	-	-	-
S. polyphylla (DC.) Britton & Rose	?	-	-	-
S. pteridifolia (Benth.) Seigler & Ebinger*	FOD, RST	-	-	-
S. recurva (Benth.) Seigler & Ebinger	?	-	-	-
S. riparia (Kunth) Britton & Rose *ex* Britton & Killip	?	-	-	-
S. serra (Benth.) Seigler & Ebinger*	FOD (?)	-	-	-
S. tenuifolia (L.) Britton & Rose	?	-	-	-
S. tucumanensis (Griseb.) Seigler & Ebinger*	FOD	-	-	-
S. velutina (DC.) Seigler & Ebinger*	FOD	-	-	-
Senna – 33/ca. 300				
S. acutisepala (Benth.) H.S.Irwin & Barneby*	FOD, RST	-	-	-
S. affinis (Benth.) H.S.Irwin & Barneby	FOD	-	-	-
S. alata (L.) Roxb.	FOD, RST	-	-	-
S. angulata (Vogel) H.S.Irwin & Barneby	FOD	-	-	-
S. appendiculata (Vogel) Wiersema*	RST	-	-	-
S. araucarietorum H.S.Irwin & Barneby*	FOM	-	-	-
S. cana (Nees & Mart.) H.S.Irwin & Barneby	FOD, RST, FES, FCA	-	-	-
S. cernua (Balb.) H.S.Irwin & Barneby	FCA	-	-	-
S. corymbosa (Lam.) H.S.Irwin & Barneby	FCA	-	-	-
S. formosa H.S.Irwin & Barneby*	RST	-	-	-
S. hirsuta (L.) H.S.Irwin & Barneby	FOD, FES	-	-	-
S. itatiaiae H.S.Irwin & Barneby*	FOD, FCA	-	-	-
S. macranthera (DC. *ex* Collad.) H.S.Irwin & Barneby	FOD, FES	-	-	-
S. multijuga (Rich.) H.S.Irwin & Barneby	FOD, FES, RST	-	-	-
S. neglecta (Vogel) H.S.Irwin & Barneby	FOD, RST, FOM, FES	-	-	-
S. oblongifolia (Vogel) H.S.Irwin & Barneby	FCA	-	-	-
S. obtusifolia (L.) H.S.Irwin & Barneby	FOD, RST, FES, FCA	-	-	-
S. occidentalis (L.) Link	FOD, FES, FOM, RST	-	-	-
S. organensis (Glaz. *ex* Harms) H.S.Irwin & Barneby*	FOM, FCA	-	-	-
S. pendula (Humb. & Bonpl. *ex* Willd.) H.S.Irwin & Barneby	FOD, FOM, RST, FCA, FES	-	-	-
S. pentagonia (Mill.) H.S.Irwin & Barneby	FOD, FES	-	-	-
S. phlebadenia H.S.Irwin & Barneby*	FOD	-	-	-
S. pilifera (Vogel) H.S.Irwin & Barneby	FOD, FCA, RST, FES	-	-	-
S. pinheiroi H.S.Irwin & Barneby	FOD, RST	-	-	-
S. pneumatica H.S.Irwin & Barneby*	FCA	-	-	-
S. quinquangulata (Rich.) H.S.Irwin & Barneby	RST	-	-	-
S. silvestris (Vell.) H.S.Irwin & Barneby	FOD, FES, FED	-	-	-
S. spectabilis (DC.) H.S.Irwin & Barneby	FOD, FES	-	-	-
S. spinigera (Rizzini) H.S.Irwin & Barneby*	FOD	-	-	-
S. splendida (Vogel) H.S.Irwin & Barneby	FOD, FES, FOM	-	-	-
S. subtrijuga H.S.Irwin & Barneby*	RST	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
S. tenuifolia (Vogel) H.S.Irwin & Barneby	FCA	-	-	-
S. tropica (Vell.) H.S.Irwin & Barneby	FOD, FES	-	-	-
Sesbania – 4/ca. 60				
S. exasperata Kunth	FOD, FES	-	-	-
S. oligosperma Taub.*	?	-	-	-
S. punicea (Cav.) Burkart	FCA	-	-	-
S. virgata (Cav.) Pers.	FCA	-	-	-
Sophora – 1/ca. 50				
S. tomentosa L.	RST	-	-	-
Stryphnodendron – 4/ca. 35				
S. polyphyllum Mart.	FOD, FES	-	-	-
S. pulcherrimum (Willd.) Hochr.	FOD, FES	-	-	-
S. roseiflorum (Ducke) Ducke	FES	-	-	-
S. rotundifolium Mart.	FES, FED, FCA	-	-	-
Stylosanthes – 15/ca. 25				
S. angustifolia Vogel	FOD, FES, FCA, RST	-	-	-
S. aurea M.B.Ferreira & S.Costa	FCA	-	-	-
S. bracteata Vogel	FED, FCA	-	-	-
S. capitata Mohlenbr.	FED, FCA, RST	-	-	-
S. gracilis Kunth	FOD, FED, FCA, RST	-	-	-
S. grandifolia M.B.Ferreira & S.Costa	FOD, FES, FED, FCA,	-	-	-
S. guianensis (Aubl.) Sw.	FOD, FES, FED, FCA, RST	-	-	-
S. hippocampoides Mohlenbr.	FOD, FES, FCA	-	-	-
S. humilis Kunth	FES, FED, FCA	-	-	-
S. leiocarpa Vogel	FOD, FOM, FES, FCA	-	-	-
S. longiseta Micheli	FOD, FCA	-	-	-
S. macrocephala M.B.Ferreira & S.Costa	FES, FED, FCA	-	-	-
S. montevidensis Vogel	FES, FED, FCA	-	-	-
S. scabra Vogel	FOD, FES, FED, FCA, RST	-	-	-
S. viscosa Sw.	FOD, FES, FED, FCA, RST	-	-	-
Swartzia – 24/ca. 180				
S. acutifolia Vogel*	FOD, FES	-	-	-
S. alternifoliolata Mansano*	FOD	-	-	-
S. apetala Raddi*	FOD, FES, RST	-	-	-
S. bahiensis R.S.Cowan*	FOD, FES	-	-	-
S. capixabensis Mansano*	FOD	-	-	-
S. curranii R.S.Cowan*	FOD	-	-	-
S. dipetala Willd. *ex* Vogel	FOD	-	-	-
S. flaemingii Raddi	FOD, FES	-	-	-
S. glazioviana (Taub.) Glaz.*	RST	-	EN	ANEXO I
S. langsdorffii Raddi*	FOD	-	-	-
S. linharensis Mansano*	FOD	-	-	-
S. macrostachya Benth.	FOD, FES	-	-	-
S. micrantha R.S.Cowan*	FOD	-	-	-
S. multijuga Vogel*	FOD, FES	-	-	-
S. myrtifolia Sm.	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
S. oblata R.S.Cowan*	FES, FOD	-	-	-
S. peremarginata R.S.Cowan*	FOD	-	-	-
S. pickelii Killip *ex* Druce*	FOD	-	EN	ANEXO I
S. pilulifera Benth.*	FOD	-	-	-
S. pinheiroana R.S.Cowan*	FOD	-	-	-
S. polita (R.S.Cowan) Torke *	FOD	-	-	-
S. riedelii R.S.Cowan*	FOD	-	-	-
S. simplex (Sw.) Spreng.	FOD	-	-	-
S. submarginata (Benth.) Mansano*	FOD	-	-	-
Sweetia – 1/1				
S. fruticosa Spreng.	FOD, FES, FED	-	-	-
Tachigali – 11/ca. 70				
T. aurea Tul.	FES, FED	-	-	-
T. beaurepairei (Harms) L.G.Silva & H.C.Lima *	FOD	-	-	-
T. densiflora (Benth.) L.G.Silva & H.C.Lima *	FOD, FES	-	-	-
T. denudata (Vogel) Oliveira-Filho*	FOD	-	-	-
T. duckei (Dwyer) Oliveira-Filho*	FOD	-	-	-
T. friburgensis (Harms) L.G.Silva & H.C.Lima *	FOD	-	-	-
T. paratyensis (Vell.) H.C.Lima *	FOD, FES	-	-	-
T. pilgeriana (Harms) Oliveira-Filho*	FOD	-	-	-
T. rugosa (Mart. *ex* Benth.) Zarucchi & Pipoly	FOD, FES	-	-	-
T. urbaniana (Harms) L.G.Silva & H.C.Lima *	FOD	-	-	-
T. vulgaris L.G.Silva & H.C.Lima	FES, FED, FCA	-	-	-
Tephrosia – 13/ca. 350				
T. adunca Benth.	FCA	-	-	-
T. candida DC.	FOM	-	-	-
T. cinerea (L.) Pers.	FCA	-	-	-
T. egregia Sandwith	RST	-	-	-
T. guaranitica Chodat & Hassl.	FCA	-	-	-
T. hassleri Chodat	FCA	-	-	-
T. leptostachya DC.	FCA	-	-	-
T. noctiflora Bojer *ex* Baker	FCA	-	-	-
T. purpurea (L.) Pers.	FCA	-	-	-
T. rufescens Benth.	FCA	-	-	-
T. sessiliflora (Poir.) Hassl.	FCA	-	-	-
T. sinapou (Bunchoz) A.Chev.	FOM	-	-	-
T. vogelii Hook.f.	FOM	-	-	-
Teramnus – 1/9				
T. uncinatus (L.) Sw.	FOD, FOM, FES, FED, FCA, RST-		-	-
Trifolium – 1/ca. 250				
T. riograndense Burkart*	FCA	-	-	-
Trischidium – 4/ ?				
T. alternum (Benth.) H.Ireland	FOD, FES	-	-	-
T. decipiens (R.S.Cowan) H.Ireland*	FOD	-	-	-
T. limae (R.S.Cowan) H.Ireland*	RST	-	-	-
T. molle (Benth.) H.E.Ireland	FES, FED	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Vachellia – 1/ca. 161				
V. farnesiana (L.) Wight & Arn	FED, RST	-	-	-
Vatairea – 1/8				
V. heteroptera (Allemão) Ducke *ex* Assis Iglesias*	FOD, FES	-	-	-
Vataireopsis –1/3				
V. araroba (Aguiar) Ducke*	FOD, FES		-	-
Vicia – 6/ca. 160				
V. graminea Sm.	FCA	-	-	-
V. linearifolia Hook. & Arn.	FCA	-	-	-
V. montevidensis Vogel	FCA	-	-	-
V. nana Vogel	FCA, FED	-	-	-
V. stenophylla Vogel	FCA, FOM	-	-	-
V. tephrosoides Vogel	FCA, FED	-	-	-
Vigna – 10/ca. 100				
V. adenantha (G.Mey.) Maréchal *et al.*	FOD, FES, FCA, RST	-	-	-
V. candida (Vell.) Maréchal *et al.*	FOD, FES, FCA, RST	-	-	-
V. caracalla (L.) Verdc.	FOD, FES, FCA, RST	-	-	-
V. lasiocarpa (Mart. *ex* Benth.) Verdc.	FES, FCA	-	-	-
V. linearis (Kunth) Maréchal *et al.*	FOD, FES, FCA, RST	-	-	-
V. longifolia (Benth.) Verdc.	FOD, FES, FCA, RST	-	-	-
V. luteola (Jacq.) Benth.	FCA, RST	-	-	-
V. peduncularis (Kunth) Fawc. & Rendle	FOD, FES, FCA	-	-	-
V. speciosa (Kunth) Verdc.	FOD, FES, FCA, RST	-	-	-
V. vexillata (L.) A.Rich.	FOD, RST	-	-	-
Zollernia – 6/10				
Z. cowanii Mansano*	FOD	-	-	-
Z. glabra (Spreng.) Yakovlev*	FOD, FES	-	-	-
Z. glaziovii Yakovlev*	FOD	-	-	-
Z. ilicifolia (Brongn.) Vogel	FOD, FES	-	-	-
Z. magnifica A.M.Carvalho & Barneby*	FOD	-	-	-
Z. modesta A.M.Carvalho & Barneby*	FOD	-	-	-
Zornia – 20/ca. 75				
Z. brasiliensis Vogel	AFL	-	-	-
Z. burkartii Vanni	FCA	-	-	-
Z. cearensis Huber	FCA, AFL	-	-	-
Z. confusa Vanni	AFL	-	-	-
Z. crinita (Mohlenbr.) Vanni	FCA	-	-	-
Z. cryptantha Arechav.	AFL	-	-	-
Z. curvata Mohlenbr.	FCA, AFL	-	-	-
Z. echinocarpa (Moric.) Benth.	AFL	-	-	-
Z. glabra Desv.	RST	-	-	-
Z. hebecarpa Mohlenbr.	FCA	-	-	-
Z. latifolia Sm.	FCA, AFL	-	-	-
Z. multinervosa Burkart *ex* N.M.Bacigal.	FCA	-	-	-
Z. myriadena Benth.	AFL	-	-	-
Z. orbiculata Mohlenbr.	FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Z. pardina Mohlenbr.	FCA	-	-	-
Z. ramboiana Mohlenbr.	FCA	-	-	-
Z. reticulata Sm.	FCA, AFL	-	-	-
Z. trachycarpa Vogel	FCA	-	-	-
Z. vestita Mohlenbr.	AFL	-	-	-
Z. virgata Moric.	FCA	-	-	-
Zygia – 4/ca. 50				
Z. cataractae (Kunth) L.Rico	FES	-	-	-
Z. latifolia (L.) Fawc. & Rendle	FOD	-	-	-
Z. morongii Barneby & J.W.Grimes	FOD	-	-	-
Z. selloi (Benth.) L.Rico*	FOD	-	-	-

Gelsemiaceae

Marcos Sobral

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
GELSEMIACEAE – 1/11				
Mostuea – 1/2				
M. muricata Sobral & L.Rossi	FES	-	-	-

Gentianaceae

Mariana Machado Saavedra, Claudio Nicoletti de Fraga & Elsie Franklin Guimarães

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
GENTIANACEAE – 41/174				
Calolisianthus – 5/6				
C. amplissimus (Mart.) Gilg	FCA	-	-	-
C. pedunculatus (Cham. & Schltdl.) Gilg	FCA, AFL	-	-	-
C. pendulus (Mart.) Gilg	FCA	-	-	-
C. pulcherrimus (Mart.) Gilg	FCA, AFL	-	-	-
C. speciosus (Cham. & Schltdl.) Gilg	FCA, AFL	-	-	-
Chelonanthus – 3/8				
C. alatus (Aubl.) Pulle	FCA	-	-	-
C. purpurascens (Aubl.) L.Struwe *et al.*	AFL, RST	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
C. viridiflorus (Mart.) Gilg	FCA	-	-	-
Coutoubea – 1/5				
C. spicata Aubl.	FCA, RST	-	-	-
Curtia – 3/8				
C. conferta (Mart.) Knobl.	FCA, AFL, RST	-	-	-
C. diffusa (Mart.) Cham.	AFL	-	-	-
C. patula (Mart.) Knobl.	FCA, AFL	-	-	-
Deianira – 4/7				
D. chiquitana Herzog	FCA	-	-	-
D. damazioi E.F.Guim.*	AFL	-	-	-
D. erubescens Cham. & Schltdl.	FCA, AFL	-	-	-
D. nervosa Cham. & Schltdl.	FCA, AFL	-	-	-
Helia – 1/2				
H. oblongifolia Mart.	FCA	-	-	-
*Hockinia** – 1/1				
H. montana Gardner*	FCA, AFL	-	-	-
Macrocarpaea – 4/90				
M. glaziovii Gilg.*	FOD	-	-	-
M. illecebrosa J.R.Grant*	FOD	-	-	-
M. obtusifolia (Griseb.) Gilg	FOD, AFL, FCA	-	-	-
M. rubra Malme*	FOD	-	-	-
Prepusa – 4/5				
P. alata Porto & Brade*	FCA	-	-	-
P. connata Gardner*	FCA	-	-	-
P. hookeriana Gardner*	FCA	-	EN	ANEXO I
P. viridiflora Brade*	FCA	-	EN	ANEXO II
Schultesia – 6/19				
S. australis Griseb.	FCA, RST	-	-	-
S. brachyptera Cham.	FCA	-	-	-
S. doniana Progel	FCA, RST	-	-	-
S. gracilis Mart.	FCA, AFL	-		
S. guianensis (Aubl.) Malme	FCA, RST	-	-	-
S. pohliana Progel	FCA	-	-	-
Senaea – 2/2				
S. coerulea Taub.	FCA	-	CR	ANEXO II
S. janeirensis Brade*	FCA	-	CR	ANEXO II
Tetrapollinia – 1/1				
T. caerulescens (Aubl.) Maguire & B.M.Boom	FCA	-	-	-
Voyria – 5/19				
V. aphylla (Jacq.) Pers.	FOD	-	-	-
V. caerulea Aubl.	FOD	-	-	-
V. flavescens Griseb.	FOD	-	-	-
V. obconica Progel*	FOD	-	-	-
V. tenella Guild. *ex* Hook.	FOD	-	-	-
Zygostigma – 1/1				
Z. australe (Cham. & Schltdl.) Griseb.	FCA	-	-	-

Geraniaceae

Marcos Sobral

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
GERANIACEAE – 8/700				
Erodium – 1/60				
E. geoides A.St.-Hil.	FOD, FCA	-	-	-
Geranium – 7/300				
G. albicans A.St.-Hil.	FOD, FCA	-	-	-
G. arachnoideum A.St.-Hil.*	FOD, FCA	-	-	-
G. brasiliense Progel*	FOD, FCA	-	-	-
G. carolinianum L.	FOD, FCA	-	-	-
G. dissectum L.	FOD, FCA	-	-	-
G. glanduligerum R.Knuth*	FOD, FCA	-	-	-
G. robertianum L.	FOD, FCA	-	-	-

Gesneriaceae

Alain Chautems

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
GESNERIACEAE – 127/3500				
Anetanthus – 1/2				
A. gracilis Hiern	AFL	-	-	-
Besleria – 9/>150				
B. flavovirens Nees & Mart.	FOD	-	-	-
B. fluminensis Brade*	FOD	-	-	-
B. laxiflora Benth.	FOD	-	-	-
B. longimucronata Hoehne*	FOD	-	-	-
B. macahensis Brade*	FOD	-	-	-
B. melancholica (Vell.) C.V.Morton*	FOD	-	-	-
B. meridionalis C.V.Morton*	FOD	-	-	-
B. selloana Klotzsch & Hanst.*	FOD	-	-	-
B. umbrosa Mart.*	FOD	-	-	-
Codonanthe – 9/18				
C. carnosa (Gardner) Hanst.*	FOD	-	-	-
C. cordifolia Chautems*	FOD	-	-	-
C. devosiana Lem.*	FOD, RST	-	-	-
C. gibbosa Rossini & Chautems*	FOD	-	-	-
C. gracilis (Mart.) Hanst.*	FOD, RST	-	-	-
C. mattos-silvae Chautems*	FOD	-	-	-
C. serrulata Chautems*	FOD	-	-	-
C. uleana Fritsch	FOD	-	-	-
C. venosa Chautems*	FOD	-	-	-
Columnea – 2/ca 200				
C. sanguinea (Pers.) Hanst.	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
C. ulei Mansf.*	FOD	-	-	-
Drymonia – 2/70				
D. coccinea (Aubl.) Wiehler	FOD	-	-	-
D. serrulata (Poepp.) Wiehler	FOD	-	-	-
Napeanthus – 2/16				
N. primulifolius (Raddi) Sandwith*	FOD	-	-	-
N. reitzii (L.B.Sm.) Leeuwenb.*	FOD	-	-	-
*Nematanthus** – 31/31				
N. albus Chautems*	FOD	-	-	-
N. australis Chautems*	FOD	-	-	-
N. bradei (Handro) Chautems*	FOD	-	-	-
N. brasiliensis (Vell.) Chautems*	FOD	-	-	-
N. corticola Schrad.*	FOD	-	-	-
N. crassifolius (Schott) Wiehler*	FOD	-	-	-
N. fissus (Vell.) L.E.Skog*	FOD	-	-	-
N. fluminensis (Vell.) Fritsch*	FOD	-	-	-
N. fornix (Vell.) Chautems*	FOD	-	-	-
N. fritschii Hoehne*	FOD	-	-	-
N. gregarius D.L.Denham*	FOD	-	-	-
N. hirtellus (Schott) Wiehler*	FOD	-	-	-
N. jolyanus (Handro) Chautems*	FOD	-	-	-
N. kautskyi Chautems & Rossini*	FOD	-	-	-
N. kuhlmannii (Handro) Chautems*	FOD	-	-	-
N. lanceolatus (Poir.) Chautems*	FOD, FES	-	-	-
N. maculatus (Fritsch) Wiehler*	FOD	-	-	-
N. mattosianus (Handro) H.E.Moore*	FOD	-	-	-
N. mirabilis (Handro) Chautems*	FOD	-	-	-
N. monanthos (Vell.) Chautems*	FOD	-	-	-
N. punctatus Chautems*	FOD	-	-	-
N. pycnophyllus Chautems *et al.**	FOD	-	-	-
N. sericeus (Hanst.) Chautems*	FOD, FES	-	-	-
N. serpens (Vell.) Chautems*	FOD	-	-	-
N. striatus (Handro) Chautems*	FOD	-	-	-
N. strigillosus (Mart.) H.E.Moore*	AFL	-	-	-
N. teixeiranus (Handro) Chautems*	FOD	-	-	-
N. tessmannii (Hoehne) Chautems*	FOD	-	-	-
N. villosus (Hanst.) Wiehler*	FOD	-	-	-
N. wettsteinii (Fritsch) H.E.Moore*	FOD	-	-	-
N. wiehleri Chautems & M.Peixoto*	FOD	-	-	-
Paliavana – 5/6				
P. gracilis (Mart.) Chautems	FCA	-	-	-
P. prasinata (Ker Gawl.) Benth.*	FOD	-	-	-
P. sericiflora Benth.	AFL	-	-	-
P. tenuiflora Mansf.	AFL	-	-	-
P. werdermannii Mansf.	AFL	-	-	-
Seemannia – 1/4				
S. sylvatica (Kunth) Hanst.	FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Sinningia – 57/ca. 75				
S. aggregata (Ker Gawl.) Wiehler	FOD, AFL	-	-	-
S. aghensis Chautems*	AFL	-	-	-
S. allagophylla (Mart.) Wiehler	AFL, FCA	-	-	-
S. amambayensis Chautems*	AFL	-	-	-
S. araneosa Chautems	AFL	-	-	-
S. barbata (Nees & Mart.) G.Nicholson*	FOD	-	-	-
S. brasiliensis (Regel & Schmidt) Wiehler & Chautems*	AFL	-	-	-
S. bulbosa (Ker Gawl.) Wiehler*	AFL	-	-	-
S. calcaria (Malme) Chautems*	AFL, FOD	-	-	-
S. canescens (Mart.) Wiehler*	AFL	-	-	-
S. carangolensis Chautems*	AFL	-	EN	ANEXO II
S. cardinalis (Lehm.) H.E.Moore*	AFL	-	EN	ANEXO I
S. cochlearis (Hook.) Chautems*	AFL	-	EN	ANEXO I
S. conspicua (Seem.) G.Nicholson*	FOD	-	-	-
S. cooperi (Paxton) Wiehler*	FOD	-	-	-
S. curtiflora (Malme) Chautems*	FOD, FCA	-	-	-
S. defoliata (Malme) Chautems	FES	-	-	-
S. douglasii (Lindl.) Chautems*	FOD, FOM	-	-	-
S. elatior (Kunth) Chautems	FCA	-	-	-
S. eumorpha H.E.Moore*	FES	-	-	-
S. gigantifolia Chautems*	FOD, FOM	-	-	-
S. glazioviana (Fritsch) Chautems*	FOD, FOM	-	-	-
S. guttata Lindl.*	FOD	-	EN	ANEXO I
S. hatschbachii Chautems*	AFL	-	-	-
S. helleri Nees*	FOD	-	-	-
S. hirsuta (Lindl.) G.Nicholson*	FOD	-	EN	ANEXO I
S. iarae Chautems*	FOD	-	-	-
S. incarnata (Aubl.) D.L.Denham	AFL	-	-	-
S. insularis (Hoehne) Chautems*	AFL	-	-	-
S. kautskyi Chautems*	FOD	-	-	-
S. lateritia (Lindl.) Chautems*	AFL	-	-	-
S. leopoldii (Planch.) Chautems*	AFL	-	-	-
S. leucotricha (Hoehne) H.E.Moore*	AFL	-	-	-
S. lindleyi Schauer*	FOD	-	EN	ANEXO I
S. lineata (Hjelmq.) Chautems*	AFL	-	-	-
S. macrophylla (Nees & Mart.) Benth. & Hook. *ex* Fritsch*	FOD	-	-	-
S. macropoda (Sprague) H.E.Moore*	AFL	-	-	-
S. macrostachya (Lindl.) Chautems	AFL	-	-	-
S. magnifica (Otto & A.Dietr.) Wiehler*	AFL	-	-	-
S. mauroana Chautems*	FOD	-	-	-
S. micans (Fritsch) Chautems*	FOD	-	-	-
S. nivalis Chautems*	AFL	-	-	-
S. nordestina Chautems *et al.**	AFL	-	-	-
S. piresiana (Hoehne) Chautems	FES, AFL	-	-	-
S. polyantha (DC.) Wiehler*	RST	-	-	-
S. pusilla (Mart.) Baill.*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
S. reitzii (Hoehne) L.E.Skog*	FOD	-	-	-
S. rupicola (Mart.) Wiehler*	AFL	-	-	-
S. sceptrum (Mart.) Wiehler*	FOD	-	-	-
S. schiffneri Fritsch*	FOD	-	-	-
S. sellovii (Mart.) Wiehler*	AFL	-	-	-
S. speciosa (Lodd.) Hiern*	AFL, FOD	-	-	-
S. striata (Fritsch) Chautems*	AFL	-	-	-
S. tuberosa (Mart.) H.E.Moore*	AFL	-	-	-
S. valsuganensis Chautems*	AFL	-	-	-
S. villosa Lindl.*	FOD	-	-	-
S. warmingii (Hiern) Chautems	AFL, FES	-	-	-
*Vanhouttea** – 9/9				
V. bradeana Hoehne*	AFL	-	EN	ANEXO I
V. brueggeri Chautems*	AFL	-	-	-
V. calcarata Lem.*	AFL	-	-	-
V. fruticulosa (Glaz. *ex* Hoehne) Chautems*	FOD	-	EN	ANEXO I
V. gardneri (Hook.) Fritsch*	AFL, FOD	-	-	-
V. hilariana Chautems*	AFL	-	-	-
V. lanata Fritsch*	AFL	-	EN	ANEXO I
V. leonii Chautems*	AFL	-	VU	ANEXO II
V. pendula Chautems*	AFL	-	VU	ANEXO II

Goodeniaceae

João Renato Stehmann

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
GOODENIACEAE – 1/440				
Scaevola – 1/130				
S. plumieri (L.) Vahl	RST	-	-	-

Griseliniaceae

Caetano Troncoso Oliveira

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
GRISELINIACEAE – 1/7				
Griselinia – 1/7				
G. ruscifolia (Clos) Taub.	FOD, FOM	-	-	-

Gunneraceae

Caetano Troncoso Oliveira

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
GUNNERACEAE – 2/42				
Gunnera – 2/40				
G. herteri Ost.	RST	-	VU	ANEXO II
G. manicata Linden*	FOD, FOM	-	-	-

Haloragaceae

João Renato Stehmann

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
HALORAGACEAE – 3/ca. 150				
Laurembergia – 1/4				
L. tetrandra (Schott) Kanitz	FAQ, RST	-	-	-
Myriophyllum – 1/60				
M. aquaticum (Vell.) Verdc.	FAQ	-	-	-
Proserpinaca – 1/2				
P. palustris L.	FAQ	-	-	-

Heliconiaceae

João Marcelo Alvarenga Braga

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
HELICONIACEAE – 14/ca. 225				
Heliconia – 11/ca. 225				
H. aemygdiana Burle-Marx	FOD, FES	-	-	-
H. angusta Vell.	FOD, FES	-	-	ANEXO I
H. episcopalis Vell.	FOD, FES, RST	-	-	-
H. farinosa Raddi	FOD	-	-	ANEXO I
H. hirsuta L.f.	FOD, FOM, FES	-	-	-
H. kautzkiana Emygdio & E.Santos	FOD	-	-	-
H. pendula Wawra	FOD, FES, RST	-	-	-
H. psittacorum L.f.	FOD, FES, FOM, RST	-	-	-
H. richardiana Miq.	FOD, FES	-	-	-
H. spathocircinata Aristeg.	FOD, FES	-	-	-
H. subulata Ruiz & Pav.	FOD, FES	-	-	-

Heliotropiaceae

Elsie Franklin Guimarães & Erika von Sohsten Medeiros

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
HELIOTROPIACEAE – 23/410				
Heliotropium – 14/260				
H. amplexicaule Vahl	FOD, RST	-	-	-
H. angiospermum Murray	FOD, FCA, RUD	-	-	-
H. elongatum (Lehm.) I.M.Johnst.	FOD, FES	-	-	-
H. filiforme Lehm.	FOD	-	-	-
H. fruticosum L.	FOD	-	-	-
H. indicum L.	FOD, RUD	-	-	-
H. leiocarpum Morong	FOD	-	-	-
H. ocellatum Cham.	FOD	-	-	-
H. phylicoides Cham.	FOD	-	-	-
H. polyphyllum Lehm.	FOD	-	-	-
H. procumbens Mill.	FOD	-	-	-
H. salicoides Cham.	FOD, FCA	-	-	-
H. tiaridioides Cham.	FOD, FES	-	-	-
H. transalpinum Vell.	FOD, FES, FCA, RUD	-	-	-
Tournefortia – 9/150				
T. bicolor Sw.	FOD	-	-	-
T. breviflora DC.	FOD	-	-	-
T. gardneri A.DC.	FOD	-	-	-
T. membranacea DC.	FOD, RST	-	-	-
T. paniculata Cham.	FOD	-	-	-
T. rubicunda Salzm. *ex* DC.	FOD	-	-	-
T. salicifolia DC.*	FOD	-	-	-
T. subsessilis Cham.	FOD	-	-	-
T. villosa Salzm. *ex* DC.	FOD, RST	-	-	-

Hernandiaceae

Flávio Dayrell Gontijo

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
HERNANDIACEAE – 4/45				
Gyrocarpus – 1/4				
G. acuminatus Meisn.*	FOD	-	-	-
Sparattanthelium – 3/16				
S. botocudorum Mart.*	FOD, FES	-	-	-
S. tupinambazum Mart.*	FOD	-	-	-
S. tupiniquinorum Mart.	FOD	-	-	-

Herreriaceae

Julie H. A. Dutilh

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
HERRERIACEAE – 6/ca. 15				
Hagenbachia – 1/5				
H. brasiliensis Nees & Mart.	FOD, FES	-	-	-
Herreria – 5/8				
H. glaziovii Lecomte	FOD, FES, FED	-	-	-
H. grandiflora Griseb.	FOD, FOM	-	-	-
H. latifolia Woodson	FES	-	-	-
H. montevidensis Klotzsch *ex* Griseb.	FOD, FOM, FES	-	-	-
H. salsaparilha Mart.	FOD, FES, FED	-	-	-

Humiriaceae

Luís Carlos da Silva Giordano

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
HUMIRIACEAE – 10/63				
Humiria – 1/4				
H. balsamifera (Aubl.) J. St.-Hil.	FOD, FCA, RST	-	-	-
Humiriastrum – 4/17				
H. dentatum (Casar.) Cuatrec.*	FOD, FES, RST	-	-	-
H. glaziovii (Urb.) Cuatrec.*	FOD, FES, FCA, RST	-	-	-
H. mussungense Cuatrec.*	FOD	-	-	-
H. spiritu-sancti Cuatrec.*	FOD	-	-	-
Sacoglottis – 1/10				
S. mattogrossensis Malme	FOD, FCA, RST	-	-	-
Schistostemon – 1/9				
S. retusum (Ducke) Cuatrec.	RST	-	-	-
Vantanea – 3/20				
V. bahiaensis Cuatrec.*	FOD, FCA, RST	-	-	-
V. compacta (Schnizl.) Cuatrec.	FOD	-	-	-
V. obovata (Nees & Mart.) Benth.	FOD, FCA	-	-	-

Hydnoraceae

Marcos Sobral

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
HYDNORACEAE – 1/7				
Prosopanche – 1/2				
P. bonacinae Speg.	FES, FED	-	-	-

Hydrocharitaceae

João Renato Stehmann

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
HYDROCHARITACEAE – 5/ca. 76				
Apalanthe – 1/1				
A. granatensis (Humb. & Bonpl.) Planch.	FAQ	-	-	-
Egeria – 2/2				
E. densa Planch.	FAQ			
E. najas Planch.	FAQ	-	-	-
Limnobium – 1/2				
L. laevigatum (Humb. & Bonpl. *ex* Willd.) Heine	FAQ	-	-	-
Ottelia – 1/21				
O. brasiliensis (Planch.) Walp.	FAQ	-	-	-
HYDROCHARITACEAE – 5/ca. 76				
Apalanthe – 1/1				
A. granatensis (Humb. & Bonpl.) Planch.	FAQ	-	-	-
Egeria – 2/2				
E. densa Planch.	FAQ			
E. najas Planch.	FAQ	-	-	-
Limnobium – 1/2				
L. laevigatum (Humb. & Bonpl. *ex* Willd.) Heine	FAQ	-	-	-
Ottelia – 1/21				
O. brasiliensis (Planch.) Walp.	FAQ	-	-	-

Hydroleaceae

Marco Otávio Pivari & Fernando Alves Ferreira

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
HYDROLEACEAE – 2/10				
Hydrolea – 2/10				
H. elatior Schott	FAQ	-	-	-
H. spinosa Griseb.	FAQ	-	-	-

Hypericaceae

João Renato Stehmann

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
HYPERICACEAE – 25/540				
Hypericum – 17/420				
H. brasiliense Choisy	FCA	-	-	-
H. campestre Cham. & Schltdl.	FCA	-	-	-
H. caprifoliatum Cham. & Schltdl.*	FCA	-	-	-
H. carinatum Griseb.	FCA	-	-	-
H. connatum Lam.	FCA	-	-	-
H. cordatum (Vell.) N.Robson*	FCA	-	-	-
H. denudatum A.St.-Hil.*	FCA	-	-	-
H. gentianoides (L.) Britton *et al.*	FCA	-	-	-
H. linoides A.St.-Hil.	FCA	-	-	-
H. lorentzianum R.Keller	FCA	-	-	-
H. mutilum L.	FOD, FCA	-	-	-
H. piriai Arechav.	FCA	-	-	-
H. pleiostylum C.Jim.*	FCA	-	-	-
H. polyanthemum Reichardt	FCA	-	-	-
H. rigidum A.St.-Hil.*	FCA	-	-	-
H. teretiusculum A.St.-Hil.*	FCA	-	-	-
H. ternum A.St.-Hil.*	FCA	-	-	-
Vismia – 8/52				
V. brasiliensis Choisy	FOD, FES			
V. macrophylla Kunth	FOD	-	-	-
V. magnoliifolia Cham. & Schltdl.*	FOD, FES	-	-	-
V. martiana Mart.	FOD, FES	-	-	-
V. micrantha A.St.-Hil.*	FOD, FES			
V. parviflora Cham. & Schltdl.	FES	-	-	-
V. pentagyna (Spreng.) Ewan*	FOD	-	-	-
V. reichardtiana (Kuntze) Ewan	FOD	-	-	-

Hypoxidaceae

Julie H. A. Dutilh

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
HYPOXIDACEAE – 1/60				
Hypoxis – 1/50				
H. decumbens L.	FOM, FES, RST	-	-	-

Icacinaceae

Milton Groppo

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
ICACINACEAE – 5/ca. 150				
Casimirella – 1/7				
C. diversifolia R.A.Howard	FOD	-	-	-
Emmotum – 2/17				
E. affine Miers*	FOD	-	-	-
E. nitens (Benth.) Miers	FES, FOD	-	-	-
Leretia – 1/10				
L. cordata Vell.	FOD	-	-	-
Pleurisanthes – 1/6				
P. brasiliensis (Val.) Tiegh.	FOD	-	-	-

Iridaceae

Nadia Said Chukr

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
IRIDACEAE – 34/2025				
Alophia – 2/4				
A. coerulea (Vell.) Chukr	FCA	-	VU	ANEXO II
A. sellowiana Klatt	FCA	-	-	-
Calydorea – 1/10				
C. campestris (Klatt) Baker*	FCA	-	-	-
Cipura – 1/5				
C. paludosa Aubl.	FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Crocosmia – 1/22				
C. crocosmiiflora (Lem. *ex* E.Morren) N.E.Br*	FCA	-	-	-
Cypella – 1/15				
C. linearis (Kunth) Baker	FCA, FES	-	-	-
Eleutherine – 1/2				
E. bulbosa (Mill.) Urb.	FES, FCA	-	-	-
Itysa – 1/2				
I. gardneri (Baker) Ravenna	FCA	-	-	-
Neomarica – 13/20				
N. caulosa (Ravenna) Chuckr*	RST, FOD	-	-	-
N. coerulea (Ker Gawl.) Sprague*	RST, FOM	-	-	-
N. fluminensis (Ravenna) Chukr*	RST	-	-	-
N. glauca (Seub. *ex* Klatt) Sprague	FCA, FES	-	-	-
N. gracilis (Herb.) Sprague*	RST, FES	-	-	-
N. heloisa-mariae Occhioni*	RST, FOD	-	-	-
N. humilis (Klatt) Capell.	RST, FOD	-	-	-
N. imbricata (Hand.-Mazz.) Sprague	RST, FCA, FES	-	-	-
N. northiana (Schneev.) Sprague*	RST, FES, FOM	-	-	-
N. portosecurensis (Ravenna) Chukr*	RST, FOD	-	-	-
N. rigida (Ravenna) Capell.*	FCA, FES	-	-	-
N. sabini (Lindl.) Chukr*	RST, FOD	-	-	-
N. sylvestris (Vell.) Chukr*	FOD	-	-	-
Sisyrinchium – 9/150				
S. commutatum Klatt	FCA, FES	-	-	-
S. fasciculatum Klatt	FCA	-	-	-
S. hasslerianum Baker	FCA	-	-	-
S. luzula Klotzsch *ex* Klatt	FCA	-	-	-
S. micranthum Cav.	FCA, FES	-	-	-
S. palmifolium L.	FCA	-	-	-
S. restioides Spreng.	FCA	-	-	-
S. setaceum Klatt	FCA	-	-	-
S. vaginatun Spreng.	FCA, FES	-	-	-
Trimezia – 4/18				
T. juncifolia (Klatt) Benth. & Hook.	FCA	-	-	-
T. lutea (Klatt) Foster	FCA, FES	-	-	-
T. martinicensis (Jacq.) Herb.	FCA, RST, FES	-	-	-
T. spathata (Klatt) Baker	FCA, FES	-	-	-

Juncaceae

Marccus Alves

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
JUNCACEAE – 7/300				
Juncus – 6/220				
J. densiflorus Kunth	AFL, FCA, FOD, FAQ	-	-	-
J. effusus L.	FOD, FAQ	-	-	-
J. micranthus Schrad. *ex* Meyer	FOD, FAQ	-	-	-
J. microcephalus Kunth	AFL, FOD, FOM, FAQ	-	-	-
J. tenuis Willd.	FCA, FOD, FAQ	-	-	-
J. ustulatus Buchenau*	AFL, FCA, FOD, FAQ	-	-	-
Luzula – 1/75				
L. campestris (L.) DC.	FOD	-	-	-

Juncaginaceae

Marcos Sobral

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
JUNCAGINACEAE – 1/20				
Triglochin – 1/17				
T. striata Ruiz & Pav.	FAQ	-	-	-

Krameriaceae

Caetano Troncoso Oliveira

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
KRAMERIACEAE – 3/15				
Krameria – 3/15				
K. bahiana B.Simpson*	RST	-	-	-
K. grandiflora A.St.-Hil.	RST	-	-	-
K. tomentosa A.St.-Hil.	RST	-	-	-

Lacistemaceae

Márcio de Souza Werneck

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
LACISTEMACEAE – 6/14				
Lacistema – 6/11				
L. aggregatum (P.J.Bergius) Rusby	FOD, FES	-	-	-
L. hasslerianum Chodat	FOD, FES	-	-	-
L. lucidum Schnizl.*	FOD	-	-	-
L. pubescens Mart.	FOD, FES, RST	-	-	-
L. robustum Schnizl.*	FOD, FES, RST	-	-	-
L. serrulatum Mart.*	FOD	-	-	-

Lamiaceae

Élide Santos Jimena, Flávio França & Marcos Sobral

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
LAMIACEAE – 236/7173				
Aegiphila – 19/116				
A. australis Moldenke*	FOD	-	-	-
A. brachiata Vell.*	FOD	-	-	-
A. capitata Moldenke*	?	-	-	-
A. casseliiformis Schauer*	FOD	-	-	-
A. fluminensis Vell.*	FOD	-	-	-
A. gloriosa Moldenke	FOD	-	-	-
A. graveolens Mart. & Schauer	FOD	-	-	-
A. integrifolila (Jacq.) Moldenke	FOD, FES	-	-	-
A. laevis (Aubl.) Gmel.	FOD	-	-	-
A. luschnathii Schauer	RST	-	-	-
A. macrantha Ducke	FOD, RST	-	-	-
A. mediterranea Vell.	FOD, FES, RST	-	-	-
A. novofriburgensis Moldenke*	FOD	-	-	-
A. obducta Vell.	FOD	-	-	-
A. pernambucensis Moldenke*	FOD, RST	-	-	-
A. racemosa Vell.	FOD	-	-	-
A. riedeliana Schauer*	FOD	-	-	-
A. verticillata Vell.	FOD, FOM, FES, FED, FCA, AFL, RST	-	-	-
A. vitelliniflora Walp.	FOD, FES	-	-	-
Amasonia – 1/8				
A. angustifolia Mart. & Schauer	FCA	-	-	-
Clinopodium – 1/100				
C. brownei (Sw.) Kuntze	FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Cunila – 11/15				
C. angustifolia Benth.*	FCA, FOM	-	-	-
C. fasciculata Benth.*	FCA	-	-	-
C. galioides Benth.*	FCA	-	-	-
C. incana Benth.*	FCA	-	-	-
C. incisa Benth.*	FCA	-	-	-
C. menthiformis Epling*	FCA	-	-	-
C. menthoides Benth.*	FCA	-	-	-
C. microcephala Benth.*	FCA	-	-	-
C. platyphylla Epling*	FCA	-	-	-
C. spicata Benth.*	FCA	-	-	-
C. tenuifolia Epling*	FCA	-	-	-
Eriope – 4/30				
E. arenaria Harley	FCA	-	-	-
E. blanchetii (Benth.) Harley*	RST	-	EN	ANEXO II
E. crassipes Benth.	FCA	-	-	-
E. macrostachya Mart. *ex* Benth.	FCA	-	-	-
*Eriothymus** – 1/1				
E. rubiaceus J.Schmidt*	FCA	-	-	-
*Glechon** – 6/6				
*G. ciliata Benth.**	FCA	-	-	-
G. discolor Epling*	FCA	-	-	-
G. elliptica C.Pereira & Hatschb.*	FCA	-	-	-
G. marifolia Benth.*	FCA	-	-	-
G. spathulata Benth.*	FCA	-	-	-
G. thymoides Spreng.*	FCA	-	-	-
Hedeoma – 3/42				
H. crenatum Irving*	FCA	-	-	-
H. multiflorum Benth.	FCA	-	-	-
H. polygalifolium Benth.	FCA	-	-	-
Hesperozygis – 7/8				
H. dimidiata Epling & Mathias*	FCA	-	-	-
H. kleinii Epling*	FCA	-	-	-
H. myrtoides (A.St.-Hil.) Epling*	FOD, FCA	-	-	-
H. nitida (Benth.) Epling*	FCA	-	-	-
H. rhododon Epling*	FCA	-	-	-
H. ringens (Benth.) Epling	FOD, FCA	-	VU	ANEXO I
H. spathulata Epling*	FCA	-	-	-
*Hoehnea** – 4/4				
H. epilobioides (Epling) Epling & Stewart*	FCA	-	-	-
H. minima (J.Schmidt) Epling*	FCA	-	-	-
H. parvula (Epling) Epling*	FCA	-	-	-
H. scutellarioides (Benth.) Epling*	FCA	-	-	-
Hypenia – 4/23				
H. glauca (A.St.-Hil. *ex* Benth.) Harley	FCA	-	-	-
H. macrantha (A.St.-Hil. *ex* Benth.) Harley	FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
H. reticulata (Mart. *ex* Benth.) Harley	FCA	-	-	-
H. salzmannii (Benth.) Harley	FCA	-	-	-
Hyptidendron – 8/19				
H. asperrimum (Epling) Harley	FCA	-	-	-
H. canum (Pohl *ex* Benth.) Harley	FCA	-	-	-
H. claussenii (Benth.) Harley*	FCA	-	VU	ANEXO I
H. conspersum (Benth.) Harley	FCA	-	VU	ANEXO II
H. leucophyllum (Pohl *ex* Benth.) Harley	FCA	-	-	-
H. rhabdocalyx (Mart. *ex* Benth.) Harley	FCA	-	-	-
H. vauthieri (Briq.) Harley	FCA	-	-	-
H. vepretorum (Mart. *ex* Benth.) Harley	FCA	-	-	-
Hyptis – 85/280				
H. alata (Raf.) Shinners	FCA, FES, FOM	-	-	-
H. althaeifolia Pohl *ex* Benth.	FCA	-	-	-
H. alutacea Pohl *ex* Benth.	FCA	-	-	-
H. amaurocaula Briq.	FCA	-	-	-
H. angulosa Schott *ex* Benth.	FCA	-	-	-
H. apertiflora Epling	FCA	-	-	-
H. atrorubens Poit.	FOM, RST	-	-	-
H. australis Epling*	FES	-	-	-
H. balansae Briq.	FOD, FOM, RST	-	-	-
H. brevipes Poit.	FES, FOD, FOM, RST	-	-	-
H. caespitosa A.St.-Hil. *ex* Benth.	FCA, FES	-	-	-
H. calida Mart. *ex* Benth.	FCA	-	-	-
H. cardiophylla Pohl *ex* Benth.	FCA	-	-	-
H. carpinifolia Benth.	FCA	-	-	-
H. complicata A.St.-Hil. *ex* Benth.	FCA	-	-	-
H. conferta Pohl *ex* Benth.	FCA	-	-	-
H. corymbosa Benth.	FCA	-	-	-
H. crinita Benth.	FCA	-	-	-
H. cuneata Pohl *ex* Benth.	FCA	-	-	-
H. cymulosa Benth.*	FCA	-	-	-
H. ditassoides Mart. *ex* Benth.	FCA	-	-	-
H. duplicatodentata Pohl *ex* Benth.	FCA	-	-	-
H. elegans (Briq.) Briq. *ex* Micheli	FCA	-	-	-
H. eriophylla Pohl *ex* Benth.	FCA	-	-	-
H. erythrostachys Epling*	FCA	-	-	-
H. fasciculata Benth.	FCA	-	-	-
H. fruticosa Salzm. *ex* Benth.	FCA, RST	-	-	-
H. glomerata Mart. *ex* Schrank	FCA	-	-	-
H. hassleri Briq.	FCA	-	-	-
H. heterodon Epling*	FCA	-	-	-
H. homalophylla Pohl *ex* Benth.	FCA	-	-	-
H. imbricata Pohl *ex* Benth.	FCA	-	-	-
H. lacunosa Pohl *ex* Benth.	FCA	-	-	-
H. lacustris A.St.-Hil. *ex* Benth.	FOD, RST	-	-	-
H. lagenaria A.St.-Hil. *ex* Benth.*	FOM	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
H. lappacea Benth.	FCA, FES, FOD, FOM, RST	-	-	-
H. lappulacea Mart. *ex* Benth.	FOM	-	-	-
H. leptostachys Epling	FCA	-	-	-
H. linarioides Pohl *ex* Benth.	FCA	-	-	-
H. lippioides Pohl *ex* Benth.	FCA	-	-	-
H. lorentziana O.Hoffm.	FCA , FES, FOD, RST	-	-	-
H. lucida Pohl *ex* Benth.	FCA	-	-	-
H. lutescens Pohl *ex* Benth.	FCA	-	-	-
H. macrotera Briq.	FCA	-	-	-
H. marrubioides Epling	FCA, FES	-	-	-
H. microphylla Pohl *ex* Benth.	FCA	-	-	-
H. mollissima Benth.	FCA	-	-	-
H. monticola Mart. *ex* Benth.*	FCA	-	-	-
H. muelleri Briq.	FCA, FOD, FOM, RST	-	-	-
H. multibracteata Benth.*	FCA, FOD	-	-	-
H. multiseta Benth.	FCA	-	-	-
H. muricata Schott *ex* Benth.*	FCA	-	-	-
H. mutabilis (Rich.) Briq.	FCA, FES, FOD, FOM, RST	-	-	-
H. nudicaulis Benth.	FCA	-	-	-
H. paludosa A.St.-Hil. *ex* Benth.	FCA	-	-	-
H. passerina Mart. *ex* Benth.	FCA	-	-	-
H. pectinata (L.) Poit.	FCA	-	-	-
H. peduncularis Benth.	FCA	-	-	-
H. plectranthoides Benth.	FCA	-	-	-
H. propinqua Epling*	FCA	-	-	-
H. proteoides A.St.-Hil. *ex* Benth.	FCA	-	-	-
H. pulchella Briq.	FCA	-	-	-
H. racemulosa Mart. *ex* Benth.*	FES	-	-	-
H. recurvata Poit.	FCA	-	-	-
H. rhypidiophylla Briq.*	FCA	-	VU	ANEXO I
H. rotundifolia Benth.	FCA	-	-	-
H. rubicunda Pohl *ex* Benth.	FCA	-	-	-
H. rubiginosa Benth.	FCA	-	-	-
H. rugosa Benth.	FCA	-	-	-
H. salviifolia Pohl *ex* Benth.*	FCA	-	-	-
H. selloi Benth.*	FCA	-	-	-
H. sericea Benth.	FCA	-	-	-
H. sinuata Pohl *ex* Benth.	FCA	-	-	-
H. stricta Benth.	FCA	-	-	-
H. suaveolens Poit.	FCA	-	-	-
H. suaveolens Poit.	FCA	-	-	-
H. subviolacea Briq.	FCA	-	-	-
H. tenuifolia Epling	FCA	-	-	-
H. tetracephala Bordignon*	FCA, FOD, RST	-	-	-
H. tetragona Pohl	FCA	-	-	-
H. thyrsiflora Epling*	FCA, FOD	-	-	-
H. tricephala A.St.-Hil. *ex* Benth.	FCA	-	VU	ANEXO II

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
H. turnerifolia Mart. *ex* Benth.	FCA	-	-	-
H. uliginosa A.St.-Hil. *ex* Benth.*	FCA	-	-	-
H. umbrosa Salzm. *ex* Benth.	FCA	-	-	-
H. virgata Benth.	FCA	-	-	-
Lepechinia – 1/40				
L. speciosa (A.St.-Hil. *ex* Benth.) Epling*	FCA	-	-	-
Marsypianthes – 2/5				
M. chamaedrys (Vahl) Kuntze	FCA, RST	-	-	-
M. hassleri Briq.	FCA	-	-	-
Monochilus – 1/2				
M. gloxiniifolius Fisch. & C.A.Mey.	FCA	-	-	-
Ocimum – 4/65				
O. neurophyllum Briq.	FCA	-	-	-
O. nudicaule Benth.	FCA	-	-	-
O. ovatum Benth.	FCA	-	-	-
O. selloi Benth.	FCA	-	-	-
Peltodon – 4/6				
P. longipes A.St.-Hil. *ex* Benth.	FCA	-	-	-
P. radicans Pohl	FCA	-	-	-
P. rugosus Tolm.*	FCA	-	-	-
P. tomentosus Pohl	FCA	-	-	-
*Rhabdocaulon** – 7/7				
R. coccineum (Benth.) Epling*	FOD, FCA	-	-	-
R. denudatum (Benth.) Epling*	FCA	-	-	-
R. erythrostachys Epling*	FCA	-	-	-
R. gracile (Benth.) Epling*	FCA	-	-	-
R. lavanduloides (Benth.) Epling*	FCA	-	-	-
R. stenodontum (Briq.) Epling*	FCA	-	-	-
R. strictum (Benth.) Epling*	FCA	-	-	-
Rhaphiodon – 1/1				
R. echinus Schauer	FCA	-	-	-
Salvia – 63/900				
S. aliciae E.P.Santos*	FCA	-	-	-
S. altissima Pohl*	FOD	-	-	-
S. apparicii Brade & Barb.Per.*	FCA	-	-	-
S. arenaria A.St.-Hil. *ex* Benth.*	FCA	-	-	-
S. aridicola Briq.*	FCA	-	-	-
S. articulata Epling*	FOD	-	-	-
S. balaustina Pohl*	FOD	-	-	-
S. benthamiana Gardner*	FCA	-	-	-
S. borjensis E.P.Santos*	FCA	-	-	-
S. brevipes Benth.*	FCA	-	-	-
S. caaguazuensis Briq.*	FCA	-	-	-
S. calcicola Harley*	FCA	-	-	-
S. campicola Briq.*	FCA	-	-	-
S. camposportoi Brade*	FCA	-	-	-
S. cardiophylla Benth.*	FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
S. confertiflora Pohl*	FOD, FCA	-	-	-
S. congestiflora Epling*	FCA	-	-	-
S. consimilis Epling*	FCA	-	-	-
S. cordata Benth.*	FCA	-	-	-
S. curta Epling*	FOD	-	-	-
S. decurrens Epling*	FCA	-	-	-
S. durifolia Epling*	FCA	-	-	-
S. espiritosantensis Brade & Barb.Per.*	FCA	-	-	-
S. expansa Epling*	FCA	-	-	-
S. fruticetorum Benth.*	FOD	-	-	-
S. guaranitica A.St.-Hil. *ex* Benth.*	FOD	-	-	-
S. hatschbachii E.P.Santos*	FOD	-	-	-
S. hilarii Benth.*	FOD	-	-	-
S. itatiaiensis Dusén*	FOD	-	-	-
S. lachnostachys Benth.*	FCA	-	-	-
S. lepida Epling*	FCA	-	-	-
S. longibracteata E.P.Santos*	FOD	-	-	-
S. macrocalyx Gardner*	FOD	-	-	-
S. melissiflora Benth.*	FOD	-	-	-
S. mentiens Pohl*	FOD	-	-	-
S. minarum Briq.*	FCA	-	-	-
S. neovidensis Benth.*	FCA	-	-	-
S. oligantha Dusén*	FOD, FCA	-	-	-
S. ombrophila Dusén*	FOD	-	-	-
S. ovalifolia A.St.-Hil. *ex* Benth.*	FCA	-	-	-
S. pachypoda Briq.*	FCA	-	-	-
S. pallida Benth.*	FCA	-	-	-
S. paraguariensis Briq.*	FCA	-	-	-
S. persicifolia A.St.-Hil. *ex* Benth.*	FOD	-	-	-
S. procurrens Benth.*	FCA	-	-	-
S. propinqua Benth.	?	-	-	-
S. regnelliana Briq.*	FCA	-	-	-
S. rivularis Gardner*	FOD	-	-	-
S. rosmarinoides A.St.-Hil. *ex* Benth.*	FCA	-	-	-
S. salicifolia Pohl*	FOD	-	-	-
S. scabrida Pohl*	FCA	-	-	-
S. scoparia Epling*	FCA	-	-	-
S. scytinophylla Briq.*	FCA	-	-	-
S. secunda Benth.*	FOD, FCA	-	-	-
S. sellowiana Benth.*	FOD	-	-	-
S. splendens Sellow *ex* Roem. & Schult.*	FOD	-	-	-
S. subrotunda A.St.-Hil. *ex* Benth.*	FES	-	-	-
S. tenuiflora Epling*	FOD	-	-	-
S. tomentella Pohl*	FCA	-	-	-
S. uliginosa Benth.*	FOD	-	-	-
S. viscida A.St.-Hil. *ex* Benth.*	FCA	-	-	-
S. xanthotricha Harley *ex* E.P.Santos*	FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Scutellaria – 6/360				
S. agrestis A.St.-Hil. *ex* Benth.	FCA	-	-	-
S. platensis Speg.	FCA	-		
S. purpurascens Sw.	FCA	-	-	-
S. racemosa Pers.	FCA	-	-	-
S. tubiflora Benth.*	FCA	-	-	-
S. uliginosa A.St.-Hil. *ex* Benth.	FCA	-	-	-
Vitex – 11/250				
V. chrysleriana Moldenke	FOD	-	-	-
V. cymosa Bertero *ex* Spreng.	FOD, FES	-	-	-
V. hypoleuca Schauer*	RST	-	-	-
V. megapotamica (Spreng.) Moldenke	FOD, FES, FCA, RST	-	-	-
V. mexiae Moldenke	FOD	-	-	-
V. orinocensis Kunth	FOD	-	-	-
V. polygama Cham.	FOD, FES, FCA	-	-	-
V. regnelliana Moldenke*	FOD, RST	-	-	-
V. rufescens A.Juss.	FOD, RST	-	-	-
V. sellowiana Cham.	FOD, FCA	-	-	-
V. vauthieri DC. *ex* Schauer	FOD	-	-	-

Lauraceae

Alexandre Quinet

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
LAURACEAE – 142/2500				
Aiouea – 3/19				
A. acarodomatifera Kosterm.*	FOD	-	-	-
A. bracteata Kosterm.	FOD	-	VU	ANEXO II
A. saligna Meisn.	FOD	-	-	-
Aniba – 2/41				
A. firmula (Nees & Mart. *ex* Nees) Mez	FOD, FES, RST	-	-	-
A. pedicellata Kosterm.*	FOD	-	-	-
Beilschmiedia – 7/250				
B. angustifolia Kosterm.*	FOD	-	-	-
B. emarginata (Meisn.) Kosterm.*	FOD	-	-	-
B. fluminensis Kosterm.*	FOD	-	-	-
B. linharensis S.Nishida & van der Werff*	FOD	-	-	-
B. rigida (Mez) Kosterm.*	FOD	-	VU	ANEXO I
B. stricta Kosterm.*	FOD	-	-	-
B. taubertiana (Schwacke & Mez) Kosterm.*	FOD	-	-	-
Cassytha – 1/17				
C. filiformis L.	FOD, FOM, FES, FED, RST	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Cinnamomum – 6/200-350				
C. glaziovii Mez*	FOD	-	-	-
C. riedelianum Kosterm.*	FOD	-	-	-
C. sellowianum (Nees & Mart. *ex* Nees) Kosterm.	FCAB,FOM	-	-	-
C. stenophyllum (Meisn.) Vattimo-Gil*	FOD	-	-	-
C. tomentulosum Kosterm.	FOD	-	-	-
C. triplinerve (Ruiz & Pav.) Kosterm.	FOD, FES	-	-	-
Cryptocarya – 12/300-350				
C. aschersoniana Mez	FOD, FOM, FES	-	-	-
C. botelhensis P.L.R. de Moraes*	FOD	-	-	-
C. citriformis (Vell.) P.L.R. de Moraes*	FOD	-	-	-
C. mandioccana Meisn.*	FOD, FES	-	-	-
C. micrantha Meisn.*	FOD, FES	-	-	-
C. moschata Nees & Mart. *ex* Nees	FES	-	-	-
C. riedeliana P.L.R. de Moraes*	FOD	-	-	-
C. saligna Mez*	FOD, FES	-	-	-
C. sellowiana P.L.R. de Moraes*	FES	-	-	-
C. subcorymbosa Mez*	FOD	-	-	-
C. velloziana P.L.R.de Moraes*	FOD	-	-	-
C. wiedensis P.L.R. de Moraes*	FOD	-	-	-
Endlicheria – 2/60				
E. glomerata Mez	FOD, FES	-	-	-
E. paniculata (Spreng.) J.F.Macbr.	FOD, FES, RST, MAN	-	-	-
Licaria – 3/38				
L. armeniaca (Nees) Kosterm.	FOD, FES	-	-	-
L. bahiana Kurz	FOD, FES	-	-	-
L. guianensis Aubl.	FOD	-	-	-
Mezilaurus – 1/18				
M. navalium (Allemão) Taub. *ex* Mez*	FOD	VU	-	-
Nectandra – 15/114				
N. barbellata Coe-Teix.*	FOD, FES	VU	-	-
N. cissiflora Nees	FOD, FES	-	-	-
N. debilis Mez*	FOD	CR	-	-
N. grandiflora Nees & Mart. *ex* Nees	FOD, FES, FOM, FCA	-	-	-
N. lanceolata Nees & Mart. *ex* Nees	FOD, FES, FOM	-	-	-
N. leucantha Nees & Mart. *ex* Nees*	FOD	-	-	-
N. megapotamica (Spreng.) Mez	FES, FOM	-	-	-
N. membranacea (Sw.) Griseb.	FOD, FES	-	-	-
N. nitidula Nees & Mart. *ex* Nees*	FOD, FES	-	-	-
N. oppositifolia Nees & Mart. *ex* Nees	FOD, FES, RST	-	-	-
N. psammophila Nees*	FOD, RST	-	-	-
N. puberula (Schott) Nees	FOD, RST	-	-	-
N. reticulata (Ruiz & Pav.) Mez	FOD, FES, RST	-	-	-
N. spicata Meisn.*	FOD	-	-	-
N. weddellii Meisn.*	FOD	EN	-	-
Ocotea – 70/350				
O. aciphylla (Nees & Mart. *ex* Nees) Mez	FOD, FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
O. aniboides (Meisn.) Mez*	FOD	-	-	-
O. argentea Mez*	FOD	-	-	-
O. basicordatifolia Vattimo-Gil*	FOD	EN	VU	ANEXO I
O. beulahiae Baitello *	FES	-	-	-
O. beyrichii (Nees) Mez*	FOD	-	-	-
O. brachybotrya (Meisn.) Mez*	FOD, FES	-	-	-
O. bragae Coe-Teix.*	FOD	-	VU	ANEXO I
O. caesia Mez*	FOD	-	-	-
O. catharinensis Mez*	FOD, FES	VU	VU	ANEXO I
O. cernua (Nees) Mez	FOD	-	-	-
O. citrosmoides (Nees) Mez*	FOD	-	-	-
O. complicata (Meisn.) Mez	FOD, RST	-	-	-
O. confertiflora (Meisn.) Mez	RST	-	-	-
O. corymbosa (Meisn.) Mez	FOD, FES	-	-	-
O. cryptocarpa Baitello*	FOD	-	VU	ANEXO II
O. curucutuensis Baitello*	FOD	-	-	-
O. daphnifolia (Meisn.) Mez*	FOD	-	-	-
O. diospyrifolia (Meisn.) Mez	FOD, FES	-	-	-
O. dispersa (Nees & Mart. *ex* Nees) Mez*	FOD	-	-	-
O. divaricata (Nees) Mez*	FOD, FES	-	-	-
O. domatiata Mez*	FOD	-	-	-
O. elegans Mez*	FOD, FES	-	-	-
O. felix Coe-Teix.*	FOD	-	-	-
O. frondosa (Meisn.) Mez*	FOD	-	-	-
O. glauca (Nees & Mart. *ex* Nees) Mez	FOD, RST	-	-	-
O. glaziovii Mez	FOD, FES	-	-	-
O. hypoglauca (Nees & Mart. *ex* Nees) Mez*	FOD, FES	-	-	-
O. indecora (Schott) Mez*	FOD, FES	-	-	-
O. insignis Mez*	FOD	-	-	-
O. itatiaiae Vattimo-Gil*	FOD	-	-	-
O. kostermanniana Vattimo-Gil*	FOD	-	-	-
O. lanata (Nees & Mart. *ex* Nees) Mez*	FOD, FES	-	-	-
O. lancifolia (Schott) Mez	FOD, FES	-	-	-
O. langsdorffii (Meisn.) Mez*	FOD, FES, FCA	VU	VU	ANEXO I
O. laxa (Nees) Mez*	FOD, FES, FOM	-	-	-
O. lobbii (Meisn.) Rohwer	FES, FCA, RST	-	-	-
O. longifolia Kunth	FES, FOD	-	-	-
O. microbotrys (Meisn.) Mez*	FOD	-	-	-
O. minarum (Nees & Mart. *ex* Nees) Mez	FES	-	-	-
O. montana (Meisn.) Mez*	FOD	-	-	-
O. nectandrifolia Mez*	FOD	-	-	-
O. nitida (Meisn.) Rohwer	FOD	-	-	-
O. notata (Nees & Mart. *ex* Nees) Mez*	FOD, FES, RST	-	-	-
O. nunesiana (Vattimo-Gil) Baitello*	FOD	-	-	-
O. nutans (Nees) Mez*	FOD	-	-	-
O. odorifera (Vell.) Rohwer*	FOD, FES	-	VU	ANEXO I
O. percoriacea Kosterm.*	FOD, FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
O. pluridomatiata A.Quinet*	FOD	-	-	-
O. polyantha (Nees & Mart.) Mez*	RST	-	-	-
O. porosa (Nees & Mart. *ex* Nees) Barroso*	FOD, FOM	VU	VU	ANEXO I
O. puberula (Rich.) Nees	FOD, FES	-	-	-
O. pulchella (Nees & Mart. *ex* Nees) Mez	FOD, FES, RST, FOM	-	-	-
O. pulchra Vattimo-Gil*	FOD	-	-	-
O. sassafras (Meisn.) Mez*	FOD	-	-	-
O. schwackeana Mez*	FOD	-	-	-
O. semicompleta (Nees & Mart. *ex* Nees) Mez*	FOD	-	-	-
O. serrana Coe-Teix.*	FOD	-	VU	ANEXO II
O. silvestris Vattimo-Gil*	FOD, FES	-	-	-
O. spixiana (Nees) Mez	FOD, FES	-	-	-
O. sulcata Vattimo-Gil*	FOD	-	-	-
O. tabacifolia (Meisn.) Rohwer	FOD, FES	-	-	-
O. teleiandra (Meisn.) Mez*	FOD	-	-	-
O. tenuiflora (Nees) Mez*	FOD, FES	-	-	-
O. tristis (Nees & Mart. *ex* Nees) Mez	FOD	-	-	-
O. urbaniana Mez*	FOD	-	-	-
O. vaccinioides (Meisn.) Mez*	FOD	-	-	-
O. velloziana (Meisn.) Mez	FES, FOD	-	-	-
O. velutina (Nees) Rohwer	FES, FOD	-	-	-
O. villosa Kosterm.*	FOD	-	-	-
Persea – 11/200				
P. alba Nees & Mart. *ex* Nees	FOD	-	-	-
P. aurata Miq.	FOD, RST	-	-	-
P. caesia Meisn.*	FOD	-	-	-
P. fulva Kopp	FOD	-	-	-
P. major Kopp	FOD	-	-	-
P. microphylla Mez*	FOD, FCA	-	-	-
P. obovata Nees & Mart. *ex* Nees*	FOD, FCA	-	-	-
P. punctata Meisn.*	FOD	-	EN	ANEXO I
P. rufotomentosa Nees & Mart. *ex* Nees	FOD	-	-	-
P. venosa Nees & Mart. *ex* Nees*	FES, FOD	-	-	-
P. willdenovii Kosterm.	FOD, FES, RST	-	-	-
*Phyllostemonodaphne** – 1/1				
P. geminiflora (Mez) Kosterm.*	FOD	EN	VU	ANEXO I
Pleurothyrium – 1/40				
P. amplifolium (Mez) Rohwer*	FOD	-	-	-
Rhodostemonodaphne – 3/41				
R. anomala (Mez) Rohwer*	FOD	-	-	-
R. capixabensis Baitello & Coe-Teix.*	FOD	-	EN	ANEXO I
R. macrocalyx (Meisn.) Rohwer *ex* Madriñán*	FOD	-	-	-
*Urbanodendron** – 3/3				
U. bahiense (Meisn.) Rohwer*	FOD, FES	EN	VU	ANEXO II
U. macrophyllum Rohwer*	FOD	EN	EN	ANEXO II
U. verrucosum (Nees) Mez*	FOD	VU	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Williamodendron – 1/4				
W. cinnamomeum Van der Werff*	FOD	-	EN	ANEXO II

Laxmanniaceae

João Renato Stehmann

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
LAXMANNIACEAE – 25/178				
Cordyline – 1/24				
C. spectabilis Kunth & C.D.Bouché	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-

Lecythidaceae

Nathan P. Smith & Scott A. Mori

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
LECYTHIDACEAE – 19/ca. 300				
Cariniana – 4/9				
C. estrellensis (Raddi) Kuntze	FOD	-	-	-
C. ianeirensis R.Knuth	FOD	EN	-	-
C. legalis (Mart.) Kuntze*	FOD	VU	-	-
C. parvifolia S.A.Mori, Prance & Menandro*	FOD	-	EN	ANEXO I
Couratari – 4/19				
C. asterophora Rizzini*	FOD	CR	-	-
C. asterotricha Prance*	FOD	CR	VU	ANEXO I
C. macrosperma A.C.Sm.	FOD	-	-	-
C. pyramidata (Vell.) Kunth*	FOD	EN	-	-
Eschweilera – 6/86				
E. alvimii S.A.Mori*	FOD	EN	VU	ANEXO II
E. complanata S.A.Mori*	FOD	-	-	-
E. compressa (Vell.) Miers*	FOD	CR	-	-
E. mattos-silvae S.A.Mori*	FOD	-	-	-
E. ovata (Cambess.) Mart. *ex* Miers	FOD, RST	-	-	-
E. tetrapetala S.A.Mori*	FOD	VU	VU	ANEXO II
Gustavia – 1/40				
G. augusta L.	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Lecythis – 4/26				
L. lanceolata Poir.	FOD	-	-	-
L. lurida (Miers) S.A.Mori	FOD	-	-	-
L. pisonis Cambess.	FOD	-	-	-
L. schwackei (R.Knuth) S.A.Mori	FOD, FCA	VU	-	-

Lentibulariaceae

Cláudia Petean Bove & Paulo Cesar Baleeiro Souza

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
LENTIBULARIACEAE – 42/ca. 325				
Genlisea – 6/21				
G. aurea A.St.-Hil.	FAQ, FOD, FOM, FAQ, FED	-	-	-
G. filiformis A.St.-Hil.	FAQ, FOD, FES	-	-	-
G. lobata Fromm*	FAQ, FOD, FCA, AFL	-	-	-
G. pigmea A.St.-Hil.	FAQ, FED	-	-	-
G. repens Benj.	FAQ, FOD, FOM, FES	-	-	-
G. violacea A.St.-Hil.	FAQ, FOD, FES, FCA, AFL	-	-	-
Utricularia – 36/ca. 220		-		
U. amethystina Salzm. ex A.St.-Hil. & Girard	FAQ, FOD, FES, FCA	-	-	-
U. breviscapa Wright ex Griseb.	FAQ, FOD, FES	-	-	-
U. cucullata A.St.-Hil. & Girard	FAQ, FOD, FOM, FES, FCA	-	-	-
U. erectiflora A.St.-Hil. & Girard	FAQ, FOD, RST, FCA	-	-	-
U. flaccida A.DC.*	FAQ, FED, RST	-	VU	ANEXO II
U. foliosa L.	FAQ, FOD, FES, RST	-	-	-
U. geminiloba Benj.*	FAQ, FOD, FES	-	-	-
U. gibba L.	FAQ, FOD, FES, RST	-	-	-
U. guyanensis A.DC.	FAQ, FOD, FES	-		
U. hispida Lam.	FAQ, FOD	-	-	-
U. hydrocarpa Vahl	FAQ, FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
U. juncea Vahl.	FAQ, FES, FED	-	-	-
U. laciniata A.St.-Hil & Girard.	FAQ, FES, FCA, AFL	-	-	-
U. laxa A.St.-Hil. & Girard	FAQ, FES, RST	-	-	-
U. longifolia Gardner*	FAQ, FOD, FCA, RST	-	-	-
U. myriocista A.St.-Hil & Girard.	FAQ, FOD, FES, FCA	-	-	-
U. nana A.St.-Hil. & Girard	FAQ, FOD, RST, FCA	-	-	-
U. nelumbifolia Gardner*	FAQ, FOD, FCA, AFL	-	-	-
U. neottioides A. St.–Hil & Girard	FAQ, FCA, AFL	-	-	-
U. nephrophylla Benj.*	FAQ, FOD	-	-	-
U. nervosa G.Weber ex Benj.	FAQ, FOD, FES, FCA	-	-	-
U. nigrescens Sylvén	FAQ, FOD, FES, FCA	-	-	-
U. olivacea C. Wright ex Griseb.	FAQ, FES, RST, FCA	-	-	-
U. platensis Speg.	FAQ, FES, FED	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
U. poconensis Fromm	FAQ, FES, RST	-	-	-
U. praelonga A.St.-Hil. & Girard	FAQ, FOD, FES, RST	-	-	-
U. pubescens Sm.	FAQ, FOD, FES, AFL	-	-	-
U. pusilla Vahl	FAQ, FOD, FES	-	-	-
U. reniformis A.St.-Hil.*	FAQ, FOD, FES	-	-	-
U. simulans Pilg.	FAQ, FOD, FES	-	-	-
U. subulata L.	FAQ, FOD, FES, FOM, FCA, RST	-	-	-
U. tricolor A.St.-Hil.	FOD, FOM, FES, FAQ, RST	-	-	-
U. tricophyla Spruce *ex* Oliv.	FAQ, FES, FCA	-	-	-
U. tridentata Sylvén	FAQ, FOD, FES	-	-	-
U. triloba Benj.	FAQ, FOD, FES, FCA,	-	-	-
U. warmingii Kamienski	FAQ, FES	-	-	-

Limnocharitaceae

Marcos Sobral

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
LIMNOCHARITACEAE – 5/7				
Hydrocleys – 4/5				
H. martii Seub.	FAQ	-	-	-
H. modesta Pedersen	FAQ	-	-	-
H. nymphoides (Willd.) Buchenau	FAQ	-	-	-
H. parviflora Seub.	FAQ	-	-	-
Limnocharis – 1/2				
L. flava (L.) Buchenau	FAQ	-	-	-

Linaceae

Marcos Sobral

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
LINACEAE – 6/250				
Cliococca – 1/1				
C. selaginoides (Lam.) Rogers & Mildner	FCA	-	-	-
Linum – 5/180				
L. brevifolium A.St.-Hil. & Naudin*	FCA	-	-	-
L. carneum A.St.-Hil.	FCA	-	-	-
L. erigeroides A.St.-Hil.	FCA	-	-	-
L. littorale A.St.-Hil.	FCA	-	-	-
L. smithii Mildner*	FCA	-	-	-

Loasaceae

João Renato Stehmann

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
LOASACEAE – 7/ca. 300				
Aosa – 2/7				
A. parviflora (Schrad. *ex* DC.) Weigend*	FOD	-	-	-
A. uleana (Urb. & Gilg) Weigend*	FOD, FCA	-	-	-
Blumenbachia – 5/ca. 30				
B. catharinensis Urb. & Gilg*	FOD	-	-	-
B. eichleri Urb.*	FOD	-	-	-
B. exalata Weigend*	FOM	-	-	-
B. latifolia Cambess.	FOM, FED, FCA	-	-	-
B. scabra (Miers) Urb.*	FOD, FOM, FCA	-	-	-

Loganiaceae

Elsie Franklin Guimarães & Evelin Andrade Manoel

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
LOGANIACEAE - 55/400				
Bonyunia – 1/6				
B. antoniifolia Progel	FCA	-	-	-
Spigelia – 31/57				
S. amplexicaulis E.F.Guim. & Fontella*	FOD	-	-	-
S. anthelmia L.	FCA	-	-	-
S. araucariensis E.F.Guim. & Fontella	FOM	-	-	-
S. australis L.B.Sm.	FOD	-	-	-
S. bahiana L.B.Sm.	FCA	-	-	-
S. beyrichiana Cham. & Schltdl.	FOM	-	-	-
S. blanchetiana A.DC.	FCA	-	-	-
S. catarinensis E.F.Guim. & Fontella	FOD	-	-	-
S. dusenii L.B.Sm.	FOD	-	-	-
S. flemingeana Cham. & Schltdl.	FOM	-	-	-
S. glabrata Mart.	FOD	-	-	-
S. heliotropoides (Pohl) E.F.Guim. & Fontella	FOM	-	-	-
S. insignis Progel	FCA	-	-	-
S. kleinii L.B.Sm.	FOD, FCA	-	-	-
S. laurina Cham. & Schltdl.	RST	-	-	-
S. linarioides DC.	FOD	-	-	-
S. lundiana A.DC.*	FCA, FOD	-	CR	ANEXO II

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
S. macrophylla A.DC.	FOM	-	-	-
S. martiana Cham.	FOD	-	-	-
S. olfersiana Cham. & Schltdl.	FCA, FOD	-	-	-
S. pusilla Mart.	FOM	-	-	-
S. reflexicalyx E.F.Guim. & Fontella	FOM	-	-	-
S. reitzii L.B.Sm.	FCA	-	-	-
S. riparia L.B.Sm.	FOD	-	-	-
S. scabra Cham. & Schltdl.	FOM	-	-	-
S. schlechtendaliana Mart.	FOM	-	-	-
S. sellowiana Cham. & Schltdl.	FOM	-	VU	ANEXO II
S. spartioides Cham.	FCA, FOD	-	-	-
S. stenophylla Progel	FOM	-	-	-
S. tetraptera Taub.	FOM	-	-	-
S. vestita L.B.Sm.*	FOM	-	-	-
Strychnos – 23/200				
S. acuta Progel	FOM	-	-	-
S. alvimiana Krukoff & Barneby*	FOM	-	-	-
S. atlantica Krukoff & Barneby*	FOM	-	-	-
S. bahiensis Krukoff & Barneby	FOM	-	-	-
S. beyrichiana Cham. & Schltdl.	FOD	-	-	-
S. bicolor Progel	FCA	-	-	-
S. brasiliensis Mart.	FOM	-	-	-
S. cerradoensis Krukoff & Barneby	FOD	-	-	-
S. divaricans Ducke	FOM	-	-	-
S. fulvotomentosa Gilg.	FOM	-	-	-
S. gardneri A.DC.	RST, FCA	-	-	-
S. kuhlmannii Ducke*	FOD	-	-	-
S. mattogrossensis S.Moore	FOM	-	-	-
S. nigricans Progel	FOD	-	-	-
S. parviflora Spruce *ex* Benth.	FOM	-	-	-
S. parvifolia A.DC.	FOD	-	-	-
S. pseudoquina A.St.-Hil.	FCA	-	-	-
S. recognita Krukoff & Barneby	FOM	-	-	-
S. romeu-belenii Krukoff & Barneby	FOM	-	-	-
S. rubiginosa A.DC.	FCA	-	-	-
S. setosa Krukoff & Barneby	FOM	-	-	-
S. torresiana Krukoff & Monachino	FOM	-	-	-
S. trinervis (Vell.) Mart.	FOD	-	-	-

Loranthaceae

Claudenir Simões Caires

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
LORANTHACEAE – 43/264				
Cladocolea – 1/33				
C. alternifolia (Eichl.) Kuijt*	FOD	-	-	-
Ixocactus – 2/7				
I. clandestinus (Mart.) Kuijt*	FOD, RST	-	-	-
I. macrophyllus Kuijt*	FOD	-	-	-
Ligaria – 1/2				
L. cuneifolia (Ruiz & Pav.) Tiegh.	FOD	-	-	-
Phthirusa – 3/ca. 40				
P. caatingae Rizz.	FED, AFL	-	-	-
P. janeirensis Eichl.*	FOD	-	-	-
P. podoptera (Cham. & Schltdl.) Kuijt	FOD	-	-	-
Psittacanthus – 9/119				
P. bolbocephalus Kuijt	FED	-	-	-
P. brasiliensis (Desr.) G. Don*	FOD	-	-	-
P. dichroos (Mart.) Mart.	RST	-	-	-
P. excrenulatus Rizz.*	FOD	-	-	-
P. hatschbachii Kuijt*	FOD	-	-	-
P. pluricotyledonarius Rizz.*	FOD	-	-	-
P. robustus (Mart.) Mart.	FOD	-	-	-
P. salvadorensis Kuijt*	RST	-	-	-
P. tenellus Kuijt*	FOD	-	-	-
Struthanthus – 25/ca. 60				
S. acuminatus (Ruiz & Pav.) Blume *ex* Roem. & Schult.	FOD	-	-	-
S. andrastylus Eichl.	FOD	-	-	-
S. armandianus Rizz.	FOD	-	-	-
S. concinnus Mart.	FOD, RST	-	-	-
S. confertus Mart.	FOD	-	-	-
S. cuspidatus (Mart.) Mart.	FOD	-	-	-
S. dorothyi Rizz.*	FOD	-	-	-
S. flexicaulis Mart.	FOD, FES, FED, FCA	-	-	-
S. glomeriflorus Eichl.	FOD	-	-	-
S. involucratus Rizz.	FOD	-	-	-
S. jatibocensis Rizz.	FOD	-	-	-
S. marginatus (Desr.) Blume	FOD	-	-	-
S. maricensis Rizz.*	RST	-	-	-
S. pentamerus Rizz.*	FOD	-	-	-
S. polyrhizus Mart.	FOD, FOM	-	-	-
S. retusus Blume *ex* Roem. & Schult.	FOD	-	-	-
S. rhyncophyllus Eichl.	FOD	-	-	-
S. salicifolius Mart.	FOD	-	-	-
S. sessiliflorus Kuijt*	FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
S. staphylinus Mart.	FOD	-	-	-
S. syringifolius (Mart.) Mart.	FOD	-	-	-
S. taubatensis Eichl.	FOD	-	-	-
S. tetraquetrus (Mart.) Mart.	FES	-	-	-
S. uraguensis (Hook. & Arn.) G.Don	FOD, RST, MAN	-	-	-
S. vulgaris Mart.	FOM, FES, FED, FCA	-	-	-
Tripodanthus – 2/3				
T. acutifolius (Ruiz & Pav.) Tiegh.	FOM, FES	-	-	-
T. flagellaris (Cham. & Schltdl.) Eichl.	FOD	-	-	-

Lythraceae

Taciana Barbosa Cavalcanti

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
LYTHRACEAE – 57/ca. 600				
Adenaria – 1/6				
A. floribunda Kunth	FES, MAN	-	-	-
Ammannia – 3/ca. 130				
A. auriculata Willd.	FCA, MAN	-	-	-
A. coccinea Rottboell	MAN	-	-	-
A. latifolia L.	RST	-	-	-
Crenea – 1/4				
C. surinamensis (L.f.) Koehne	MAN, RST	-	-	-
Cuphea – 40/ca. 250				
C. acinifolia A.St.-Hil.	AFL, FOD	-	-	-
C. anagalloidea A.St.-Hil.	FCA	-	-	-
C. antisyphilitica Kunth	FCA, RST	-	-	-
C. aperta Koern.*	FCA, RST	-	-	-
C. arenarioides A.St.-Hil.	FCA, FOD	-	-	-
C. brachiata Koern.	FCA, RST	-	-	-
C. calophylla Cham. & Schltdl.	FOD	-	-	-
C. campylocentra Griseb.*	FCA	-	-	-
C. carthagenensis (Jacq.) J.F.Macbr.	FOD	-	-	-
C. confertiflora A.St.-Hil.	FCA, FOM	-	-	-
C. flava Spreng.	RST	-	-	-
C. fruticosa Spreng.	FCA, FOD, RST	-	-	-
C. glaziovii Koern.	AFL, FOD	-	-	-
C. glutinosa Cham. & Schltdl.	AFL, FCA, FES, FOM	-	-	-
C. ingrata Cham. & Schltdl.	FCA, FOD	-	-	-
C. linarioides Cham. & Schltdl.	FCA, FOM	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
C. lindmaniana Bacig.*	FCA	-	-	-
C. linifolia (A.St.-Hil.) Koehne	FCA, FOM	-	-	-
C. lutescens Koern.	AFL, FCA, FES, RST	-	-	-
C. lysimachioides Cham. & Schltdl.	FCA	-	-	-
C. melvilla Lindl.	AFL, FOD	-	-	-
C. micrantha Kunth	FCA	-	-	-
C. origanifolia Griseb.	FCA	-	-	-
C. pascuorum Koern.	FCA	-	-	-
C. polymorpha A.St.-Hil.	FCA, FOM	-	-	-
C. polymorphoides Koern.	FES	-	-	-
C. pterosperma Koern.	FCA, FOD	-	-	-
C. racemosa (L.f.) Spreng.	AFL, FCA, FOD, MAN, RST	-	-	-
C. reitzii Lourteig*	FCA, MAN	-	-	-
C. repens Koern.	FCA	-	-	-
C. rubescens Koern.*	FOD	-	-	-
C. santos-limae G.Barroso*	AFL	-	-	-
C. schwackei Koern.*	FCA, AFL, FOD	-	-	-
C. sessiliflora A.St.-Hil.	FES, FOD, FCA	-	-	-
C. sessilifolia Mart.	FES, FOD, FCA, RST	-	-	-
C. strigulosa Kunth	FOD, RST	-	-	-
C. thymoides Cham. & Schltdl.	FCA	-	-	-
C. tuberosa Cham. & Schltdl.	FCA, FOM, MAN	-	-	-
C. urbaniana Koern.*	AFL, FCA, FOD, FOM, MAN	-	-	-
C. varia Bacig.*	FCA, FOD, FOM	-	-	-
Diplusodon – 2/ca. 100				
D. villosissimus Pohl	FCA	-	-	-
D. virgatus Pohl	FES	-	-	-
Heimia – 2/5				
H. myrtifolia Cham. & Schltdl.*	FES, FOD	-	-	-
H. salicifolia (Kunth) Link	FOD	-	-	-
Lafoensia – 2/12				
L. nummularifolia A.St.-Hil.*	FCA	-	-	-
L. pacari A.St.-Hil.	FED, FES, FOM	-	-	-
Lythrum – 2/ca. 160				
L. hyssopifolia L.	FCA	-	-	-
L. maritimum Kunth	RST	-	-	-
Pleurophora – 2/13				
P. anomala (A.St.-Hil.) Koehne	FES, RST	-	-	-
P. saccocarpa Koern.*	FCA	-	-	-
Rotala – 2/57				
R. mexicana Cham. & Schltdl.	FAQ, FCA, FOD	-	-	-
R. ramosior (L.) Koehne	FAQ, FCA, FOD	-	-	-

Magnoliaceae

Caetano Troncoso Oliveira

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
MAGNOLIACEAE – 2/230				
Magnolia – 2/215				
M. ovata (A.St.-Hil.) Spreng.	FES	-	-	-
M. sellowiana (A.St.-Hil.) Govaerts*	FES, FOD	-	-	-

Malpighiaceae

André Márcio Araujo Amorim

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
MALPIGHIACEAE – 154/ca. 1.200				
Alicia – 1/2				
A. anisopetala (A.Juss.) W.R.Anderson	FOD	-	-	-
Amorimia – 3/10				
A. exotropica (Griseb.) W.R.Anderson*	FOD	-	-	-
A. maritima (A.Juss.) W.R.Anderson*	AFL, FOD	-	-	-
A. rigida (A.Juss.) W.R.Anderson	FOD, FES	-	-	-
Banisteriopsis – 12/ca. 70				
B. adenopoda (A.Juss.) B.Gates	FOD, FES	-	-	-
B. basifixa B.Gates*	FOD	-	-	-
B. magdalenensis B.Gates*	FOD	-	VU	ANEXO II
B. membranifolia (A.Juss.) B.Gates	FOD	-	-	-
B. multifoliolata (A.Juss.) B.Gates	FOD	-	-	-
B. muricata (Cav.) Cuatrec.	FES	-	-	-
B. nummifera (A.Juss.) B.Gates	FOD	-	-	-
B. parviflora (A.Juss.) B.Gates*	FOD	-	VU	ANEXO II
B. parviglandula B.Gates	FOD	-	-	-
B. pseudojanusia (Nied.) B.Gates	FOD	-	-	-
B. scutellata (Griseb.) B.Gates*	FOD	-	-	-
B. sellowiana (A.Juss.) B.Gates*	FOD, RST	-	VU	ANEXO II
Barnebya – 1/2				
B. dispar (Griseb.) W.R.Anderson & B.Gates*	FOD	-	-	-
Bronwenia – 2/10				
B. ferruginea (Cav.) W.R.Anderson & C.Cav.Davis	FES	-	-	-
B. peckoltii W.R.Anderson & C.Cav.Davis*	FOD	-	-	-
Bunchosia – 5/ca. 100				
B. acuminata Dobson*	FOD	-	VU	ANEXO II

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
B. itacarensis W.R.Anderson*	FOD	-	VU	ANEXO II
B. macilenta Dobson*	FES	-	-	-
B. maritima (Vell.) J.F.Macbr.*	FOD	-	-	-
B. pernambucana W.R.Anderson*	FOD	-	VU	ANEXO II
Byrsonima – 19/ca. 230				
B. alvimii W.R.Anderson*	FOD	-	VU	ANEXO II
B. bahiana W.R.Anderson*	RST	-	VU	ANEXO II
B. cacaophila W.R.Anderson*	FOD, FES	-	VU	ANEXO II
B. coccolobifolia Kunth	FCA, RST	-	-	-
B. correifolia A.Juss.	FOD	-	-	-
B. crispa A.Juss.	FOD	-	-	-
B. fanswawei W.R.Anderson	FOD	-	-	-
B. intermedia A.Juss.	FOD	-	-	-
B. laevigata (Poir.) DC.	FOD	-	-	-
B. laxiflora Griseb.	FOD	-	-	-
B. ligustrifolia A.Juss.	FOD	-	-	-
B. microphylla A.Juss.*	RST	-	VU	ANEXO II
B. myricifolia Griseb.	FOD	-	-	-
B. niedenzuiana Skottsb.	FOD, RST	-	-	-
B. oblanceolata Nied.*	FOD	-	-	-
B. pedunculata W.R.Anderson*	FOD	-	-	-
B. perseifolia Griseb.	FOD	-	-	-
B. sericea DC.	FOD, RST	-	-	-
B. stipulacea A.Juss.	FOD	-	-	-
Callaeum – 1/11				
C. psilophyllum (A.Juss.) D.M.Johnson	AFL, FCA, FES	-	-	-
Carolus – 2/6				
C. chlorocarpus (A.Juss.) W.R.Anderson	FOD, FES	-	-	-
C. renidens (A.Juss.) W.R.Anderson	FOD	-	-	-
Dicella – 2/11				
D. bracteosa (A.Juss.) Griseb.	FOD, FES	-	-	-
D. nucifera Chodat	FOD	-	-	-
Diplopterys – 4/29				
D. carvalhoi W.R.Anderson & C.Cav.Davis*	FOD	-	-	-
D. nigrescens (A.Juss.) W.R.Anderson & C.Cav.Davis*	FOD	-	-	-
D. patula (B.Gates) W.R.Anderson & C.Cav.Davis	FES	-	-	-
D. sepium (A.Juss.) W.R.Anderson & C.Cav.Davis	FES	-	-	-
Galphimia – 2/38				
G. australis Chodat	AFL, FES, RST	-	-	-
G. brasiliensis (L.) A.Juss.	AFL, RST	-	-	-
Heladena – 1/5				
H. multiflora (Hook. & Arn.) Nied.	FOD	-	-	-
Heteropterys – 41/ca. 210				
H. admirabilis Amorim*	FOD	-	VU	ANEXO II
H. alternifolia W.R.Anderson*	RST	-	EN	ANEXO II
H. andersonii Amorim*	FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
H. argyrophaea A.Juss.	FES	-	-	-
H. bahiensis Nied.*	FOD, FES	-	-	-
H. banksiifolia Griseb.*	FOD	-	-	-
H. bicolor A.Juss.	FES	-	-	-
H. bullata Amorim*	FOD	-	VU	ANEXO II
H. capixaba Amorim*	FOD	-	VU	ANEXO II
H. chrysophylla (Lam.) DC.*	FOD, RST	-	-	-
H. coleoptera A.Juss.*	FOD, RST	-	-	-
H. conformis W.R.Anderson*	FES	-	VU	ANEXO II
H. cordifolia Moric. *ex* A.Juss.*	FOD	-	-	-
H. crenulata Mart. *ex* Griseb.	FES	-	-	-
H. crinigera Griseb.*	FOD	-	-	-
H. fluminensis (Griseb.) W.R.Anderson*	FES, RST	-	-	-
H. fragilis Amorim*	FOD	-	VU	ANEXO II
H. glabra Hook. & Arn.	FOM, FES	-	-	-
H. glazioviana Nied.*	AFL	-	-	-
H. grandiflora A.Juss.	AFL, FOD, FES	-	-	-
H. imperata Amorim*	FOD	-	-	-
H. intermedia (A.Juss.) Griseb.	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
H. jardimii Amorim*	FOD	-	-	-
H. leschenaultiana A.Juss.*	FOD	-	-	-
H. lindleyana A.Juss.*	FOD	-	-	-
H. macrostachya A.Juss.	FOD	-	-	-
H. megaptera A.Juss.	FOD	-	-	-
H. mulgurae W.R.Anderson	FES	-	-	-
H. nitida (Lam.) DC.*	FOD	-	-	-
H. nordestina Amorim*	FOD, FES	-	-	-
H. oberdanii Amorim*	RST	-	VU	ANEXO II
H. occhionii Amorim	FOD	-	VU	ANEXO II
H. patens (Griseb.) A.Juss.*	FOD	-	-	-
H. pauciflora A.Juss.*	FOD, FES	-	-	-
H. rufula A.Juss.*	RST	-	-	-
H. sanctorum W.R.Anderson*	FOD, FES	-	VU	ANEXO II
H. sericea (Cav.) A.Juss.	AFL, FOD	-	-	-
H. syringifolia Griseb.	FES	-	-	-
H. ternstroemiifolia A.Juss.*	FOD	-	CR	ANEXO II
H. thyrsoidea (Griseb.) A.Juss.*	FOD	-	-	-
H. trigoniifolia A.Juss.	AFL, FOD	-	-	-
Hiraea – 5/ca. 140				
H. bahiensis Moric.*	FOD	-	-	-
H. bullata W.R.Anderson*	FOD	-	-	-
H. cuneata Griseb.	FOD	-	-	-
H. fagifolia (DC.) A.Juss.	FOD	-	-	-
H. wideana A.Juss.	FOD	-	-	-
Janusia – 2/16				
J. anisandra (A.Juss.) Griseb.	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
J. hexandra (Vell.) W.R.Anderson	FOD	-	-	-
Lophopterys – 1/7				
L. floribunda W.R.Anderson & C.Cav.Davis	AFL, FES	-	-	-
Mascagnia – 5/ca. 120				
M. bierosa (A.Juss.) W.R.Anderson	FOD, FES	-	-	-
M. cordifolia (A.Juss.) Griseb.	FOD	-	-	-
M. divaricata (Kunth) Nied.	FOD	-	-	-
M. sepium (A.Juss.) Griseb.	FOD, FES	-	-	-
M. velutina C.Anderson	FOD	-	-	-
Mezia – 1/15				
M. araujoi Nied.*	FOD	-	-	-
Niedenzuella – 7/16				
N. acutifolia (Cav.) W.R.Anderson	AFL, FOD, FES	-	-	-
N. glabra (Spreng.) W.R.Anderson	FOD	-	-	-
N. leucosepala (Griseb.) W.R.Anderson	FOD	-	-	-
N. lucida (A.Juss.) W.R.Anderson	FOD	-	-	-
N. mogoriifolia (A.Juss.) W.R.Anderson*	FOD	-	-	-
N. poeppigiana (A.Juss.) W.R.Anderson	FOD	-	-	-
N. sericea (A.Juss.) W.R.Anderson	FOD, FES	-	-	-
Peixotoa – 5/32				
P. catarinensis C.Anderson*	RST	-	VU	ANEXO II
P. hispidula A.Juss.*	FOD, RST	-	-	-
P. jussieuana A.Juss.	FOD	-	-	-
P. parviflora A.Juss.	FOD, FCA	-	-	-
P. sericea C.Anderson*	FOD	-	-	-
Stigmaphyllon – 27/ca. 150				
S. acuminatum A.Juss.	FOD	-	-	-
S. affine A.Juss.	FOD	-	-	-
S. alternifolium A.Juss.	FOD	-	-	-
S. angustilobum A.Juss.	FOD	-	-	-
S. arenicola C.Anderson*	FOD, RST	-	-	-
S. auriculatum (Cav.) A.Juss.	AFL, FED, FES, RST	-	-	-
S. blanchetii C.Anderson*	FOD, FES, RST	-	-	-
S. bonariense (Hook. & Arn.) C.Anderson	FES, FOD	-	-	-
S. bradei C.Anderson	FOD	-	VU	ANEXO I
S. carautae C.Anderson	FOD	-	VU	ANEXO II
S. cavernulosum C.Anderson	FES	-	-	-
S. ciliatum (Lam.) A.Juss.	RST	-	-	-
S. crenatum C.Anderson*	FCA	-	VU	ANEXO II
S. gayanum A.Juss.*	FOD	-	-	-
S. glabrum C.Anderson	FOD	-	VU	ANEXO II
S. hatschbachii C.Anderson	FOD	-	VU	ANEXO II
S. hispidum C.Anderson*	FOD	-	-	-
S. jatrophifolium A.Juss.	FES	-	-	-
S. lalandianum A.Juss.	FOD	-	-	-
S. macropodum A.Juss.*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
S. paralias A.Juss.	AFL, FCA, RST	-	-	-
S. puberulum Griseb.	FOD	-	-	-
S. rotundifolium A.Juss.	FOD	-	-	-
S. salzmannii A.Juss.*	FOD	-	-	-
S. saxicola C.Anderson	FES	-	-	-
S. tomentosum A.Juss.	FOD	-	-	-
S. vitifolium A.Juss.*	FOD	-	VU	ANEXO II
Tetrapterys – 4/ca. 130				
T. anisoptera A.Juss.	FOD	-	-	-
T. longibracteata A.Juss.	FES	-	-	-
T. mucronata Cav.	FOD, FES	-	-	-
T. phlomoides (Spreng.) Nied.	FOD, FOM, FES	-	-	-
Thryallis – 1/27				
T. brachystachys Lindl.	RST	-	-	-

Malvaceae

Massimo G. Bovini

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
MALVACEAE – 284/2.500				
Abutilon – 27/160				
A. anodoides A.St.-Hil. & Naud.*	FOD, RST	-	CR	ANEXO II
A. appendiculatum K.Schum.*	FOD	-	-	-
A. bedfordianum (Hook.) A.St.-Hil.*	FOD	-	-	-
A. carinatum Krapov.*	FOD	-	-	-
A. clausenii Krapov.*	FOD	-	-	-
A. costicalyx K.Schum.*	FOD	-	-	-
A. esculentum A.St.-Hil.*	RST	-	-	-
A. fluviatile (Vell.) K.Schum.*	FOD	-	-	-
A. inaequale (Link & Otto) K.Schum.*	FOD, RST	-	-	-
A. inaequilaterum A.St.-Hil.*	FOD	-	-	-
A. itatiaiae R.E.Fr.*	FOD	-	-	-
A. latipetalum G.L.Esteves & Krapov.*	FOD	-	-	-
A. longifolium K.Schum.*	FOD	-	-	-
A. macranthum A.St.-Hil.*	FOD	-	-	-
A. minarum K.Schum.*	FOD	-	-	-
A. molle Sweet*	FOD	-	-	-
A. nigricans G.L.Esteves & Krapov.*	FOD	-	-	-
A. parviflorum A.St.-Hil.*	FOD	-	-	-
A. pauciflorum A.St.-Hil.	FOD, RST	-	-	-
A. peltatum K.Schum.*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
A. purpurascens K.Schum.*	RST	-	-	-
A. ramiflorum A.St.-Hil.	FOD	-	-	-
A. regnellii Miq.*	FOD	-	-	-
A. rufinerve A.St.-Hil.*	FOD	-	-	-
A. scabridum K.Schum.*	FOD	-	-	-
A. sellowianum (Klotzsch) Regel*	FOD	-	-	-
A. umbelliflorum A.St.-Hil.	FOD	-	-	-
*Akrosida** – 1/1				
A. macrophylla (Ulbr.) Fryxell & J.Fuertes*	FOD	-	-	-
Apeiba – 2/17				
A. albiflora Ducke	FOD, FOM, FES	-	-	-
A. tibourbou Aubl.	FOD, FOM, FES	-	-	-
Ayenia – 1/73				
A. tomentosa L.	FOD, RST	-	-	-
Bastardia – 1/4				
B. bivalvis Kunth*	FOD, FES, RST	-	-	-
Bastardiopsis – 1/10				
B. densiflora (Hook. & Arn.) Hassl.	FOD	-	-	-
Bombacopsis – 3/26				
B. calophylla (K.Schum.) A.Robyns*	FOD	-	-	-
B. glabra (Pasq.) A.Robyns	FOD	-	-	-
B. stenopetala (Casar.) A.Robyns	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
Briquetia – 1/5				
B. spicata (Kunth) Fryxell	FOD, FOM, FES, FED, RST	-	-	-
Byttneria – 12/130				
B. abutiloides A.St.-Hil. & Naudin*	FOD, FOM	-	-	-
B. australis A.St.-Hil.	FOD, FES	-	-	-
B. beyrichiana K.Schum.*	FOD, RST	-	-	-
B. catalpifolia (A.St.-Hil.) Cristóbal	FOD, FOM, FES	-	-	-
B. gayana A.St.-Hil.*	FOD, RST, AFL	-	-	-
B. gracilipes Decne. *ex* Baill.	FOD, FOM	-	-	-
B. hatschbachii Cristóbal*	FOD	-	-	-
B. implacabilis Cristóbal*	FOD	-	-	-
B. sagittifolia A.St.-Hil.	FOD, FES	-	-	-
B. scabra L.	FES, FED, AFL	-	-	-
B. triadenia Cristóbal*	FOD, FOM	-	-	-
B. urticifolia K.Schum.	FOD	-	-	-
Calyculogygas – 1/1				
C. uruguayensis Krapov.	FOD, FOM	-	VU	ANEXO II
*Calyptraemalva** – 1/1				
C. catharinensis Krapov.*	FOD	-	VU	ANEXO I
Ceiba – 6/16				
C. crispiflora (Kunth) Ravenna*	FOD, FOM, RST	-	-	-
C. erianthos (Cav.) K.Schum.	FOD, FOM, RST	-	-	-
C. glaziovii (Kuntze) K.Schum.	FOD, FOM, FES	-	-	-
C. pubiflora (A.St.-Hil.) K.Schum.	FOD, FOM, FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
C. speciosa (A.St.-Hil.) Ravenna	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
C. ventricosa (Nees & Mart.) Ravenna	FOD, FOM, FES	-	-	-
Cienfuegosia – 2/27				
C. affinis (Kunth) Hochr.	FOM, FES	-	-	-
C. ituiutabensis Brandão & Laca-Buendia	FOM, FES	-	-	-
Corchorus – 3/30				
C. argutus Kunth*	FOD, FOM, FES	-	-	-
C. hirtus L.	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
C. olitorius L.	FOD, FOM, FES	-	-	-
Cristiana – 2/7				
C. africana DC.	FOD, FOM, FES	-	-	-
C. macrodon Toledo*	FOD, FOM	-	VU	ANEXO II
Eriotheca –7/21				
E. candolleana (K.Schum.) A.Robyns	FOD, FOM, FES	-	-	-
E. dolichopoda A.Robyns*	FOM	-	-	-
E. globosa (Aubl.) A.Robyns	FOD, FOM, FES, FED, RST	-	-	-
E. macrophylla (K.Schum.) A.Robyns*	FOD	-	-	-
E. obcordata A.Robyns & S.Nilsson	FOD, FES	-	-	-
E. pentaphylla (Vell. emend. K.Schum.) A.Robyns*	FOD, RST	-	-	-
E. platyandra A.Robyns*	FES	-	-	-
Gaya – 6/34				
G. aurea A.St.-Hil.*	FOM, FES	-	-	-
G. dominguensis Urb.	FOD, FOM, FES	-	-	-
G. gaudichaudiana A.St.-Hil.*	RST	-	-	-
G. gracilipes K.Schum.	FOM, FES	-	-	-
G. guerkeana K.Schum.	FES	-	-	-
G. ibitipocana Krapov.*	FES	-	-	-
Guazuma – 2/4				
G. crinita Mart.	FOD, FES, RST	-	-	-
G. ulmifolia Lam.	FOD, FES, FED, RST	-	-	-
Helicteres – 10/60				
H. brevispira A.St.-Hil.	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
H. eichleri K.Schum.	FOD, FES, FED	-	-	-
H. heptandra L.B.Sm.	FOD, FES, FED	-	-	-
H. laciniosa Cristóbal*	FOD	-	-	-
H. macropetala A.St.-Hil.	FOD, FOM, FED	-	-	-
H. ovata Lam.*	FOD, FOM, RST	-	-	-
H. pintonis Cristóbal	FOD, FES, FED	-	-	-
H. sacarolha A.St.-Hil.	FOM, FES, FED	-	-	-
H. velutina K.Schum.	FOM, FES, FED	-	-	-
H. vuarame Mart.	FOM, FES, FED	-	-	-
Heliocarpus – 1/11				
H. americanus L.	FOD, FOM	-	-	-
Herissantia – 2/6				
H. crispa Brizicky	FOM, AFL	-	-	-
H. nemoralis (A.St.-Hil.) Brizicky	FOM, AFL	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Hibiscus – 6/200				
H. bifurcatus Cav.	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
H. diversifolius Jacq.	FOD, RST	-	-	-
H. flagelliformis A.St.-Hil.	FES, FED	-	-	-
H. furcellatus Desr.	FOD, FES, RST	-	-	-
H. kitaibelifolius A.St.-Hil.	FOD	-	-	-
H. radiatus Cav.	FOD, FES	-	-	-
*Hydrogaster** – 1/1				
H. trinervis Kuhlm.*	FOD, FES	-	-	-
Krapovickasia – 3/5				
K. flavescens (Cav.) Fryxell	FOD, FOM, FES	-	-	-
K. macrodon (DC.) Fryxell	FOD, FOM, FES	-	-	-
K. urticifolia (A.St.-Hil.) Fryxell	FOD, FOM, FES	-	-	-
Luehea – 7/20				
L. candicans Mart. & Zucc.	FOD, FOM, FES	-	-	-
L. conwentzii K.Schum.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
L. divaricata Mart. & Zucc.	FOD, FOM, FES	-	-	-
L. grandiflora Mart. & Zucc.	FOD, FOM, FES	-	-	-
L. ochrophylla Mart.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
L. paniculata Mart. & Zucc.	FOD, FOM, FES	-	-	-
L. rufescens A.St.-Hil.	FOD, FOM, FES	-	-	-
Malvastrum – 3/25				
M. americanum (L.) Torrey	FOD, FOM, FES	-	-	-
M. coromandelianum (L.) Garcke	FOD, FOM, FES	-	-	-
M. tomentosum (L.) S.R.Hill	FOD, FOM, FES	-	-	-
Melochia – 4/190				
M. pyramidata L.*	FOD, RST	-	-	-
M. simplex A.St.-Hil.	FOD, FOM	-	-	-
M. spicata (L.) Fryxell	FOD, FES, FCA	-	-	-
M. tomentosa L.	FOD, FES, RST	-	-	-
Monteiroa – 10/10				
M. bullata (Ekman) Krapov.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
M. catharinensis Krapov.*	FOD, FOM	-	-	-
M. dusenii (Ekman) Krapov.*	FOD, FOM	-	-	-
M. glomerata (Hook. & Arn.) Krapov.	FOD, FOM, FES	-	-	-
M. hatschbachii Krapov.*	FOD, FOM	-	-	-
M. leitei Monteiro*	FOD	-	-	-
M. ptarmicifolia (A.St.-Hil. & Naudin) Krapov.*	FOD, FOM	-	-	-
M. reitzii Krapov.*	FOD, FOM	-	-	-
M. smithii Krapov.*	FOD	-	-	-
M. triangularifolia Krapov.*	FOD, FOM	-	-	-
Pavonia – 65/250				
P. almasana Ulbr.*	FOD, FOM	-	VU	ANEXO II
P. alnifolia A.St.-Hil.*	RST	-	VU	ANEXO I
P. atlantica Fryxell*	FOD	-	-	-
P. blanchetiana Miq.	FOM, FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
P. calyculosa A.St.-Hil.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
P. cancellata (L.) Cav.	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
P. castaneifolia A.St.-Hil.*	FOD, FOM	-	-	-
P. cauliflora (Nees) Fryxell*	FOD	-	-	-
P. ciliata G.L.Esteves*	FOD	-	-	-
P. communis A.St.-Hil.	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
P. corymbosa (Sw.) Willd.	FOD	-	-	-
P. cracens Fryxell & G.L.Esteves	FOD, FES, AFL	-	-	-
P. crassipedicellata Krapov.*	FES	-	-	-
P. crispa Krapov.*	FOD	-	-	-
P. distinguenda A.St.-Hil.	FOD	-	-	-
P. ducke-limae Monteiro*	FOD	-	-	-
P. dusenii Krapov.*	FOD	-	-	-
P. flavispina Miq.	FOD, FOM, FES	-	-	-
P. fruticosa (Mill.) Fawc. & Rendle	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
P. garckeana Gürke	FOD, FOM, FES	-	-	-
P. geminiflora Moric.	FOD, FOM, FES	-	-	-
P. glazioviana Gürke	FOD, FOM, FES	-	-	-
P. goetheoides (Hassl.) Fryxell*	FOD	-	-	-
P. gracilis R.E.Fr.	FES	-	-	-
P. guerkeana R.E.Fr.	FOD	-	-	-
P. harleyi Krapov.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
P. hastata Cav.	FOD, FOM, FES	-	-	-
P. hexaphylla (S.Moore) Krapov.	FOD, FOM, FES	-	-	-
P. horrida Krapov.*	FOD	-	-	-
P. humifusa A.St.-Hil.	FOD, FOM, RST	-	-	-
P. intermedia A.St.-Hil.*	FES	-	-	-
P. kleinii Krapov. & Cristóbal*	FOD, FOM	-	-	-
P. latibracteolata Krapov.*	FOD	-	-	-
P. laxifolia A.St.-Hil.	FOD, FOM, FES	-	-	-
P. longifolia A.St.-Hil.*	FOD, FOM	-	-	-
P. longipedunculata Gürke*	FOD	-	-	-
P. makoyana E.Morren*	FOD	-	-	-
P. malacophylla (Link & Otto) Garcke	FOD, FOM, FES	-	-	-
P. malvaviscoides A.St.-Hil.	FOD, FOM, FES	-	-	-
P. martii Colla	FOM, FES	-	-	-
P. montana Garcke *ex* Gürke	FOM, FES	-	-	-
P. morii Krapov.*	FOD	-	-	-
P. multiflora A.St.-Hil.*	FES	-	-	-
P. nemoralis A.St.-Hil.	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
P. opulifolia S.Moore	FOD, FOM, FES	-	-	-
P. ovaliphylla G.L.Esteves & Krapov.*	FOD	-	-	-
P. paniculata Cav.	FOD, FOM, FES	-	-	-
P. reticulata Garcke*	FOD, FOM, FES	-	-	-
P. rubriphylla G.L.Esteves*	FOD	-	-	-
P. sagittata A.St.-Hil.	FOD, FOM, FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
P. sancti Krapov.*	FOD	-	-	-
P. schiedeana Steud.	FOD, FOM, FES	-	-	-
P. schrankii Spreng.	FOD, FOM, FES	-	-	-
P. schwackei Gürke	FOM, FES	-	-	-
P. semiserrata (Schrad.) Steud.*	FOD	-	-	-
P. sepium A.St.-Hil.	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
P. sidifolia Kunth	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
P. spectabilis Krapov.*	FOD	-	-	-
P. spiciformis Krapov.*	FOD	-	EN	ANEXO II
P. spinistipula Gürke	FOD, FOM, FES	-	-	-
P. stellata (Spreng.) Spreng.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
P. stipularis Krapov.*	FOD	-	-	-
P. strictiflora (Hook.f.) G.L.Esteves*	FOD	-	-	-
P. tricalycaris A.St.-Hil.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
P. viscosa A.St.-Hil.*	FOM, FES	-	-	-
Peltaea – 5/17				
P. edouardii (Hochr.) Krapov. & Cristóbal	FOD, FOM, FES, AFL	-	-	-
P. lasiantha Krapov. & Cristóbal	FOD, FOM, FES	-	-	-
P. obsita (Mart. *ex* Colla) Krapov. & Cristóbal	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
P. polymorpha (A.St.-Hil.) Krapov. & Cristóbal	FOD, FOM, FES	-	-	-
P. speciosa (Kunth) Standley	FOD, FOM, FES	-	-	-
Pseudabutilon – 2/21				
P. aristulosum (K.Schum.) Krapov.	FES, FED	-	-	-
P. pintoi Monteiro*	FOM, FES	-	-	-
Pseudobombax – 4/22				
P. endecaphyllum (Vell.) A.Robyns*	FOD, FOM, RST	-	-	-
P. grandiflorum (Cav.) A.Robyns*	FOD, RST	-	-	-
P. longiflorum (Mart. & Zucc.) A.Robyns	FOD	-	-	-
P. marginatum (A.St.-Hil. *et al*.) A.Robyns	FOD, FED	-	-	-
Pterygota – 1/11				
P. brasiliensis Allemão*	FOD, RST	-	-	-
Quararibea – 1/30				
Q. turbinata (Sw.) Poir.	FOD, FOM	-	-	-
Rhynchosida – 1/1				
R. physocalyx (A.Gray) Fryxell	FOD, FES	-	-	-
Sida – 43/110				
S. acuta Burm.f.	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
S. angustissima A.St.-Hil.	FOD, FED, RST	-	-	-
S. anomala A.St.-Hil.	FOD, RST	-	-	-
S. ascendens A.St.-Hil.*	FOD, FOM	-	-	-
S. brittoni Leon	FOD, RST	-	-	-
S. caudata A.St.-Hil. & Naudin*	FOD, FOM, FES	-	-	-
S. cearensis Ulbr.	FES	-	-	-
S. chapadensis K.Schum.	FOD, AFL	-	-	-
S. cordifolia L.	FOD, FOM, FES, FED, RST	-	-	-
S. galheirensis Ulbr.	FES, FED, RST	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
S. glaziovii K.Schum.	FOD, FOM, RST	-	-	-
S. glomerata Cav.	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
S. harleyi Krapov.	AFL	-	-	-
S. hatschbachii Krapov.*	FOD	-	-	-
S. honoriana Krapov.	FOD, FOM, FES	-	-	-
S. jussiaeana DC.	FOM, FES	-	-	-
S. leitaofilhoi Krapov.*	AFL	-	-	-
S. linifolia Cav.	FOD, FOM, RST	-	-	-
S. lonchitis A.St.-Hil. & Naudin*	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
S. luschnathiana Steud.	FOD, FOM, FES	-	-	-
S. martiana A.St.-Hil.	FES	-	-	-
S. multicrena Hochr.*	FOD	-	-	-
S. nemorensis Mart. *ex* Colla	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
S. petropolitana Monteiro*	FOD	-	-	-
S. planicaulis Cav.	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
S. plumosa Cav.*	FOD, FES, RST	-	-	-
S. potentilloides A.St.-Hil.*	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
S. pseudopotentilloides Monteiro	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
S. pseudorubifolia Krapov. & Bueno	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
S. regnellii R.E.Fr.	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
S. reitzii Krapov.*	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
S. rhombifolia L.	FOD, FOM, FES, FED, RST, RUD	-	-	-
S. salviifolia C.Presl	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
S. salzmannii Monteiro	FOD, FES, FED	-	-	-
S. sampaiana Monteiro*	FOD	-	-	-
S. santaremensis Monteiro	FOD, RST	-	-	-
S. schumanniana Krapov.*	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
S. spinosa L.	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
S. tomentella Miq.*	FOD, FES	-	-	-
S. tuberculata R.E.Fr.	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
S. ulmifolia Mill.	FOD	-	-	-
S. urens L.	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
S. viarum A.St.-Hil.	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
Sidastrum – 3/8				
S. micranthum (A.St.-Hil.) Fryxell	FOD, FOM, FES, FED, RST	-	-	-
S. multiflorum (Jacq.) Fryxell	FOD, FES, FED	-	-	-
S. paniculatum (L.) Fryxell	FOD, FOM, FES, FED, RST	-	-	-
Spirotheca – 1/11				
S. rivieri (Decne.) Ulbr.*	FOD, FOM	-	-	-
Sterculia – 1/300				
S. curiosa (Vell.) Taroda*	FOD	-	-	-
Talipariti – 1/22				
T. tiliaceum (L.) Fryxell	MAN	-	-	-
Triumfetta – 7/45				
T. abutiloides A.St.-Hil.	FOD, RST	-	-	-
T. altheoides Lam.	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
T. bartramia L.	FOD	-	-	-
T. bogotensis DC.	FOD, FOM	-	-	-
T. grandiflora Vahl	FOD, FOM	-	-	-
T. obscura A.St.-Hil.	FOM, FOM, RST	-	-	-
T. semitriloba Jacq.	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
*Tropidococcus** – 1/1				
T. pinnatipartitus (A.St.-Hil. & Naudin) Krapov.*	FOD, FOM	-	-	-
Urena – 1/8				
U. lobata L.	FOD, FOM, FES, FED, RST	-	-	-
Waltheria – 13/60				
W. americana L.	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
W. aspera K.Schum.	FOD, FES, RST	-	-	-
W. bracteosa A.St.-Hil. & Naudin	FOD, FOM, FES	-	-	-
W. cinerascens A.St.-Hil.	FOD, FES, AFL	-	-	-
W. communis (A.St.-Hil.) K.Schum.	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
W. douradinha A.St.-Hil.	FOD, FOM	-	-	-
W. ferruginea A.St.-Hil.	FOD, FOM, FES	-	-	-
W. glazioviana K.Schum.	FOD, FOM, RST	-	-	-
W. indica L.	FOD, FOM, FES, RST, RUD	-	-	-
W. macropoda Turcz.*	FOD, FED, AFL	-	-	-
W. maritima A.St.-Hil.*	RST	-	-	-
W. petiolata K.Schum.*	FOD, RST	-	-	-
W. viscosissima A.St.-Hil.	FOD, FOM, AFL, RST	-	-	-
Wissadula – 8/28				
W. amplissima (L.) R.E.Fr.	FOD, FOM, FES, FED, RST	-	-	-
W. caribea (DC.) Bovini	FOD, FOM, FES, FED, RST	-	-	-
W. contracta (Link) R.E.Fr.	FOD, FOM, FES, FED, RST	-	-	-
W. excelsior (Cav.) C.Presl	FOD, FOM, FES, FED, RST	-	-	-
W. glechomifolia (A.St.-Hil.) R.E.Fr.*	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
W. hernandioides (L.Hér.) Garcke	FOD, FOM, FES, FED, RST	-	-	-
W. parviflora (A.St.-Hil.) R.E.Fr.*	FOD, FOM, FES, FED, RST	-	-	-
W. periplocifolia (L.) C.Presl *ex* Thwaites	FOD, FOM, FES, FED, RST	-	-	-

Marantaceae

João Marcelo Alvarenga Braga

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
MARANTACEAE – 90/ca. 530				
Calathea – 37/ca. 300				
C. aemula Körn.*	FOD	-	-	-
C. amplissima Petersen*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
C. annae H.Kenn. & J.M.A.Braga*	FOD	-	-	-
C. arrabidae Körn.*	FOD	-	-	-
C. brasiliensis Körn.	FOD, FOM, FES	-	-	-
C. burle-marxii H.Kenn.*	FOD	-	-	-
C. colorata (Körn.) Benth.*	FOD	-	-	-
C. crocata E.Morren & Joriss.	FOD, FOM	-	-	-
C. cylindrica (Roscoe) K.Schum.*	FOD, FES	-	-	-
C. dryadica J.M.A.Braga*	FOD	-	-	-
C. eichleri Petersen	FOD, FES	-	-	-
C. fasciata (Linden *ex* K.Koch) Regel & Körn.*	FOD	-	-	-
C. fatimae H.Kenn. & J.M.A.Braga*	FOD	-	EN	ANEXO II
C. glazioui Körn.*	FOD	-	-	-
C. grandiflora (Roscoe) K.Schum.	FOD, FOM, FES	-	-	-
C. grazielae H.Kenn. & J.M.A.Braga*	FOD	-	-	-
C. joffilyana J.M.A.Braga*	FOD	-	-	-
C. longibracteata (Sweet) Lindl.*	FOD, FES	-	-	-
C. makoyana E.Morren & Joriss.*	FOD, FES	-	-	-
C. monophylla (Vell.) Körn.*	FOD, FES	-	-	-
C. oblonga (Mart.) Körn.*	FOD, FES	-	-	-
C. orbifolia (Linden) H.Kenn.*	FOD	-	-	-
C. prolifera (Vell.) J.M.A.Braga*	FOD	-	-	-
C. reginae J.M.A.Braga*	FOD	-	-	-
C. rufibarba Fenzl*	FOD	-	-	-
C. sciuroides Petersen*	FOD, FES	-	-	-
C. sellowii Körn.*	FOD, FES	-	-	-
C. singularis H.Kenn.*	FES	-	-	-
C. sphaerocephala K.Shum.*	FOD, FES	-	-	-
C. truncata (Link) K.Schum.*	FOD, FES	-	-	-
C. tuberosa (Vell.) Körn.*	FOD, FES	-	-	-
C. umbrosa Körn.*	FOD, FES	-	-	-
C. vaginata Petersen*	FOD, FES	-	-	-
C. violacea Lindl.*	FOD	-	-	-
C. widgrenii Körn.*	FOD	-	-	-
C. wiotii (E.Morren) Regel*	FOD	-	-	-
C. zebrina (Sims) Lindl.*	FOD	-	-	-
Ctenanthe – 12/ca.13				
C. burle-marxii Kennedy*	FOD	-	-	-
C. casupoides Petersen*	FOD, FES	-	-	-
C. compressa (A.Dietr.) Eichler	FOD, FOM, FES	-	-	-
C. glabra (Körn.) Eichler	FOD, FES	-	-	-
C. kummeriana (E.Morren) Eichler*	FOD, FES	-	-	-
C. lanceolata Petersen*	FOD	-	-	-
C. lubbersiana (E.Morren) Eichler*	FOD, FES	-	-	-
C. luschnathiana (Regel & Körn.) Eichler	FOD, FES, FED	-	-	-
C. marantifolia (Vell.) J.M.A.Braga & H.Gomes*	FOD, FES	-	-	-
C. muelleri Petersen*	FOD, FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
C. oppenheimiana (E.Morren) K.Schum.*	FOD	-	-	-
C. setosa (Roscoe) Eichler	FOD, FES	-	-	-
Ischnosiphon – 3/ca. 35				
I. bahiensis L.Andersson*	FOD	-	-	-
I. gracilis (Rudge) Körn.	FOD, FED	-	-	-
I. ovatus Körn.*	FOD	-	-	-
Maranta – 20/ca. 34				
M. anderssoniana Yosh.-Arns *et al.*	FOD, FES, FED	-	-	-
M. bicolor Ker Gawl.*	FOD, FES	-	-	-
M. burchellii K.Schum.	FOD, FES	-	-	-
M. cordata Körn.*	FOD, FES	-	-	-
M. divaricata Roscoe*	FOD, FES	-	-	-
M. foliosa Körn.*	FOD	-	-	-
M. hatschbachiana Yosh.-Arns *et al.*	FOD, FES, FED	-	-	-
M. incrassata L.Andersson	FOD, FES	-	-	-
M. leuconeura E.Morren	FOD, FES	-	-	-
M. lindmanii L.Andersson*	FOD, FES	-	-	-
M. noctiflora Regel & Körn.*	FOD, FES	-	-	-
M. parviflora Petersen	FOD, FES	-	-	-
M. phrynioides Körn.	FES	-	-	-
M. pluriflora (Petersen) K.Schum.	FES, FED	-	-	-
M. protracta Miq.	FOD	-	-	-
M. rupicola L.Andersson	FOD FES	-	-	-
M. sobolifera L.Andersson	FOD, FOM, FES	-	-	-
M. subterranea J.M.A.Braga*	FOD, FES	-	-	-
M. tuberculata L.Andersson*	FES	-	-	-
M. zingiberina L.Andersson	FES, FED	-	EN	ANEXO II
Monotagma – 1/ca. 20				
M. plurispicatum (Körn.) K.Schum.	FOD, FES	-	-	-
Myrosma – 1/1				
M. cannifolia L.f.	FOD, FES, FED	-	-	-
*Saranthe** – 7/7				
S. composita (Link) K.Schum.*	FOD, FES	-	-	-
S. eichleri Petersen*	FOD, FES	-	-	-
S. gladioli (Jakob-Makoy) K.Schum.*	FOD	-	-	-
S. glumacea (van Houtte) K.Schum.*	FOD	-	-	-
S. klotzschiana (Körn.) Eichler*	FOD, FES	-	-	-
S. lennartiana J.M.A.Braga*	FOD	-	-	-
S. leptostachya (Regel & Körn.) Eichler*	FOD, FES	-	-	-
Stromanthe – 7/ca. 17				
S. glabra Yosh.-Arns	FOD, FES	-	-	-
S. papilosa Petersen*	FOD	-	-	-
S. porteana Gris*	FOD, FES	-	-	-
S. schottiana (Körn.) Eichler*	FOD, FES	-	-	-
S. sellowiana K.Schum.*	FOD, FES	-	-	-
S. thalia (Vell.) J.M.A.Braga*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
S. tonckat (Aubl.) Eichler	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
Thalia – 2/7				
T. densibracteata Petersen	FOD, FES, FED, FAQ	-	-	-
T. geniculata L.	FOD, FOM, FES, FED, FAQ	-	-	-

Marcgraviaceae

Luciana H. Yoshino Kamino & Rafaella Cardoso Ribeiro

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
MARCGRAVIACEAE – 11/ca. 260				
Marcgravia – 3/ca. 100				
M. comosa C.Presl*	FOD	-	-	-
M. polyantha Delpino*	FOD, FES	-	-	-
M. umbellata L.	AFL	-	-	-
Marcgraviastrum – 2/14				
M. cuneifolium (Gardner) Bedell *	FOD	-	-	-
M. delpinianum (Wittm.) Gir.-Cañas*	FOD	-	-	-
Norantea – 2/49				
N. bahiensis Mart. *ex* Wittm.	RST	-	-	-
N. guianensis Aubl.	FCA, FES, AFL	-	-	-
Schwartzia – 3/19				
S. adamantinum (Cambess.) Bedell *ex* Gir.-Cañas	AFL	-	-	-
S. brasiliensis (Choisy) Bedell *ex* Gir.-Cañas*	FOD, FES, RST, MAN	-	-	-
S. jucuensis Gir.-Cañas*	FOD, AFL	-	-	-
Souroubea – 1/28				
S. guianensis Aubl.	FOD, FES, RST	-	-	-

Martyniaceae

Marcos Sobral

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
MARTYNIACEAE – 2/15				
Craniolaria – 1/3				
C. integrifolia Cham.	FCA	-	-	-
Ibicella – 1/3				
I. lutea (Lindl.) van Eselt.	FCA	-	-	-

Mayacaceae

Rafaella Cardoso Ribeiro

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
MAYACACEAE – 2/5				
Mayaca – 2/5				
M. fluviatilis Aubl.	RST, FAQ	-	-	-
M. sellowiana Kunth	RST, FAQ	-	-	-

Melastomataceae

Renato Goldenberg, Paulo José F. Guimarães, Ricardo Kriebel & Rosana Romero

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
MELASTOMATACEAE – 571/4.570				
Aciotis – 5/13				
A. indecora (Bonpl.) Triana	FOD	-	-	-
A. ornata (Miq.) Gleason	FOD	-	-	-
A. paludosa (DC.) Triana*	FOD, FES	-	-	-
A. rubricaulis (DC.) Triana	FOD	-	-	-
A. viscida (Benth.) Freire-Fierro	FOD	-	-	-
Acisanthera – 2/17				
A. bivalvis (Aubl.) Cogn.	FCA, RST	-	-	-
A. quadrata Pers.	FCA, RST	-	-	-
Adelobothrys – 1/31				
A. atlântica Schulman*	FOD			
*Behuria** – 12/12				
B. comosa Tavares *et al.**	AFL	-	-	-
B. cordifolia Cogn.*	AFL	-	-	-
B. corymbosa Cogn.*	AFL	-	-	-
B. edmundoi Brade*	FOD	-	-	-
B. glazioviana Cogn.*	?	-	-	-
B. glutinosa Cogn.*	FCA (?)	-	-	-
B. huberioides Brade*	AFL	-	-	-
B. insignis Cham.*	FOD	-	-	-
B. limae Brade*	AFL	-	-	-
B. mourae Cogn.*	AFL	-	-	-
B. parvifolia Cogn.*	FOD	-	-	-
B. souzalimae Brade*	FOD	-	-	-
*Benevidesia** – 2/2				
B. magdalenesis Brade*	AFL	-	-	-
B. organensis Saldanha *ex* Cogn. *	AFL	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Bertolonia – 16/18				
B. acuminata Gardner*	FOD	-	-	-
B. angustifolia Cogn.*	FOD	-	-	-
B. carmoi Baumgratz*	FOD	-	-	-
B. formosa Brade*	FOD	-	-	-
B. foveolata Brade*	FOD	-	-	-
B. grazielae Baumgratz*	FOD	-	-	-
B. hoehneana Brade*	FOD	-	-	-
B. leuzeana (Bonpl.) DC.*	FOD	-	-	-
B. maculata DC.*	FOD	-	-	-
B. marmorata (Naudin) Naudin*	FOD	-	-	-
B. mosenii Cogn.*	FOD	-	-	-
B. nymphaeifolia Raddi*	FOD	-	-	-
B. paranaensis (Wurdack) Baumgratz*	FOD	-	-	-
B. sanguinea Saldanha *ex* Cogn.*	FOD	-	-	-
B. valenteana Baumgratz*	FOD	-	-	-
B. wurdackiana Baumgratz*	FOD	-	-	-
*Bisglaziovia** – 1/1				
B. behurioides Cogn.*	FOM (?)	-	-	-
Cambessedesia – 3/21				
C. eichlerii Cogn.*	AFL	-	VU	ANEXO II
C. espora DC.	AFL, FCA	-	-	-
C. hilariana (Kunth.) DC.	FCA	-	-	-
Chaetostoma – 5/11				
C. albiflorum (Naudin) Kosch & A.B.Martins	AFL	-	-	-
C. armatum (Spreng.) Cogn.	AFL	-	-	-
C. fastigiatum Naudin	AFL	-	VU	ANEXO II
C. glaziovii Cogn.	AFL	-	-	-
C. inerme Naudin	AFL	-	-	-
Clidemia – 10/120				
C. atrata Spring*	FOD	-	-	-
C. biserrata DC.	FES	-	-	-
C. blepharodes DC.*	FOD	-	-	-
C. capilliflora (Naudin) Cogn.*	FOD	-	-	-
C. capitellata (Bonpl.) D.Don	FOD	-	-	-
C. debilis Crueger	FOD	-	-	-
C. dentata D.Don	FOD	-	-	-
C. hirta (L.) D.Don	FOD, FES, RST	-	-	-
C. parasitica Triana*	FOD	-	-	-
C. urceolata DC.	FOD, RST	-	-	-
Conostegia – 1/43				
C. icosandra (Sw.) Urb.	FOD	-	-	-
Desmoscelis – 1/1				
D. villosa (Aubl.) Naudin	FCA	-	-	-
*Dolichoura** – 2/2				
D. kollmannii R.Goldenb. & Tavares*	AFL	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
D. spiritusanctensis Brade*	FOM	-	VU	ANEXO II
*Eriocnema** –2/2				
E. acaulis Triana*	FES	-	VU	ANEXO I
E. fulva Naudin*	FES	-	EN	ANEXO I
Fritzschia – 1/1				
F. erecta Cham.	FCA	-	-	-
Graffenrieda – 2/44				
G. intermedia Triana	FOD	-	-	-
G. weddellii Naudin	FES	-	-	-
Henriettea – 4/13				
H. glazioviana Cogn.*	FOD	-	-	-
H. gomesii Brade*	RST	-	-	-
H. saldanhae Cogn.*	FOD	-	-	-
H. succosa (Aubl.) DC.	FOD	-	-	-
Henriettella – 2/51				
H. glabra (Vell.) Cogn.*	FOD	-	-	-
H. glazioviana Cogn.*	FOD	-	-	-
Huberia – 10/16				
H. carvalhoana Baumgratz*	RST	-	-	-
H. consimilis Baumgratz	FOD, FES	-	-	-
H. espiritosantensis Baumgratz*	FOD	-	VU	ANEXO II
H. glazioviana Cogn.*	FOD	-	-	-
H. minor Cogn.*	FOD	-	-	-
H. nettoana Brade*	FOD	-	-	-
H. ovalifolia DC.*	FOD, RST	-	-	-
H. parvifolia Cogn.*	FOD	-	-	-
H. semiserrata DC.*	FOD, RST	-	-	-
H. triplinervis Cogn.*	FOD	-	-	-
*Itatiaia** – 1/1				
I. cleistopetala (Ule) Ule*	FCA	-	-	-
Lavoisiera – 3/46				
L. bicolor Naudin	AFL	-	-	-
L. imbricata Cham.	AFL, FCA	-	-	-
L. pulchella Cham.	AFL, FCA	-	-	-
Leandra – 149/250				
L. acuminata Cogn.*	FOD	-	-	-
L. acutiflora (Naudin) Cogn.*	FOD, FOM	-	-	-
L. alpestris Cogn.*	FOD	-	-	-
L. amplexicaulis DC.*	FOD, FOM	-	-	-
L. aptera Cogn.	?	-	-	-
L. aspera Cogn.*	FOD	-	-	-
L. atrata Cogn.*	FOD	-	-	-
L. atroviridis Cogn.*	FOD	-	-	-
L. attenuata Cogn.*	FOD	-	-	-
L. aurea (Cham.) Cogn.	FOD, FOM, FES	-	-	-
L. australis (Cham.) Cogn.*	FOD, FOM, FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
L. balduinii Brade*	FOM	-	-	-
L. barbinervis (Triana) Cogn.*	FOD, FOM	-	-	-
L. bergiana Cogn.*	FOD	-	-	-
L. blanchetiana Cogn.	FES	-	-	-
L. brackenridgei Cogn.*	FOD	-	-	-
L. breviflora Cogn.*	FOD	-	-	-
L. calvescens Cogn.*	FOD	-	-	-
L. carassana (DC.) Cogn.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
L. catharinensis Cogn.*	FOM	-	-	-
L. chaetocalyx Cogn.*	FOD	-	-	-
L. circumscissa Cogn.*	FOD	-	-	-
L. clidemioides (Naudin) Wurdack	FOD	-	-	-
L. collina Wurdack*	FOD	-	-	-
L. confusa Cogn.*	FOD	-	-	-
L. cordifolia Cogn.*	FOD	-	-	-
L. cordigera (Triana) Cogn.*	FOD, FOM, AFL	-	-	-
L. cuneata Cogn.*	FOD	-	-	-
L. dasytricha Cogn.*	FOD, FOM	-	-	-
L. debilis Cogn.*	FOD, FOM	-	-	-
L. dentata Cogn.*	FOD	-	-	-
L. depauperata Cogn. *ex* Kuntze*	FOD	-	-	-
L. diffusa Cogn.*	FOD	-	-	-
L. dispar Cogn.*	FOD	-	-	-
L. dubia DC.*	FOD	-	-	-
L. echinata Cogn.*	FOD	-	-	-
L. eichlerii Cogn.	FOM, FES	-	-	-
L. eriocalyx Cogn.*	FOD	-	-	-
L. erostrata (DC.) Cogn.	FOM, FOD	-	-	-
L. euphorbioides (Naudin) M.L.D.R.Souza & Baumgratz*	FCA	-	-	-
L. fallacissima Markgr.*	FOD	-	-	-
L. fallax (Cham.) Cogn.*	FOD, FOM	-	-	-
L. flavescens Cogn.*	?	-	-	-
L. fluminensis Cogn.	?	-	-	-
L. foveolata (DC.) Cogn.	FOD, FOM	-	-	-
L. fragilis Cogn.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
L. freyreissii Cogn.*	?	-	-	-
L. gardneriana Cogn.*	FOD	-	-	-
L. glabrata Cogn.*	FOD	-	-	-
L. glazioviana Cogn.	FOD	-	-	-
L. gracilis Cogn.*	FOD, FOM	-	-	-
L. grayana Cogn.*	FOD	-	-	-
L. hatschbachii Brade*	FOD	-	-	-
L. hermogenesii Baumgratz & M.L.D.R.Souza*	FOD	-	-	-
L. hirta Raddi*	FOD	-	-	-
L. hirtella Cogn.*	FOD	-	-	-
L. humilis (Cogn.) Wurdack*	FOD, AFL	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
L. involucrata DC.*	?	-	-	-
L. ionopogon (Mart.) Cogn.*	FOD	-	-	-
L. itatiaiae (Wawra) Cogn.*	FOD, AFL	-	-	-
L. kleinii Brade*	FOM	-	-	-
L. laevigata (Triana) Cogn.*	FOD, FOM	-	-	-
L. lancifolia Cogn.*	FOD	-	-	-
L. lapae M.L.D.R.Souza & Baumgratz*	FOD	-	-	-
L. laxa Cogn.*	FOD, FOM	-	-	-
L. limbata Cogn.*	FOD	-	-	-
L. longisetosa Cogn.*	FOD, FOM	-	-	-
L. longistyla Cogn.*	FOD	-	-	-
L. luctatoris Wurdack*	AFL	-	-	-
L. lutea Cogn.*	FOD	-	-	-
L. macropora Cogn.*	FOM	-	-	-
L. macrosepala Ule*	FOD	-	-	-
L. magdalenensis Brade*	FOM	-	-	-
L. markgrafii Brade*	?	-	-	-
L. mattosii Baumgratz & M.L.D.R.Souza*	FOD	-	-	-
L. melastomoides Raddi*	FOD, FOM, FES	-	-	-
L. miconiastrum Cogn.*	FOD, FOM	-	-	-
L. microphylla Cogn.	AFL	-	-	-
L. mollis Cogn.*	?	-	-	-
L. mosenii Cogn.*	?	-	-	-
L. mourae Cogn.*	FOD	-	-	-
L. multiplinervis (Naudin) Cogn.*	FOD	-	-	-
L. multisetosa Cogn.*	FOD	-	-	-
L. navicularis Brade*	FOM	-	-	-
L. neglecta Brade*	FOD	-	-	-
L. neurotricha Cogn.*	FOD	-	-	-
L. nianga Cogn.*	FOD	-	-	-
L. niangiformis Cogn.*	?	-	-	-
L. niederleinii Cogn.	?	-	-	-
L. nutans Cogn.*	FOD	-	-	-
L. oblongifolia Cogn.*	?	-	-	-
L. opaca Brade*	FOM	-	-	-
L. organensis Cogn.*	?	-	-	-
L. pallida Cogn.*	FOD, AFL	-	-	-
L. paulina DC.*	?	-	-	-
L. pectinata Cogn.*	FOD	-	-	-
L. pennipilis Cogn.*	AFL	-	-	-
L. pilonensis Wurdack*	FOD	-	-	-
L. planifilamentosa Brade*	FOM	-	-	-
L. polystachya (Naudin) Cogn.	FOM	-	-	-
L. pubescens Cogn.*	FOM	-	-	-
L. purpurascens Cogn.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
L. purpureovillosa Hoehne*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
L. quinquedentata (DC.) Cogn.	FOD	-	-	-
L. quinquenodis Cogn.*	FOD	-	-	-
L. ramboi Brade*	FOM	-	-	-
L. refracta Cogn.*	FOD	-	-	-
L. regnellii (Triana) Cogn.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
L. reitzii Wurdack*	FOD	-	-	-
L. reversa (DC.) Cogn.*	FOD	-	-	-
L. rhamnifolia (Naudin) Cogn.*	FOD	-	-	-
L. ribesiaeflora Cogn.*	FOD	-	-	-
L. riograndensis (Brade) Wurdack*	FOD, FOM	-	-	-
L. rubida Cogn.*	FOD	-	-	-
L. rufescens (DC.) Cogn.	FOD	-	-	-
L. sabiaensis Brade*	FOD	-	-	-
L. saldanhae Cogn.*	FOD	-	-	-
L. salicina (DC.) Cogn.	FOM, FES, FOD	-	-	-
L. santos-limae Brade*	FOD	-	-	-
L. schwackei Cogn.*	FOD	-	-	-
L. sericea DC.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
L. sessiliflora Cogn.*	?	-	-	-
L. sparsisetulosa Hoehne*	FOD	-	-	-
L. sphaerocarpa Cogn.*	FOD	-	-	-
L. strigilliflora Cogn.*	FOD	-	-	-
L. sulfurea Cogn.*	FOD, AFL	-	-	-
L. sylvatica Cogn.*	?	-	-	-
L. sylvestris DC.*	FOD	-	-	-
L. tetragona Cogn.*	FOD	-	-	-
L. tetraquetra Cogn.*	FOD	-	-	-
L. therezopolitana Cogn.*	FOD	-	-	-
L. thyrsiflora Markgr.*	FOD	-	-	-
L. tomentosa Cogn.*	FOD	-	-	-
L. trauninensis Cogn.*	FOD	-	-	-
L. tristis Cogn.*	?	-	-	-
L. truncata Baumgratz & M.L.D.R.Souza*	FOD	-	-	-
L. ulaei Cogn.*	FOD	-	-	-
L. uliginosa Brade*	FOD	-	-	-
L. umbellata DC.*	FOD, FES	-	-	-
L. urbaniana Cogn.*	FOD	-	-	-
L. urophylla Cogn.*	FOD	-	-	-
L. variabilis Raddi*	FOD	-	-	-
L. velutina Cogn.*	?	-	-	-
L. vesiculosa Cogn.*	FOD	-	-	-
L. viridiflava Brade*	?	-	-	-
L. xanthocoma Cogn.	FOD, FOM, FES	-	-	-
L. xantholasia Cogn.	FOD	-	-	-
L. xanthopogon Cogn.*	?	-	-	-
L. xanthostachya Cogn.*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Marcetia – 2/27				
M. ericoides (Spreng.) Berg *ex* Cogn.	RST	-	-	-
M. taxifolia (A.St.-Hil.) DC.	AFL, FCA	-	-	-
Meriania – 13/74				
M. callophylla (Cham.) Triana*	FOD	-	-	-
M. calyptrata (Naudin) Triana*	FOD	-	-	-
M. claussenii (Naudin) Triana*	FOD	-	-	-
M. dentata Cogn.*	FOD	-	-	-
M. excelsa (Gardner) Cogn.*	FOD	-	-	-
M. glabra (DC.) Triana*	FOD	-	-	-
M. glazioviana Cogn.*	?	-	-	-
M. longipes Triana*	?	-	-	-
M. paniculata (DC.) Triana*	FOD	-	-	-
M. pergamentacea Cogn.*	FOD	-	-	-
M. robusta Cogn.*	FOD	-	-	-
M. sanchezii R.Goldenb.*	FOD	-	-	-
M. tetramera Wurdack*	FOD	-	-	-
*Merianthera** – 2/2				
M. burlemarxii Wurdack*	AFL	-	CR	ANEXO I
M. pulchra Kuhlm.*	AFL	-	-	-
Miconia – 115/1.050				
M. affinis DC.	FES	-	-	-
M. albicans (Sw.) Triana	FES, FOD	-	-	-
M. altissima Cogn.*	FOD	-	-	-
M. amacurensis Wurdack	FOD	-	-	-
M. amoena Triana*	FOD, RST	-	-	-
M. argyraea Cogn.*	FOD	-	-	-
M. augusti Cogn.*	FOD	-	-	-
M. baumgratziana R.Goldenb. & C.V.Martin *	FOD	-	-	-
M. brasiliensis (Spreng.) Triana*	FOD	-	-	-
M. brunnea DC.*	FOD	-	-	-
M. budlejoides Triana*	FOD, FES	-	-	-
M. cabussu Hoehne*	FOD	-	-	-
M. calvescens DC.	FOD, FES	-	-	-
M. capixaba R.Goldenb.*	FOD	-	VU	ANEXO II
M. castaneiflora Naudin*	FOD	-	-	-
M. caudigera DC.	FOD	-	-	-
M. centrodesma Naudin	FOD	-	-	-
M. chamissois Naudin	FOD, FES	-	-	-
M. chartacea Triana	FOD	-	-	-
M. ciliata (Rich.) DC.	FOD	-	-	-
M. cinerascens Miq.*	FOD, FOM	-	-	-
M. cinerea Cogn.*	FOD	-	-	-
M. cinnamomifolia (DC.) Naudin*	FOD	-	-	-
M. collatata Wurdack	FOD, FES, FOM	-	-	-
M. compressa Naudin*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
M. cubatanensis Hoehne	FOD	-	-	-
M. cuspidata Naudin	FOD	-	-	-
M. cyathanthera Triana	AFL, FCA	-	-	-
M. depauperata Gardner*	FOD	-	-	-
M. dichroa Cogn.*	FOD	-	-	-
M. discolor DC.*	FOD, FES	-	-	-
M. divaricata Gardner*	FOD	-	-	-
M. dodecandra (Desr.) Cogn.	FOD	-	-	-
M. doriana Cogn.*	FOD	-	-	-
M. eichleri Cogn.*	FOD	-	-	-
M. elaeodendron (DC.) Naudin*	FOD	-	-	-
M. elegans Cogn.	FES	-	-	-
M. fasciculata Gardner*	FOD	-	-	-
M. flammea Casar.*	FOD	-	-	-
M. fluminensis Ule*	FOD	-	-	-
M. formosa Cogn.*	FOD	-	-	-
M. gigantea Cogn.*	FOD	-	-	-
M. gilva Cogn.*	FOD	-	-	-
M. glazioviana Cogn.*	FOD	-	VU	ANEXO II
M. hirtella Cogn.	FOD	-	-	-
M. holosericea (L.) DC.	FOD	-	-	-
M. hyemalis A.St.-Hil. & Naudin	FOD, FOM	-	-	-
M. hypoleuca (Benth.) Triana	FOD	-	-	-
M. ibaguensis (Bonpl.) Triana	RST, FOD, FES	-	-	-
M. inaequidens (DC.) Naudin*	FOD	-	-	-
M. inconspicua Miq.*	FOD	-	-	-
M. jucunda (DC.) Triana*	FOD, FES	-	-	-
M. klotzschii Triana*	FOD	-	-	-
M. kollmannii R.Goldenb. & Reginato*	FOM	-	-	-
M. kriegeriana Baumgratz & Chaves.*	FOD	-	-	-
M. labiakiana R.Goldenb. & C.V.Martin*	FOD	-	-	-
M. laeta Cogn.*	FOD	-	-	-
M. lagunensis Ule*	FOD	-	-	-
M. langsdorffii Cogn.	FES	-	-	-
M. latecrenata (DC.) Naudin*	FOD, FOM	-	-	-
M. lepidota DC.	FOD	-	-	-
M. ligustroides (DC.) Naudin	FOD, FES	-	-	-
M. longicuspis Cogn.*	FOD	-	VU	ANEXO II
M. lurida Cogn.*	FOD	-	-	-
M. lymanii Wurdack*	FOD	-	-	-
M. mellina DC.*	FOD	-	-	-
M. mendoncae Cogn.*	FOD	-	-	-
M. minutiflora (Bonpl.) DC.	FOD	-	-	-
M. mirabilis (Aubl.) L.O.Williams	FOD	-	-	-
M. molesta Cogn.*	FOD	-	-	-
M. mourae Cogn.*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
M. multinervia Cogn.*	FES	-	-	-
M. nervosa (Sm.) Triana	FOD	-	-	-
M. oblongifolia Cogn.*	FOD	-	-	-
M. octopetala Cogn.	FOD	-	-	-
M. organensis Gardner*	FOD	-	-	-
M. ovalifolia Cogn.*	FOD	-	-	-
M. ovata Cogn.*	FOD	-	-	-
M. paniculata (DC.) Naudin*	FOD, FES	-	-	-
M. penduliflora Cogn.*	FOD	-	VU	ANEXO II
M. petroniana Cogn. & Saldanha*	FOD, FES	-	VU	ANEXO II
M. petropolitana Cogn.*	FOD, FES, FOM	-	-	-
M. picinguabensis R.Goldenb.*	FOD	-	VU	ANEXO II
M. pileata DC.	?	-	-	-
M. polyandra Gardner*	FOD	-	-	-
M. prasina (Sw.) DC.	FOD, FES	-	-	-
M. pseudoeichleri Cogn.*	FOD	-	-	-
M. pseudonervosa Cogn.	FES	-	-	-
M. pulchra Cogn.*	FOD	-	-	-
M. pusilliflora (DC.) Naudin	FOD, FES, FOM, RST	-	-	-
M. pyrifolia Naudin	FOD	-	-	-
M. rabenii Cogn.*	FOD	-	-	-
M. racemifera (DC.) Triana*	FOD	-	-	-
M. ramboi Brade*	FOD	-	-	-
M. rimalis Naudin	FOD, FES	-	-	-
M. robustissima Cogn.*	FOD	-	-	-
M. ruficalyx Gleason	FOD	-	-	-
M. rufipila Triana*	FOD	-	-	-
M. saldanhae Cogn.*	FOD	-	-	-
M. sellowiana Naudin	FOD, FOM, AFL	-	-	-
M. serrulata (DC.) Naudin	FOD	-	-	-
M. setosociliata Cogn.*	FOD	-	VU	ANEXO II
M. shepherdii R.Goldenb. & Reginato*	FOM	-	-	-
M. speciosa (A.St.-Hil. & Naudin) Naudin*	FES	-	-	-
M. splendens (Sw.) Griseb.	FES	-	-	-
M. staminea (Desr.) DC.*	FES, FOD	-	-	-
M. subvernicosa Cogn.*	FOD	-	-	-
M. tentaculifera Naudin*	FES, FOD	-	-	-
M. theaezans (Bonpl.) Cogn.	FES, FOD	-	-	-
M. tomentosa (Rich.) D.Don	FOD	-	-	-
M. trianae Cogn.	FOD, FES	-	-	-
M. tristis Spring*	FOD, FES	-	-	-
M. urophylla DC.*	FOD	-	-	-
M. valtherii Naudin*	FOD	-	-	-
M. willdenowii Klotzsch *ex* Naudin*	FOD	-	-	-
Microlepis – 1/4				
M. oleifolia (DC.) Triana	AFL, FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Microlicia – 31/100				
M. avicularis Mart. *ex* Naudin	AFL, FCA	-	-	-
M. cardiophora Naudin	AFL	-	-	-
M. confertiflora Naudin	AFL, FCA	-	-	-
M. cordata (Spreng.) Cham.	AFL, FCA	-	-	-
M. crenulata (DC.) Mart.	AFL	-	-	-
M. cuspidifolia Mart. *ex* Naudin	AFL	-	VU	ANEXO II
M. doryphylla Naudin	FCA	-	-	-
M. elegans Naudin	AFL	-	VU	ANEXO II
M. euphorbioides Mart.	AFL, FCA	-	-	-
M. fasciculata Mart.	FCA	-	-	-
M. formosa Cham.	AFL	-	-	-
M. fulva (Spreng.) Cham.	AFL, FCA	-	-	-
M. glandulifera Cogn.	AFL, FCA	-	-	-
M. glazioviana Cogn.	AFL, FCA	-	EN	ANEXO II
M. graveolens DC.	AFL, FCA	-	-	-
M. helvola (Spreng.) Triana	FCA	-	-	-
M. humilis Naudin	FCA	-	VU	ANEXO II
M. isophylla DC.	AFL, FCA	-	-	-
M. juniperina A.St.-Hil.	AFL, FCA	-	VU	ANEXO II
M. linifolia Cham.	AFL	-	-	-
M. macrophylla Naudin	AFL, FCA	-	-	-
M. martiana O.Berg. *ex* Triana	AFL, FCA	-	-	-
M. microphylla (Naudin) Cogn.	AFL	-	VU	ANEXO II
M. multicaulis Mart. *ex* Naudin	AFL	-	-	-
M. polystemma Naudin	FCA	-	-	-
M. regeliana Cogn.	AFL	-	-	-
M. serrulata Cham.	AFL	-	-	-
M. suborbicularifolia Hoehne	AFL	-	-	-
M. tetrasticha Cogn.	AFL	-	-	-
M. tomentella Naudin	AFL	-	-	-
M. warmingiana Cogn.	AFL	-	-	-
Mouriri – 12/86				
M. arborea Gardner*	FOD	-	-	-
M. arenicola Morley*	RST	-	-	-
M. bahiensis Morley*	FOD	-	-	-
M. chamissoana Cogn.*	FOD	-	-	-
M. doriana Cogn.*	FOD	-	-	-
M. glazioviana Cogn.	FOD, FES	-	-	-
M. guianensis Aubl.	FOD, FES	-	-	-
M. megasperma Morley*	FES	-	-	-
M. myrtilloides (Sw.) Poir.	FES	-	-	-
M. regeliana Cogn.*	FOD	-	-	-
M. sagotiana Triana	FOD	-	-	-
M. sellowiana (Berg.) Burret*	?	-	-	-
Nepsera – 1/1				
N. aquatica (Aubl.) Naudin	FOD, RST	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Ossaea – 14/91				
O. amygdaloides (DC.) Triana*	FOD, RST	-	-	-
O. angustifolia (DC.) Triana*	FOD	-	-	-
O. cabraliensis D.R.Souza*	FOD	-	-	-
O. cogniauxii D.R.Souza*	FES	-	-	-
O. confertiflora (DC.) Triana*	FOD	-	-	-
O. congestiflora (Naudin) Cogn.	FCA	-	-	-
O. consimilis D.R.Souza*	FOD	-	-	-
O. fragilis Cogn.*	FOD	-	-	-
O. marginata (Desr.) Triana*	FOD, FOM, FES	-	-	-
O. meridionalis D.R.Souza*	FOD, FOM, FES	-	-	-
O. quadrisulca (Naudin) Wurdack	FOD	-	-	-
O. sanguinea Cogn.*	FOD	-	-	-
O. sulbahiensis D.R.Souza*	FOD	-	-	-
O. suprabasalis R.Goldenb. & Reginato*	FOD	-	-	-
*Physeterostemon** – 3/3				
P. fiaschii R.Goldenb. & Amorim*	FOD	-	-	-
P. jardimii R.Goldenb. & Amorim*	FOD	-	-	-
P. thomasii Amorim *et al.**	FOD	-	-	-
*Pleiochiton** – 9/9				
P. crassifolium A.Gray*	FOD	-	-	-
P. ebracteatum Triana*	FOD	-	-	-
P. glaziovianum Cogn.*	FOD	-	-	-
P. longipetiolatum Brade*	FOD	-	-	-
P. magdalenesis Brade*	FOD	-	-	-
P. micranthum Cogn.*	FOD	-	-	-
P. parvifolium Cogn.*	FOD	-	-	-
P. roseum Cogn.*	FOD	-	-	-
P. setulosum Cogn.*	FOD	-	-	-
Pterolepis – 3/14				
P. glomerata (Rottb.) Miq.	RST	-	-	-
P. repanda (DC.) Triana	FOM	-	-	-
P. trichotoma (Rottb.) Cogn.	FCA	-	-	-
Rhynchanthera – 7/15				
R. brachyrrhyncha Cham.	FCA	-	-	-
R. cordata DC.	FCA	-	-	-
R. dichotoma (Desr.) DC.	FCA	-	-	-
R. grandiflora (Aubl.) DC.	FCA	-	-	-
R. hispida Naudin	FCA	-	-	-
R. novemnervia DC.	FCA	-	-	-
R. ursina Naudin	FCA	-	-	-
Salpinga – 1/8				
S. margaritacea (Naudin) Triana*	FOD	-	-	-
Siphanthera – 5/16				
S. arenaria (DC.) Cogn.	FCA	-	-	-
S. cordata Pohl *ex* DC.	FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
S. foliosa (Naudin) Wurdack	FCA	-	-	-
S. gracillima (Naudin) Wurdack	FCA	-	-	-
S. paludosa (DC.) Cogn.	FOD	-	-	-
Svitramia – 6/6				
S. hatschbachii Wurdack	AFL	-	-	-
S. integerrima R.Romero & A.B.Martins	AFL	-	VU	ANEXO II
S. minor R.Romero & A.B.Martins	AFL	-	VU	ANEXO II
S. petiolata R.Romero & A.B.Martins	AFL	-	EN	ANEXO II
S. pulchra Cham.	AFL	-	-	-
S. wurdackiana R.Romero & A.B.Martins	AFL	-	VU	ANEXO II
Tibouchina – 104/240				
T. ademarii P.J.F.Guim. *et al.*	FES	-	VU	ANEXO II
T. alata Cogn.*	FOD	-	-	-
T. apparicioi Brade*	FDO	-	-	-
T. arborea (Gardner) Cogn.*	FOD	-	-	-
T. asperior (Cham.) Cogn.*	FOD	-	-	-
T. australis (Triana) Cogn.	FOD, FCA,FOM	-	-	-
T. axillaris Cogn.*	FOD	-	-	-
T. bahiensis Wurdack*	FOD	-	-	-
T. benthamiana (Gardner) Cogn.*	FOD	-	-	-
T. boraceiensis Brade*	FOD	-	-	-
T. boudetii P.J.F.Guim. & R.Goldenb.*	FOD	-	VU	ANEXO II
T. bradeana Renner*	FOD, RST	-	-	-
T. caldensis Cogn.*	FOM	-	-	-
T. canescens (D.Don) Cogn.*	FOD	-	-	-
T. castellensis Brade*	FOD	-	VU	ANEXO II
T. cerastifolia Cogn.	FCA, FOD, FOM	-	-	-
T. chamissoana Cogn.*	FOM	-	-	-
T. cinerea Cogn.*	FOD	-	-	-
T. cisplatensis Cogn.*	FCA, FED	-	-	-
T. clavata (Pers.) Wurdack*	RST	-	-	-
T. clidemioides (Triana) Cogn.*	FOD	-	-	-
T. clinopodiifolia Cogn.*	FOD, FOM	-	-	-
T. cordifolia Cogn.*	FOD, FCA	-	-	-
T. corymbosa (Raddi) Cogn.*	FOD, RST	-	-	-
T. cristata Brade*	FOD	-	-	-
T. debilis Cogn.*	FCA	-	-	-
T. discolor Brade*	FOD	-	-	-
T. divaricata Cogn.*	FOM	-	-	-
T. dubia Cogn.*	FCA	-	-	-
T. dusenii Cogn.*	FOD	-	-	-
T. eichleri Cogn.*	FCA	-	-	-
T. elegans (Gardner) Cogn.*	FOD	-	-	-
T. estrellensis (Raddi) Cogn.*	FOD, FOM	-	-	-
T. fissinervia (Schrank & Mart. *ex* DC.) Cogn.	FOD, FOM	-	-	-
T. floribunda Cogn.*	FCA, FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
T. formosa Cogn.*	FOM	-	-	-
T. fothergillae (Schrank & Mart. *ex* DC.) Cogn.*	FOD, FOM	-	-	-
T. foveolata (Naudin) Cogn.*	FOD, FOM	-	-	-
T. francavillana Cogn.*	RST	-	-	-
T. frigidula (DC.) Cogn.	FCA, FOM	-	-	-
T. gardneriana (Triana) Cogn.*	FOD, FOM	-	-	-
T. gaudichaudiana (DC.) Baill.*	FOD, RST	-	-	-
T. gracilis (Bonpl.) Cogn.	FCA	-	-	-
T. granulosa (Desr.) Cogn.*	FOD	-	-	-
T. guimaraensis Brade*	FCA	-	-	-
T. hatschbachii Wurdack*	FCA	-	-	-
T. herbacea (DC.) Cogn.*	FCA, FOD, FOM	-	-	-
T. heteromalla (D.Don) Cogn.	AFL, FCA, FOD, FOM	-	-	-
T. hieracioides (DC.) Cogn.*	FCA	-	-	-
T. hirsutissima Cogn.*	RST	-	-	-
T. hospita Cogn.*	FCA	-	-	-
T. itatiaiae Cogn.*	FCA	-	-	-
T. kleinii Wurdack*	FCA, FOD	-	-	-
T. kuhlmannii Brade*	FOD	-	-	-
T. langsdorffiana (Bonpl.) Baill.*	RST	-	-	-
T. lhotzkyana (C.Presl) Cogn.*	RST, FOD	-	-	-
T. longipilosa Cogn.	FED	-	-	-
T. longistyla (Cogn.) Renner*	FOD	-	-	-
T. lutzii Brade*	FOD	-	-	-
T. macrochiton (Mart. *ex* DC.) Cogn.*	RST	-	-	-
T. manicata Cogn.*	FOD	-	-	-
T. martialis (Cham.) Cogn.	FCA	-	-	-
T. martiusiana (DC.) Cogn.	FCA	-	-	-
T. maximiliana (DC.) Baill.*	RST	-	-	-
T. melanocalyx R.Romero *et al.*	AFL	-	-	-
T. microphylla Cogn. *ex* Schwake*	FDO	-	-	-
T. minor Cogn.	FCA	-	-	-
T. minutiflora Cogn.*	FCA	-	-	-
T. mosenii Cogn.*	FCA	-	-	-
T. mutabilis (Vell.) Cogn.*	FOD	-	-	-
T. nitida (Graham) Cogn.	FOD, FOM	-	-	-
T. noblickii Wurdack	?	-	-	-
T. pallida Cogn.*	FCA, FOD	-	-	-
T. paratropica (Griseb.) Cogn.	FOD	-	-	-
T. paulo-alvimii Guim. da Vinha*	FOD	-	-	-
T. pilosa Cogn.*	FOD	-	-	-
T. pulchra Cogn.*	FOD	-	-	-
T. quartzophila Brade*	FOD	-	CR	ANEXO I
T. radula Markgr.*	FCA, FOD	-	-	-
T. ramboi Brade*	FCA, FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
T. regnellii Cogn.*	FOD	-	-	-
T. reitzii Brade*	FOD	-	-	-
T. riedeliana Cogn.*	FOD	-	-	-
T. rigidula (Naudin) Wurdack	FCA	-	-	-
T. rupestris Cogn.*	FCA, FED	-	-	-
T. salviifolia (Cham.) Cogn.*	RST	-	-	-
T. scaberrima (Triana) Cogn.*	FOD	-	-	-
T. schenckii Cogn.*	FOD	-	-	-
T. schwackei Cogn.*	FOD	-	-	-
T. sebastianopolitana Cogn.	FCA, FOD, FOM	-	-	-
T. sellowiana Cogn.*	FOD, FOM	-	-	-
T. semidecandra (Schrank & Mart. *ex* DC.) Cogn.	FCA, FOD, FOM	-	-	-
T. serrana P.J.F.Guim. & A.B.Martins	FCA, FOM	-	-	-
T. stipulacea Vinha*	FOD	-	-	-
T. taperoensis Wurdack*	FOD	-	-	-
T. thereminiana (DC.) Cogn.*	FOD	-	-	-
T. tomentulosa Wurdack*	FOD	-	-	-
T. trichopoda (DC.) Baill.*	RST, FOD	-	-	-
T. urbanii Cogn.*	FCA, FED	-	-	-
T. urceolaris (Schrank & Mart. *ex* DC.) Cogn.*	FOD	-	-	-
T. ursina (Cham.) Cogn.*	FCA, FOD	-	-	-
T. urvilleana (DC.) Cogn.*	RST, FOD	-	-	-
T. versicolor (Lindl.) Cogn.*	FOD	-	-	-
T. virgata (Gardner) Cogn.*	FOD	-	-	-
Trembleya – 7/18				
T. calycina Cham.	AFL	-	-	-
T. elegans (Cogn.) Almeda & A.B.Martins	FCA	-	-	-
T. laniflora (D.Don) Cogn.	AFL	-	-	-
T. parviflora (D.Don) Cogn.	FCA	-	-	-
T. pentagona Naudin	AFL	-	-	-
T. phlogiformis DC.	FCA	-	-	-
T. tridentata Naudin	AFL	-	-	-

Meliaceae

Ary Teixeira de Oliveira-Filho

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
MELIACEAE – 29/135				
Cabralea – 1/1				
C. canjerana (Vell.) Mart.	FOD, FOM, FES, FCA, RST	-	-	-
Cedrela – 3/8				
C. fissilis Vell.	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
C. lilloi C.DC.	FES, FED	EN	VU	ANEXO II
C. odorata L.	FOD, FES, FED	-	-	-
Guarea – 5/40				
G. blanchetii C.DC.*	FOD	-	-	-
G. guidonia (L.) Sleumer	FOD, FES, FED, RST	-	-	-
G. kunthiana A.Juss.	FOD, FES, FED	-	-	-
G. macrophylla Vahl	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
G. pendula R.S.Ramalho *et al.**	FES	-	-	-
Trichilia – 20/86				
T. blanchetii C.DC.*	FOD	EN	-	-
T. casarettoi C.DC.*	FOD, FES, RST	-	-	-
T. catigua A.Juss.	FOD, FES, FED	-	-	-
T. claussenii C.DC.	FOD, FOM, FES, FED, RST	-	-	-
T. elegans A.Juss.	FOD, FOM, FES, FED, RST	-	-	-
T. emarginata (Turcz.) C.DC.*	FOD, FES	-	-	-
T. florbranca T.D.Penn.*	FOD	CR	-	-
T. hirta L.	FES, FED	-	-	-
T. lepidota Mart.	FOD, FES, RST	-	-	-
T. magnifoliola T.D.Penn.*	FOD, FES	VU	-	-
T. martiana C.DC.	FOD	-	-	-
T. pallens C.DC.*	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
T. pallida Sw.	FOD, FES, FED	-	-	-
T. pleeana (A.Juss.) C.DC.	FOD	-	-	-
T. pseudostipularis (A.Juss) C.DC.*	FOD, FES, RST	-	-	-
T. quadrijuga Kunth	FOD, FES	-	-	-
T. ramalhoi Rizzini*	FOD, FES, RST	VU	-	-
T. silvatica C.DC.	FOD, FES	-	-	-
T. tetrapetala C.DC.*	FOD, FES	EN	-	-
T. trifolia L.	FOD, FED, FES	-	-	-

Menispermaceae

João Marcelo Alvarenga Braga

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
MENISPERMACEAE – 23/ca. 520				
Abuta – 2/30				
A. convexa (Vell.) Diels*	FOD, FES	-	-	-
A. selloana Eichler*	FOD, FES	-	-	-
Anomospermum – 1/7				
A. reticulatum (Mart.) Eichler	FOD, FOM, FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Borismene – 1/1				
B. japurensis (Mart.) Barneby	FOD, FOM, FES	-	-	-
Chondrodendron – 2/3				
C. microphyllum (Eichler) Moldenke*	FOD	-	-	-
C. platyphyllum (A.St.-Hil.) Miers *	FOD	-	-	-
Cissampelos – 4/19				
C. andromorpha DC.	FOD, FOM, FES	-	-	-
C. glaberrima A.St.-Hil.	FOD, FES	-	-	-
C. pareira L.	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
C. sympodialis Eichler	FOD, FES, FED	-	-	-
Curarea – 1/5				
C. crassa Barneby*	FOD	-	-	-
Disciphania – 4/19				
D. contraversa Barneby*	FOD	-	-	-
D. hernandia (Vell.) J.M.A.Braga*	FOD	-	-	-
D. modesta Diels*	FOD	-	-	-
D. sagittaria Barneby*	FOD	-	-	-
Hyperbaena – 2/19				
H. dominguensis (DC.) Benth.	FOD, FOM, FES	-	-	-
H. oblongifolia (Mart.) Chodat & Hassl.	FOD, FOM, FES	-	-	-
Odontocarya –2/30				
O. acuparata Miers	FOD, FES	-	-	-
O. vitis (Vell.) J.M.A.Braga*	FOD, FES	-	VU	ANEXO II
Orthomene – 1/4				
O. schomburgkii (Miers) Barneby & Krukoff	FOD, FOM, FES	-	-	-
Sciadotenia – 2/17				
S. acutifolia Krukoff & Barneby*	FES	-	-	-
S. pubistaminea (K.Schum.) Diels*	FES	-	-	-
*Ungulipetalum** – 1/1				
U. filipendulum (Mart.) Moldenke*	FOD, FES	-	EN	ANEXO II

Menyanthaceae

Marco Otávio Pivari

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
MENYANTHACEAE – 1/40				
Nymphoides – 1/20				
N. indica (L.) Kuntze	FAQ	-	-	-

Molluginaceae

Márcio de Souza Werneck

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
MOLLUGINACEAE – 2/ca. 130				
Glinus – 1/13				
G. radiatus (Ruiz & Pav.) Rohrb.	FAQ	-	-	-
Mollugo – 1/46				
M. verticillata L.	FOD, FES, RST, FAQ, FCA	-	-	-

Monimiaceae

Ariane Luna Peixoto & Marcos Gonzales

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
MONIMIACEAE – 37/77				
*Grazielanthus** – 1/1				
G. arkeocarpus Peixoto & Per.-Moura*	FOD	-	-	-
*Hennecartia** – 1/1				
H. omphalandra J.Poiss.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
Macropeplus – 4/4				
M. dentatus (Perkins) I.Santos & Peixoto*	FOD, FES	-	-	-
M. friburgensis (Perkins) I.Santos & Peixoto*	FOD	-	EN	ANEXO I
M. ligustrinus (Tul.) Perkins	FOD	-	-	-
M. schwackeanus (Perkins) I.Santos & Peixoto*	FOD	-	-	-
*Macrotorus** – 1/1				
M. utriculatus (Mart.) Perkins*	FOD	-	VU	ANEXO I
Mollinedia – 30/70				
M. acutissima Perkins*	FOD	-	-	-
M. argyrogyna Perkins	FOD, FES	-	-	-
M. blumenaviana Perkins*	FOM, FES	-	-	-
M. boracensis Peixoto*	FOD, RST	-	VU	ANEXO I
M. calodonta Perkins*	FOD	-	-	-
M. clavigera Tul.*	FOM	-	-	-
M. corcovadensis Perkins*	FOD	-	-	-
M. elegans Tul.*	FES, FOM	-	-	-
M. engleriana Perkins*	FOD	VU	-	-
M. fruticulosa Perkins*	FOD, FES	-	-	-
M. gilgiana Perkins*	FOD	CR	VU	ANEXO I
M. glabra (Spreng.) A.DC.*	FES, RST	VU	VU	ANEXO I
M. glaziovii Perkins*	FOD	-	-	-
M. heteranthera Perkins*	FOD	-	-	-
M. howeana Perkins*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
M. lamprophylla Perkins*	FOD	CR	VU	ANEXO I
M. longifolia Perkins*	FOD	-	-	-
M. luizae Peixoto*	FOD	-	-	-
M. marqueteana Peixoto*	FES	VU	-	-
M. micrantha Perkins*	FOD, FES	-	-	-
M. myriantha Perkins*	FOD	-	-	-
M. oligantha Perkins*	FOD	-	-	-
M. ovata Ruiz & Pav.	FOD, FES	-	-	-
M. pachysandra Perkins*	FOD	-	-	-
M. salicifolia Perkins*	FOD	-	VU	ANEXO II
M. schottiana (Spreng.) Perkins	FOD, FES	-	-	-
M. stenophylla Perkins*	FOD	EN	-	-
M. triflora (Spreng.) Tul.*	FOD	-	-	-
M. uleana Perkins*	FOD	-	-	-
M. widgrenii A.DC.	FES	-	-	-

Moraceae

Sergio Romaniuc Neto, Gisela Pelissari, Alessandra dos Santos & Patricia Aparecida de São José

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
MORACEAE – 92/914				
Brosimum – 4/15				
B. glaucum Taub.*	FOD, FES	-	VU	ANEXO I
B. glaziovii Taub.*	FOD, FES	EN	-	-
B. guianense (Aubl.) Huber	FOD	-	-	-
B. lactescens (S.Moore) C.C.Berg	FOD, FOM	-	-	-
Clarisia – 2/3				
C. ilicifolia (Spreng.) Lanj. & Rossberg	FOD, FES	-	-	-
C. racemosa Ruiz & Pav.	FOD, FES	-	-	-
Dorstenia – 29/105				
D. albertii Carauta *et al.**	FOD, FES	-	-	-
D. appendiculata Miq.	FES	-	-	-
D. arifolia Lam.	FOD, FES	-	-	-
D. bahiensis Klotzsch *ex* Fisch. & C.A.Mey.*	FOD, FES	-	-	-
D. bonijesu Carauta & C.Valente	FOD, FES	-	-	-
D. bowmaniana Baker*	FOD	-	-	-
D. brevipetiolata C.C.Berg *	FOD	-	-	-
D. caatingae R.M.Castro	FES	-	-	-
D. capricorniana Carauta *et al.**	FOD, FES	-	-	-
D. carautae C.C.Berg	FOD	-	-	-
D. cayapia Vell.	FOD, FOM, FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
D. conceptionis Carauta*	FOD	-	-	-
D. contensis Carauta & C.C.Berg*	FOD	-	-	-
D. elata Hook.*	FOD, FOM	-	VU	ANEXO I
D. erecta Vell.*	FOD	-	-	-
D. gracilis Carauta *et al.*	FOD	-	-	-
D. grazielae Carauta *et al.**	FOD, FES	-	-	-
D. hildegardis Carauta *et al.**	FOD	-	-	-
D. hirta Desv.*	FOD, FES	-	-	-
D. longifolia Moric.*	FOD	-	-	-
D. mariae Carauta *et al.**	FOD	-	-	-
D. maris C.Valente & Carauta*	FOD	-	-	-
D. milaneziana Carauta *et al.*	FOD	-	-	-
D. ramosa (Desv.) Carauta *et al.*	FOD	-	-	-
D. setosa Moric.	FOD	-	-	-
D. tentaculata Fisch. & C.A.Mey.*	FOD	-	-	-
D. tenuis Bonpl. *ex* Bureau	FOD, FOM	-	-	-
D. turnerifolia Fisch. & C.A.Mey.	FOD	-	-	-
D. urceolata Schott	FOD, FOM	-	-	-
Ficus – 44/750				
F. adhatodifolia Schott *ex* Spreng.	FOD, FES	-	-	-
F. arpazusa Casar.*	FOD, RST	-	-	-
F. bahiensis C.C.Berg & Carauta*	FOD	-	-	-
F. broadwayi Urb.	FOD, FES, FOM	-	-	-
F. calyptroceras (Miq.) Miq.	FES	VU	-	-
F. castellviana Dugand	FOD, FES	-	-	-
F. cestrifolia Schott *ex* Spreng.*	FOD, FES	-	-	-
F. citrifolia Mill.	FOD, FES, RST	-	-	-
F. clusiifolia Schott	RST, FOD	-	-	-
F. crocata (Miq.) Miq.	RST, FOD, FED	-	-	-
F. cyclophylla (Miq.) Miq.	FOD, RST	-	-	-
F. donnell-smithii Standl.	FES	-	-	-
F. duartei C.C.Berg & Carauta	FOD	-	-	-
F. enormis Mart. *ex* Miq.	RST, FOD	-	-	-
F. eximia Schott	FOD, FES, RST	-	-	-
F. gardneriana (Miq.) Miq.	FES	-	-	-
F. gomelleira Kunth & C.D.Bouché	FOD, FES	-	-	-
F. guaranitica Chodat	FOD, FES	-	-	-
F. guianensis Desv.	FOD	-	-	-
F. hirsuta Schott*	FOD, RST, FES	-	-	-
F. holosericea Schott*	FOD, FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
F. insipida Willd.	FOD, FES	-	-	-
F. lagoensis C.C.Berg & Carauta*	FOD, FOM	-	-	-
F. laureola Warb. *ex* C.C.Berg & Carauta*	FOD	-	-	-
F. longifolia Schott	FOD	-	-	-
F. luschnathiana (Miq.) Miq.	FOD, FES	-	-	-
F. mariae C.C.Berg *et al.*	FOD, FES	-	-	-
F. mathewsii (Miq.) Miq.	FOD	-	-	-
F. maxima Mill.	RST, FOD	-	-	-
F. monckii Hassl.	FES	-	-	-
F. nevesiae Carauta*	FOD	-	-	-
F. nymphaeifolia Mill.	FOD	-	-	-
F. obtusifolia Kunth	FOD, FES	-	-	-
F. obtusiuscula (Miq.) Miq.	FOD	-	-	-
F. organensis (Miq.) Miq.*	FOD, RST	-	-	-
F. pakkensis Standl.	FOD	-	-	-
F. pertusa L.f.	FOD, FES	-	-	-
F. piresiana Vázq.Avila & C.C.Berg	FOD	-	-	-
F. pulchella Schott *ex* Spreng.	FOD	VU	-	-
F. rupicola C.C.Berg & Carauta *	FED	EN	-	-
F. salzmanniana (Miq.) Miq.*	FOD	-	-	-
F. tomentella (Miq.) Miq.*	FOD	-	-	-
F. trigona L.f.	FOD, FES	-	-	-
F. trigonata L.	FOD, FES	-	-	-
Helicostylis – 2/7				
H. pedunculata Benoist	FOD	-	-	-
H. tomentosa (Poepp. & Endl.) Rusby	FOD, FES	-	-	-
Maclura – 2/2				
M. brasiliensis (Mart.) Endl.	FOD, FES	-	-	-
M. tinctoria (L.) D. Don *ex* Steud.	FOD, FOM, FES	-	-	-
Pseudolmedia – 3/9				
P. hirtula Kuhlm.*	FOD, FOM	EN	-	-
P. laevigata Trécul	FOD, FES	-	-	-
P. macrophylla Trécul	FOD	-	-	-
Sorocea – 6/23				
S. bonplandii (Baill.) W.C.Burger *et al.**	FOD, FES, FOM	-	-	-
S. guilleminiana Gaudich.	FOD, FES, FOM	VU	-	-
S. hilarii Gaudich.*	FOD, FES, RST	-	-	-
S. jureiana Romaniuc*	FOD	-	-	-
S. racemosa Gaudich.*	FOD	-	-	-
S. saxicola Hassl.	FES	-	-	-

Myristicaceae

William Rodrigues

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
MYRISTICACEAE – 3/500				
Virola – 3/48				
V. bicuhyba (Schott *ex* Spreng.) Warb.*	FOD, FES	-	-	-
V. gardneri (A.DC.) Warb.*	FOD, FES	-	-	-
V. officinalis Warb.*	FOD	-	-	-

Myrsinaceae

Maria de Fátima Freitas & Tatiana Tavares Carrijo

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
MYRSINACEAE – 51/1.400				
Ardisia – 1/500				
A. catharinensis Mez*	FOD	-	-	-
Cybianthus – 20/200				
C. alpestris (Warm) Mez*	AFL	-	-	-
C. amplus (Mez) G.Agostini	FOD	-	-	-
C. blanchetii (A.DC.) G.Agostini*	FES	-	-	-
C. coriaceus Mart.*	FOD	-	-	-
C. cuneifolius Mart.*	FOD	-	-	-
C. densicomus Mart.*	FES	-	-	-
C. densiflorus Miq.*	RST	-	-	-
C. detergens Mart.	FES	-	-	-
C. fulvopuberulentus (Mez) G.Agostini	RST	-	-	-
C. gardneri (A.DC.) G.Agostini*	RST	-	-	-
C. glaber A.DC.*	FOD	-	-	-
C. gracillimus (Warm.) Mez*	FOD	-	-	-
C. indecorus Mez*	FES	-	-	-
C. nemoralis (Mart.) G.Agostini*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
C. oblongifolius (A.DC.) G.Agostini*	FOD	-	-	-
C. peruvianus (A.DC.) Miq.*	FOD, FES	-	-	-
C. potiae (Mez) G.Agostini*	FES	-	-	-
C. psychotriifolius (Rusby) Mez*	FES	-	-	-
C. schwackeanus Mez*	FES	-	-	-
C. venezuelanus Mez*	FES	-	-	-
Myrsine – 21/300				
M. altomontana M.F.Freitas & Kin.-Gouv.*	FCA	-	-	-
M. balansae (Mez) Arechav.	FES	-	-	-
M. cipoensis M.F.Freitas & Kin.-Gouv.*	AFL	-	-	-
M. congesta (Sw.) Pipoly*	AFL	-	VU	ANEXO II
M. coriacea (Sw.) R.Br. *ex* Roem. & Schult.	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
M. emarginella Miq.*	FES	-	-	-
M. gardneriana A.DC.	FOD, FOM, FES	-	-	-
M. glazioviana Warm.*	FOD, FES, AFL	-	VU	ANEXO II
M. guianensis (Aubl.) O.Kuntze	FOD, FES, RST	-	-	-
M. lancifolia Mart. *ex* A.DC.*	FOD, FES, AFL	-	-	-
M. leuconeura Mart.*	FES	-	-	-
M. lineata (Mez) Imkhan.*	FOD, FES	-	-	-
M. loefgrenii (Mez) Imkhan.	FES	-	-	-
M. monticola Mart.*	FES, AFL	-	-	-
M. parvifolia A.DC.*	RST	-	-	-
M. parvula (Mez) Otegui	FOD, FES	-	-	-
M. rubra M.F.Freitas & Kin.-Gouv.*	RST	-	-	-
M. squarrosa (Mez) M.F.Freitas & Kin.-Gouv.*	FES, AFL	-	-	-
M. umbellata Mart.*	FOD, FES, RST	-	-	-
M. venosa A.DC.*	FOD, RST	-	-	-
M. villosissima A.DC.*	FOD, AFL	-	VU	ANEXO II
Stylogyne – 9/62				
S. depauperata Mez*	FOD, RST	-	-	-
S. laevigata (Miq.) Mez*	FOD	-	-	-
S. leptantha (Miq.) Mez*	FOD	-	-	-
S. lhotzkiana (A.DC.) Mez	FOD	-	-	-
S. martiana A.DC.*	FOD	-	-	-
S. pauciflora Mez*	FOD	-	-	-
S. sellowiana Mez*	FOD	-	-	-
S. sordida Mez*	FOD	-	-	-
S. warmingii Mez*	FOD, FOM, FES	-	-	-

Myrtaceae

Marcos Sobral, Eve Lucas, Leslie Landrum & Lúcia Soares-Silva

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
MYRTACEAE – 636/5.800				
Acca – 1/3				
A. sellowiana (O.Berg) Burret*	FES, FOM	-	-	-
*Accara** – 1/1				
A. elegans (DC.) Landrum*	FCA	-	VU	ANEXO II
Blepharocalyx – 3/4				
B. eggersii (Kiaersk.) Landrum	FOD	-	-	-
B. myriophyllus (Casar.) P.O.Morais & Sobral*	FCA	-	-	-
B. salicifolius (Kunth) O.Berg	FES, FOD, FOM, FOD, FOM, FES, FCA, RST	-	-	-
Calycolpus – 2/13				
C. australis Landrum*	FCA	-	-	-
C. legrandii Mattos*	RST	-	VU	ANEXO II
Calyptranthes – 42/250				
C. affinis O.Berg*	FOD	-	-	-
C. anceps O.Berg*	FOD	-	-	-
C. angustifolia Kiaersk.*	FOD	-	-	-
C. aromatica A.St.-Hil.*	FOD	-	-	-
C. bimarginata O.Berg*	FOD	-	-	-
C. blanchetiana O.Berg*	FOD	-	-	-
C. brasiliensis Spreng.*	FES, FCA, FOD, RST	-	-	-
C. caudata Gardner*	FOD	-	-	-
C. clusiifolia O.Berg	FCA, FOD, FOM, FES	-	-	-
C. concinna DC.	FOD, FOM, FES	-	-	-
C. cordata O.Berg	FCA	-	-	-
C. dardanoi Mattos*	FOD, RST	-	-	-
C. dichotoma Casar.*	FOD	-	-	-
C. dryadica M.L.Kawas.*	FOD	-	VU	ANEXO II
C. eugenioides Cambess.*	FOD	-	-	-
C. fusiformis M.L.Kawas.*	FOD	-	-	-
C. glazioviana Kiaersk.*	FOD	-	-	-
C. grammica (Spreng.) D.Legrand*	FCA, FOD, FES	-	-	-
C. grandiflora O.Berg*	FOD	-	-	-
C. grandifolia O.Berg*	FOD, FES	-	-	-
C. hatschbachii D.Legrand*	FOD	-	-	-
C. lanceolata O.Berg*	FOD	-	-	-
C. langsdorffii O.Berg*	FOD	-	-	-
C. lucida Mart. *ex* DC. *	FOD, FES	-	-	-
C. martiusiana DC.*	FOD	-	-	-
C. obovata Kiaersk.*	FOD	-	-	-
C. obversa O.Berg*	FOD	-	-	-
C. ovalifolia Cambess.	FES	-	-	-
C. ovata O.Berg*	FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
C. pauciflora O.Berg*	FOD	-	-	-
C. pereireana Mattos & D.Legrand *	RST	-	VU	ANEXO I
C. pileata D.Legrand*	FOD	-	-	-
C. platyphylla O.Berg*	FOD	-	-	-
C. pteropoda O.Berg*	FCA, FOD	-	-	-
C. regeliana O.Berg*	FOD, RST	-	-	-
C. restingae Sobral*	RST	-	VU	ANEXO I
C. rubella (O.Berg) D.Legrand*	FOD, RST	-	-	-
C. strigipes O.Berg*	FOD	-	-	-
C. tetraptera O.Berg*	FES, FCA, FOD, RST	-	-	-
C. tricona D.Legrand*	FOD, FOM	-	-	-
C. ursina Barroso & Peixoto *	FOD	-	-	-
C. widgreniana O.Berg*	FOD, FES	-	-	-
Campomanesia – 28/30				
C. adamantium (Cambess.) O.Berg	FCA	-	-	-
C. anemonea Landrum*	FOD	-	-	-
C. aromatica (Aubl.) Griseb.	FOD	VU	-	-
C. aurea O.Berg	FCA	-	-	-
C. dichotoma (O.Berg) Mattos*	FOD	-	-	-
C. espiritosantensis Landrum*	FOD	-	VU	ANEXO II
C. eugenioides (Cambess.) D.Legrand *ex* Landrum	FOD, FES	-	-	-
C. guaviroba (DC.) Kiaersk.*	FOD, FES	-	-	-
C. guazumifolia (Cambess.) O.Berg*	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
C. hirsuta Gardner*	FOD	EN	-	-
C. laurifolia Gardner*	FOD, FES	EN	-	-
C. lineatifolia Ruiz & Pav.	FOD	-	-	-
C. littoralis D.Legrand*	FOD, RST	-	-	-
C. lundiana (Kiaersk.) Mattos*	FOD	EX	-	-
C. macrobracteolata Landrum*	FOD	-	VU	ANEXO II
C. neriiflora (O.Berg) Nied.*	FOD	VU	-	-
C. phaea (O.Berg) Landrum*	FOD, FES	VU	-	-
C. prosthecesepala Kiaersk.*	FOD	-	-	-
C. pubescens (DC.) O.Berg	FCA	-	-	-
C. reitziana D.Legrand*	FOD	-	-	-
C. rhombea O.Berg*	FOD, FOM	-	-	-
C. rufa (O.Berg) Nied.	FCA, FOD	-	-	-
C. schlechtendaliana (O.Berg) Nied.*	FOD, FES	-	-	-
C. sessiliflora (O.Berg) Mattos	FCA, FOD, FES, FED	-	-	-
C. simulans M.L.Kawas.*	FOD, FES	-	-	-
C. velutina (Cambess.) O.Berg	FCA, FED, FES	-	-	-
C. viatoris Landrum*	FOD	EN	-	-
C. xanthocarpa (Mart.) O.Berg*	FOD, FES, FED	-	-	-
*Curitiba** – 1/1				
C. prismatica (D.Legrand) Salywon & Landrum*	FOM	-	-	-
Eugenia – 241/600				
E. acutata Miq.*	FOD, FES, FED	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
E. adenantha O.Berg*	FOD	-	-	-
E. adenocarpa O.Berg*	FOD	-	-	-
E. angelyana Mattos*	FOD	-	-	-
E. apiocarpa O.Berg*	FOD	-	-	-
E. arenaria Cambess.*	FOD, RST, FES	-	-	-
E. arvensis Vell.*	FOD	-	-	-
E. augustana Kiaersk.*	FOD	-	-	-
E. ayacuchae Steyerm.*	FOD, RST	-	-	-
E. bacopari D.Legrand*	FOD, RST	-	-	-
E. badia O.Berg*	FOD	-	-	-
E. bahiana Mattos*	FOD	-	-	-
E. bahiensis DC.*	FOD, RST	-	-	-
E. batingabranca Sobral*	FOD	-	-	-
E. belemii (Mattos) Mattos*	FOD	-	-	-
E. beruttii (Mattos) Mattos*	FOD	-	-	-
E. bimarginata DC.	FCA, RST	-	-	-
E. blastantha (O.Berg) D.Legrand*	FOD, FES	-	-	-
E. bocainensis Mattos*	FOD	-	-	-
E. botequimensis Kiaersk.*	FOD	-	-	-
E. brasiliensis Lam.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
E. brejoensis Mazine*	FES	-	-	-
E. brunneopubescens Mazine*	FOD	-	-	-
E. brunoi Mattos*	FOD	-	-	-
E. bunchosiifolia Nied.*	FOD	-	-	-
E. burkartiana (D.Legrand) D.Legrand*	FOD	-	-	-
E. calycina Cambess.	FCA	-	-	-
E. cambucae Mattos*	FOD	-	-	-
E. candolleana DC.*	FCA, FOD	-	-	-
E. capitulifera O.Berg*	FOD	-	-	-
E. capixaba Mazine*	FOD	-	-	-
E. catharinae O.Berg*	FOD, RST	-	-	-
E. catharinensis D.Legrand*	FOD	-	-	-
E. cavalcanteana Mattos	FCA, FOD	-	-	-
E. cerasiflora Miq.	FOD, FES	-	-	-
E. cereja D.Legrand*	FOD	-	-	-
E. chlorocarpa O.Berg*	FOD	-	-	-
E. chlorophylla O.Berg*	FOD	-	-	-
E. cinerascens Gardner*	FOD	-	-	-
E. coccifera O.Berg*	FOD	-	-	-
E. conchalensis D.Legrand & Mattos*	FOD	-	-	-
E. concolor Mattos*	FOD	-	-	-
E. convexinervia D.Legrand*	FOD	-	-	-
E. copacabanensis Kiaersk.*	FOD, RST	-	-	-
E. corcovadensis Kiaersk.*	FOD	-	-	-
E. costatifructa Mazine*	RST	-	-	-
E. cuprea (O.Berg) Nied.*	FOD, FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
E. curvatopetiolata Kiaersk.*	FOD	-	-	-
E. cuspidata O.Berg*	FOD, RST	-	-	-
E. cymatodes O.Berg*	FOD	-	-	-
E. dichroma O.Berg*	FOD	-	-	-
E. dimorpha O.Berg	FCA, FOD	-	VU	ANEXO II
E. disperma Vell.*	FOD	-	-	-
E. dodonaeifolia Cambess.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
E. dulcis O.Berg*	FOD	-	-	-
E. dysenterica DC.	FCA, FED	-	-	-
E. egensis DC.	FES	-	-	-
E. ellipsoidea Kiaersk.*	FOD	-	-	-
E. elongata Nied.*	FOD	-	-	-
E. excelsa O.Berg*	FOD, RST, FES	-	-	-
E. excoriata O.Berg*	FOD	-	-	-
E. exechusa O.Berg*	FOD	-	-	-
E. expansa Spring *ex* Mart. *	FOD	-	-	-
E. falkenbergiana Mattos*	FOD	-	-	-
E. fissurata Mattos*	FOD	-	-	-
E. flamingensis O.Berg*	FOD, RST	-	-	-
E. flavescens DC.	FOD	-	-	-
E. florida DC.	FCA, FOD, FOM, RST, FES, FED	-	-	-
E. francavilleana O.Berg*	FOD, FES	-	-	-
E. fusca O.Berg*	FOD, FES	-	-	-
E. gaudichaudiana O.Berg*	FOD	-	-	-
E. glandulosissima Kiaersk.*	FOD	-	-	-
E. goyazensis Nied.	FCA	-	-	-
E. gracilis O.Berg*	FOD	-	-	-
E. gracillima Kiaersk.	FOD, FOM	-	-	-
E. grandifolia O.Berg*	FOD	-	-	-
E. grazielae Mattos & D.Legrand *	FOD	-	-	-
E. hamiltonii (Mattos) Mattos*	FCA	-	-	-
E. handroana D.Legrand*	FOD	-	-	-
E. handroi (Mattos) Mattos*	FOD, FOM	-	-	-
E. hermesiana Mattos*	FOD	-	VU	ANEXO II
E. hiemalis Cambess.	FCA, FOD, FOM, FES	-	-	-
E. hirta O.Berg*	FOD	-	-	-
E. ilhensis O.Berg*	FOD	-	-	-
E. imaruiensis D.Legrand*	FOD	-	-	-
E. inversa Sobral*	RST	-	-	-
E. involucrata DC.	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
E. irirensis O.Berg*	FOD	-	-	-
E. ischnosceles O.Berg*	FOD	-	-	-
E. itacarensis Mattos*	FOD	-	VU	ANEXO I
E. itaguahiensis Nied.*	FOD	-	-	-
E. itahypensis O.Berg*	FOD	-	-	-
E. itajurensis Cambess.*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
E. itapemirimensis Cambess.*	FOD	-	-	-
E. janeirensis O.Berg*	FOD	-	-	-
E. joenssonii Kausel*	FOD	-	-	-
E. kleinii D.Legrand*	FOD	-	-	-
E. kuhlmanniana Mattos & D.Legrand *	FOD	-	-	-
E. lagoensis Kiaersk.	FAC, FES	-	-	-
E. lambertiana DC.	FOD	-	-	-
E. laruotteana Cambess.*	FOD, FES	-	-	-
E. leonanii Mattos*	FOD	-	-	-
E. leonorae Mattos*	FOD	-	-	-
E. leptoclada O.Berg*	FOM, FES	-	-	-
E. ligustrina (Sw.) Willd.	FOD, FES, FED	-	-	-
E. lilloana D.Legrand*	FOD	-	-	-
E. lindbergiana O.Berg*	FOD	-	-	-
E. linearifolia O.Berg*	FCA	-	-	-
E. linguiformis O.Berg*	FOD	-	-	-
E. longibracteata Mazine*	FOD	-	-	-
E. longifolia DC.*	FOD	-	-	-
E. longipetiolata Mattos*	FOD	-	-	-
E. luschnathiana (O.Berg) Klotzsch *ex* B.D.Jacks.*	FOD	-	-	-
E. macahensis O.Berg*	FOD	-	-	-
E. macedoi Mattos & D.Legrand	FCA	-	-	-
E. macrantha O.Berg*	FOD, FES	-	-	-
E. macrobracteolata Mattos*	FOD	-	-	-
E. macrosperma DC.*	FOD, FES	-	-	-
E. magnibracteolata Mattos & D.Legrand *	FOD	-	-	-
E. magnifica Spring *ex* Mart. *	FOD, FES	-	-	-
E. magnifolia Kiaersk.*	FOD	-	-	-
E. malacantha D.Legrand*	FOD	-	-	-
E. mandioccensis O.Berg*	FOD	-	-	-
E. mansoi O.Berg	FOD, FOM, FES	-	-	-
E. marambaiensis M.C.Souza & M.P.Morim*	RST	-	-	-
E. martiana (O.Berg) Mattos*	FOD	-	-	-
E. mattosii D.Legrand*	FOD	-	EN	ANEXO II
E. melanogyna (Legrand) Sobral*	FOD	-	-	-
E. membranifolia Nied.*	FOD	-	-	-
E. modesta DC.	FCA, FES	-	-	-
E. monosperma Vell.*	FOD	-	-	-
E. moonioides O.Berg*	FOD	-	-	-
E. moraviana O.Berg	FOD	-	-	-
E. mosenii (Kausel) Sobral*	FOD	-	-	-
E. multicostata D.Legrand*	FOD	-	-	-
E. myrcianthes Nied.	FCA, FOD	-	-	-
E. myrciariifolia Soares-Silva & Sobral *	FES	-	EN	ANEXO II
E. neoaustralis Sobral*	FOD, FES	-	-	-
E. neoformosa Sobral*	FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
E. neoglomerata Sobral*	FOD	-	-	-
E. neolaurifolia Sobral*	FOD	-	-	-
E. neomyrtifolia Sobral*	FOD, FED	-	-	-
E. neonitida Sobral*	FOD, RST	-	-	-
E. neosericea P.O.Morais & Sobral*	FCA	-	-	-
E. neosilvestris Sobral*	FOD	-	-	-
E. neotristis Sobral*	FOD, RST	-	-	-
E. neoverrucosa Sobral*	FOM	-	-	-
E. nutans O.Berg*	FOM	-	-	-
E. oblongata O.Berg*	FOD	-	-	-
E. oeidocarpa O.Berg*	FOD, FOM	-	-	-
E. olivacea O.Berg*	FOD	-	-	-
E. ophthalmantha Kiaersk.*	FOD	-	-	-
E. orlandoi (Mattos) Mattos*	FOD	-	-	-
E. oxyoentophylla Kiaersk.*	FOD, FOM	-	EN	ANEXO II
E. pachnantha O.Berg*	FOD	-	-	-
E. pachyclada D.Legrand*	FOD	-	-	-
E. pallescens Kiaersk.*	FOD	-	-	-
E. pantagensis O.Berg*	FOD	-	-	-
E. paranapiacabensis Mattos*	FOD	-	-	-
E. pauciflora DC.*	FOD	-	-	-
E. persicifolia O.Berg*	FOD	-	-	-
E. peruibensis Mattos*	FOD, RST	-	EN	ANEXO II
E. pia DC.*	FCA	-	-	-
E. piloensis Cambess.*	FOD	-	-	-
E. pirataquinensis (Mattos) Mattos*	FOD	-	-	-
E. piresiana Cambess.*	FOD	-	-	-
E. piresii Mattos	FOD	-	-	-
E. pisiformis Cambess.*	FOD	-	-	-
E. pitanga (O.Berg) Nied.	FCA	-	-	-
E. platyphylla O.Berg*	FOD, FES	-	-	-
E. platysema O.Berg*	FOD	-	-	-
E. pleurantha O.Berg*	FOD, FES	-	-	-
E. plicata Nied.*	FOD	-	-	-
E. plicatocostata O.Berg*	FOD, RST	-	-	-
E. pluriflora DC.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
E. prasina O.Berg*	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
E. prostrata Mattos	FOD	-	-	-
E. pruinosa D.Legrand*	FOD	-	-	-
E. pruniformis Cambess.*	FOD	-	-	-
E. pseudodichasiantha Kiaersk.*	FOD	-	-	-
E. pseudomalacantha D.Legrand*	FOD	-	-	-
E. puberula Nied.*	FOD	-	-	-
E. pulcherrima Kiaersk.*	FOD	-	-	-
E. punicifolia (Kunth) DC.	FCA, FOD, RST, FES, FED	-	-	-
E. pyriflora O.Berg*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
E. pyriformis Cambess.	FOD, FOM, FES	-	-	-
E. ramboi D.Legrand*	FOD, FOM, FES	-	-	-
E. reitziana D.Legrand*	FCA	-	-	-
E. repanda O.Berg	FOD, FES	-	-	-
E. rigida DC.*	FOD	-	-	-
E. rizzoana Mattos	FCA	-	-	-
E. robustovenosa Kiaersk.*	FOD	-	-	-
E. rostrata O.Berg*	FOD	-	-	-
E. rostrifolia D.Legrand*	FOD, FOM	-	-	-
E. rotundicosta D.Legrand*	FOD, FOM	-	-	-
E. rugosissima Sobral*	FOD	-	-	-
E. schottiana O.Berg*	FOD	-	-	-
E. schuechiana O.Berg*	FOD	-	-	-
E. sclerocalyx D.Legrand*	FOD	-	-	-
E. sessilifolia DC.*	FOD	-	-	-
E. sonderiana O.Berg	FCA, FOD	-	-	-
E. speciosa Cambess.	FOD, RST, FES	-	-	-
E. sphenoides O.Berg*	FOD	-	-	-
E. sphenophylla O.Berg*	FOD	-	-	-
E. sprengelii DC.*	FOD	-	-	-
E. squamiflora Mattos*	FOD	-	-	-
E. stenosepala Kiaersk.*	FOD	-	-	-
E. stephanii O.Berg	FCA	-	-	-
E. stictopetala DC.	FCA, FOD, FES	-	-	-
E. stigmatosa DC.*	FOD, RST	-	-	-
E. strellensis O.Berg*	FOD	-	-	-
E. stricta (O.Berg) Nied.	FCA, FOD	-	-	-
E. strigipes O.Berg*	FOD	-	-	-
E. subamplexicaulis DC.*	FOD	-	-	-
E. subavenia O.Berg*	FOD, FES	-	-	-
E. suberosa Cambess.	FCA	-	-	-
E. subreticulata Glaz.*	FOD	-	-	-
E. subterminalis DC.	FOD, FOM, FES	-	-	-
E. subundulata Kiaersk.*	FOD	-	-	-
E. sulcata Spring *ex* Mart. *	FOD, RST	-	-	-
E. supraaxillaris Spring*	FOD	-	-	-
E. teixeireana (Mattos) Mattos*	FOD	-	-	-
E. tenuipedunculata Kiaersk.	FOD, FOM	-	-	-
E. ternatifolia Cambess.*	FOD, FES	-	-	-
E. theodorae Kiaersk.*	FOD	-	-	-
E. tinguyensis Cambess.*	FOD, FES	-	-	-
E. umbelliflora O.Berg*	FOD	-	-	-
E. umbrosa O.Berg*	FOD	-	-	-
E. uniflora L.	FCA, FOD, FOM, RST, FES	-	-	-
E. uruguayensis Cambess.	FOD, FOM	-	-	-
E. vallsiana Mattos	FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
E. vattimoana Mattos*	FOD	-	-	-
E. vernicosa O.Berg*	FOD	-	-	-
E. vicozensis O.Berg*	FOD	-	-	-
E. villaenovae Kiaersk.*	FOD	-	VU	ANEXO I
E. violascens O.Berg*	FOD	-	-	-
E. viridiflora Cambess.*	FES	-	-	-
E. widgrenii Sond. *ex* O.Berg *	FES	-	-	-
E. xanthoxyloides Cambess.*	FOD	-	-	-
E. xiriricana Mattos*	FOD	-	-	-
E. zuccarinii O.Berg*	FOD	-	-	-
Marlierea – 52/100				
M. affinis (O.Berg) D.Legrand*	FOD	-	-	-
M. angustifolia (O.Berg) Mattos*	FCA, FOD, FES	-	-	-
M. antonia (O.Berg) D.Legrand*	FOD	-	-	-
M. choriophylla Kiaersk.*	FOD	-	-	-
M. clausseniana (O.Berg) Kiaersk.	FCA, FOD, FES	-	-	-
M. cordata Mattos*	FOD	-	-	-
M. dimorpha O.Berg*	FOD	-	-	-
M. estrellensis O.Berg*	FOD	-	-	-
M. eugenioides (Cambess.) D.Legrand*	FOD, FES	-	-	-
M. eugeniopsoides (Kausel & D.Legrand) D.Legrand*	FOD	-	-	-
M. excoriata Mart.*	FOD, FES	-	-	-
M. gardneriana (O.Berg) Nied.*	FOD	-	-	-
M. gaudichaudiana (O.Berg) Loefgr. & Everett*	FOD	-	-	-
M. glabra Cambess.*	FOD	-	-	-
M. glazioviana Kiaersk.*	FOD	-	-	-
M. grandifolia O.Berg*	FOD	-	-	-
M. guanabarina Mattos & D.Legrand *	FOD	-	-	-
M. involucrata (O.Berg) Nied.*	FOD	-	-	-
M. krapovickae D.Legrand*	FOD	-	-	-
M. laevigata (DC.) Kiaersk.	FCA, FOD, FES	-	-	-
M. langsdorffii O.Berg*	FOD	-	-	-
M. lealcostae G.Barroso & Peixoto *	FOD	-	EN	ANEXO II
M. luschnathiana (O.Berg) D.Legrand*	FOD	-	-	-
M. martinellii G.Barroso & Peixoto *	FOD	-	-	-
M. neuwiediana (O.Berg) Nied.*	FOD	-	-	-
M. obscura O.Berg*	FOD	-	-	-
M. obversa D.Legrand*	FOD	-	-	-
M. occhionii D.Legrand*	FOD	-	-	-
M. parvifolia O.Berg*	FOD	-	-	-
M. polygama (O.Berg) D.Legrand*	FOD	-	-	-
M. racemosa (Vell.) Kiaersk.*	FOD, FES	-	-	-
M. regeliana O.Berg*	FOD	-	-	-
M. reitzii D.Legrand*	FOD	-	-	-
M. resupinata (Vell.) O.Berg*	FOD	-	-	-
M. riedeliana (O.Berg) D.Legrand*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
M. rubiginosa (Cambess.) D.Legrand	FCA, FOD, FES	-	-	-
M. rufa (Vell.) O.Berg*	FOD	-	-	-
M. schottiana O.Berg*	FOD	-	-	-
M. schottii D.Legrand*	FOD	-	-	-
M. sessiliflora O.Berg*	FOD	-	-	-
M. silvatica (O.Berg) Kiaersk.*	FOD	-	-	-
M. silvestris (Vell.) Mattos*	FOD	-	-	-
M. skortzoviana Mattos*	FOD	-	VU	ANEXO II
M. strigipes (Mart.) O.Berg*	FOD	-	-	-
M. suaveolens Cambess.*	FOD	-	-	-
M. subacuminata Kiaersk.*	FOD	-	-	-
M. sucrei G.Barroso & Peixoto *	FOD	-	EN	ANEXO II
M. teuscheriana (O.Berg) D.Legrand*	FOD	-	-	-
M. tomentosa Cambess.*	FOD, FES	-	-	-
M. verticillaris O.Berg*	FOD	-	-	-
M. villasboasii Mattos*	FOD	-	-	-
M. warmingiana Kiaersk.	FOD	-	-	-
Myrceugenia – 28/41				
M. acutiflora (Kiaersk.) D.Legrand & Kausel*	FOD, FOM	-	-	-
M. alpigena (DC.) Landrum*	FAC, FOD, FOM, FES	-	-	-
M. bracteosa (DC.) D.Legrand & Kausel*	FOD, FOM, FES	VU	-	-
M. brevipedicellata (Burret) D.Legrand & Kausel*	FOD, FOM	VU	VU	ANEXO II
M. campestris (DC.) D.Legrand & Kausel*	FOD, FOM, RST	VU	-	-
M. cucullata D.Legrand*	FOD, FOM	-	-	-
M. euosma (O.Berg) D.Legrand*	FOD, FOM	-	-	-
M. foveolata (O.Berg) Sobral*	FOD, FOM	-	VU	ANEXO II
M. franciscensis (O.Berg) Landrum*	FOD, FOM	VU	-	-
M. gertii Landrum*	FOD, FOM	-	-	-
M. glaucescens (Cambess.) D.Legrand & Kausel	FCA, FOD, FOM	-	-	-
M. hatschbachii Landrum*	FOD, FOM	-	VU	ANEXO II
M. hoehnei (Burret) D.Legrand & Kausel*	FOD, FOM	-	-	-
M. kleinii D.Legrand & Kausel *	FOD	VU	-	-
M. mesomischa (Burret) D.Legrand & Kausel*	FOD, FOM	-	-	-
M. miersiana (Gardner) D.Legrand & Kausel*	FOD, FOM, FES	-	-	-
M. myrcioides (Cambess.) O.Berg*	FOD, FOM, RST, FES	-	-	-
M. myrtoides O.Berg	FCA, FOD	-	-	-
M. ovalifolia (O.Berg) Landrum*	FOD, FOM	-	-	-
M. ovata (Hook. & Arn.) O.Berg	FOD, FOM, FES	-	-	-
M. oxysepala (Burret) D.Legrand & Kausel*	FOD, FOM	-	-	-
M. pilotantha (Kiaersk.) Landrum*	FOD, FOM	VU	-	-
M. reitzii D.Legrand*	FOD	-	-	-
M. rufescens (DC.) D.Legrand & Kausel*	FOD, FOM	VU	-	-
M. scutellata D.Legrand*	FOD, FOM	VU	-	-
M. seriatoramosa (Kiaersk.) D.Legrand & Kausel*	FOD, FOM	-	-	-
M. smithii Landrum*	FOD, FOM	-	VU	ANEXO II
M. venosa D.Legrand*	FOM	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Myrcia – 132/350				
M. accioliana Mattos*	FOD	-	-	-
M. amazonica DC.	FOD, RST, FES, FED	-	-	-
M. amblyphylla Kiaersk.*	FOD	-	-	-
M. amplexicaulis (O.Berg) Hook.f.*	FOD	-	-	-
M. anacardiifolia Gardner*	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
M. anceps (Spreng.) O.Berg*	FOD, FES	-	-	-
M. anomala Cambess.	AFL, FCA	-	-	-
M. apiocarpa (O.Berg) N.Silveira*	FOD	-	-	-
M. badia (O.Berg) N.Silveira*	FOD	-	-	-
M. bergiana O.Berg*	FOD, RST	-	-	-
M. bicolor Kiaersk.*	FOD	-	-	-
M. blanchetiana (O.Berg) Mattos	FES	-	-	-
M. bombycina (O.Berg) Nied.*	FOD, FOM	-	-	-
M. brasiliensis Kiaersk.*	FOD, RST	-	-	-
M. brunnea Cambess.*	FOD	-	-	-
M. calyptranthoides (O.Berg) Mattos*	FOD	-	-	-
M. cambessedeana O.Berg	FCA	-	-	-
M. clavija Sobral*	FOD	-	-	-
M. coelosepala Kiaersk.*	FOD	-	-	-
M. colpodes Kiaersk.*	FOD	-	-	-
M. cordiifolia DC.*	FOD, FES	-	-	-
M. crocea (Vell.) Kiaersk.*	FOD, FES	-	-	-
M. decorticans DC.	FOD, RST, FES	-	-	-
M. densa (DC.) Sobral	FCA, FOD	-	-	-
M. diaphana (O.Berg) N.Silveira*	FOD	-	-	-
M. dichrophylla D.Legrand*	FOD, RST	-	-	-
M. dolichopetala Kiaersk.*	FOD	-	-	-
M. eriocalyx DC.	FCA, FOD, FOM, FES	-	-	-
M. eriopus DC.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
M. eumecephylla (O.Berg) Nied.*	FOD	-	-	-
M. felisbertii (DC.) O.Berg*	FOD	-	-	-
M. fenzliana O.Berg	FCA, FOD	-	-	-
M. follii G.Barroso & Peixoto*	FOD, FES	-	VU	ANEXO I
M. freyreissiana (O.Berg) Kiaersk.*	FOD, RST	-	-	-
M. gestasiana Cambess.*	FOD	-	-	-
M. gigantea (O.Berg) Nied.*	FOD	-	-	-
M. gilsoniana G.Barroso & Peixoto *	FOD	-	VU	ANEXO I
M. glabra (O.Berg) D.Legrand*	FOD, RST	-	-	-
M. glazioviana Kiaersk.*	FOD	-	-	-
M. glaziovii Mattos & D.Legrand	FCA	-	-	-
M. gomidesioides Kiaersk.*	FOD	-	-	-
M. grandifolia Cambess.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
M. guianensis (Aubl.) DC.	FCA, FOD, FOM, FES, FED, RST	-	-	-
M. hartwegiana (O.Berg) Kiaersk.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
M. hatschbachii D.Legrand*	FOD, FOM	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
M. hebepetala DC.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
M. heringii D.Legrand*	FOD	-	-	-
M. hexasticha Kiaersk.*	FOD	-	-	-
M. hirtiflora DC.*	FOD	-	-	-
M. hypoleuca Spring *ex* Mart.	FES	-	-	-
M. ilheosensis Kiaersk.*	FOD, RST	-	-	-
M. inconspicua L.Kollmann & Sobral *	FOD	-	-	-
M. innovans Kiaersk.*	FOD	-	-	-
M. insularis Gardner*	FOD, RST	-	-	-
M. isaiana G.Barroso & Peixoto *	FOD, RST	-	VU	ANEXO I
M. lacerdaeana O.Berg*	FOD	-	-	-
M. lacunosa (O.Berg) N.Silveira*	FOD	-	-	-
M. lajeana D.Legrand*	FOD, FOM	-	-	-
M. lanceolata Cambess.*	FOD	-	-	-
M. laruotteana Cambess.	FOD, FOM, FES	-	-	-
M. lasiantha DC.	FCA	-	-	-
M. laxiflora Cambess.*	FOD	-	-	-
M. limae G.Barroso & Peixoto *	FOD	-	VU	ANEXO II
M. lineata (O.Berg) Nied.*	FOD, FES	VU	-	-
M. littoralis DC.*	FOD, RST	-	-	-
M. lundiana Kiaersk.*	FOD, RST	-	-	-
M. lutescens Cambess.*	FCA, FOD	-	-	-
M. macrocarpa DC.*	FOD	-	-	-
M. magnifolia Cambess.*	FOD	-	-	-
M. maximiliana O.Berg*	FOD	-	-	-
M. micropetala (Mart.) Nied.*	FOD	-	-	-
M. mischophylla Kiaersk.	FCA, FOD, FES	-	-	-
M. montana Cambess.*	FOD, FES	-	-	-
M. morroqueimadensis Kiaersk.*	FOD	-	-	-
M. multiflora (Lam.) DC.	FOD, FES, RST	-	-	-
M. mutabilis (O.Berg) N.Silveira	FCA, FOD, FES	-	-	-
M. neorostrata Sobral*	FOD	-	-	-
M. nivea Cambess.	FCA	-	-	-
M. oblongata DC.*	FOD, FES	-	-	-
M. oligantha O.Berg*	FOD, FOM	-	-	-
M. oreioeca Kiaersk.*	FOD	-	-	-
M. ovata Cambess.*	FOD, RST	-	-	-
M. palustris DC.	FOD, RST, FES	-	-	-
M. perforata O.Berg*	FOD	-	-	-
M. plusiantha Kiaersk.*	FOD	-	-	-
M. polyantha DC.*	FOD	-	-	-
M. pubescens DC.	FCA, FOD, FES	-	-	-
M. pubiflora DC.*	FOD, FES	-	-	-
M. pubipetala Miq.*	FOD, FES, RST	-	-	-
M. pulchra (O.Berg) Kiaersk.*	FCA, FOD, FOM, FES, RST	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
M. racemosa (O.Berg) Kiaersk.*	FOD, RST	-	-	-
M. ramuliflora (O.Berg) N.Silveira*	FOD, RST	-	-	-
M. recurvata O.Berg*	FOD, RST	-	-	-
M. reticulata Cambess.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
M. retorta Cambess.*	FCA, FOD, FOM, FES	-	-	-
M. richardiana (O.Berg) Kiaersk.*	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
M. rimosa Cambess.	FES	-	-	-
M. riodocensis G.Barroso & Peixoto *	FOD	-	VU	ANEXO II
M. robusta Sobral*	FOD	-	-	-
M. rubiginosa Cambess.*	FOD	-	-	-
M. rufipes DC.	FOD	-	-	-
M. rupicola D.Legrand*	FCA, FOD, FOM	-	-	-
M. salzmannii O.Berg*	FOD	-	-	-
M. selloi (Spreng.) N.Silveira	FOD, RST	-	-	-
M. silvatica (Mey.) DC.	FOD	-	-	-
M. spathulata (O.Berg) Nied.*	FCA	-	-	-
M. spectabilis DC.*	FOD, FES, RST	-	-	-
M. splendens (Sw.) DC.	FCA, FOD, FOM, FES, FED, RST		-	- -
M. sporadosticta Kiaersk.*	FOD	-	-	-
M. springiana (O.Berg) Kiaersk.*	FOD	-	-	-
M. squamata (Mattos & D.Legrand) Mattos*	FOD	-	-	-
M. stictophylla (O.Berg) N.Silveira*	FOD	-	-	-
M. stigmatosa O.Berg*	FOD	-	-	-
M. subavenia (O.Berg) N.Silveira	FCA	-	-	-
M. subcordata DC.*	FCA, FOD, FES	-	-	-
M. subsericea A.Gray*	FOD	-	-	-
M. subverticillaris (O.Berg) Kiaersk. - conf. Autores*	FCA, FOD	-	-	-
M. tenuifolia (O.Berg) Sobral	FOD	-	-	-
M. tenuivenosa Kiaersk.*	FOD	-	-	-
M. thyrsoidea O.Berg*	FOD, RST	-	-	-
M. tijucensis Kiaersk.*	FOD, RST	-	-	-
M. tomentosa (Aubl.) DC.	FCA, FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
M. undulata O.Berg*	FOM, FES	-	-	-
M. variabilis DC.	FCA, FES	-	-	-
M. vauthieriana O.Berg*	FCA, FOD	-	-	-
M. velutiflora (Mattos & D.Legrand) Mattos*	FOD	-	-	-
M. venulosa DC.	FCA, FOD, FOM, FES	-	-	-
M. verrucosa Sobral*	FOD	-	-	-
M. verticillaris O.Berg	FCA, FOD	-	-	-
M. vestita DC.	FCA, FES	-	-	-
M. vittoriana Kiaersk.*	FOD	-	-	-
M. warmingiana Kiaersk.*	FOD	-	-	-
Myrcianthes – 5/30				
M. bradeana Mattos & D.Legrand	FOD	-	-	-
M. cionei Mattos*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
M. cisplatensis (Cambess.) O.Berg	FCA, RST	-	-	-
M. gigantea (D.Legrand) D.Legrand	FOM, FES	-	-	-
M. pungens (O.Berg) D.Legrand	FCA, FOD, FOM, FES	-	-	-
Myrciaria – 15/30				
M. cuspidata O.Berg	FCA, FOD, FES, RST	-	-	-
M. delicatula (DC.) O.Berg*	FOD, FOM, FES	-	-	-
M. disticha O.Berg*	FOD, FES	-	-	-
M. ferruginea O.Berg*	FOD, RST	-	-	-
M. floribunda (H.West *ex* Willd.) O.Berg	FCA, FOD, FOM, RST, FES, FED	-	-	-
M. glanduliflora (Kiaersk.) Mattos & D.Legrand	FCA, FOD	-	-	-
M. guaquiea (Kiaersk.) Mattos & D.Legrand	FOD	-	-	-
M. glazioviana (Kiaersk.) G.Barroso *ex* Sobral*	FOD, FES	-	-	-
M. leucadendron O.Berg*	FOD	-	-	-
M. pallida O.Berg*	FOD	-	-	-
M. pilosa Sobral & Couto*	FCA, FOD	-	-	-
M. plinioides D.Legrand*	FOD	-	-	-
M. pumila Gardner*	FOD	-	-	-
M. strigipes O.Berg*	FOD, RST	-	-	-
M. tenella (DC.) O.Berg	FOD, FOM, FES	-	-	-
Myrrhinium – 1/1				
M. atropurpureum Schott	FOD, FOM, RST	-	-	-
*Neomitranthes** – 16/16				
N. amblymitra (Burret) Mattos*	FOD	-	-	-
N. apiculata (Burret) Mattos*	FOD	-	-	-
N. capivariensis (Mattos) Mattos*	FOD	-	-	-
N. castellanosii (Mattos & D.Legrand) Mattos*	FOD	-	-	-
N. cordifolia (D.Legrand) D.Legrand*	FOD, RST	VU	-	-
N. gemballae (D.Legrand) D.Legrand*	FOD, FOM	-	-	-
N. glomerata (D.Legrand) D.Legrand*	FOD, RST	-	-	-
N. gracilis (Burret) N.Silveira*	FOD	-	-	-
N. langsdorffii (O.Berg) Mattos*	FOD	VU	-	-
N. nitida Mattos*	RST	-	VU	ANEXO I
N. obscura (DC.) N.Silveira*	RST	-	-	-
N. obtusa Sobral & Zambom *	RST	-	VU	ANEXO II
N. pedicellata (Burret) Mattos*	FOD	-	VU	ANEXO I
N. riedeliana (O.Berg) Mattos*	FOD	-	-	-
N. warmingiana (Kiaersk.) Mattos*	FOD, FES	-	-	-
N. wilsoniana Mattos*	FOD	-	-	-
Pimenta – 1/15				
P. pseudocaryophyllus (Gomes) Landrum*	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
Plinia – 28/40				
P. anonyma Sobral	FOD	-	-	-
P. brachybotrya (D.Legrand) Sobral*	FOD	-	-	-
P. callosa Sobral*	FOD	-	VU	ANEXO I
P. cauliflora (Mart.) Kausel	FOD, FES	-	-	-
P. complanata M.L.Kawas. & B.Holst *	FOD	-	CR	ANEXO II

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
P. cordifolia (D.Legrand) Sobral*	FOD	-	-	-
P. edulis (Vell.) Sobral*	FOD	-	-	-
P. grandifolia (Mattos) Sobral*	FOD, FES	-	-	-
P. hatschbachii (Mattos) Sobral*	FOD	-	VU	ANEXO I
P. ilhensis G.Barroso*	FOD	-	EN	ANEXO I
P. jaboticaba (Vell.) Kausel	FOD	-	-	-
P. longiacuminata Sobral*	FOD	-	-	-
P. marqueteana G.Barroso*	FOD	-	-	-
P. martinellii G.Barroso & Peron *	FOD	-	-	-
P. muricata Sobral*	FOD	-	VU	ANEXO II
P. oblongata (Mattos) Mattos*	FOD	-	-	-
P. pauciflora M.L.Kawas. & B.Holst *	FOD	-	-	-
P. phitrantha (Kiaersk.) Sobral*	FOD, FES	-	-	-
P. rara Sobral*	FOD	-	VU	ANEXO I
P. renatiana G.Barroso & Peixoto *	FOD	-	VU	ANEXO I
P. rivularis (Cambess.) Rotman	FOD, FOM, FES	-	-	-
P. rogersiana Mattos*	FOD	-	-	-
P. sebastianopolitana G.Barroso*	FOD	-	-	-
P. spiciflora (Nees & Mart.) Sobral*	FOD	-	-	-
P. spiritosantensis (Mattos) Mattos*	FOD	-	-	-
P. stictophylla G.Barroso & Peixoto*	FOD	-	-	-
P. subavenia Sobral*	FOD	-	-	-
P. trunciflora (O.Berg) Kausel	FOD, FOM, FES	-	-	-
Psidium – 32/100				
P. amplexicaule Pers.	RST	-	-	-
P. araucanum Soares-Silva & Proença*	FOM	-	-	-
P. australe Cambess.	FCA	-	-	-
P. bahianum Landrum & Funch*	FOD	-	-	-
P. brownianum Mart. *ex* DC.	FOD	-	-	-
P. cattleianum Sabine*	FOD, RST, FES	-	-	-
P. cauliflorum Landrum & Sobral*	FOD	-	-	-
P. cupreum DC.	FOD	-	-	-
P. decussatum DC.	FOD	-	-	-
P. firmum O.Berg	FCA	-	-	-
P. giganteum Mattos*	FOD	-	-	-
P. glaziovianum Kiaersk.	FOD	-	-	-
P. guineense Sw.	FCA, FOD, FES, FED, RST	-	-	-
P. laruotteanum Cambess.	FOD	-	-	-
P. longipetiolatum D.Legrand*	FOD, FOM	-	-	-
P. macahense O.Berg*	FOD, RST	-	-	-
P. myrtoides O.Berg	FOD, FES RST	-	-	-
P. nutans O.Berg	FCA	-	-	-
P. oblongatum O.Berg*	FOD	-	-	-
P. oblongifolium O.Berg	FOD	-	-	-
P. oligospermum DC.	FCA, FOD	-	-	-
P. ovale (Spreng.) Burret*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
P. reptans (D.Legrand) Soares-Silva & Proença*	FCA	-	-	-
P. riparium Mart. *ex* DC.	FOD	-	-	-
P. robustum O.Berg	FCA	-	-	-
P. rufum Mart. *ex* DC. *	FOD, FOM, FES	-	-	-
P. salutare (Kunth) O.Berg	FCA, FOD	-	-	-
P. sartorianum (O.Berg) Nied.	FOD, FES	-	-	-
P. schenckianum Kiaersk.	FCA	-	-	-
P. sorocabense O.Berg	FOD	-	-	-
P. striatulum Mart. *ex* DC.	FOD	-	-	-
P. ubatubense Mattos*	FOD	-	-	-
Siphoneugena – 7/9				
S. delicata Sobral & Proença*	FOD	-	-	-
S. dussii (Krug & Urb.) Proença	FOD	-	-	-
S. guilfoyleiana Proenca*	FOD, RST	-	-	-
S. kiaerskoviana (Burret) Kausel*	FOD, FOM, FES	-	-	-
S. kuhlmannii Mattos*	FOD, FOM	-	VU	ANEXO II
S. reitzii D.Legrand*	FOM, FOD	-	-	-
S. widgreniana O.Berg*	FES, FOD, FOM,	-	-	-

Nyctaginaceae

Cyl Farney Catarino de Sá

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
NYCTAGINACEAE – 27/300-400				
*Andradaea** – 1/1				
A. floribunda All.*	FOD, FES	-	-	-
*Belemia** – 1/1				
B. fucsioides Pires*	FOD, FES	-	-	-
Boerhavia – 1/20				
B. diffusa L.	FOD, FES, RST, FOM, FED	-	-	-
Bougainvillea – 2/18				
B. glabra Choisy	FES, FED	-	-	-
B. spectabilis Willd.	FOD, FES, RST	-	-	-
Guapira – 8/30-40				
G. areolata (Heimerl) Lundell	FOD, FES	-	-	-
G. hirsuta (Choisy) Lundell	FOD, FES	-	-	-
G. nitida (Mart. *ex* J.A.Schmidt) Lundell*	FOD, RST	-	-	-
G. obtusata (Jacq.) Little	FOD, RST	-	-	-
G. opposita (Vell.) Reitz	FOD, FES, RST, MAN	-	-	-
G. pernambucensis (Casar.) Lundell*	RST	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
G. tomentosa (Casar.) Lundell*	FOD, FCA	-	-	-
G. venosa (Choisy) Lundell	FOD	-	-	-
*Leucaster** – 1/1				
L. caniflorus (Mart.) Choisy*	RST, FES	-	-	-
Mirabilis – 1/54				
M. jalapa L.	FOD, FES	-	-	-
Neea – 9/30-40				
N. floribunda Poepp. & Endl.	FOD, FES	-	-	-
N. hermaphrodita S.Moore	FES	-	-	-
N. hirsuta Poepp. & Endl.	FOD	-	-	-
N. laxa Poepp. & Endl.	FOD	-	-	-
N. macrophylla Poepp. & Endl.	FES	-	-	-
N. ovalifolia Spruce *ex* J.A.Schmidt	FOD	-	-	-
N. pendulina Heimerl*	FOD	-	-	-
N. schwackeana Heimerl*	FOD	-	-	-
N. verticillata Ruiz & Pav.	FOD	-	-	-
Pisonia – 2/35				
P. aculeata L.	FOD, FES, RST	-	-	-
P. ambigua Heimerl	FOD, FOM	-	-	-
*Ramisia** – 1/1				
R. brasiliensis Oliv.*	FOD, FES	-	-	-

Nymphaeaceae

Maria do Carmo Estanislau do Amaral

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
NYMPHAEACEAE – 14/60				
Nymphaea – 14/50				
N. amazonum Mart. & Zucc.	FAQ	-	-	-
N. ampla (Salisb.) DC.	FAQ	-	-	-
N. caerulea Savigny	FAQ	-	-	-
N. conardii Wiersema	FAQ	-	-	-
N. gardneriana Planch.	FAQ	-	-	-
N. gibertii (Morong) Conard	FAQ	-	-	-
N. jamesoniana Planch.	FAQ	-	-	-
N. lasiophylla Mart. & Zucc.	FAQ	-	-	-
N. lingulata Wiersema	FAQ	-	-	-
N. lotus L.	FAQ	-	-	-
N. mexicana Zucc.	FAQ	-	-	-
N. odorata Aiton	FAQ	-	-	-
N. rudgeana G.Mey.	FAQ	-	-	-
N. tenerinervia Casp.	FAQ	-	-	-

Ochnaceae

Claudio Nicoletti de Fraga & Ary Teixeira de Oliveira-Filho

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
OCHNACEAE – 59/ca.400				
Elvasia – 4/15				
E. capixaba Fraga & Saavedra*	FOD	-	-	-
E. gigantifolia Fraga & Saavedra*	FOD	-	-	-
E. kollmannii Fraga & Saavedra*	FOD	-	-	-
E. tricarpellata Sastre*	FOD	-	-	-
Luxemburgia – 8/17				
L. bracteata Dwyer	FCA	-	-	-
L. corymbosa A.St.-Hil.*	FES	-	VU	ANEXO II
L. glazioviana (Engl.) Beauverd*	FCA	-	-	-
L. mysteriosa Fraga & Feres*	AFL	-	-	-
L. nobilis Eichler *ex* Engl.*	FCA	-	-	-
L. octandra A.St.-Hil.	FCA	-	-	-
L. schwackeana Taub.	FCA	-	-	-
L. speciosa A.St.-Hil.	FCA	-	-	-
Ouratea – 38/ca.150				
O. bahiensis Sastre*	FOD, RST	-	-	-
O. blanchetiana (Planch.) Engl.*	FOD, RST	-	-	-
O. campos-portoi Sleumer*	FOD	-	-	-
O. cassinifolia (DC.) Engl.*	FOD, RST	-	-	-
O. castaneifolia (DC.) Engl.	FOD	-	-	-
O. cearensis (Tiegh.) Santos*	FOD	-	-	-
O. crassa Tiegh.*	FOD, RST	-	-	-
O. crassifolia (Pohl) Engl.	FOD, FES	-	-	-
O. cuspidata Tiegh.*	FOD, RST	-	-	-
O. decipiens Tiegh.*	FOD	-	-	-
O. fieldingiana Engl.	RST	-	-	-
O. floribunda (A.St.-Hil.) Engl.	FOD, FES	-	-	-
O. gigantophylla (Erhardt) Engl.*	FOD, RST	-	-	-
O. grandifolia (Planch.) Engl.*	FOD	-	-	-
O. hexasperma (A.St.-Hil.) Baill.	FOD, FES	-	-	-
O. humilis (A.St.-Hil.) Engl.*	FOD	-	-	-
O. longipes Sastre	FOD	-	-	-
O. lucidula (Turcz.) Engl.*	FOD, FES	-	-	-
O. miersii (Planch.) Engl.*	FOD	-	-	-
O. multiflora (Pohl) Engl.*	FOD	-	-	-
O. oleifolia (A.St.-Hil.) Engl.	FES	-	-	-
O. oliviformis (A.St.-Hil.) Engl.*	FOD	-	-	-
O. papulosa Sastre*	FOD	-	-	-
O. parviflora (DC.) Baill.*	FOD, FES	-	-	-
O. parvifolia (A.St.-Hil.) Engl.	FES	-	-	-
O. platicaulis Sastre*	RST	-	-	-
O. polygyna Engl.	FOD, RST	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
O. pychnostachys (Mart. *ex* Erhardt) Engl.*	FOD	-	-	-
O. rotundifolia (Field & Gardn.) Engl.	FOD, RST	-	-	-
O. salicifolia (A.St.-Hil. & Tul.) Engl.	FOD, FES, RST	-	-	-
O. sellowii (Planch.) Engl.*	FOD	-	-	-
O. semiserrata (Mart.et Nees) Engl.	FES	-	-	-
O. spectabilis (Mart.) Engl.	FES	-	-	-
O. stipulata (Vell.) Engl.*	FOD	-	-	-
O. suaveolens Engl.*	FOD, RST	-	-	-
O. tenuifolia Engl.	FOD, FES	-	-	-
O. vaccinioides (A.St.-Hil. & Tul.) Engl.*	FOD	-	-	-
O. verticillata (Vell.) Engl.	FOD, FES	-	-	-
Sauvagesia – 9/ca.70				
S. alpestris (Mart.) Zappi & E.Lucas*	FCA	-	-	-
S. capillaris (A.St.-Hil.) Sastre	FCA	-	-	-
S. erecta L.	FCA	-	-	-
S. ericoides (A.St.-Hil.) Sastre	FCA	-	-	-
S. glandulosa (A.St.-Hil.) Sastre	FCA	-	-	-
S. racemosa A.St.-Hil.	FCA	-	-	-
S. sprengelii A.St.-Hil.	FOM	-	-	-
S. tenella Lam.	FCA	-	-	-
S. vellozii (Vell. *ex* A.St.-Hil.) Sastre*	FOM	-	-	-

Olacaceae

Milton Groppo

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
OLACACEAE – 13/103				
Aptandra – 1/3				
A. tubicina (Poepp.) Benth. *ex* Miers	FOD	-	-	-
Cathedra – 2/4				
C. bahiensis Sleumer*	FOD	-	-	-
C. rubricaulis Miers*	FOD	-	-	-
Dulacia – 3/15				
D. papillosa (J.O.Rangel) Sleumer	FOD	-	-	-
D. pauciflora (Benth.) Kuntze	FOD	-	-	-
D. singularis Vell.*	FOD	-	-	-
Heisteria – 5/33				
H. brasiliensis (Engl.) Sleumer	FES, FOD	-	-	-
H. cauliflora Sm.	FOD	-	-	-
H. ovata Benth.	FOD	-	-	-
H. perianthomega (Vell.) Sleumer	FES, FOD	-	-	-
H. silvianii Schwacke*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Tetrastylidium – 1/2				
T. grandiflorum (Baill.) Sleumer*	FOD	-	-	-
Ximenia – 1/8				
X. americana L.	FOD	-	-	-

Oleaceae

Julio Antonio Lombardi

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
OLEACEAE – 9/25				
Chionanthus – 9/ca.60				
C. crassifolius (Mart.) P.S.Green	FES	-	-	-
C. ferrugineus (Gilg) P.S.Green	FES	-	-	-
C. filiformis (Vell.) P.S.Green*	FOD	-	-	-
C. fluminensis (Miers) P.S.Green*	FOD	CR	-	-
C. greenii Lombardi*	FES	-	-	-
C. micranthus (Mart.) Lozano & Fuertes*	FOD	VU	-	-
C. subsessilis (Eichler) P.S.Green	FES	CR	EN	ANEXO I
C. tenuis P.S.Green*	FOD	CR	-	-
C. trichotomus (Vell.) P.S.Green	FOD	-	-	-

Onagraceae

Ana Odete Santos Vieira

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
ONAGRACEAE – 41/656				
Epilobium – 1/165				
E. hirtigerum A.Cunn.	FOM, FAQ	-	-	-
Fuchsia – 8/105				
F. alpestris Gardner*	FOM, FCA	-	-	-
F. bracelinae Munz*	FCA	-	-	-
F. brevilobes P.Berry*	FOM	-	-	-
F. campos-portoi Pilger & Schulze *	FOM, FCA	-	-	-
F. coccinea Dryander*	FOM	-	-	-
F. glazioviana Taubert*	FOD	-	-	-
F. hatschbachii P.Berry*	FCA	-	-	-
F. regia (Vell.) Munz*	FOD, FOM	-	-	-
Ludwigia – 26/82				
L. affinis (DC.) H.Hara	FAQ	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
L. anastomosans (DC.) H.Hara*	FOM, FAQ	VU	-	-
L. bonariensis (Micheli) H.Hara	FAQ	-	-	-
L. burchellii (Micheli) H.Hara	FAQ	-	-	-
L. caparosa (Cambess.) H.Hara	FAQ	-	-	-
L. elegans (Cambess.) H.Hara	FAQ	-	-	-
L. erecta (L.) H.Hara	FAQ	-	-	-
L. grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet	FAQ	-	-	-
L. hookeri (Micheli) H.Hara	FAQ	-	-	-
L. hyssopifolia (G.Don) Exell	FAQ	-	-	-
L. irwinii Ramamoorthy	FAQ	-	-	-
L. lagunae (Morong) H.Hara	FAQ	-	-	-
L. laruotteana (Cambess.) H.Hara	FAQ	-	-	-
L. leptocarpa (Nutt.) H.Hara	FAQ	-	-	-
L. longifolia (DC.) H.Hara	FAQ	-	-	-
L. major (Micheli) Ramamoorthy	FAQ	-	-	-
L. martii (Micheli) Ramamoorthy	FAQ	-	-	-
L. multinervia (Hook. & Arn.) Ramamoorthy	FAQ	-	-	-
L. myrtifolia (Cambess.) H.Hara	FAQ	-	-	-
L. nervosa (Poir.) H.Hara	FAQ	-	-	-
L. octovalvis (Jacq.) P.H.Raven	FAQ	-	-	-
L. peploides (Kunth) P.H.Raven	FAQ	-	-	-
L. peruviana (L.) H.Hara	FAQ	-	-	-
L. quadrangularis (Micheli) H.Hara*	FOM	-	-	-
L. sedoides (Bonpl.) H.Hara	FAQ	-	-	-
L. sericea (Cambess.) H.Hara	FAQ	-	-	-
Oenothera – 6/145				
O. affinis Cambess.	FOM	-	-	-
O. catharinensis Cambess.*	RST	-	-	-
O. indecora W.Dietr.	FCA	-	-	-
O. mollissima L.	FCA, RST	-	-	-
O. parodiana W.Dietr.	FCA	-	-	-
O. ravenii W.Dietr.	FCA	-	-	-

Opiliaceae

Caetano Troncoso Oliveira

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
OPILIACEAE – 3/33				
Agonandra – 3/10				
A. brasiliensis Miers *ex* Benth. & Hook.	FES	-	-	-
A. excelsa Griseb.	FOD, FES, FED	-	-	-
A. fluminensis Rizzini & Occhioni*	FOD	-	-	-

Orchidaceae

Fábio de Barros, Vinícius Trettel Rodrigues & João Aguiar Nogueira Batista

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
ORCHIDACEAE – 1.257/24.900				
Acianthera – 78/140				
A. acuminatipetala (A.Samp.) Luer*	FOD	-	-	-
A. adirii (Brade) Pridgeon & M.W.Chase*	FOD	-	-	-
A. alborosea (Kraenzl.) Luer*	FOD	-	-	-
A. alligatorifera (Rchb.f.) Pridgeon & M.W.Chase*	FOD	-	-	-
A. antennata (Garay) Pridgeon & M.W.Chase*	FOD	-	-	-
A. aphthosa (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase	FOM	-	-	-
A. auriculata (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase	FOM	-	-	-
A. aveniformis (Hoehne) C.N.Gonç. & Waechter	FOM	-	-	-
A. binotii (Regel) Pridgeon & M.W.Chase*	FOD	-	-	-
A. brachyloba (Hoehne) Pridgeon & M.W.Chase*	FOD	-	-	-
A. bragae (Ruschi) F.Barros*	FOD	-	-	-
A. caldensis (Hoehne & Schltr.) F.Barros*	FOM	-	-	-
A. capanemae (Barb.Rodr.) Pridgeon & M.W.Chase*	FOD	-	-	-
A. capillaris (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase*	FOD	-	-	-
A. crinita (Barb.Rodr.) Pridgeon & M.W.Chase*	FOM	-	-	-
A. cristata (Barb.Rodr.) Luer*	FOD	-	-	-
A. cryptantha (Barb.Rodr.) Pridgeon & M.W.Chase*	FOM	-	-	-
A. cryptophoranthoides (Loefgr.) Pridgeon & M.W.Chase*	FOM	-	-	-
A. duartei (Hoehne) Pridgeon & M.W.Chase*	FOD	-	-	-
A. dutrae (Pabst) C.N.Conç. & Waechter*	FOM	-	-	-
A. exarticulata (Barb.Rodr.) Pridgeon & M.W.Chase*	FOM	-	-	-
A. exdrasii (Luer & Toscano) Luer*	FOD	-	-	-
A. fenestrara (Barb.Rodr.) Pridgeon & M.W.Chase*	FOD	-	-	-
A. glanduligera (Lindl.) Luer*	FOM	-	-	-
A. glumacea (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase*	FOD	-	-	-
A. gracilisepala (Brade) Luer*	FES	-	-	-
A. guimaraensii (Brade) F.Barros*	FOD	-	-	-
A. heliconiscapa (Hoehne) F.Barros*	FOM	-	-	-
A. heringeri (Hoehne) F.Barros	FOM	-	-	-
A. hoffmannseggiana (Rchb.f.) Luer*	FOM	-	-	-
A. hygrophila (Berb.Rodr.) Pridgeon & M.W.Chase	FOM	-	-	-
A. hystrix (Kraenzl.) F.Barros*	FOD	-	-	-
A. johannensis (Barb.Rodr.) Pridgeon & M.W.Chase	AFL	-	-	-
A. jordanensis (Brade) F.Barros*	FOM	-	-	-
A. karlii (Pabst) C.N.Conç. & Waechter*	FOD	-	-	-
A. klotzschiana (Rchb.f.) Pridgeon & M.W.Chase	FOM	-	-	-
A. leptotifolia (Barb.Rodr.) Pridgeon & M.W.Chase	FOM	-	-	-
A. limae (Porto & Brade) Pridgeon & M.W.Chase*	FOD	-	-	-
A. luteola (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase	FOM	-	-	-
A. macropoda (Barb.Rodr.) Pridgeon & M.W.Chase*	FOM	-	-	-
A. macuconensis (Barb.Rodr.) F.Barros*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
A. magalhanesii (Pabst) F.Barros*	FOD	-	-	-
A. malachantha (Rchb.f.) Pridgeon & M.W.Chase*	FOD	-	-	-
A. marumbyana (Garay) Luer*	FOD	-	-	-
A. melachyla (Barb.Rodr.) Luer*	FOD	-	-	-
A. micrantha (Barb.Rodr.) Pridgeon & M.W.Chase*	FOM	-	-	-
A. modestissima (Rchb.f. & Warm.) Pridgeon & M.W.Chase	FES	-	-	-
A. muscicola (Barb.Rodr.) Pridgeon & M.W.Chase*	FOD	-	-	-
A. muscosa (Barb.Rodr.) Pridgeon & M.W.Chase*	FOM	-	-	-
A. nemorosa (Barb.Rodr.) F.Barros*	FOD, FES	-	-	-
A. ochreata (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase	FOM, FES	-	-	-
A. octophrys (Rchb.f.) Pridgeon & M.W.Chase*	FOD, FES	-	-	-
A. oligantha (Barb.Rodr.) F.Barros*	FOD	-	-	-
A. panduripetala (Barb.Rodr.) Pridgeon & M.W.Chase*	FOD	-	-	-
A. papillosa (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase	FOM	-	-	-
A. pardipes (Rchb.f.) Pridgeon & M.W.Chase*	FOD	-	-	-
A. pectinata (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase*	FOD	-	-	-
A. prolifera (Herb. *ex* Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase	FES	-	-	-
A. pubescens (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase	FOD, FOM	-	-	-
A. punctata (Barb.Rodr.) F.Barros*	FOD	-	-	-
A. purpureoviolacea (Cogn.) F.Barros*	FOD	-	-	-
A. ramosa (Barb.Rodr.) F.Barros	FOM	-	-	-
A. recurva (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase*	FOM	-	-	-
A. rostellata (Barb.Rodr.) Luer*	FOM	-	-	-
A. saundersiana (Rchb.f.) Pridgeon & M.W.Chase	FOD, FOM, FES	-	-	-
A. saurocephala (Lodd.) Pridgeon & M.W.Chase*	FOM	-	-	-
A. serpentula (Barb.Rodr.) F.Barros*	FOD	-	-	-
A. sonderana (Rchb.f.) Pridgeon & M.W.Chase*	FOM	-	-	-
A. spilantha (Barb.Rodr.) Luer*	FOD	-	-	-
A. strupifolia (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase*	FOD	-	-	-
A. teres (Lindl.) Borba	FES, AFL	-	-	-
A. translucida (Barb.Rodr.) Luer*	FOD	-	-	-
A. tricarinata (Poepp. & Endl.) Pridgeon & M.W.Chase	FOM	-	-	-
A. tristis (Barb.Rodr.) Pridgeon & M.W.Chase*	FOD	-	-	-
A. variegata (Barb.Rodr.) Campacci*	FOD	-	-	-
A. violaceomaculata (Hoehne) Pridgeon & M.W.Chase*	FOD	-	-	-
A. wageneriana (Klotzsch) Pridgeon & M.W.Chase	FOM	-	-	-
A. wels-windischiae (Pabst) Pridgeon & M.W.Chase*	FOD	-	-	-
Alatiglossum – 8/18				
A. barbatum (Lindl.) Baptista	FED	-	-	-
A. ciliatum (Lindl.) Baptista	FOM, FES	-	-	-
A. cognauxianum (Schltr.) Baptista*	FOD	-	-	-
A. croesus (Rchb.f.) Baptista*	FOD	-	-	-
A. longipes (Lindl.) Baptista	FOD, FOM	-	-	-
A. macropetalum (Lindl.) Baptista	FOM	-	-	-
A. micropogon (Rchb.f.) Baptista	FOM	-	-	-
A. uniflorum (Booth.) Baptista*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Anathallis – 54/100				
A. adenochila (Loefgr.) F.Barros*	FOD	-	-	-
A. aquinoi (Schltr.) Pridgeon & M.W.Chase*	FOD, FOM	-	-	-
A. bleyensis (Pabst) F.Barros*	FOD	-	-	-
A. carvalhoi (Luer & Toscano) Luer*	FOD	-	-	-
A. citrina (Schltr.) Pridgeon & M.W.Chase*	FOD	-	-	-
A. corticicola (Schltr. *ex* Hoehne) Pridgeon & M.W.Chase*	FOD	-	-	-
A. crebrifolia (Barb.Rodr.) Luer*	FOD	-	-	-
A. dryadum (Schltr.) F.Barros*	FOD	-	-	-
A. ferdinandiana (Barb.Rodr.) F.Barros*	FOD	-	-	-
A. fernandiana (Hoehne) F.Barros*	FOD	-	-	-
A. flammea (Barb.Rodr.) F.Barros*	FOD	-	-	-
A. gehrtii (Hoehne & Schltr.) F.Barros*	FOD	-	-	-
A. gert-hatschbachii (Hoehne) Pridgeon & M.W.Chase*	FOD	-	-	-
A. githaginea (Pabst & Garay) Pridgeon & M.W.Chase*	FOD	-	-	-
A. graveolens (Pabst) F.Barros	FOD, AFL	-	-	-
A. guarujaensis (Hoehne) F.Barros*	FOD	-	-	-
A. helmutii (Hoehne) F.Barros*	FOD	-	-	-
A. imbricata (Barb.Rodr.) F.Barros & F.Pinheiro	FOM	-	-	-
A. jordanensis (Hoehne) F.Barros*	FOM	-	-	-
A. kautskyi (Pabst) Pridgeon & M.W.Chase*	FOD	-	-	-
A. kleinii (Pabst) Luer*	FOD	-	-	-
A. lichenophila (Porto & Brade) Luer*	FOD	-	-	-
A. linearifolia (Cogn.) Pridgeon & M.W.Chase	FOM	-	-	-
A. liparanges (Rchb.f.) Luer*	FOD	-	-	-
A. malmeana (Dutra *ex* Pabst) Pridgeon & M.W.Chase*	FOD	-	-	-
A. microblephara (Schltr.) Pridgeon & M.W.Chase*	FOD	-	-	-
A. microgemma (Schltr. *ex* Hoehne) Pridgeon & M.W.Chase*	FOD	-	-	-
A. microphyta (Barb.Rodr.) C.O.Azevedo & van den Berg	FOM	-	-	-
A. modesta (Barb.Rodr.) Pridgeon & M.W.Chase*	FOD	-	-	-
A. montipelladensis (Hoehne) F.Barros *	FOD	-	-	-
A. nectarifera Barb.Rodr.*	FOD	-	-	-
A. obovata (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase	FOD, FOM	-	-	-
A. pabstii (Garay) Pridgeon & M.W.Chase*	FOD	-	-	-
A. paranaensis (Schltr.) Pridgeon & M.W.Chase*	FOM	-	-	-
A. paranapiacabensis (Hoehne) F.Barros *	FOD	-	-	-
A. peroupavae (Hoehne & Brade) F.Barros*	FOD	-	-	-
A. petersiana (Schltr.) Pridgeon & M.W.Chase*	FOD	-	-	-
A. piratiningana (Hoehne) F.Barros*	FOD	-	-	-
A. pubipetala (Hoehne) Pridgeon & M.W.Chase*	FOD	-	-	-
A. pusilla (Barb.Rodr.) F.Barros*	FOD	-	-	-
A. puttemansii (Hoehne) F.Barros*	FOD	-	-	-
A. radialis (Porto & Brade) Pridgeon & M.W.Chase*	FOD	-	-	-
A. reedii (Luer) F.Barros*	FOD	-	-	-
A. rubens (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase*	FOM	-	-	-
A. rudolfii (Pabst) Pridgeon & M.W.Chase*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
A. sclerophylla (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase*	FOD	-	-	-
A. simpliciglossa (Loefgr.) Pridgeon & M.W.Chase*	FOD	-	-	-
A. sororcula (Schltr.) Luer*	FOD	-	-	-
A. spannageliana (Hoehne) Pridgeon & M.W.Chase*	FOD	-	-	-
A. stictophylla (Schltr.) Pridgeon & M.W.Chase*	FOD	-	-	-
A. subnulla (Luer & Toscano) F.Barros*	FOD	-	-	-
A. trullilabia (Pabst) F.Barros*	FOD	-	-	-
A. welteri (Pabst) F.Barros*	FOM	-	-	-
A. ypirangae (Kraenzl.) Pridgeon & M.W.Chase*	FOD	-	-	-
*Anneliesia** – 4/4				
A. candida (Lindl.) Brieger & Lückel*	FOD	-	-	-
A. cuneata (Lindl.) Senghas & Lückel*	FOD	-	-	-
A. kayasimae (Pabst) Senghas & Lückel*	FOD	-	-	-
A. russeliana (Lindl.) Senghas & Lückel*	FOD	-	-	-
Aspasia – 2/7				
A. lunata Lindl.*	FOD	-	-	-
A. silvana F.Barros*	FOD	-	-	-
Aspidogyne – 12/20				
A. argentea (Vell.) Garay*	FOD	-	-	-
A. bidentifera (Schltr.) Garay	FOM	-	-	-
A. bruxelii (Pabst) Garay	FOM	-	-	-
A. commelinoides (Barb.Rodr.) Garay*	FOM	-	-	-
A. decora (Rchb.f.) Garay & G.Romero	FOM	-	-	-
A. fimbrillaris (B.S.Will.) Garay*	FOD	-	-	-
A. foliosa (Poepp. & Endl.) Garay	FOM	-	-	-
A. hylibates (Rchb.f.) Garay*	FOD	-	-	-
A. kuczynskii (Porsch) Garay	FOM	-	-	-
A. lindleyana (Cogn.) Garay	FOM	-	-	-
A. logicornu (Cogn.) Garay	FOM	-	-	-
A. malmei (Kraenzl.) Garay	FOM	-	-	-
Baptistonia – 24/27				
B. albinoi (Schltr.) Chiron & V.P.Castro*	FOD	-	-	-
B. amicta (Lindl.) Chiron & V.P.Castro*	FOM	-	-	-
B. brieniana (Rchb.f.) V.P.Castro & Chiron	FOM	-	-	-
B. colorata (Koern. & J.G.Winman) Chiron*	FOD	-	-	-
B. cornigera (Lindl.) Chiron & V.P.Castro	FOM	-	-	-
B. cruciata (Rchb.f.) Chiron & V.P.Castro*	FOD	-	-	-
B. damacenoi Chiron & V.P.Castro*	FOM	-	-	-
B. echinata Barb.Rodr.*	FOD	-	-	-
B. gutfreundiana (Chiron & V.P.Castro) Chiron & V.P.Castro*	FOM	-	-	-
B. kautskyi (Pabst) Chiron & V.P.Castro*	FOD	-	-	-
B. leinigii (Pabst) Chiron & V.P.Castro*	FOD	-	-	-
B. lietzei (Regel) Chiron & V.P.Castro*	FOM	-	-	-
B. nitida (Barb.Rodr.) Chiron & V.P.Castro*	FOM	-	-	-
B. pabstii (Campacci & C.Espejo) Chiron & V.P.Castro*	FOD	-	-	-
B. pubes (Lindl.) Chiron & V.P.Castro	FOM	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
B. pulchella (Regel) Chiron & V.P.Castro*	FOD	-	-	-
B. riograndensis (Cogn.) Chiron & V.P.Castro*	FOD	-	-	-
B. sarcodes (Lindl.) van den Berg & M.W.Chase*	FOD	-	-	-
B. silvana (V.P.Castro & Campacci) V.P.Castro & Chiron*	FOD	-	-	-
B. truncata (Pabst) Chiron & V.P.Castro*	FOD	-	-	-
B. uhlii Chiron & V.P.Castro*	FOD	-	-	-
B. velteriana V.P.Castro & Chiron*	FOD	-	-	-
B. venusta (Drapiez) Chiron*	FOD	-	-	-
B. widgrenii (Lindl.)V.P.Castro & Chiron*	FOM	-	-	-
Barbosella – 10/18				
B. australis (Cogn.) Schltr.*	FOD	-	-	-
B. cogniauxiana (Speg. & Kraenzl.) Schltr.*	FOD	-	-	-
B. crassifolia (Edwall) Schltr.*	FOD	-	-	-
B. dusenii (A.Samp.) Schltr.*	FOD	-	-	-
B. gardneri (Lindl.) Schltr.*	FOD	-	-	-
B. macaheensis (Cogn.) Luer*	FOD	-	-	-
B. miersii (Lindl.) Schltr.*	FOD	-	-	-
B. porschii (Kraenzl.) Schltr.*	FOD	-	-	-
B. spiritu-sanctensis (Pabst) F.Barros & Toscano*	FOD	-	-	-
B. trilobata Pabst*	FOD	-	-	-
Baskervilla – 1/12				
B. paranaensis (Kraenzl.) Schltr.*	FOD, FES	-	-	-
Bifrenaria – 15/18				
B. atropurpurea Lindl.*	FOD	-	-	-
B. aureofulva (Hook.) Lindl.	FOD, FOM, FES	-	-	-
B. calcarata Barb.Rodr.	FOD	-	-	-
B. charlesworthii Rolfe*	FOD	-	-	-
B. clavigera Rchb.f.*	FOD	-	-	-
B. harrisoniae (Hook.) Rchb.f.	FOD, FOM	-	-	-
B. inodora Lindl.*	FOD	-	-	-
B. leucorrhoda Rchb.f.*	FOD	-	-	-
B. mellicolor Rchb.f.*	FOD	-	-	-
B. racemosa (Hook.) Lindl.*	FOD	-	-	-
B. silvana V.P.Castro*	FOD	-	VU	ANEXO II
B. stefanae V.P.Castro*	FOD	-	-	-
B. tetragona (Lindl.) Schltr.*	FOD	-	-	-
B. vitellina (Lindl.) Lindl.*	FOD	-	-	-
B. wittigii (Rchb.f.) Hoehne*	FOD	-	VU	ANEXO II
*Binotia** – 2/2				
B. messmeriana Campacci*	FOD	-	-	-
B. brasiliensis (Rolfe) Rolfe*	FOD	-	-	-
Bipinnula – 1/11				
B. biplumata (L.f.) Rchb.f.	FCA	-	-	-
Brachionidium – 1/65				
B. restrepioides (Hoehne) Pabst*	FOD	-	-	-
Brachystele – 4/20				
B. cyclochila (Kraenzl.) Schltr.	FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
B. dilatata (Lindl.) Schltr.	FCA	-	-	-
B. subfiliformis (Cogn.) Schltr.	FCA	-	-	-
B. widgrenii (Rchb.f.) Schltr.	FCA	-	-	-
Brasilidium – 9/10				
B. crispum (Lodd.) Campacci*	FOM	-	-	-
B. curtum (Lindl.) Campacci*	FOM	-	-	-
B. forbesii (Hook.) Campacci	FOM	-	-	-
B. gardneri (Lindl.) Campacci	FOM	-	-	-
B. gravesianum (Rolfe) Campacci	FOM	-	-	-
B. marshallianum (Rchb.f.) Campacci*	FOD	-	-	-
B. pectorale (Lindl.) Campacci*	FOD	-	-	-
B. praetextum (Rchb.f.) Campacci*	FOM	-	-	-
B. zappii (Pabst) Campacci*	FOM	-	-	-
Brasiliorchis – 12/13				
B. barbosae (Loefgr.) R.Singer *et al.**	FOM	-	-	-
B. chrysantha (Barb.Rodr.) R.Singer *et al.**	FOM	-	-	-
B. consanguinea (Klotzsch) R.Singer *et al.**	FOM, AFL	-	-	-
B. gracilis (Lodd.) R.Singer *et al.**	FOM	-	-	-
B. kautskyi (Pabst) R.Singer *et al.**	FOD	-	-	-
B. marginata (Lindl.) R.Singer *et al.**	FOM	-	-	-
B. phoenicanthera (Barb.Rodr.) R.Singer *et al.**	FOD	-	-	-
B. picta (Hook.) R.Singer *et al.**	FOD, FOM	-	-	-
B. polyantha (Barb.Rodr.) R.Singer *et al.**	FOD	-	-	-
B. porphyrostele (Rchb.f.) R.Singer *et al.**	FOD	-	-	-
B. schunkiana (Campacci & Kautsky) R.Singer	FOD	-	-	-
B. ubatubana (Hoehne) R.Singer *et al.**	FOD	-	-	-
Brassavola – 2/20				
B. flagellaris Barb.Rodr.*	FOD	-	-	-
B. tuberculata Hook.	FOD, FOM, RST, MAN	-	-	-
Brassia – 1/34				
B. arachnoidea Barb.Rodr.	FOD	-	-	-
Bulbophyllum – 30/1.800				
B. arianeae Fraga & E.C.Smidt*	FOD	-	-	-
B. atropurpureum Barb.Rodr.*	FOD	-	-	-
B. boudetianum Fraga*	FOM	-	-	-
B. campos-portoi Brade*	FOD, FOM	-	-	-
B. cantagallense (Barb.Rodr.) Cogn.	FOD, FOM	-	-	-
B. carassense R.C. Mota *et al.**	FES, AFL	-	-	-
B. chloroglossum Rchb.f. & Warm.	FOD, FOM	-	-	-
B. chloropterum Rchb.f.	FOD	-	-	-
B. dusenii Kraenzl.	FOD, FOM, FES	-	-	-
B. epiphytum (Barb.Rodr.) Cogn.	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
B. exaltatum Lindl.	FOM, AFL	-	-	-
B. gehrtii E.C.Smidt & Borba	FOM, FES	-	-	-
B. gladiatum Lindl.	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
B. glutinosum (Barb.Rodr.) Cogn.*	FOD, FOM	-	-	-
B. granulosum Barb.Rodr.*	FOD, FOM, FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
B. kautskyi Toscano*	FOD	-	-	-
B. macroceras Barb.Rodr.*	FOD	-	-	-
B. malachadenia Cogn.*	FOD, FOM	-	-	-
B. melloi Pabst	FOD, FOM	-	-	-
B. mentosum Barb.Rodr.	FOM, FES	-	-	-
B. meridense Rchb.f.	FOD, FOM, AFL	-	-	-
B. micranthum Barb.Rodr.	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
B. micropetaliforme J.E.Leite	FOD, FOM	-	-	-
B. napellii Lindl.*	FOD, FOM	-	-	-
B. perii Schltr.	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
B. plumosum (Barb.Rodr.) Cogn.	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
B. regnellii Rchb.f.*	FOD, FOM	-	-	-
B. teimosense E.C.Smidt & Borba*	FOD	-	-	-
B. tripetalum Lindl.	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
B. weddellii (Lindl.) Rchb.f.	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
Camaridium – 3/80				
C. carinatum (Barb.Rodr.) Hoehne	FOD, FOM	-	-	-
C. micranthum M.A.Blanco*	FOD, FOM	-	-	-
C. ochroleucum Lindl.	FOM	-	-	-
Campylocentrum – 24/73				
C. aciculatum (Rchb.f. & Warm.) Cogn.*	FOD, FOM, RST	-	-	-
C. aromaticum Barb.Rodr.	FOM	-	-	-
C. brachycarpum Cogn.*	FOD	-	-	-
C. crassirhizum Hoehne*	FOD	-	-	-
C. densiflorum Cogn.	FOM	-	-	-
C. gracile Cogn.*	FOD	-	-	-
C. grisebachii Cogn.	FOM	-	-	-
C. hirtellum Cogn.*	FOD	-	-	-
C. iglesiasii Brade*	FOD	-	-	-
C. lansbergii (Rchb.f.) Schltr.	FOM	-	-	-
C. linearifolium Cogn.	FOM	-	-	-
C. micranthum (Lindl.) Rolfe	FOM, RST	-	-	-
C. neglectum (Rchb.f. & Warm.) Cogn.	FOM, RST	-	-	-
C. organense (Rchb.f.) Rolfe*	FOD	-	-	-
C. ornithorhynchum (Lindl.) Rolfe*	FOD	-	-	-
C. parahybunense (Barb.Rodr.) Rolfe*	FOD	-	-	-
C. pauloense Schltr. & Hoehne	FOD	-	-	-
C. pernambucense Hoehne*	FOD	-	VU	ANEXO I
C. pubirhachys Schltr.*	FOD	-	-	-
C. robustum Cogn.	FOM	-	-	-
C. sellowii (Rchb.f.) Rolfe	FOM	-	-	-
C. spannagelii Hoehne*	FOD	-	-	-
C. ulei Cogn.*	FOM	-	-	-
C. wawrae (Rchb.f. *ex* Beck) Rolfe	FOM	-	-	-
Capanemia – 11/14				
C. adelaidae Brade*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
C. angustilabia Schltr.*	FOD	-	-	-
C. australis (Kraenzl.) Schltr.	FOM	-	-	-
C. carinata Barb.Rodr.	FOM	-	-	-
C. fluminensis Pabst*	FOD	-	-	-
C. gehrtii Hoehne*	FOD	-	-	-
C. micromera Barb.Rodr.	FOM	-	-	-
C. riograndensis Pabst*	FOD	-	-	-
C. spathuliglossa Pabst*	FOD	-	-	-
C. superfula (Rchb.f.) Garay	FOM	-	-	-
C. thereziae Barb.Rodr.	FOM	-	-	-
Carenidium – 7/10				
C. concolor (Hook.) Baptista	FOM	-	-	-
C. dasystyle (Rchb.f.) Baptista*	FOD	-	-	-
C. hookeri (Rolfe) Baptista	FOD, FOM	-	-	-
C. loefgrenii (Cogn.) Baptista*	FOD	-	-	-
C. ouricanense (V.P.Castro & Campacci) Baptista*	FOD	-	-	-
C. paranaense (Kraenzl.) Baptista	FOM	-	-	-
C. raniferum (Lindl.) Baptista	FOD, FOM	-	-	-
Catasetum – 16/157				
C. arietinum F.E.L.Miranda & K.G.Lacerda*	FOD, FOM	-	-	-
C. atratum Lindl.*	FOM	-	-	-
C. blackii Pabst*	FOM	-	-	-
C. cernuum (Lindl.) Rchb.f.*	FOM, FOD	-	-	-
C. discolor Lindl.	FOD, RST	-	-	-
C. fimbriatum Lindl.	FED, FES	-	-	-
C. hookeri Lindl.	FOD, FOM, FES	-	-	-
C. labiatum Barb.Rodr.*	FOM	-	-	-
C. luridum Lindl.*	FOD, RST	-	-	-
C. macrocarpum Rich. *ex* Kunth	FOM	-	-	-
C. mattosianum Bicalho*	FOD, RST	-	-	-
C. micranthum Barb.Rodr.*	FOD	-	-	-
C. purum Nees & Sinnings*	FOD, FOD	-	-	-
C. triodon Rchb.f.*	FOM	-	-	-
C. trulla Lindl.*	FOD	-	-	-
C. uncatum Rolfe*	FOD	-	VU	ANEXO I
Cattleya – 18/54				
C. acklandiae Planch.*	FOD	-	VU	ANEXO II
C. amethystoglossa Linden & Rchb.f.*	FOD	-	-	-
C. bicolor Lindl.	FOM	-	-	-
C. dormaniana Rchb.f.*	FOD	-	VU	ANEXO I
C. forbesii Lindl.*	FOD, RST	-	-	-
C. granulosa Veitch*	RST	-	VU	ANEXO I
C. guttata Lindl.*	FOD, RST	-	-	-
C. harrisoniana Batem. *ex* Lindl.*	FOM, RST	-	-	-
C. intermedia Graham*	FOD, RST, MAN	-	-	-
C. kerrii Brieger & Bicalho*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
C. labiata Lindl.	FES, FED, AFL	-	EN	ANEXO I
C. loddigesii Lindl.	FOM	-	-	-
C. porphyroglossa Linden & Rchb.f.	FOM	-	-	-
C. schilleriana Rchb.f.*	FOD	-	CR	ANEXO I
C. schofieldiana Rchb.f.*	FOD	-	-	-
C. tigrina A.Rich.*	FOD	-	-	-
C. velutina Rchb.f.*	FOM	-	EN	ANEXO I
C. warneri T.Moore*	FOD, FOM	-	VU	ANEXO I
*Centroglossa** – 5/5				
C. castellensis Brade*	FOD	-	-	-
C. greeniana (Rchb.f.) Cogn.*	FOD	-	-	-
C. macroceras Rchb.f.*	FOD	-	-	-
C. nuneslimae Porto & Brade*	FOD	-	-	-
C. tripollinica Barb.Rodr.*	FOD	-	-	-
Christensonella – 8/10				
C. acicularis (Herb. *ex* Lindl.) Szlach. *et al.**	FOD, FOM	-	-	-
C. cepula (Rchb.f.) S Koehler*	FOD	-	-	-
C. echinophyta (Barb.Rodr.) Szlach. *et al.**	FOD	-	-	-
C. ferdinandiana (Barb.Rodr.) Szlach. *et al.**	FOM, FES	-	-	-
C. neuwiedii (Rchb.f.) S.Koehler*	FOD, FES	-	-	-
C. pumila (Hook.) Szlach. *et al.**	FOD, FES	-	-	-
C. subulata (Lindl.) Szlach. *et al.**	FOD, FOM	-	-	-
C. vernicosa (Barb.Rodr.) Szlach. *et al.**	FOD, FES	-	-	-
*Chytroglossa** – 3/3				
C. aurata Rchb.f.*	FOD	-	-	-
C. marileoniae Rchb.f.*	FOD	-	-	-
C. paulensis Edwall*	FOD	-	-	-
Cirrhaea – 7/9				
C. dependens Rchb.f.	FOD, FOM	-	-	-
C. loddigesii Lindl.*	FOD	-	-	-
C. longiracemosa Hoehne*	FOD	-	-	-
C. nasuta Brade*	FOD	-	-	-
C. saccata Lindl.*	FOD	-	-	-
C. seidelii Pabst*	FOD	-	-	-
C. silvana V.P.Castro & Campacci*	FOD	-	-	-
Cleistes – 8/20				
C. castanoides Hoehne	FCA	-	-	-
C. gracilis (Barb.Rodr.) Schltr.	FCA	-	-	-
C. itatiaiae Pabst	FCA, AFL	-	-	-
C. libonii (Rchb.f.) Schltr.*	FOD, FOM, RST, FCA	-	-	-
C. montana Gardner*	FCA	-	-	-
C. paranaensis (Barb.Rodr.) Schltr.	FCA, AFL	-	-	-
C. tenuis (Rchb.f. *ex* Griseb.) Schltr.	FCA	-	-	-
C. unguiculata (Rchb.f.) Schltr.*	FCA	-	-	-
Cochleanthes – 1/2				
C. flabelliformis (Sw.) Schult. & Garay	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Comparettia – 1/7				
C. coccinea Lindl.*	FOM	-	-	-
Constantia – 2/6				
C. australis (Cogn.) Porto & Brade	FOD	-	-	-
C. rupestris Barb.Rodr.	FOM	-	VU	ANEXO II
Coppensia – 16/30				
C. barbaceniae (Lindl.) Campacci	FCA	-	-	-
C. bifolia (Sims) Dumort	FOM	-	-	-
C. blanchetii (Rchb.f.) Campacci	FCA	-	-	-
C. caldensis (Rchb.f.) Docha Neto	FCA	-	-	-
C. doniana (Batem *ex* W.Baxter) Campacci*	FCA	-	-	-
C. edmundoi (Pabst) Campacci*	AFL	-	-	-
C. flexuosa (Sims) Campacci	FOD, FOM	-	-	-
C. fuscans (Rchb.f.) Campacci	FCA	-	-	-
C. hydrophyla (Barb.Rodr.) Campacci	FCA	-	-	-
C. majevskyi (Toscano & V.P.Castro) Campacci*	FCA	-	-	-
C. paranapiacabensis (Hoehne) Campacci*	FCA	-	-	-
C. pontagrossensis Campacci*	FCA	-	-	-
C. ramosa (Lindl.) Campacci	FCA	-	-	-
C. varicosa (Lindl.) Campacci	FOM	-	-	-
C. warmingii (Rchb.f.) Campacci	FCA	-	-	-
C. welteri (Pabst) Campacci*	FOM	-	-	-
Coryanthes – 1/38				
C. speciosa Hook.	FOD, FOM	-	-	-
Corymborchis – 1/6				
C. flava (Sw.) Kuntze	FOD, FOM	-	-	-
Cranichis – 3/54				
C. candida (Barb.Rodr.) Cogn.	FOM	-	-	-
C. diphylla Sw.	FOM	-	-	-
C. muscosa Sw.	FOM	-	-	-
Cryptarrhena – 2/2				
C. brasiliensis Brade*	FOD	-	-	-
C. guatemalensis Schltr.	FOD	-	-	-
Cyanaeorchis – 2/2				
C. arundinae (Rchb.f.) Barb.Rodr.	FOM, FCA	-	-	-
C. minor Schltr.	FCA	-	-	-
Cyclopogon – 25/82				
C. alexandrae (Kraenzl.) Schltr.*	FOM	-	-	-
C. apricus (Lindl.) Schltr.	FOM	-	-	-
C. argyrifolius Barb.Rodr.*	FCA	-	-	-
C. bicolor (Ker Gawl.) Schltr.	FOM	-	-	-
C. calophyllus Barb.Rodr.	FOM	-	-	-
C. cearensis Barb.Rodr.*	FOM	-	-	-
C. congestus (Vell.) Hoehne	FOM	-	-	-
C. dusenii Schltr.*	FOM	-	-	-
C. dutrae Schltr.	FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
C. elatus (Sw.) Schltr.	FOM	-	-	-
C. elegans Hoehne	FOD, RST	-	-	-
C. graciliscapus Schltr.	FOM	-	-	-
C. hatschbachii Schltr.*	FOD	-	-	-
C. iguapensis Schltr.*	FOD	-	-	-
C. itatiayensis (Kraenzl.) Hoehne	FOM	-	-	-
C. longibracteatus (Barb.Rodr.) Schltr.	FOD	-	-	-
C. multiflorus Schltr.*	FOM, RST	-	-	-
C. oliganthus (Hoehne) Hoehne & Schltr.	FOM	-	-	-
C. proboscideus Szlach.*	FOD	-	-	-
C. subalpestris Schltr.	FOM	-	-	-
C. trifasciatus Schltr.	FOM	-	-	-
C. variegatus Barb.Rodr.	FCA	-	-	-
C. venustus (Barb.Rodr.) Schltr.	FOM	-	-	-
C. vittatus Dutra *ex* Pabst*	FCA	-	-	-
C. warmingii (Rchb.f.) Schltr.*	FOM	-	-	-
Cycnoches – 1/33				
C. pentadactylum Lindl.	FOD	-	-	-
Cyrtopodium – 14/44				
C. aliciae Lindl. & Rchb.f.	FOD	-	-	-
C. brandonianum Barb.Rodr.	FCA	-	-	-
C. flavum Link & Otto *ex* Rchb.f.	FCA, RST	-	-	-
C. gigas (Vell.) Hoehne*	FOD, FOM	-	-	-
C. glutiniferum Raddi	FCA	-	-	-
C. hatschbachii Pabst	FCA	-	-	-
C. holstii L.C.Menezes*	FOM, RST	-	-	-
C. intermedium Brade	FCA	-	-	-
C. kleinii J.A.N.Batista & Bianchetti	FCA	-	-	-
C. lissochiloides Hoehne & Schltr.	FCA	-	VU	ANEXO II
C. pallidum Rchb.f. & Warm.	FCA	-	-	-
C. palludicolum Hoehne	FCA	-	-	-
C. palmifrons Rchb.f. & Warm.	FOM	-	-	-
C. parviflorum Lindl.	FOD	-	-	-
Dichaea – 8/110				
D. anchorifera Rchb.f.*	FOM	-	-	-
D. australis Cogn.	FOM	-	-	-
D. brevicaulis Cogn.*	FOM	-	-	-
D. bryophyla Rchb.f.*	FOD, FOM	-	-	-
D. cogniauxiana Schltr.*	FOD, FOM	-	-	-
D. mosenii Cogn.*	FOD	-	-	-
D. pendula (Aubl.) Cogn.*	FOD, FOM	-	-	-
D. trulla Rchb.f.*	FOD, FOM	-	-	-
*Dictyophyllaria** – 1/1				
D. dietschiana (Edwall) Garay*	FCA	-	-	-
Dimerandra – 1/6				
D. emarginata (G.Mey.) Hoehne	FOD, FOM	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Dryadella – 12/42				
D. auriculigera (Rchb.f.) Luer*	FOD	-	-	-
D. aviceps (Rchb.f.) Luer*	FOD	-	-	-
D. crenulata (Pabst) Luer*	FOD	-	-	-
D. edwallii (Cogn.) Luer*	FOD	-	-	-
D. espirito-santensis (Pabst) Luer*	FOD	-	-	-
D. gomes-ferreirae (Pabst) Luer*	FOD	-	-	-
D. kautskyi (Pabst) Luer*	FOD	-	-	-
D. liliputiana (Cogn.) Luer*	FOD	-	-	-
D. susanae (Pabst) Luer*	FOD	-	-	-
D. toscanoi Luer*	FOD	-	-	-
D. vitorinoi Luer & Toscano*	FOD	-	-	-
D. zebrina (Porsch) Luer*	FOD	-	-	-
Dungsia – 2/4				
D. harpophylla (Rchb.f.) Chiron & V.P.Castro*	FOD	-	-	-
D. kautskyi (Pabst) Chiron & V.P.Castro*	FOD	-	-	-
Elleanthus – 3/106				
E. brasiliensis Rchb.f.	FOD, FOM	-	-	-
E. crinipes Rchb.f.*	FOD, FOM	-	-	-
E. graminifolius (Barb.Rodr.) Løjtnant*	FOD, RST	-	-	-
Eltroplectris – 6/13				
E. calcarata (Sw.) Garay & Sweet	FOM, RST	-	-	-
E. janeirensis (Porto & Brade) Pabst	FOM	-	-	-
E. kuhlmanniana (Hoehne) Pabst*	FOD	-	-	-
E. lurida (M.N.Correa) Pabst	FCA	-	-	-
E. schlechteriana (Porto & Brade) Pabst	FCA	-	-	-
E. triloba (Lindl.) Pabst	FOD, RST, FCA	-	-	-
Encyclia – 19/154				
E. advena (Rchb.f.) Porto & Brade	FOM, AFL	-	-	-
E. bonhkiana V.P.Castro & Campacci*	FOM	-	-	-
E. bracteata (Barb.Rodr.) Schltr.*	FOD	-	-	-
E. bragancae Ruschi*	FOD	-	-	-
E. conchaechila (Barb.Rodr.) Porto & Brade*	FOD	-	-	-
E. cordigera (Kunth) Dressler	?	-	-	-
E. dasilvae V.P.Castro & Campacci*	FOD	-	-	-
E. dichroma (Lindl.) Schltr.	AFL	-	-	-
E. euosma (Rchb.f.) Porto & Brade*	FOD	-	-	-
E. fowliei Duveen*	FOD	-	VU	ANEXO II
E. gallopavina (Rchb.f.) Porto & Brade*	FOD, FOM	-	-	-
E. marxiana Campacci	FOM	-	-	-
E. oncidioides (Lindl.) Schltr.	FOM, AFL	-	-	-
E. osmantha (Barb.Rodr.) Schltr.	FOM, AFL	-	-	-
E. patens Hook.	FOD, FOM, RST	-	-	-
E. pauciflora (Barb.Rodr.) Porto & Brade*	FOM	-	-	-
E. silvana V.P.Castro & Campacci*	FOD	-	-	-
E. spiritusanctensis L.C.Menezes*	FOD, AFL	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
E. unaensis Fowlie*	FOD	-	-	-
Epidendrum – 64/1130				
E. addae Pabst*	FOD	-	-	-
E. ammophilum Barb.Rodr.*	FOD	-	-	-
E. anatipedium L.M.Sánchez & Hágsater*	FOD	-	-	-
E. armeniacum Lindl.	FOD, FOM	-	-	-
E. avicula Lindl.	FOD	-	-	-
E. berkeleyi (Rolfe) Baptista*	FOD	-	-	-
E. caldense Barb.Rodr.	FOD, FOM	-	-	-
E. campaccii Hágsater & L.M.Sánchez	FOM, FOD	-	-	-
E. carvalhoi Toscano*	FOD	-	-	-
E. chlorinum Barb.Rodr.*	FOM	-	-	-
E. cinnabarinum Salzm.*	RST	-	-	-
E. cooperianum Batem.	FOD	-	-	-
E. coronatum Ruiz & Pav.	FOD, FOM	-	-	-
E. cristatum Ruiz & Pav.*	FOD	-	-	-
E. dendrobioides Thunb.	FOM	-	-	-
E. densiflorum Lindl.	FOD, FOM	-	-	-
E. denticulatum Barb.Rodr.	FOM, AFL, RST	-	-	-
E. ecostatum Pabst*	FOD, FOM	-	-	-
E. filicaule (Sw.) Lindl.*	FOD	-	-	-
E. forcipatoides Hágsater*	FOD	-	-	-
E. fulgens Brongn.*	RST	-	-	-
E. garciae Pabst*	FOD	-	-	-
E. geniculatum Barb.Rodr.	FOD	-	-	-
E. goebelii Schltr.*	FOD	-	-	-
E. henschenii Barb.Rodr.	FOM	-	-	-
E. hololeucum Barb.Rodr.*	FOD	-	-	-
E. imatophyllum Lindl.	FOD, FOM	-	-	-
E. infaustum Rchb.f.*	FOD, FOM	-	-	-
E. janeirense Porto & Brade*	FOD, FOM	-	-	-
E. kautskyi Pabst*	FOD	-	-	-
E. klueppelianum Pabst*	FOD	-	-	-
E. latilabre Lindl.	FOD, FOM	-	-	-
E. loefgrenii Cogn.*	FOD	-	-	-
E. magdalenense Porto & Brade*	FOD	-	-	-
E. mantiqueiranum Porto & Brade	FOM	-	-	-
E. martianum Lindl.	FOD, FOM	-	-	-
E. minarum Hoehne & Schltr.	FOM, AFL	-	-	-
E. nocturnum Jacq.	FOM, FOD	-	-	-
E. nutans Sw.	FOD, FOM	-	-	-
E. obergii Hawkes	FOD, FOM	-	-	-
E. ochrochlorum Barb.Rodr.	FOD, FOM	-	-	-
E. orchidiflorum (Salzm.) Lindl.	FOM, RST	-	-	-
E. paniculosum Barb.Rodr.*	FOD	-	-	-
E. paranaense Barb.Rodr.*	FOD, FOM	-	-	-
E. patens Sw.	FOD, FOM	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
E. pium Rchb.f. & Warm.	FOD, FOM	-	-	-
E. proligerum Barb.Rodr.*	FOD, FOM	-	-	-
E. pseudodifforme Hoehne & Schltr.*	FOM, FOD	-	-	-
E. punicoluteum F.Pinheiro & F.Barros*	FOD, RST	-	-	-
E. ramosum Jacq.	FOD, FOM, MAN	-	-	-
E. rigidum Jacq.	FOD, FOM, RST, MAN	-	-	-
E. robustum Cogn.*	FOD	-	-	-
E. rodriguesii Cogn.	FOD, FOM	-	-	-
E. saxatile Lindl.	FOM	-	-	-
E. saximontanum Pabst*	FOD	-	-	-
E. schomburgkii Lindl.	FOD, FOM	-	-	-
E. secundum Jacq.	FOD, FOM, RST, AFL	-	-	-
E. strobiliferum Rchb.f.	FOD, FOM	-	-	-
E. successivum Hágsater & F.E.L.Miranda*	FOD	-	-	-
E. tridactylum Lindl.	FOD, FOM	-	-	-
E. vesicatum Lindl.*	FOD, FOM	-	-	-
E. xanthinum Lindl.	FOM, AFL	-	-	-
E. waiandtii V.P.Castro*	FOD	-	-	-
E. zappii Pabst*	FOD	-	-	-
Epistephium – 1/23				
E. lucidum Cogn.	FOD, RST, FCA	-	-	-
Erycina – 2/7				
E. glossomistax (Rchb.f.) N.H.Williams & M.W.Chase	FOD, FOM	-	-	-
E. pusilla (L.) N.H.Williams & M.W.Chase	FOD, FOM	-	-	-
Eulophia – 1/211				
E. alta (L.) Fawc. & Rendle	FOM	-	-	-
Eurystyles – 6/18				
E. actinosophila (Barb.Rodr.) Schltr.	FOD, FOM	-	-	-
E. cogniauxii (Kraenzl.) Pabst	FOM	-	-	-
E. cotyleton Wawra	FOD, FOM	-	-	-
E. crocodilus Szlach.*	FOD	-	-	-
E. lorenzii (Cogn.) Schltr.*	FOD, FOM	-	-	-
E. rutkowskiana Szlach.*	FOD	-	-	-
Galeandra – 6/18				
G. beyrichii Rchb.f.	FOM, FES	-	-	-
G. junceoides Barb.Rodr.	FCA	-	-	-
G. montana Barb.Rodr.	FCA, RST	-	-	-
G. paraguayensis Cogn.	FCA	-	-	-
G. stangeana Rchb.f.	FOD	-	-	-
G. stylomisantha (Vell.) Hoehne	FCA	-	-	-
Galeottia – 1/12				
G. ciliata (Morel) Dressler & Christenson	FOD	-	-	-
Geoblasta – 1/2				
G. penicillata (Rchb.f.) Hoehne *ex* M.N.Correa	FCA	-	-	-
Gomesa – 12/17				
G. alpina Porsch*	FOM	-	-	-
G. barkeri (Hook.) Regel*	FOM	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
G. crispa (Lindl.) Klotzsch & Rchb.f.	FOM	-	-	-
G. duseniana Kraenzl.*	FOD, FOM	-	-	-
G. fischeri Regel*	FOD, FOM	-	-	-
G. foliosa (Hook.) Klotzsch & Rchb.f.*	FOM	-	-	-
G. glaziovii Cogn.*	FOD	-	-	-
G. laxiflora (Lindl.) Klotzsch & Rchb.f.*	FOM	-	-	-
G. paranaensis Kraenzl.*	FOD	-	-	-
G. planifolia (Lindl.) Klotzsch & Rchb.f.*	FOD, FOM	-	-	-
G. recurva R.Br.*	FOM	-	-	-
G. sessilis Barb.Rodr.*	FOM	-	-	-
Gongora – 1/58				
G. bufonia Lindl.*	FOD, FOM, RST	-	-	-
Govenia – 1/19				
G. utriculata (Sw.) Lindl.	FOM	-	-	-
Grandiphyllum – 8/10				
G. auricula (Vell.) Docha Neto*	FOD	-	-	-
G. divaricatum (Lindl.) Docha Neto*	FOD	-	-	-
G. edwallii (Cogn.) Docha Neto*	FOD, FOM	-	-	-
G. hians (Lindl.) Docha Neto*	FOD, FOM	-	-	-
G. pohlianum (Cogn.) Docha Neto*	FOD	-	-	-
G. pulvinatum (Lindl.) Docha Neto	FOD, FOM	-	-	-
G. schunkianum (Campacci & Catharino) Docha Neto*	FOD	-	-	-
G. sphegiferum (Lindl.) Docha Neto*	FOD	-	-	-
Grobya – 4/5				
G. amherstiae Lindl.	FOD, FOM	-	-	-
G. fascifera Rchb.f.*	FOD, FOM	-	-	-
G. galeata Lindl.*	FOD, FOM	-	-	-
G. guieselii F.Barros & R.Lourenço*	FOD	-	-	-
Habenaria – 77/850				
H. achalensis Kraenzl.	FCA	-	-	-
H. alpestris Cogn.	FCA	-	-	-
H. angulosa Barb.Rodr.	FCA	-	-	-
H. areaneiflora Barb.Rodr.	FCA	-	-	-
H. armata Rchb.f.	FCA	-	-	-
H. ayangannensis Renz	FCA	-	-	-
H. balansae Cogn.	FCA	-	-	-
H. biflora Barb.Rodr.	FCA	-	-	-
H. brachyplectron Hoehne & Schltr.	FCA	-	VU	ANEXO II
H. bractescens Lindl.	FCA	-	-	-
H. caldensis Kraenzl.	FCA	-	-	-
H. crucifera Rchb.f. & Warm.	FCA	-	-	-
H. cryptophila Barb.Rodr.	FCA	-	-	-
H. cultellifolia Barb.Rodr.	FCA	-	-	-
H. curvilabria Barb.Rodr.	FCA	-	-	-
H. distans Griseb.	FCA	-	-	-
H. drepanopetala Pabst	FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
H. dusenii Schltr.	FCA	-	-	-
H. edwallii Cogn.	FCA	-	-	-
H. ekmaniana Kraenzl.	FCA	-	-	-
H. ernestiulei Hoehne	FCA	-	-	-
H. exaltata Barb.Rodr.	FCA	-	-	-
H. fluminensis Hoehne	FOD	-	-	-
H. galeandriformis Hoehne	FCA	-	-	-
H. glaucophylla Barb.Rodr.	FCA	-	-	-
H. gnoma Barb.Rodr.	FCA	-	-	-
H. gourlieana Gill. *ex* Lindl.	FCA	-	-	-
H. graciliscapa Barb.Rodr.	FCA	-	-	-
H. guilleminii Rchb.f.	FCA	-	-	-
H. gustavi-edwallii Hoehne	FCA	-	-	-
H. habenarioides (Hoehne) R.E.Nogueira & R.J.V.Alves	FCA	-	-	-
H. heleogena Schltr.	FCA	-	-	-
H. henscheniana Barb.Rodr.	FCA	-	-	-
H. hexaptera Lindl.	FCA	-	-	-
H. hydrophila Barb.Rodr.	FCA	-	-	-
H. inconspicua Cogn.	FCA	-	-	-
H. itatiayae Schltr.	FCA	-	-	-
H. jaguariahyvae Kraenzl.	FCA	-	-	-
H. johannensis Barb.Rodr.	FCA	-	-	-
H. jordanensis (J.E.Leite) Garay	FOM, FCA	-	-	-
H. josephensis Barb.Rodr.*	FOM	-	-	-
H. leptoceras Hook.	FOD, FOM, RST	-	-	-
H. leucosantha Barb.Rodr.	FCA	-	-	-
H. macrodactyla Kraenzl.	FCA	-	-	-
H. macronectar (Vell.) Hoehne	FCA	-	-	-
H. magdalenensis Hoehne	FCA	-	-	-
H. megapotamensis Hoehne	FCA	-	-	-
H. melanopoda Hoehne & Schltr.	FCA	-	-	-
H. mitomorpha Kraenzl.	FCA	-	-	-
H. modestissima Rchb.f.	FCA	-	-	-
H. montevidensis Spreng.	FCA	-	-	-
H. nabucoi Ruschi	FCA	-	-	-
H. novaesii Edwall & Hoehne	FCA	-	-	-
H. nuda Lindl.	FCA	-	-	-
H. paranaensis Barb.Rodr.	FCA	-	-	-
H. parviflora Lindl.	FCA	-	-	-
H. paulensis Porsch	FCA	-	-	-
H. paulistana J.A.N.Batista & Bianchetti*	FCA	-	-	-
H. petalodes Lindl.	FCA	-	-	-
H. piraquarensis Hoehne*	FCA	-	-	-
H. pleiophylla Hoehne & Schltr.	FCA	-	-	-
H. pratensis (Salzm. *ex* Lindl.) Rchb.f.	FCA	-	-	-
H. regnellii Cogn.	FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
H. repens Nutt.	FCA	-	-	-
H. riedelii Cogn.*	FCA	-	-	-
H. rodeiensis Barb.Rodr.	FCA	-	-	-
H. rolfeana Schltr.	FCA	-	-	-
H. rotundiloba Pabst*	FCA	-	-	-
H. rudolfi-schlechteri Hoehne*	FCA	-	-	-
H. rupicola Barb.Rodr.	FCA	-	-	-
H. sceptrum Schltr.	FCA	-	-	-
H. schwackei Barb.Rodr.	FCA	-	-	-
H. secunda Lindl.	FCA	-	-	-
H. setacea Lindl.	FCA	-	-	-
H. trifida Kunth	FCA	-	-	-
H. ulei Cogn.*	FCA	-	-	-
H. umbraticola Barb.Rodr.*	FCA	-	-	-
Hadrolaelia – 15/22				
H. alaorii (Brieger & Bicalho) Chiron & V.P.Castro*	FOD	-	-	-
H. coccinea (Lindl.) Chiron & V.P.Castro*	FOD	-	-	-
H. crispa (Lindl.) Chiron & V.P.Castro*	FOD	-	-	-
H. fidelensis (Pabst) Chiron & V.P.Castro*	FOM	-	-	-
H. grandis (Lindl.) Chiron & V.P.Castro*	FOD, FOM	-	-	-
H. lobata (Lindl.) Chiron & V.P.Castro*	AFL	-	-	-
H. mantiqueirae (Fowlie) Chiron & V.P.Castro*	FOM	-	-	-
H. perrinii (Lindl.) Chiron & V.P.Castro*	FOD	-	-	-
H. pumila (Hook.) Chiron & V.P.Castro*	FOD, FOM	-	-	-
H. purpurata (Lindl.) Chiron & V.P.Castro*	FOD	-	-	-
H. pygmaea (Pabst) Chiron & V.P.Castro*	FOD	-	-	-
H. tenebrosa (Rolfe) Chiron & V.P.Castro*	FOD	-	-	-
H. virens (Lindl.) Chiron & V.P.Castro*	FOD	-	-	-
H. wittigiana (Barb.Rodr.) Chiron & V.P.Castro*	FOD	-	-	-
H. xanthina (Lindl.) Chiron & V.P.Castro*	FOD	-	-	-
Hapalorchis – 4/8				
H. candidus (Kraenzl.) Schltr.*	FOD	-	-	-
H. lineatus (Lindl.) Schltr.	FOD	-	-	-
H. micranthus (Barb.Rodr.) Hoehne*	FOD	-	-	-
H. pauciflorus Porto & Brade*	AFL	-	-	-
Heterotaxis – 2/14				
H. brasiliensis (Brieger & Bicalho) F.Barros*	FOD, FOM	-	-	-
H. valenzuelana (A.Rich.) F.Barros*	FOD	-	-	-
*Hoehneella** – 2/2				
H. gehrtiana (Hoehne) Ruschi*	FOD, FOM	-	-	-
H. heloisae Ruschi*	FOD	-	-	-
Hoffmannseggella – 7/50				
H. alvaroana (F.E.Miranda) V.P.Castro & Chiron*	AFL	-	-	-
H. bahiensis (Schltr.) H.G.Jones*	AFL	-	-	-
H. cinnabarina (Batem. *ex* Lindl.) van den Berg & M.W.Chase	FOD, AFL	-	-	-
H. gloedeniana (Hoehne) Chiron & V.P.Castro*	FOM, AFL	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
H. kautskyana V.P.Castro & Chiron*	AFL	-	-	-
H. mixta (Hoehne) Chiron & V.P.Castro*	AFL	-	-	-
H. munchowiana (F.E.Miranda) V.P.Castro & Chiron*	AFL	-	-	-
Homalopetalum – 1/4				
H. hypoleptum (Lindl.) Soto-Arenas	FOD	-	-	-
Houlletia – 1/9				
H. broklehurstiana Lindl.*	FOD	-	-	-
Huntleya – 1/13				
H. meleagris Lindl.*	FOD, FOM	-	-	-
Ionopsis – 1/6				
I. utricularioides (Sw.) Lindl.	FOM	-	-	-
Isabelia – 3/3				
I. pulchella (Kraenzl.) Senghas & Teuscher*	FOM	-	-	-
I. violacea (Lindl.) van den Berg & M.W.Chase*	FOD, FOM	-	-	-
I. virginalis Barb.Rodr.	FOD, FOM	-	-	-
Isochilus – 1/12				
I. linearis (Jacq.) R.Br.	FOD, FOM, FES	-	-	-
Jacquiniella – 2/6				
J. globosa (Jacq.) Schltr.	FOD, FOM	-	-	-
J. teretifolia (Sw.) Britton & Wilson	FOD	-	-	-
Koellensteinia – 5/19				
K. altissima Pabst*	FOM, RST	-	-	-
K. florida (Rchb.f.) Garay*	?	-	-	-
K. graminea (Lindl.) Rchb.f.	FOD	-	-	-
K. spiralis Gomes-Ferreira & L.C.Menezes*	FOM	-	-	-
K. tricolor (Lindl.) Rchb.f.	FCA	-	-	-
Lankesterella – 7/11				
L. caespitosa (Lindl.) Hoehne*	FOD	-	-	-
L. ceracifolia (Barb.Rodr.) Mansf.*	FOD	-	-	-
L. epiphytica (Barb.Rodr.) Mansf.*	FOD	-	-	-
L. gnoma (Kraenzl.) Hoehne*	FOD	-	-	-
L. longicollis (Cogn.) Hoehne*	FOD	-	-	-
L. pilosa (Cogn.) Hoehne*	FOD	-	-	-
L. spannageliana (Hoehne & Brade) Mansf.*	FOD	-	-	-
Lepanthopsis – 3/39				
L. densiflora (Barb.Rodr.) Ames*	FOD, FOM	-	-	-
L. floripecten (Rchb.f.) Ames	FOD, FOM	-	-	-
L. vellozicola R.C.Mota *et al.**	AFL	-		
Leptotes – 5/6				
L. bicolor Lindl.	FOD, FOM	-	-	-
L. pauloensis Hoehne*	?	-	-	-
L. pohlitinocoi V.P.Castro & Chiron*	FOD	-	-	-
L. tenuis Rchb.f.*	FOD	-	-	-
L. unicolor Barb.Rodr.*	FOD	-	-	-
Ligeophila – 3/9				
L. clavigera (Rchb.f.) Garay	FOD, FOM	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
L. juruensis (Hoehne) Garay	FOD	-	-	-
L. rosea (Lindl.) Garay	FOD	-	-	-
Liparis – 2/420				
L. nervosa (Thumb.) Lindl.	FOM, FES, RST	-	-	-
L. vexillifera (Llave & Lex.) Cogn.	FOM	-	-	-
Lockhartia – 2/27				
L. ludibunda Rchb.f.*	FOM	-	-	-
L. lunifera (Lindl.) Rchb.f.*	FOD	-	-	-
*Loefgrenianthus** – 1/1				
L. blanche-amesii (Loefgr.) Hoehne*	FOM	-	-	-
Lophiaris – 2/30				
L. pumila (Lindl.) Braem	FOM	-	-	-
L. schwambachiae (V.P.Castro & Toscano) Braem*	FOD	-	-	-
Lycaste – 1/50				
L. ciliata (Ruiz & Pav.) Lindl. *ex* Rchb.f.	FOD, FOM	-	-	-
Lyroglossa – 2/2				
L. grisebachii (Cogn.) Schltr.	FCA	-	-	-
L. spirata (Hoehne) Garay	FCA	-	-	-
Macradenia – 1/10				
M. multiflora (Kraenzl.) Cogn.	FOM	-	-	-
Malaxis – 7/400				
M. cognauxiana (Schltr.) Pabst*	FOM	-	-	-
M. excavata (Lindl.) Kuntze	FOM	-	-	-
M. jaraguae (Hoehne & Schltr.) Pabst*	FOM	-	-	-
M. parthonii C.Morr.	FOD, FOM	-	-	-
M. pubescens (Lindl.) Kuntze*	FOD, FOM	-	-	-
M. sertulifera (Barb.Rodr.) Pabst	FOD	-	-	-
M. warmingii (Rchb.f.) O.Ktze.	FOD, RST	-	-	-
Mapinguari – 1/4				
M. desvauxianus (Rchb.f.) Carnevali & R.Singer	FOD	-	-	-
Masdevallia – 3/510				
M. curtipes Barb.Rodr.*	FOD	-	-	-
M. discoidea Luer & Würstle*	FOD	-	VU	ANEXO II
M. infracta Lindl.*	FOD	-	-	-
Maxillaria – 7/165				
M. bradei Schltr.*	FOD, FOM, RST	-	-	-
M. leucaimata Barb.Rodr.	FOD, FOM	-	-	-
M. lindleyana Schltr.*	FOD	-	-	-
M. ochroleuca Lodd. *ex* Lindl.	FOD, FOM, RST, MAN	-	-	-
M. porrecta Lindl.*	FOD	-	-	-
M. silvana Campacci*	FOD	-	-	-
M. spiritu-sanctensis Pabst*	FOD	-	-	-
Maxillariella – 1/46				
M. robusta (Barb.Rodr.) M.A.Blanco & Carnevali	FOD	-	-	-
Mesadenella – 2/7				
M. atroviridis (Barb.Rodr.) Garay*	FOM	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
M. cuspidata Lindl.	FOM, RST	-	-	-
Mesadenus – 1/6				
M. glaziovii (Cogn.) Schltr.	FCA	-	-	-
Microchilus – 6/120				
M. arietinus (Rchb.f. & Warm.) Ormerod	FOM, FES	-	-	-
M. austrobrasiliensis (Porsch) Ormerod*	FOD	-	-	-
M. brachyplectron (Pabst) Ormerod*	FOD	-	-	-
M. densiflorus (Lindl.) D.Dietr.	FOD	-	-	-
M. lamprophyllus (Linden & Rchb.f.) Ormerod*	FOD, FOM	-	-	-
M. pedrojuanensis Ormerod	FOM	-	-	-
Microlaelia – 1/1				
M. lundii (Rchb.f.) Chiron & V.P.Castro	FOM, FES, FED	-	-	-
Miltonia – 6/10				
M. clowesii Lindl.*	FOD, FOM	-	-	-
M. flavescens (Lindl.) Lindl.	FOM	-	-	-
M. moreliana A.Rich.*	FOD	-	-	-
M. regnellii Rchb.f.*	FOM	-	-	-
M. russeliana Lindl.*	FOM	-	-	-
M. spectabilis Lindl.*	FOD	-	-	-
Mormolyca – 3/25				
M. cleistogama (Brieger & Illg) M.A.Blanco	FOD, FOM	-	-	-
M. ringens (Lindl.) Gentil	FOD	-	-	-
M. rufescens (Lindl.) M.A.Blanco	FOD, FOM	-	-	-
Myoxanthus – 8/45				
M. conceicionensis M.Frey & N.Sanson*	FOD	-	-	-
M. exasperatus (Lindl.) Luer*	FOD, FOM	-	-	-
M. lonchophyllus (Barb.Rodr.) Luer	FOM	-	-	-
M. pulvinatus (Barb.Rodr.) Luer	FOD, FOM, FES	-	-	-
M. punctatus (Barb.Rodr.) Luer*	FOD, FOM	-	-	-
M. ruschii Fraga & L.Kollmann*	FOD	-	-	-
M. scabripes (Lindl.) Luer*	FOM	-	-	-
M. seidelii Pabst*	FOD	-	-	-
*Neogardneria** – 1/1				
N. murrayana (Gardner *ex* Hook.) Schltr.*	FOD	-	-	-
*Neoruschia** – 1/1				
N. cogniauxiana (Schltr.) V.P.Castro & Catharino*	FOD	-	-	-
Notylia – 6/58				
N. hemitricha Barb.Rodr.*	FOM	-	-	-
N. longispicata Hoehne & Schltr.*	FOM	-	-	-
N. lyrata S.Moore	FOD, FOM	-	-	-
N. nemorosa Barb.Rodr.*	FOM	-	-	-
N. pubescens Lindl.*	FOD, FOM	-	-	-
N. stenatha Rchb.f.*	FOD, FOM	-	-	-
Octomeria – 56/120				
O. alexandri Schltr.*	FOD	-	-	-
O. aloefolia Barb.Rodr.*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
O. anceps Porto & Brade*	FOD	-	-	-
O. caetensis Pabst*	FOD	-	-	-
O. caldensis Hoehne*	FOM	-	-	-
O. campos-portoi Schltr.*	FOM	-	-	-
O. cariocana Pabst*	FOD	-	-	-
O. chamaeleptotes Rchb.f.*	FOD	-	-	-
O. cochlearis Rchb.f.*	FOD	-	-	-
O. concolor Barb.Rodr.	FOD	-	-	-
O. crassifolia Lindl.	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
O. cucullata Porto & Brade*	FOD	-	-	-
O. decumbens Cogn.*	FOM	-	-	-
O. diaphana Lindl.*	FOD, FOM, RST	-	-	-
O. estrellensis Hoehne*	FOD	-	-	-
O. exchlorophyllata Barb.Rodr.*	FOD, FOM	-	-	-
O. exigua C.Schweinf.	FOD, FOM, FES	-	-	-
O. fimbriata Porto & Peixoto*	FOD	-	-	-
O. flabellifera Pabst*	FOD	-	-	-
O. geraensis Barb.Rodr.*	FOM	-	-	-
O. gracilis Lodd. *ex* Lindl.*	FOM	-	-	-
O. grandiflora Lindl.	FOD, FOM, FES, FED, RST	-	-	-
O. hatschbachii Schltr.*	FOD	-	-	-
O. helvola Barb.Rodr.*	FOD	-	-	-
O. irrorata Schltr.*	FOD	-	-	-
O. itatiaiae Brade & Pabst*	FOM	-	-	-
O. juncifolia Barb.Rodr.*	FOD, FOM	-	-	-
O. leptophylla Barb.Rodr.*	FOD, FOM	-	-	-
O. lichenicola Barb.Rodr.*	FOD	-	-	-
O. linearifolia Barb.Rodr.*	FOD, RST	-	-	-
O. lithophila Barb.Rodr.*	AFL, FOM	-	-	-
O. micrantha Barb.Rodr.	FOD, FOM	-	-	-
O. minor C.Schweinf.	FOD	-	-	-
O. montana Barb.Rodr.*	FOD	-	-	-
O. multiflora Barb.Rodr.*	FOD	-	-	-
O. ochroleuca Barb.Rodr.*	FOM	-	-	-
O. octomeriantha (Hoehne) Pabst*	FOD	-	-	-
O. pamyrabellae Barb.Rodr.*	FOD, FOM	-	-	-
O. praestans Barb.Rodr.*	FOD	-	-	-
O. pusilla Lindl.	FOD, FOM, FES	-	-	-
O. riograndensis Schltr.*	FOD	-	-	-
O. rodeiensis Barb.Rodr.*	FOD	-	-	-
O. rodriguesii Cogn.*	FOD	-	-	-
O. rohrii Pabst*	FOD, FOM	-	-	-
O. rotundiglossa Hoehne*	FOD, RST	-	-	-
O. rubrifolia Barb.Rodr.	FOM, FES	-	-	-
O. sagittata (Rchb.f.) Garay	FOD, FOM, FES, FED, RST, AFL	-	-	-
O. sancti-angeli Kraenzl.*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
O. sarcophylla Barb.Rodr.*	FOD	-	-	-
O. spannagelii Hoehne*	FOD	-	-	-
O. tricolor Rchb.f.*	FOD	-	-	-
O. truncicola Barb.Rodr.*	FOD, FOM	-	-	-
O. unguiculata Schltr.*	FOD	-	-	-
O. warmingii Rchb.f.	FOD, FOM, FES, FED, RST	-	-	-
O. wawrae Rchb.f.*	FOD, FOM	-	-	-
O. wilsoniana Hoehne*	FOD	-	-	-
Oeceoclades – 1/38				
O. maculata (Lindl.) Lindl.	FOD, FOM, FES, FED, RST	-	-	-
Oncidium – 1/80				
O. baueri Lindl.	FOD, FOM	-	-	-
Ornithidium – 2/55				
O. pendens (Pabst) Senghas	FOD	-	-	-
O. rigidum (Barb.Rodr.) M.A.Blanco & Ojeda*	FOD, FOM	-	-	-
Ornithocephalus – 2/44				
O. brachystachyus Schltr.*	FOD	-	-	-
O. myrticola Lindl.	FOD, FOM	-	-	-
*Ornithophora** – 1/1				
O. radicans (Rchb.f.) Garay & Pabst*	FOD, FOM	-	-	-
Pabstia – 4/6				
P. jugosa (Lindl.) Garay*	FOD	-	-	-
P. modestior (Rchb.f.) Garay*	FOD	-	-	-
P. schunkiana V.P.Castro*	FOD	-	VU	ANEXO I
P. viridis (Lindl.) Garay*	FOD	-	-	-
Pabstiella – 2/6				
P. mirabilis (Schltr.) Brieger & Senghas*	FOD	-	-	-
P. tripterantha (Rchb.f.) F.Barros	FOD, FOM	-	-	-
*Paradisanthus** – 2/4				
P. bahiensis Rchb.f.*	RST	-	-	-
P. micranthus (Barb.Rodr.) Schltr.*	FOM, RST	-	-	-
Pelexia – 21/80				
P. bonariensis (Lindl.) Schltr.	FCA	-	-	-
P. burgeri Schltr.*	FCA	-	-	-
P. ekmanii (Kraenzl.) Schltr.	FCA	-	-	-
P. itatiayae Schltr.	FCA	-	-	-
P. laminata Schltr.	FCA	-	-	-
P. lindmaniana (Kraenzl.) Schltr.*	FCA	-	-	-
P. lindmanii Kraenzl.	FCA	-	-	-
P. loefgrenii (Porsch) Schltr.*	FCA	-	-	-
P. longibracteata Pabst*	FCA	-	-	-
P. macropoda (Barb.Rodr.) Schltr.	FCA	-	-	-
P. novofriburgensis (Rchb.f.) Garay	FOD, FCA	-	-	-
P. oestrifera (Rchb.f. & Warm.) Schltr.	FCA	-	-	-
P. orobanchoides (Kraenzl.) Schltr.	FCA	-	-	-
P. orthosepala (Rchb.f. & Warm.) Schltr.	FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
P. polyantha Schltr.*	FCA	-	-	-
P. pterygantha (Rchb.f. & Warm.) Schltr.	FCA	-	-	-
P. robusta (Kraenzl.) Hoehne*	FCA	-	-	-
P. sceptrum Schltr.*	FCA	-	-	-
P. tamanduensis (Kraenzl.) Schltr.	FCA	-	-	-
P. tenuior Schltr.*	FCA	-	-	-
P. viridis (Cogn.) Schltr.	FCA	-	-	-
Phloeophila – 1/8				
P. nummularia (Barb.Rodr.) Hoehne & Schltr.	FOD	-	-	-
Phragmipedium – 1/21				
P. sargentianum Rolfe*	AFL, FOM	-	-	-
Phymatidium – 9/9				
P. aquinoi Schltr.*	FOM	-	-	-
P. delicatulum Lindl.*	FOD, FOM	-	-	-
P. falcifolium Lindl.*	FOD, FOM	-	-	-
P. glaziovii Toscano*	FOD	-	-	-
P. hysteranthum Barb.Rodr.	FOD, FOM	-	-	-
P. limae Porto & Brade*	FOD	-	-	-
P. mellobarretoi Hoehne & Williams*	FOD, FOM	-	-	-
P. microphyllum (Barb.Rodr.) Toscano*	FOD, FOM	-	-	-
P. vogelii Pabst*	FOD	-	-	-
*Phymatochilum** – 1/1				
P. brasiliense Christenson*	FOD	-	-	-
Platyrhiza – 1/2				
P. quadricolor Barb.Rodr.*	FOD	-	-	-
Platystele – 1/90				
P. oxyglossa (Schltr.) Garay	FOD, FOM	-	-	-
Platythelys – 3/10				
P. debilis (Lindl.) Garay	FOM	-	-	-
P. paranaensis (Kraenzl.) Garay	FCA	-	-	-
P. schlechteriana (Hoehne) Garay*	FOD, FOM	-	-	-
Pleurobotryum – 6/6				
P. albopurpureum (Kraenzl.) Garay*	FOM	-	-	-
P. atropurpureum Barb.Rodr.	FOM	-	-	-
P. crepinianum (Cogn.) Hoehne*	FOM	-	-	-
P. hatschbachii (Schltr.) Hoehne	FOM	-	-	-
P. mantiquyranum (Barb.Rodr.) Hoehne*	FOM	-	-	-
P. rhabdosepalum (Schltr.) Hoehne*	FOD	-	-	-
Pleurothallis – 43/800				
P. arcuata Lindl.*	FOD	-	-	-
P. armeniaca Barb.Rodr.*	FOD	-	-	-
P. atroglossa Loefgr.*	FOM	-	-	-
P. aurantiaca Barb.Rodr.*	FOD, FOM	-	-	-
P. caroli Schltr.*	FOM	-	-	-
P. colorata Pabst*	FOD	-	-	-
P. crassicaulis (Barb.Rodr.) Cogn.*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
P. ephemera Lindl.*	FOD	-	-	-
P. ghillanyi Pabst*	FOD	-	-	-
P. globifera Pabst*	FOD	-	-	-
P. gouveiae A.Samp.*	FOD	-	-	-
P. granulosa (Barb.Rodr.) Cogn.*	FOD	-	-	-
P. henrique-aragonii Porto *ex* Pabst*	FOD	-	-	-
P. hians Lindl.*	FOD, FOM	-	-	-
P. hymenantha Lindl.*	FOD	-	-	-
P. hypnicola Lindl.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
P. imbeana Brade*	FOD	-	-	-
P. laciniata Barb.Rodr.*	FOD, FOM	-	-	-
P. limbata Cogn.	FOM, FES	-	-	-
P. mentigera Kraenzl.*	FOD, FOM	-	-	-
P. microtis Schltr.*	FOM	-	-	-
P. myrticola Barb.Rodr.*	FOM	-	-	-
P. parahybunensis (Barb.Rodr.) Luer*	FOD	-	-	-
P. parva Rolfe	FOM, FES	-	-	-
P. pellifeloidis (Barb.Rodr.) Cogn.*	FOD	-	-	-
P. per-dusenii Hoehne*	FOD	-	-	-
P. petropolitana Hoehne*	FOD	-	-	-
P. piraquarensis Hoehne*	FOD	-	-	-
P. recurvipetala Barb.Rodr.*	FOD	-	-	-
P. rubrolimbata Hoehne*	FOD	-	-	-
P. sarcopetala (Barb.Rodr.) Cogn.*	FOD	-	-	-
P. serrulata (Barb.Rodr.) Luer*	FOM	-	-	-
P. subrotundifolia Cogn.*	FOD	-	-	-
P. sulcata Porsch*	FOM	-	-	-
P. sulphurea Barb.Rodr.*	FOD	-	-	-
P. susanensis Hoehne*	FOD	-	-	-
P. tabacina (Barb.Rodr.) Cogn.*	FOD	-	-	-
P. tigridens Loefgr.*	FOD	-	-	-
P. trimeropetala Pabst*	FOD	-	-	-
P. vellozoana Schltr.*	FOM	-	-	-
P. vitorinoi Luer & Toscano*	FOD	-	-	-
P. wanderbildtiana Pabst*	FOD	-	-	-
P. wawreana Barb.Rodr.*	FOD	-	-	-
Pleurothallopsis – 1/30				
P. nemorosa (Barb.Rodr.) Porto & Brade*	FOD	-	-	-
Pogoniopsis – 1/2				
P. schenckii Cogn.*	FOD, FOM	-	-	-
Polycycnis – 1/15				
P. silvana F.Barros*	FOD	-	-	-
Polystachya – 7/220				
P. bradei Schltr.	FOM	-	-	-
P. caespitosa Barb.Rodr.	FOM	-	-	-
P. concreta (Jacq.) Garay & Sweet	FOD, FOM	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
P. estrellensis Rchb.f.	FOD, FOM	-	-	-
P. foliosa (Lindl.) Rchb.f.	FOM	-	-	-
P. micrantha Schltr.	FOD, FOM	-	-	-
P. pinicola Schltr.	FOD, FOM	-	-	-
Ponera – 1/8				
P. striata Lindl.*	FOD	-	-	-
Prescottia – 8/15				
P. densiflora (Brongn.) Cogn.	RST, FCA	-	-	-
P. glazioviana Cogn.*	FCA	-	-	-
P. lancifolia Lindl.*	FOD, FOM	-	-	-
P. leptostachya Lindl.*	FOD	-	-	-
P. montana Barb.Rodr.	FCA, AFL	-	-	-
P. oligantha (Sw.) Lindl.	FCA, FOM, RST	-	-	-
P. plantaginifolia Lindl. *ex* Hook.	FOD, FOM, RST, AFL	-	-	-
P. stachyodes Lindl.	FOD, FOM	-	-	-
Promenaea – 13/20				
P. acuminata Schltr.*	FOD	-	-	-
P. catharinensis Schltr.*	FOD	-	-	-
P. dusenii Schltr.*	FOD	-	-	-
P. fuerstenbergiana Schltr.*	FOD	-	-	-
P. guttata Rchb.f.*	FOD	-	-	-
P. lentiginosa Lindl.*	FOD	-	-	-
P. ovatiloba (Kingle) Cogn.*	FOM	-	-	-
P. paranaensis Schltr.*	FOD, FOM	-	-	-
P. riograndensis Schltr.*	FOD, FOM	-	-	-
P. rollisonii (Lindl.) Lindl.*	FOD, FOM	-	-	-
P. silvana F.Barros & Catharino*	FOD	-	-	-
P. stapelioides (Link & Otto) Lindl.*	FOD	-	-	-
P. xanthina Lindl.*	FOD, FOM	-	-	-
Prosthechea – 18/95				
P. alagoensis (Pabst) W.E.Higgins*	FOM	-	-	-
P. allemanoides (Hoehne) W.E.Higgins*	FOD, FOM	-	-	-
P. bulbosa (Vell.) W.E.Higgin	FOD, FOM	-	-	-
P. calamaria (Lindl.) W.E.Higgins	FOD, FOM	-	-	-
P. campos-portoi (Pabst) W.E.Higgins*	FOD	-	-	-
P. ebanii Chiron & V.P.Castro*	FOD	-	-	-
P. elisae Chiron & V.P.Castro*	AFL	-	-	-
P. fausta (Rchb.f. *ex* Cogn.) W.E.Higgins*	FOD, FOM	-	-	-
P. fragans (Sw.) W.E.Higgins	FOD, FOM, RST	-	-	-
P. glumacea (Lindl.) W.E.Higgins	FOD, FOM	-	-	-
P. kautskyi (Pabst) W.E.Higgins*	FOD	-	-	-
P. pachysepala (Klotzsch) Chiron & V.P.Castro*	FOM, AFL	-	-	-
P. papilio (Vell.) W.E.Higgins*	FOD, FOM	-	-	-
P. punctifera (Rchb.f.) W.E.Higgins*	FOD	-	-	-
P. pygmaea (Hook.) W.E.Higgins	FOD, FOM	-	-	-
P. silvana Catharino & V.P.Castro*	FOM	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
P. suzanensis (Hoehne) W.E.Higgins*	FOM	-	-	-
P. vespa (Vell.) W.E.Higgins	FOD, FOM, FES	-	-	-
Pseudolaelia – 8/10				
P. brejetubensis M.Frey*	AFL	-	-	-
P. canaanensis (Ruschi) F.Barros*	AFL	-	VU	ANEXO II
P. corcovadensis Porto & Brade*	AFL	-	-	-
P. dutrae Ruschi*	AFL	-	-	-
P. irwiniana Pabst*	FOD, AFL	-	-	-
P. maquijiensis M.Frey*	AFL	-	-	-
P. pavopolitana M.Frey*	AFL	-	-	-
P. vellozicola (Hoehne) Porto & Brade	FOD, FOM, RST, AFL	-	-	-
Psilochilus – 2/7				
P. dusenianus Kraenzl. *ex* Dunst. & Garay	FOM, FOD	-	-	-
P. modestus Barb.Rodr.	FOD, FOM, RST	-	-	-
Pteroglossa – 4/9				
P. glazioviana (Cogn.) Garay*	FCA	-	-	-
P. hilariana (Cogn.) Garay*	FCA	-	-	-
P. macrantha (Rchb.f.) Schltr.	FCA	-	-	-
P. roseoalba (Rchb.f.) Salazar & M.W.Chase	FCA	-	-	-
Pteroglossaspis – 1/5				
P. ruwenzoriensis (Rendle) Rolfe	FCA	-	-	-
Pygmaeorchis – 1/2				
P. brasiliensis Brade*	FOD	-	-	-
*Rauhiella** – 3/3				
R. brasiliensis Pabst & Braga*	RST	-	-	-
R. seehaweri (I.Bock) Toscano & Christenson*	FOD	-	-	-
R. silvana Toscano*	FOM	-	-	-
*Rhamphorhynchus** – 1/1				
R. mendoncae (Brade & Pabst) Garay*	?	-	-	-
Rhetinantha – 2/15				
R. cerifera (Barb.Rodr.) M.A.Blanco*	FOD, FOM	-	-	-
R. notylioglossa (Rchb.f.) M.A.Blanco	FOD, FOM	-	-	-
Rhinocidium – 2/3				
R. longicornu (Mutel) Baptista	FOM	-	-	-
R. macronix (Rchb.f.) Baptista	FOM	-	-	-
Rodriguezia – 11/50				
R. bahiensis Rchb.f.*	FOD	-	-	-
R. bifolia Barb.Rodr.*	FOM	-	-	-
R. bracteata (Vell.) Hoehne*	FOD	-	-	-
R. decora (Lem.) Rchb.f.	FOD, FOM	-	-	-
R. limae Brade*	FOD	-	-	-
R. obtusifolia (Lindl.) Rchb.f.*	FOD, FOM	-	-	-
R. pardina Rchb.f.*	FOD	-	-	-
R. pubescens (Lindl.) Rchb.f.*	FOD	-	-	-
R. rigida (Lindl.) Rchb.f.*	FOM	-	-	-
R. sucrei Braga*	RST	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
R. venusta Rchb.f.*	FOD, FOM	-	-	-
Rodrigueziella – 5/6				
R. doeringii (Hoehne) Pabst*	FOD	-	-	-
R. gomezoides (Barb.Rodr.) Pabst*	FOD, FOM	-	-	-
R. handroi (Hoehne) Pabst*	FOD, FOM	-	-	-
R. jucunda (Rchb.f.) Garay*	FOM	-	-	-
R. petropolitana Pabst*	FOD	-	-	-
*Rodrigueziopsis** – 2/2				
R. eleutherosepala (Barb.Rodr.) Schltr.*	FOD, FOM	-	-	-
R. microphyta (Barb.Rodr.) Schltr.*	FOD, FOM	-	-	-
Sacoila – 4/5		-		
S. duseniana (Kraenzl.) Garay	FCA	-	-	-
S. hassleri (Cogn.) Garay	FCA	-	-	-
S. lanceolata (Aubl.) Garay	RST, FCA	-	-	-
S. pedicellata (Cogn.) Garay	FCA	-	-	-
*Sanderella** – 2/2				
S. discolor (Barb.Rodr.) Cogn.*	FOD	-	-	-
S. riograndensis Dutra *ex* Pabst*	FOD	-	-	-
Sarcoglottis – 13/40				
S. acaulis (Sm.) Schltr.	FCA	-	-	-
S. alexandri Schltr. *ex* Mansf.	FCA	-	-	-
S. biflora (Vell.) Schltr.	FCA	-	-	-
S. depinctrix Christenson & Toscano	FCA	-	-	-
S. fasciculata (Vell.) Schltr.	FCA	-	-	-
S. glaucescens Schltr.	FCA	-	-	-
S. grandiflora (Hook.) Klotzsch	FCA	-	-	-
S. itararensis (Kraenzl.) Hoehne	FCA	-	-	-
S. juergensii Schltr.	FCA	-	-	-
S. metallica (Rolfe) Schltr.	FCA	-	-	-
S. uliginosa Barb.Rodr.	FCA	-	-	-
S. umbrosa (Barb.Rodr.) Schltr.	FCA	-	-	-
S. ventricosa (Vell.) Hoehne	FCA	-	-	-
*Saundersia** – 2/2				
S. miriabilis Rchb.f.*	FOD	-	-	-
S. paniculata Brade*	FOD	-	-	-
Sauroglossum – 2/12				
S. nitidum (Vell.) Schltr.	FOD, FOM	-	-	-
S. organense Szlach.*	?	-	-	-
Scaphyglottis – 6/65				
S. brasiliensis (Schltr.) Dressler*	FOD, FOM	-	-	-
S. emarginata (Garay) Dressler	FOD, FOM	-	-	-
S. fusiformis (Griseb.) Schult.	FOD, FOM	-	-	-
S. livida (Lindl.) Schltr.	FOD, FOM	-	-	-
S. modesta (Rchb.f.) Schltr.	FOD, FOM, RST	-	-	-
S. prolifera (R.Br.) Cogn.*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Schomburkgia – 1/15				
S. gloriosa Rchb.f.	FOM	-	-	-
Schunkea – 1/1				
S. vierlingii Senghas	FOD	-	-	-
Scuticaria – 4/8				
S. hadwenii Hook.*	FOD	-	-	-
S. kautskyi Pabst*	FOD	-	-	-
S. novaesii F.Barros & Catharino*	FOD	-	-	-
S. strictifolia Hoehne*	FOD	-	-	-
Skeptrostachys – 7/12				
S. arechavaletanii (Barb.Rodr.) Garay*	FCA	-	-	-
S. balanophorostachya (Rchb.f. & Warm.) Garay	FCA	-	-	-
S. congestiflora (Cogn.) Garay	FCA	-	-	-
S. gigantea (Cogn.) Garay	FCA	-	-	-
S. montevidensis (Barb.Rodr.) Garay*	FCA	-	-	-
S. paraguayensis (Rchb.f.) Garay	FCA	-	-	-
S. rupestris (Lindl.) Garay	FCA	-	-	-
Sobralia – 2/120				
S. liliastrum Lindl.	FOM, AFL, RST	-	-	-
S. sessilis Lindl.	FOM, RST, AFL	-	-	-
Sophronitis – 2/3				
S. alagoensis V.P.Castro & Chiron*	FOD	-	-	-
S. cernua Lindl.	FOD, FOM	-	-	-
Specklinia – 47/100				
S. acutidentata (Cogn.) Luer*	FOD	-	-	-
S. bacillaris (Pabst) Luer*	FOD	-	-	-
S. barbosana (De Wild.) Campacci*	FOD	-	-	-
S. bradei (Schltr.) Luer*	FOD	-	-	-
S. calcarata (Cogn.) Luer*	FOD	-	-	-
S. campestris (Barb.Rodr.) Luer*	FES, FCA	-	-	-
S. carinifera (Barb.Rodr.) Luer*	FOD	-	-	-
S. carrisii (Brade) Luer*	RST	-	-	-
S. castellensis (Brade) Luer*	FOD	-	-	-
S. conspersa (Hoehne) Luer*	FOD	-	-	-
S. cordilabia (Pabst) Luer*	FOD	-	-	-
S. curti-bradei (Pabst) Luer*	FOD	-	-	-
S. deltoglossa (Cogn.) Luer*	FOD	-	-	-
S. elegantula (Cogn.) Luer*	FOD	-	-	-
S. filiformis (Cogn.) Luer*	FOD	-	-	-
S. fluminensis (Pabst) Luer*	FOD	-	-	-
S. garayi (Pabst) Luer*	FOD	-	-	-
S. gomes-ferreirae (Pabst) Luer*	FOM	-	-	-
S. grobyi (Batem. *ex* Lindl.) F.Barros	FOD, FOM	-	-	-
S. leucosepala (Loefgr.) Luer*	FOD	-	-	-
S. lineolata (Barb.Rodr.) Luer*	FOM	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
S. lingua (Lindl.) Luer*	FOD, FOM	-	-	-
S. marginalis (Rchb.f.) F.Barros	FOD	-	-	-
S. matinhensis (Hoehne) Luer*	FOM	-	-	-
S. miniatolineolata (Hoehne) F.Barros*	FOD	-	-	-
S. miragliae (J.E.Leite) Luer*	FOD	-	-	-
S. mouraeoides (Hoehne) F.Barros*	FOD	-	-	-
S. parvifolia (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase*	FOD, FOM	-	-	-
S. pleurothalloides (Cogn.) Luer*	FOD	-	-	-
S. podoglossa (Hoehne) Luer*	FOD	-	-	-
S. pristeoglossa (Rchb.f. & Warm.) Luer	FOM, FES	-	-	-
S. punctatifolia (Barb.Rodr.) Luer*	FOD	-	-	-
S. quadridentata (Barb.Rodr.) Luer*	FOD, FOM	-	-	-
S. ramphastorhyncha (Barb.Rodr.) F.Barros*	FOD, FOM	-	-	-
S. robertoi Luer & Toscano*	FOD	-	-	-
S. rubrolineata (Hoehne) F.Barros*	FOD	-	-	-
S. ruschii (Hoehne) Luer*	FOD	-	-	-
S. seriata (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase*	FOD, FOM	-	-	-
S. sordida (Kraenzl.) Luer	FOD, FOM	-	-	-
S. spathuliglossa (Hoehne) Luer*	FOD	-	-	-
S. subpicta (Schltr.) F.Barros*	FOD	-	-	-
S. tenera (Barb.Rodr.) Luer*	FOD	-	-	-
S. transparens (Schltr.) Luer*	FOD	-	-	-
S. tricolor (Barb.Rodr.) Luer*	FOD, FOM	-	-	-
S. trifida (Lindl.) F.Barros*	FOD	-	-	-
S. uniflora (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase*	FOD, FOM	-	-	-
S. wacketii (Handro & Pabst) Luer*	FOD	-	-	-
Stanhopea – 3/55				
S. guttulata Lindl.*	FOD	-	-	-
S. insignis Frost *ex* Hook.*	FOD	-	-	-
S. lietzei (Regel) Schltr.*	FOD, FOM	-	-	-
Stelis – 27/400				
S. aprica Lindl.*	FOD	-	-	-
S. aquinoana Schltr.*	FOD	-	-	-
S. argentata Lindl.	FOD	-	-	-
S. chlorantha Barb.Rodr.*	FOD	-	-	-
S. deregularis Barb.Rodr.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
S. fraterna Lindl.*	FOD	-	-	-
S. gigas Barb.Rodr.*	FOM	-	-	-
S. intermedia Poepp. & Endl.	FES	-	-	-
S. itatiayae Schltr.*	FOD	-	-	-
S. leiningii Pabst*	FOD	-	-	-
S. loefgrenii Cogn.*	FOD	-	-	-
S. megantha Barb.Rodr.	FOD, FOM	-	-	-
S. minutiflora (Hoffmanns.) Rchb.f. *ex* Hoffmanns.*	FOD, FOM	-	-	-
S. modesta Barb.Rodr.*	FOM	-	-	-
S. oligantha Barb.Rodr.*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
S. palmeirensis Barb.Rodr.*	FOD	-	-	-
S. papaquerensis Rchb.f.	FOD, FOM	-	-	-
S. parvifolia Garay*	FOD	-	-	-
S. parvula Lindl.	FOD, FOM	-	-	-
S. pauciflora Lindl.*	FOD, FOM	-	-	-
S. pauloensis Hoehne & Schltr.*	FOD	-	-	-
S. peliochyla Barb.Rodr.*	FOD	-	-	-
S. porschiana Schltr.*	FOD	-	-	-
S. ruprechtiana Rchb.f.*	FOD	-	-	-
S. schenkii Schltr.*	FOD	-	-	-
S. thermophila Schltr.*	FOM	-	-	-
S. triangularis Barb.Rodr.*	FOD	-	-	-
Stenia – 1/12				
S. bohnkiana V.P.Castro & G.F.Carr*	FOD	-	-	-
Stigmatosema – 5/12				
S. garayana Szlach.*	FCA	-	-	-
S. hatschbachii (Pabst) Garay*	FCA	-	-	-
S. odileana Szlach.*	?	-	-	-
S. pedicellata Szlach.*	FOD	-	-	-
S. polyaden (Vell.) Garay	FOD	-	-	-
*Thysanoglossa** – 2/2				
T. jordanensis Porto & Brade*	FOD	-	-	-
T. organensis Brade*	FOD	-	-	-
Trichocentrum – 2/25				
T. fuscum Lindl.	FOD, FOM	-	-	-
T. tenuiflorum Lindl.	FOD, FOM	-	-	-
Trichopilia – 1/25				
T. santos-limae Brade*	FOD	-	-	-
Trichosalpinx – 4/120				
T. dura (Lindl.) Luer*	FOD	-	-	-
T. mathildae (Brade) Toscano & Luer*	FOD	-	-	-
T. montana (Barb.Rodr.) Luer*	FOD	-	-	-
T. pterophora (Cogn.) Luer*	FOD	-	-	-
Trigonidium – 4/14				
T. macranthum Barb.Rodr.	FOM, FES	-	-	-
T. acuminatum Batem. *ex* Lindl.	FOM	-	-	-
T. latifolium Lindl.	FOM, FES	-	-	-
T. obtusum Lindl.	FOM	-	-	-
Trizeuxis – 1/1				
T. falcata Lindl.	FOD, FOM	-	-	-
Uleiorchis – 1/2				
U. ulaei (Cogn.) Handro	FOM	-	-	-
Vanilla – 12/110				
V. angustipetala Schltr.	FOM, RST	-	-	-
V. bahiana Hoehne	FOM, RST	-	-	-
V. bertoniensis Bertoni*	FOM	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
V. chamissonis Klotzsch	RST, FCA	-	-	-
V. denticulata Pabst*	RST	-	-	-
V. dubia Hoehne	RST, FCA	-	-	-
V. dungsii Pabst*	FOD	-	-	-
V. edwallii Hoehne*	FOD	-	-	-
V. organensis Rolfe	FOD	-	-	-
V. palmarum (Salzm. *ex* Lindl.) Lindl.	FES	-	-	-
V. parvifolia Barb.Rodr.*	FOD	-	-	-
V. rojasiana Hoehne*	FOD	-	-	-
Veyretia – 4/9				
V. hassleri (Cogn.) Szlach.	RST, FCA	-	-	-
V. rupicola (Garay) F.Barros	FCA	-	-	-
V. simplex (Griseb.) Szlach.	FCA	-	-	-
V. undulata Szlach.*	FCA	-	-	-
Warczewiczella – 2/12				
W. candida (Lindl.) Rchb.f.*	FOD, FOM	-	-	-
W. wailesiana (Lindl.) Rchb.f. *ex* Morren*	FOM, RST	-	-	-
Warmingia – 1/5				
W. eugenii Rchb.f.	FOD, FES	-	-	-
Warrea – 1/4				
W. warreana (Lodd. *ex* Lindl.) C.Schweinf.	FOD	-	-	-
Wullschlaegelia – 1/3				
W. aphylla Rchb.f.	FOD	-	-	-
Xylobium – 2/32				
X. colleyi (Batem. *ex* Lindl.) Rolfe	FOD	-	-	-
X. variegatum (Ruiz & Pav.) Mansf.	FOD	-	-	-
Zootrophion – 1/12				
Z. atropurpureum (Lindl.) Luer*	FOD	-	-	-
Zygopetalum – 10/10				
Z. brachypetalum Lindl.*	FOD	-	-	-
Z. crinitum Lodd.*	FOD	-	-	-
Z. ghillanyi Pabst*	FCA	-	-	-
Z. intermedium Lodd.*	FOM, RST	-	-	-
Z. mackayi Hook.*	FOD	-	-	-
Z. maxillare Lodd.	FOM	-	-	-
Z. pabstii Toscano*	FCA	-	-	-
Z. pedicellatum (Thumb.) Garay*	FOD, FOM	-	-	-
Z. reginae Pabst*	FCA	-	-	-
Z. triste Barb.Rodr.	FCA	-	-	-
Zygostates – 15/20				
Z. alleniana Kraenzl.	FOD, FOM, FES	-	-	-
Z. bradei (Schltr.) Garay*	FOD	-	VU	ANEXO II
Z. cornigera (Cogn.) Toscano*	FOD	-	-	-
Z. cornuta Lindl.*	FOD, FOM	-	-	-
Z. dazhyrhiza (Kraenzl.) Schltr.*	FOD, FOM	-	-	-
Z. grandiflora (Lindl.) Mansf.*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Z. kuhlmannii Brade*	FOD	-	-	-
Z. linearisepala (Senghas) Toscano*	FOD	-	-	-
Z. lunata Lindl.*	FOD	-	-	-
Z. multiflora (Rolfe) Schltr.*	FOD	-	-	-
Z. octavioreisii Porto & Brade	FOD, FOM	-	-	-
Z. ovatipetala (Brade) Toscano*	FOD	-	-	-
Z. papillosa Cogn.*	FOD	-	-	-
Z. pellucida Rchb.f.*	FOD	-	-	-
Z. pustulata (Kraenzl.) Schltr.*	FOD	-	-	-

Orobanchaceae

Vinícius Castro Souza

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
OROBANCHACEAE – 24/2.000				
Agalinis – 6/40				
A. bandeirensis Barringer*	FCA	-	CR	ANEXO II
A. communis (Cham. & Schltdl.) D´Arcy	FCA	-	-	-
A. genistifolia (Cham. & Schltdl.) D´Arcy	FCA	-	-	-
A. linarioides (Cham. & Schltdl.) D´Arcy*	FCA	-	-	-
A. ramosissima (Benth.) D´Arcy*	FCA	-	-	-
A. ramulifera Barringer*	FCA	-	EN	ANEXO II
Buchnera – 7/100				
B. amethystina Cham. & Schltdl.*	FCA	-	-	-
B. integrifolia Larrañaga	FCA	-	-	-
B. juncea Cham. & Schltdl.	FCA	-	-	-
B. lavandulacea Cham. & Schltdl.	FCA	-	-	-
B. longifolia Kunth	FCA	-	-	-
B. rosea Kunth	FCA	-	-	-
B. ternifolia Kunth	FCA	-	-	-
Castilleja – 1/200				
C. arvensis Schltdl. & Cham.	FCA	-	-	-
Escobedia – 1/15				
E. grandiflora (L.f.) Kuntze	FCA	-	-	-
Esterhazya – 3/5				
E. eitenorum Barringer*	FCA	-	-	-
E. macrodonta (Cham.) Benth.	FCA	-	-	-
E. splendida J.C.Mikan	FCA	-	-	-
*Magdalenaea** – 1/1				
M. limae Brade*	FCA	-	CR	ANEXO I
Melasma – 2/60				
M. melampyroides (Rich.) Pennell	FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
M. rhinanthoides (Cham.) Benth.	FCA	-	-	-
*Nothochilus** – 1/1				
N. coccineus Radlk.*	FCA	-	CR	ANEXO I
Velloziella – 2/3				
V. dracocephaloides (Vell.) Baill.*	FCA	-	-	-
V. westermanii Dusén*	FCA	-	-	-

Oxalidaceae

Maria Carolina de Abreu & Pedro Fiaschi

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
OXALIDACEAE – 64/600				
Biophytum – 1/80				
B. mimosoides (A.St.-Hil.) Guillaumin	FOD	-	-	-
Oxalis – 63/500				
O. alata Mart. *ex* Zucc.*	FOD, FES	-	-	-
O. alvimii Lourteig*	FOD, RST	-	-	-
O. aptera Zucc. *ex* Progel*	FOD, FES	-	-	-
O. arachnoidea Progel*	FCA	-	VU	ANEXO II
O. articulata Savigny	FOD, FOM, FCA	-	-	-
O. barrelieri L.	FOD, FES	-	-	-
O. bela-vitoriae Lourteig*	FOD	-	VU	ANEXO II
O. bifrons Progel*	FES	-	-	-
O. bipartita A.St.-Hil.	FOM, FES, FCA	-	-	-
O. bisecta Norlind*	FCA	-	-	-
O. blackii Lourteig*	FOD	-	-	-
O. brasiliensis Lodd.	FOD, FCA, AFL	-	-	-
O. calva Progel	FCA, AFL	-	-	-
O. clausenii Lourteig*	FOD	-	-	-
O. confertissima A.St.-Hil.*	FCA	-	-	-
O. conorrhiza Jacq.	FCA	-	-	-
O. corniculata L.	FOD, FOM, FES, FCA, AFL, RST	-	-	-
O. cratensis Hook.	FOD, FES	-	-	-
O. cytisoides Mart. *ex* Zucc.	FOD, FES	-	-	-
O. debilis Kunth	FOD, FOM, FES, FCA, RST	-	-	-
O. divaricata Mart. *ex* Zucc.	FES, FCA	-	-	-
O. doceana Lourteig*	FOD	-	EN	ANEXO II

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
O. floribunda Lehm.	FOM, FCA	-	-	-
O. frutescens L.	FCA, FES, FOD	-	-	-
O. fruticosa Raddi*	FOD, RST	-	-	-
O. geralensis Knuth*	FOD, FES	-	-	-
O. hedysarifolia Raddi	FOD, FES, FCA	-	-	-
O. hepatica Norlind*	FOM, FCA	-	-	-
O. hispidula Zucc.	AFL, FOD, FOM, FES	-	-	-
O. hyalotricha Lourteig*	FES, FCA	-	-	-
O. impatiens Vell.*	FOD	-	-	-
O. irreperta Lourteig*	FOD	-	-	-
O. kuhlmannii Lourteig*	FOD	-	VU	ANEXO II
O. lasiopetala Zucc.	FES, FCA	-	-	-
O. latifolia Kunth	FOD, FES, FCA	-	-	-
O. linarantha Lourteig*	FES, FOM	-	-	-
O. mandioccana Raddi*	FOD, FES	-	-	-
O. myriophylla A.St.-Hil.*	FCA	-	-	-
O. neuwiedii Zucc.*	FES	-	-	-
O. niederleiniana Hieron. *ex* Knuth*	FES	-	-	-
O. niederleinii Knuth	FOM, FES, FCA	-	-	-
O. odonellii Lourteig*	FOM, FCA	-	-	-
O. paranaensis Lourteig*	FOD, FOM	-	VU	ANEXO II
O. perdicaria (Molina) Bertero	FES, FCA	-	-	-
O. polymorpha Mart. *ex* Zucc.*	FOD, FCA	-	-	-
O. potamophila Lourteig*	FES, FOD, AFL	-	-	-
O. praetexta Progel*	FCA	-	VU	ANEXO II
O. psoraleoides Kunth	FCA, FES, AFL	-	-	-
O. puberula Nees & Mart.	FES	-	-	-
O. refracta A.St.-Hil.	AFL, FCA	-	-	-
O. renifolia Knuth	FES	-	-	-
O. rhombeo-ovata A.St.-Hil.	AFL, FES, FOD	-	-	-
O. riparia Norlind*	FOD, AFL	-	-	-
O. rupestris A.St.-Hil.	FES, FOD, FOM, FCA	-	-	-
O. sarmentosa Zucc.*	FOM, FCA	-	-	-
O. sellowii Spreng.*	FES	-	-	-
O. sepium A.St.-Hil.	FOD, FES	-	-	-
O. serpens A.St.-Hil.*	FOM, FCA	-	-	-
O. subvillosa Norlind*	FOD, AFL	-	-	-
O. telmatica Lourteig*	FOD, FCA	-	-	-
O. tenerrima Knuth	FOD, FCA	-	-	-
O. triangularis A.St.-Hil.	FOD, FES, FCA	-	-	-
O. umbraticola A.St.-Hil.	FOD, FES	-	-	-

Passifloraceae

Armando Carlos Cervi, Luís Carlos Bernacci & Dilma Silva Nascimento

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
PASSIFLORACEAE – 69/630				
Mitostemma – 1/3				
M. glaziovii Mast.	FOD, FED	-	-	-
Passiflora – 68/450				
P. actinia Hook.*	FOD, FOM	-	-	-
P. alata Curtis	FOD, FOM, FES	-	-	-
P. amethystina J.C.Mikan	FOD, FOM, FES	-	-	-
P. bahiensis Klotzsch	RST	-	-	-
P. boticarioana Cervi*	FED	-	-	-
P. caerulea L.	FOM	-	-	-
P. campanulata Mast.	FOD	-	-	-
P. capsularis L.	FOD, FOM, FES	-	-	-
P. catharinensis Sacco*	FOD	-	-	-
P. chlorina L.Escobar*	FOD	-	-	-
P. chrysophylla Chodat	FOD	-	-	-
P. cincinnata Mast.	FES, FCA	-	-	-
P. clathrata Mast.	FCA	-	-	-
P. contracta Vitta*	FOD	-	-	-
P. deidamioides Harms*	FOD	-	-	-
P. edmundoi Sacco	FED	-	-	-
P. edulis Sims	FOD, FOM, FES, FCA, RST	-	-	-
P. eichleriana Mast.	FOD	-	-	-
P. elegans Mast.	FOD	-	-	-
P. elliptica Gardner*	FOD	-	-	-
P. farneyi Pessoa & Cervi*	RST	-	-	-
P. filamentosa Cav.	FOD, FED	-	-	-
P. foetida L.	FOD	-	-	-
P. galbana Mast.	FOD, FES	-	-	-
P. glaucescens Killip	FOD, FES	-	-	-
P. haematostigma Mart. *ex* Mast.*	FOD, FOM	-	-	-
P. hatschbachii Cervi*	FES, FED	-	VU	ANEXO I
P. hypoglauca Harms*	FOD, FES, FED	-	-	-
P. imbeana Sacco*	FOD	-	VU	ANEXO I
P. ischnoclada Harms*	FOD	-	VU	ANEXO I
P. jilekii Wawra*	FOD, RST	-	-	-
P. kermesina Link & Otto*	FOD	-	-	-
P. lepidota Mast.	FCA	-	-	-
P. loefgrenii Vitta	FOD	-	-	-
P. malacophylla Mast.	FOD, FED	-	-	-
P. marginata Mast.*	FOD	-	-	-
P. mendoncae Harms	FOD	-	-	-
P. miersii Mast.	FES, FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
P. misera Kunth	FOD, FOM, FES	-	-	-
P. morifolia Mast.	FES, FCA	-	-	-
P. mucronata Lam.*	RST	-	-	-
P. odontophylla Harms *ex* Glaz.*	FOD, RST	-	-	-
P. organensis Gardner	FOD, FES	-	-	-
P. ovalis Vell. *ex* Roem.*	FOD, RST	-	-	-
P. pardifolia Vanderpl.	FOD	-	-	-
P. pentagona Mast.*	RST	-	-	-
P. pohlii Mast.	FES, FCA	-	-	-
P. racemosa Brot.*	RST, FOD	-	-	-
P. reitzii Sacco*	FOD	-	-	-
P. rhamnifolia Mast.	FOD, FED	-	-	-
P. rubra L.	FOD, RST	-	-	-
P. saccoi Cervi*	FED	-	VU	ANEXO I
P. saxicola Gontsch.*	FOD	-	-	-
P. setacea DC.	FOD, FES, RST	-	-	-
P. setulosa Killip	FOM	-	-	-
P. sidifolia M.Roemer*	FOD, RST	-	-	-
P. speciosa Gardner*	FOD	-	-	-
P. suberosa L.	FOD, FOM, FES, FCA, AFL	-	-	-
P. subrotunda Mast.*	RST	-	-	-
P. tenuifila Killip	FOD, FES	-	-	-
P. tricuspis Mast.	FES, FCA	-	-	-
P. trintae Sacco*	FOD	-	-	-
P. truncata Regel*	FOD	-	-	-
P. urnifolia Rusby	FES, FCA	-	-	-
P. urubiciensis Cervi*	FOD	-	VU	ANEXO II
P. vellozoi Gardner*	FOD	-	-	-
P. villosa Vell.	FOD, FOM	-	-	-
P. watsoniana Mast.*	FOD	-	-	-

Pentaphyllacaceae

Marcos Sobral

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
PENTAPHYLLACACEAE– 4/337				
Ternstroemia – 4/100				
T. alnifolia Wawra	FOD	-	-	-
T. brasiliensis Cambess.	FOD, RST	-	-	-
T. carnosa Cambess.	FES			
T. cuneifolia Gardner*	FCA, FOD	-	-	-

Peraceae

João Renato Stehmann

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
PERACEAE – 6/140				
Chaetocarpus – 2/13				
C. echinocarpus (Baill.) Ducke	FOD	-	-	-
C. myrsinites Baill.	FOD	-	-	-
Pera – 3/ca.30				
P. barbinervis (Mart. *ex* Klotzsch.) Pax & K.Hoffm.	FES	-	-	-
P. glabrata (Schott) Baill.*	FOD, FES, RST	-	-	-
P. heteranthera I.M.Johnst*	FOD, FES	-	-	-
Pogonophora – 1/3				
P. schomburgkiana Benth.	FOD, FES, RST	-	-	-

Phyllanthaceae

João Renato Stehmann

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
PHYLLANTHACEAE – 43/1.800				
Amanoa – 1/16				
A. guianensis Aubl.	FOD, RST	-	-	-
Astrocasia – 1/5				
A. jacobinensis (Müll.Arg.) G.L.Webster	FES, FED	-	-	-
Discocarpus – 2/3				
D. essequeboensis Klotzsch	FOD	-	-	-
D. pedicellatus Fiaschi & Cordeiro*	FES	-	-	-
*Gonatogyne** – 1/1				
G. brasiliensis (Baill.) Müll.Arg.*	FES	-	-	-
Hieronyma– 2/40				
H. alchorneoides Allemão	FOD, FES	-	-	-
H. oblonga (Tul.) Müll.Arg.	FES	-	-	-
Margaritaria – 1/14				
M. nobilis L.f.	FOD, FES	-	-	-
Meineckia – 1/20				
M. neogranadensis (Müll.Arg.) G.L.Webster	FES	-	-	-
Phyllanthus – 30/ca. 750				
P. acuminatus Vahl	FES, FED	-	-	-
P. acutifolius Spreng.*	FOD, FCA	-	-	-
P. almadensis Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
P. amarus Schum. & Thonn.	RUD	-	-	-
P. arenicola Casar.*	FOD, FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
P. caparoensis G.L.Webster*	FCA	-	-	-
P. caroliniensis Walt.	RUD	-	-	-
P. carvalhoi G.L.Webster*	FOD	-	-	-
P. claussenii Müll.Arg.	FES	-	-	-
P. debilis Willd.	RUD	-	-	-
P. glaziovii Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
P. gradyi M.J.Silva & M.F.Sales*	FOD, FES	-	-	-
P. heteradenius Müll.Arg.	RST	-	-	-
P. hypoleucus Müll.Arg.*	FOD, FES	-	-	-
P. itatiaiensis Brade*	FCA, AFL	-	-	-
P. juglandifolius Willd.	FOD, FES	-	-	-
P. klotzschianus Müll.Arg.	RST, AFL	-	-	-
P. lindbergii Müll.Arg.	FCA	-	-	-
P. minutulus Müll.Arg.	FOD, RST	-	-	-
P. mocotensis G.L.Webster*	FOD	-	-	-
P. niruri L.	RUD	-	-	-
P. orbiculatus L.C.Rich.	FOD	-	-	-
P. perpusillus Baill.*	FCA	-	-	-
P. piranii G.L.Webster*	FOD	-	-	-
P. rosellus (Müll.Arg.) Müll.Arg.	FOD	-	-	-
P. stipulatus (Raf.) Webster	FOD	-	-	-
P. subemarginatus Müll.Arg.	FOD	-	-	-
P. tenellus Roxb.	RUD	-	-	-
P. umbrathus Müll.Arg.*	FOD, FES	-	-	-
P. urinaria L.	RUD	-	-	-
Richeria – 1/2				
R. grandis Vahl	FES	-	-	-
Savia – 3/25				
S. brasiliensis Pax & K.Hoffm.*	FOD, FES	-	-	-
S. dictyocarpa Müll.Arg.*	FOD, FES	-	-	-
S. sessiliflora (Sw.) Willd.	RST	-	-	-

Phytolaccaceae

Maria Salete Marchioretto

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
PHYTOLACCACEAE – 8/65				
Gallesia – 1/1				
G. integrifolia (Spreng.) Harms	FOD	-	-	-
Hilleria – 1/3				
H. latifolia (Lam.) H.Walter	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Phytolacca – 2/25				
P. dioica L.	FES	-	-	-
P. thyrsiflora Fenzl *ex* Schmidt	FOM	-	-	-
Seguieria – 3/6				
S. aculeata Jacq.	FOM	-	-	-
S. americana L.	FOD	-	-	-
S. langsdorffii Moq.	FOD	-	-	-
Trichostigma – 1/3				
T. octandrum (L.) H.Walter	FOD	-	-	-

Picramniaceae

José Rubens Pirani

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
PICRAMNIACEAE – 12/50				
Picramnia – 12/50				
P. andrade-limae Pirani*	FOD, RST	-	-	-
P. bahiensis Turcz.*	RST, FES	-	-	-
P. ciliata Mart.*	FOD, FES	-	-	-
P. coccinea W.W.Thomas*	FOD, RST	-	VU	ANEXO I
P. elliptica Kuhlm. *ex* Pirani	FES	-	-	-
P. excelsa Kuhlm. *ex* Pirani*	FOM	-	-	-
P. gardneri Planch.*	FOD, FES	-	-	-
P. glazioviana Engl.	FOD, FES, RST	-	-	-
P. grandifolia Engl.*	FOD	-	-	-
P. parvifolia Engl.	FOD, FOM, FED, FES, RST, MAN	-	-	-
P. ramiflora Planch.	FOD, FES	-	-	-
P. sellowii Planch.	FOD, FED, FES	-	-	-

Picrodendraceae

Flávio Dayrell Gontijo

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
PICRODENDRACEAE – 1/80				
Paradrypetes – 1/2				
P. ilicifolia Kuhlm.*	FOD, FES	-	-	-

Piperaceae

Elsie Franklin Guimarães & Erika von Sohsten Medeiros

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
PIPERACEAE – 267/3.615				
Manekia – 1/6				
M. obtusa (Miq.) Arias *et al.*	FOD	-	-	-
Ottonia – 5/25				
O. albopunctata Trel.	FOD	-	-	-
O. angustifolia Rizzini*	FOD	-	-	-
O. peltata E.F.Guim. & Ichaso*	FOD	-	-	-
O. sampaioi Yunck.	FOD	-	-	-
O. villosa Yunck.*	FOD	-	-	-
Peperomia – 125/1.000				
P. aceroana C.DC.	FES	-	-	-
P. acuminata Ruiz & Pav.	FOD	-	-	-
P. adsurgens Yunck.	FOD	-	-	-
P. alata Ruiz & Pav.	FOD	-	-	-
P. apiahyensis Yunck.*	FOD	-	-	-
P. arbuscula Yunck.*	FOD	-	-	-
P. argyreia (Miq.) E.Morr.	FOD	-	-	-
P. arifolia Miq.	FOD	-	-	-
P. arifolioides Yunck.	FES	-	-	-
P. armondii Yunck.*	FOD	-	-	-
P. augescens Miq.*	FOD	-	-	-
P. balansana C.DC.	FES	-	-	-
P. barbarana C.DC.	FOD	-	-	-
P. blanda (Jacq.) Kunth	FOD	-	-	-
P. bradei Yunck.*	FOD	-	-	-
P. brasiliensis (Miq.) Miq.*	FOD	-	-	-
P. calophylla Yunck.*	FOD	-	-	-
P. campinasana Yunck.*	FOD	-	-	-
P. casteloensis Yunck.	FOD	-	-	-
P. catharinae Miq.	FOD	-	-	-
P. caulibarbis Miq.	FOD	-	-	-
P. choroniana C.DC.*	FOD	-	-	-
P. ciliatocaespitosa Carv.-Silva & E.F.Guim.*	FOD	-	-	-
P. circinnata Link	FOD	-	-	-
P. clivicola Yunck.*	FOD	-	-	-
P. cooperi C.DC.*	FOD	-	-	-
P. corcovadensis Gardner	FOD	-	-	-
P. cordigera Dahlst.	FOD, FCA	-	-	-
P. crinicaulis C.DC.	FOD	-	-	-
P. crypticola C.DC.*	FCA	-	-	-
P. decipiens C.DC.	FOD	-	-	-
P. decora Dahlst.	FCA	-	-	-
P. delicatula Henschen	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
P. diaphanoides Dahlst.	FOD	-	-	-
P. dichotoma Regel*	FOD	-	-	-
P. distachya (L.) A.Dietr.*	FOD	-	-	-
P. duartei Yunck.*	FOD, FCA	-	-	-
P. effusa Yunck.	FES	-	-	-
P. elongata Kunth	FOD, FES	-	-	-
P. emarginella (Sw.) C.DC.	RST FOD	-	-	-
P. flexicaulis Wawra	FOD	-	-	-
P. galioides Kunth	FOD	-	-	-
P. gardneriana Miq.	FOD	-	-	-
P. glabella (Sw.) A.Dietr.	FOD	-	-	-
P. glazioui C.DC.	FOD	-	-	-
P. gracilicaulis Yunck.*	FOD	-	-	-
P. gracilis Dahlst.*	FOD	-	-	-
P. guarujana C.DC.*	FOD	-	-	-
P. hemmendorffii Yunck.*	FOD, FCA	-	-	-
P. hernandiifolia (Vahl) A.Dietr.	FOD	-	-	-
P. hilariana Miq.	FOD	-	-	-
P. hispidosa Dahlst.	FOD	-	-	-
P. humifusa Yunck.*	FOD	-	-	-
P. hydrocotyloides Yunck.*	FOD	-	-	-
P. ibiramana Yunck.*	FOD	-	-	-
P. incana (Haw.) Hook.*	FOD	-	-	-
P. itatiaiana Yunck.*	FOD	-	-	-
P. loefgrenii Yunck.*	FOD	-	-	-
P. loxensis Kunth	FOD	-	-	-
P. lyman-smithii Yunck.*	FOD	-	-	-
P. magnoliifolia (Jacq.) A.Dietr.	FOD, FES	-	-	-
P. mandioccana Miq.	FOD	-	-	-
P. mandonii C.DC.	FOD	-	-	-
P. marcoana C.DC.*	FCA	-	-	-
P. martiana Miq.	FOD	-	-	-
P. megapotamica Dahlst.	FOD	-	-	-
P. minensis Henschen	FOD	-	-	-
P. misionensis Yunck.	FES	-	-	-
P. morungavana Yunck.*	FOD	-	-	-
P. mosenii Dahlst.	FOD	-	-	-
P. nitida Dahlst.*	FOD, FCA	-	-	-
P. obtusifolia (L.) A.Dietr.	FOD, FES	-	-	-
P. oreophila Henschen	FOD, FCA	-	-	-
P. ouabianae C.DC.	FOD	-	-	-
P. papillispica C.DC.*	FOD	-	-	-
P. parcifolia C.DC.	FOD	-	-	-
P. pellucida (L.) Kunth	FOD	-	-	-
P. pereirae Yunck.*	FOD	-	-	-
P. pereskiifolia (Jacq.) Kunth	FOD, RST	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
P. perlongicaulis Yunck.	FOD	-	-	-
P. pernambucensis Miq.	FOD	-	-	-
P. polysachyoides Dahlst.	FOD	-	-	-
P. prostrata Hort.	FCA	-	-	-
P. pseudobcordata Yunck.*	FOD	-	-	-
P. pseudoestrellensis C.DC.	FOD	-	-	-
P. psilostachya C.DC.	FOD	-	-	-
P. pubipeduncula Yunck.*	FOD	-	-	-
P. punicea Dahlst.*	FOD	-	-	-
P. quadrifolia (L.) Kunth	FOD	-	-	-
P. ramboi Yunck.	FOD	-	-	-
P. renifolia Dahlst.*	FOD	-	-	-
P. retivenulosa Yunck.*	FOD	-	-	-
P. rhombea Ruiz & Pav.	FOD	-	-	-
P. riedeliana Regel*	FOD	-	-	-
P. rizzinii Yunck.*	FOD	-	-	-
P. rostulatiformis Yunck.*	FOD	-	VU	ANEXO II
P. rotundifolia (L.) Kunth	FOD	-	-	-
P. rubricaulis (Nees) A.Dietr.	FOD	-	-	-
P. rufispica Yunck.*	FOD	-	-	-
P. rusbyi C.DC.	FES	-	-	-
P. schenkiana Dahlst.	FOD	-	-	-
P. schwackei C.DC.	FOD, FES	-	-	-
P. serpens (Sw.) Loud.	FOD	-	-	-
P. serpentarioides Miq.*	FOD	-	-	-
P. stenocarpa Regel*	FOD	-	-	-
P. stroemfeltii Dahlst.*	FOD	-	-	-
P. subemarginata Yunck.*	FOD	-	-	-
P. subopposititifolia Yunck.*	FOD	-	VU	ANEXO II
P. subpubistachya Yunck.	FES	-	-	-
P. subretusa Yunck.	FOD	-	-	-
P. subrubricaulis C.DC.	FCA	-	-	-
P. subsetifolia Yunck.*	FOD	-	-	-
P. subternifolia Yunck.	FOD	-	-	-
P. tenella (Sw.) A.Dietr.	FOD	-	-	-
P. tetraphylla (G.Forst.) Hook. & Arn.	FOD	-	-	-
P. transparens Miq.	FOD	-	-	-
P. trapezoidalis Yunck.	FES	-	-	-
P. trichocarpa Miq.*	FOD	-	-	-
P. trinervis Ruiz & Pav.	FOD	-	-	-
P. trineura Miq.	FOD	-	-	-
P. trineuroides Dahlst.	FOD	-	-	-
P. turbinata Dahlst.	FOD, FES	-	-	-
P. urocarpa Fisch. & C.A.Mey.	FOD, FES	-	-	-
P. velloziana Miq.	FOD	-	-	-
P. warmingii C.DC.	FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Piper – 135/1.000				
P. abbadianum Yunck.	FCA	-	-	-
P. abutiloides Kunth*	FOD	-	-	-
P. aduncum L.	FOD, FCA	-	-	-
P. aequale Vahl	FOD	-	-	-
P. aequilaterum C.DC.	FOD	-	-	-
P. alatipetiolatum Yunck.	FOD	-	-	-
P. alnoides Kunth*	FOD	-	-	-
P. amalago L.	FOD, RST	-	-	-
P. amparoense Yunck.*	FOD	-	-	-
P. amplum Kunth	FOD	-	-	-
P. anisum (Spreng.) Angely	FOD	-	-	-
P. anostachyum Yunck.	FOD	-	-	-
P. arboreum Aubl.	FOD	-	-	-
P. bahianum Yunck.*	FOD	-	-	-
P. belloi Yunck.*	FOD, FCA	-	-	-
P. bennettianum C.DC.*	FOD	-	VU	ANEXO II
P. bowiei Yunck.*	FOD	-	-	-
P. bradei Yunck.*	FOD	-	-	-
P. cabralanum C.DC.*	FOD	-	-	-
P. caldasianum (Miq.) Yuncker	FCA	-	-	-
P. caldense C.DC.	FOD	-	-	-
P. caracolanum Yunck.*	FOD	-	-	-
P. casteloense Yunck.*	FOD	-	VU	ANEXO II
P. cernuum Vell.	FOD	-	-	-
P. chimonanthifolium Kunth	FOD	-	-	-
P. claussenianum (Miq.) C.DC.	FOD	-	-	-
P. coralfalgense C.DC.*	FOD	-	-	-
P. corcovadensis (Miq.) C.DC.	FOD	-	-	-
P. coruscans Kunth	FOD	-	-	-
P. crassinervium Kunth	FOD, FCA	-	-	-
P. crassistilum Yunck.	FOD	-	-	-
P. crebrinodum C.DC.*	FOD	-	-	-
P. cubataonum C.DC.	FOD	-	-	-
P. cunninghamii Yunck.*	FOD	-	-	-
P. dilatatum Rich.	FOD	-	-	-
P. diospyrifolium Kunth*	FOD	-	-	-
P. divaricatum G.Mey.	FOD	-	-	-
P. edwallii Yunck.*	FOD	-	-	-
P. ellipticifolium Yunck.*	FOD	-	-	-
P. emygdioi Yunck.*	FOD	-	-	-
P. eucalyptophyllum C.DC.	FOD	-	-	-
P. flavicans C.DC.	FOD	-	-	-
P. flavoviride C.DC.*	FOD	-	-	-
P. fuligineum Kunth	FOD, FCA	-	-	-
P. gaudichaudianum Kunth	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
P. gigantifolium C.DC.	FOD	-	-	-
P. glabratum Kunth	FOD	-	-	-
P. goesii Yunck.*	FOD	-	-	-
P. halesiifolium Kunth*	FOD	-	-	-
P. hatschbachii Yunck.	FOD	-	-	-
P. hayneanum C.DC.	FOD	-	-	-
P. hemmendorffii C.DC.*	FOD	-	-	-
P. hexandrum C.DC.*	FOD	-	-	-
P. hillianum C.DC.*	FOD	-	-	-
P. hispidum Sw.	FOD	-	-	-
P. hoehnei Yunck.*	FOD	-	-	-
P. hoffmannseggianum Roem. & Schult.	FOD	-	-	-
P. ilheusense Yunck.*	FOD	-	-	-
P. itatiaianum Yunck.*	FOD	-	-	-
P. jubimarginatum Yunck.*	FOD	-	-	-
P. juliflorum Nees & Mart.*	FOD	-	-	-
P. kleinii Yunck.*	FOD	-	-	-
P. klotzschianum (Kunth) C.DC.	FOD	-	-	-
P. kuhlmannii Yunck.*	FOD	-	VU	ANEXO II
P. laevicarpum Yunck.	FOD	-	EN	ANEXO II
P. lagoaense C.DC.	FOD	-	-	-
P. lanceolatum Ruiz & Pav.	FOD	-	-	-
P. lepturum Kunth	FOD	-	-	-
P. lhotzkyanum Kunth	FOD	-	-	-
P. limae Yunck.*	FOD	-	-	-
P. loefgrenii Yunck.*	FOD	-	-	-
P. longipes C.DC.	FOD	-	-	-
P. lucaeanum Kunth	FOD	-	-	-
P. lundii C.DC.	FOD	-	-	-
P. macedoi Yunck.	FOD	-	-	-
P. malacophyllum C.DC.	FOD	-	-	-
P. mapirense C.DC.	FES	-	-	-
P. marginatum Jacq.	FOD	-	-	-
P. mikanianum (Kunth) Steud.	FOD	-	-	-
P. miquelianum C.DC.	FOD	-	-	-
P. mollicomum Kunth	FOD	-	-	-
P. morisonianum C.DC.*	FOD	-	-	-
P. mosenii C.DC.	FOD	-	-	-
P. mourae Yunck.*	FOD	-	-	-
P. multinodum C.DC.	FOD	-	-	-
P. nervulosum C.DC.*	FOD	-	-	-
P. niteroiense Yunck.*	FOD	-	-	-
P. oblacifolium Yunck.*	FOD	-	-	-
P. obliquum Ruiz & Pav.	FOD	-	-	-
P. ovatum Vahl	FOD	-	-	-
P. pauciramosum Yunck.	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
P. permucronatum Yunck.*	FOD	-	-	-
P. piliovarium Yunck.*	FOD	-	-	-
P. piritubanum Yunck.	FOD	-	-	-
P. pseudopothifolium C.DC.	FOD	-	-	-
P. puberulidrupum Yunck.*	FOD	-	-	-
P. pubisubmarginalum Yunck.*	FOD	-	-	-
P. quadratiovarianum Yunck.	FOD	-	-	-
P. rarum C.DC.*	FOD	-	-	-
P. regnellii (Miq.) C.DC.	FOD, FCA	-	-	-
P. reitzii Yunck.	FOD	-	-	-
P. rhododendrifolium Kunth	FOD	-	-	-
P. richardiifolium Kunth	FOD	-	-	-
P. rioense Yunck.*	FOD	-	VU	ANEXO II
P. rivinoides Kunth	FOD	-	-	-
P. robustipedunculum Yunck.	FOD	-	-	-
P. rumicifolium (Miq.) Yuncker	FOD	-	-	-
P. saldanhae Yunck.*	FOD	-	-	-
P. sampaioi Yunck.	FOD	-	-	-
P. scabrellum Yunck.*	FOD	-	-	-
P. schenckii C.DC.*	FOD	-	-	-
P. scutifolium Yunck.*	FOD	-	-	-
P. sebastianum Yunck.*	FOD	-	-	-
P. setebarraense E.F.Guim. & L.H.P.Costa	FOD	-	-	-
P. solmsianum C.DC.	FOD	-	-	-
P. sprengelianum C.DC.	FOD	-	-	-
P. subcinereum C.DC.	FOD	-	-	-
P. subrugosum Yunck.*	FOD	-	-	-
P. taperanum Yunck.	FOD	-	-	-
P. tectoniifolium Kunth	FOD	-	-	-
P. tenuinerve C.DC.*	FOD	-	-	-
P. translucens Yunck.*	FOD	-	-	-
P. trigonodrupum Yunck.*	FOD	-	-	-
P. truncatum Yunck.*	FOD	-	-	-
P. tuberculatum Jacq.	FOD	-	-	-
P. tucumanum C.DC.	FES	-	-	-
P. ulei C.DC.*	FOD	-	-	-
P. umbellatum L.	FOD	-	-	-
P. vaginans C.DC.*	FCA	-	-	-
P. vellosoi Yunck.	FOD	-	-	-
P. velutinibaccum C.DC.	FOD	-	VU	ANEXO II
P. vissosanum Yunck.	FOD	-	-	-
P. viminifolium Trel.	FOD	-	-	-
P. weddellii C.DC.*	FOD	-	-	-
P. xylosteoides (Kunth) Steud.	FOD	-	-	-
Sarcorhachis – 1/4				
S. schwackei Yunck.*	FOD	-	-	-

Plantaginaceae

Vinícius Castro Souza

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
PLANTAGINACEAE – 51/481				
Achetaria – 3/4				
A. erecta (Spreng.) Wettst.	FOD	-	-	-
A. latifolia V.C.Souza*	RST	-	CR	ANEXO II
A. ocymoides (Cham. & Schltdl.) Wettst.	FOD, RST	-	-	-
Angelonia – 3/25				
A. cornigera Hook.f.	RST	-	-	-
A. integerrima Spreng.	FCA	-	-	-
A. procumbens (Schrad.) Nees & Mart.	FOD	-	-	-
Bacopa – 10/50				
B. aquatica Aubl.	FOD	-	-	-
B. australis V.C.Souza	FOM	-	-	-
B. congesta Chodat & Hassl.	FES, FOD	-	-	-
B. lanigera (Cham. & Schltdl.) Wettst.	FCA	-	-	-
B. monnieri (L.) Pennell	FES, FOD, RST	-	-	-
B. monnierioides (Cham.) Robinson	FOD	-	-	-
B. salzmannii (Benth.) Wettst. ex Edwall	FES	-	-	-
B. scabra (Benth.) Descole & Borsini	FES, FOD	-	-	-
B. serpyllifolia (Benth.) Pennell	FCA	-	-	-
B. stricta (Schrad.) Wettst. ex Edwall	FES, FOD	-	-	-
Conobea – 1/7				
C. scoparioides (Cham. & Schltdl.) Benth.	FOD	-	-	-
Gratiola – 1/20				
G. peruviana L.	FOD	-	-	-
*Ildefonsia** – 1/1				
I. bibracteata Gardner*	FOD	-	CR	ANEXO I
Lindernia – 3/50				
L. crustacea (L.) F.Muell.	FOD	-	-	-
L. diffusa (L.) Wettst.	FOD	-	-	-
L. rotundifolia (L.) Alston	FOD	-	-	-
Mecardonia – 4/6				
M. grandiflora (Benth.) Pennell	FOM, FOD	-	-	-
M. procumbens (Mill.) Small	FOM, FOD	-	-	-
M. pubescens Rossow*	FCA	-	-	-
M. serpylloides (Cham. & Schltdl.) Pennell	FES	-	-	-
Micranthemum – 1/3				
M. umbrosum (Walter ex J.F.Gmel.) Blake	FOD	-	-	-
Otacanthus – 4/5				
O. azureus (Linden) Ronse*	FOD	-	-	-
O. caparaoensis Brade*	FCA	-	-	-
O. fernandesii Ronse*	FOD	-	-	-
O. platychilus (Radlk.) Taub.*	FOD, FCA, RST	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Plantago – 5/200				
P. australis Lam.	FES, FOD	-	-	-
P. catharinea Decne.*	RST	-	-	-
P. guilleminiana Decne.*	FCA	-	-	-
P. lanceolata L.	FOD	-	-	-
P. tomentosa Lam.	FED	-	-	-
Scoparia – 6/10				
S. dulcis L.	FOD, FES, FCA, RST	-	-	-
S. elliptica Cham.*	FOD, FCA	-	-	-
S. ericacea Cham. & Schltdl.	FCA	-	-	-
S. hassleriana Chodat	FCA	-	-	-
S. montevidensis (Spreng.) R.E.Fr.	FCA	-	-	-
S. pinnatifida Cham.*	FCA	-	-	-
Stemodia – 8/50				
S. foliosa Benth.	FOD	-	-	-
S. hyptoides Cham. & Schltdl.	FOM, FOD	-	-	-
S. maritima L.	FOD	-	-	-
S. stricta Cham. & Schltdl.	FOM, FOD	-	-	-
S. trifoliata (Link) Reichb.*	FOD	-	-	-
S. vandellioides (Benth.) V.C.Souza*	FOD	-	-	-
S. veronicoides J.A.Schmidt	FCA	-	-	-
S. verticillata (Mill.) Hassl.	FES, FOD, FOM	-	-	-
Torenia – 1/50				
T. thouarsii (Cham. & Schltdl.) Kuntze	FOD	-	-	-

Plumbaginaceae

Caetano Troncoso Oliveira

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
PLUMBAGINACEAE – 2/800				
Limonium – 1/200				
L. brasiliense (Boiss.) Kuntze	RST, AFL	-	-	-
Plumbago – 1/21				
P. scandens L.	RST	-	-	-

Poaceae

Pedro Lage Viana, Fabrício Moreira Ferreira & Tarciso Sousa Filgueiras

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
POACEAE – 782/ca. 10.000				
Acroceras – 2/22				
A. excavatum (Henrard) Zuloaga & Morrone	FCA, FES, FOD	-	-	-
A. zizanioides (Kunth) Dandy	FES, FOD, RST, FCA	-	-	-
Agenium – 2/3				
A. letpocladum (Hack.) Clayton	FCA	-	-	-
A. villosum (Nees) Pilg.	FCA	-	-	-
Agrostis – 5/ca. 200				
A. capillaris L.	FCA	-	-	-
A. lenis Roseng.	FCA	-	-	-
A. longiberbis Hack. *ex* L.B.Sm.*	FCA	-	-	-
A. montevidensis Spreng. *ex* Nees	FCA	-	-	-
A. platensis Parodi	FCA	-	-	-
*Alvimia** – 3/3				
A. auriculata Soderstr. & Londoño*	RST	-	-	-
A. gracilis Soderstr. & Londoño*	RST	-	-	-
A. lancifolia Soderstr. & Londoño*	RST	-	-	-
Amphibromus – 1/12				
A. quadridentulus (Döll) Swallen	FCA	-	-	-
Andropogon – 17/ca. 100				
A. arenarius Hack.	FCA	-	-	-
A. bicornis L.	FCA, AFL	-	-	-
A. bogotensis (Hack.) A.Zanin	FCA	-	-	-
A. brasiliensis A.Zanin & Longhi-Wagner	FCA, AFL	-	-	-
A. carinatus Nees	AFL	-	-	-
A. fastigiatus Sw.	FCA, AFL	-	-	-
A. glaucophyllus Roseng *et al.*	FCA	-	-	-
A. glaziovii Hack.	FCA	-	-	-
A. hypogynus Hack.	FCA	-	-	-
A. ingratus Hack.	AFL	-	-	-
A. lateralis Nees	FCA, AFL	-	-	-
A. leucostachyus Kunth	FCA, AFL	-	-	-
A. lindmanii Hack.	FCA	-	-	-
A. macrothrix Triana	AFL, FCA	-	-	-
A. selloanus (Hack.) Hack.	FCA, AFL	-	-	-
A. ternatus (Spreng.) Nees	FCA	-	-	-
A. virgatus Desv. *ex* Ham.	FCA	-	-	-
*Anomochloa** – 1/1				
A. marantoidea Brongn.*	FOD	-	CR	ANEXO I
Anthaenantia – 1/4				
A. lanata (Kunth) Benth.	FCA, AFL	-	-	-
Anthaenantiopsis – 3/5				
A. fiebrigii Parodi	FCA, AFL	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
A. perforata (Nees) Parodi	FCA, AFL	-	-	-
A. trachystachya (Nees) Mez *ex* Pilg.	FCA	-	-	-
Apochloa – 6/15				
A. chnoodes (Triana) Zuloaga & Morrone	AFL	-	-	-
A. euprepes (Renvoize) Zuloaga & Morrone	AFL	-	-	-
A. lorea (Triana) Zuloaga & Morrone	AFL	-	-	-
A. lutzii (Swallen) Zuloaga & Morrone*	AFL	-	-	-
A. poliophylla (Renvoize & Zuloaga) Zuloaga & Morrone	AFL	-	-	-
A. tijucae (Renvoize) Zuloaga & Morrone*	AFL	-	-	-
*Apoclada** – 1/1				
A. simplex McClure & L.B.Sm.*	FOM	-	-	-
Arberella – 1/7				
A. bahiensis Soderstr. & Zuloaga	FOD	-	-	-
Aristida – 21/ca.280				
A. adscensionis L.	?	-	-	-
A. brasiliensis Longhi-Wagner*	FCA	-	-	-
A. capillacea Lam.	FCA	-	-	-
A. circinalis Lindm.	FCA	-	-	-
A. ekmaniana Henrard	FCA	-	-	-
A. filifolia (Arechav.) Herter	FCA	-	-	-
A. flaccida Triana & Rupr.*	FCA	-	-	-
A. gibbosa (Nees) Kunth	FCA	-	-	-
A. jubata (Arechav.) Herter	FCA	-	-	-
A. laevis (Nees) Kunth	FCA	-	-	-
A. longifolia Triana	FCA, FES	-	-	-
A. macrophylla Hack.	FCA	-	-	-
A. megapotamica Spreng. *ex* Nees	FCA	-	-	-
A. pallens Cav.	FCA	-	-	-
A. recurvata Kunth	FCA	-	-	-
A. riparia Triana	FCA	-	-	-
A. sanctae-luciae Triana	FCA	-	-	-
A. setifolia Kunth	FCA	-	-	-
A. spegazzinii Arechav.	FCA	-	-	-
A. teretifolia Arechav.	FCA	-	-	-
A. torta (Nees) Kunth	FCA	-	-	-
Arthropogon – 2/6				
A. villosus Nees	FCA	-	-	-
A. xarachne Ekman	FCA	-	-	-
Arundinella – 1/50				
A. hispida (Humb. & Bonpl. *ex* Willd.) Kuntze	FCA	-	-	-
*Athroostachys** – 1/1				
A. capitata (Hook.) Benth.*	FOD, FES	-	-	-
Atractantha – 4/5				
A. aureolanata Judz.*	FOD	-	-	-
A. cardinalis Judz.*	FOD	-	-	-
A. falcata McClure*	FOD	-	-	-
A. radiata McClure*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Aulonemia – 9/ca.40				
A. amplissima (Nees) McClure*	FOD	-	-	-
A. aristulata (Doell) McClure	FOD, FES	-	-	-
A. fimbriatifolia L.G.Clark*	FOD, FCA	-	-	-
A. glaziovii (Hack.) McClure*	FOD, FCA	-	-	-
A. goyazensis (Hack.) McClure*	FOD	-	-	-
A. radiata (Rupr.) McClure & L.B.Sm.*	FOD	-	-	-
A. ramosissima (Hack.) McClure*	FOD	-	-	-
A. setigera (Hack.) McClure*	FOD	-	-	-
A. ulei (Hack.) McClure & L.B.Sm.*	FCA	-	-	-
Axonopus – 25/ca.100				
A. affinis Chase	FCA	-	-	-
A. argentinus Parodi	FCA	-	-	-
A. aureus P.Beauv.	FCA, AFL	-	-	-
A. brasiliensis (Spreng.) Kuhlm.	FCA, AFL	-	-	-
A. capillaris (Lam.) Chase	FCA, FES, FOD, FOM	-	-	-
A. chrysoblepharis (Lag.) Chase	FCA, AFL	-	-	-
A. chrysostachyus (Schrad.) Pilg.	?	-	-	-
A. compressus (Sw.) P.Beauv.	FCA, FES	-	-	-
A. fastigiatus (Nees *ex* Triana) Kuhlm.	FCA, AFL	-	-	-
A. fissifolius (Raddi) Kuhlm.	FCA, RST, FES, FOD, AFL	-	-	-
A. jesuiticus (Araújo) Valls	FCA	-	-	-
A. laxiflorus (Triana) Chase	AFL, FCA	-	-	-
A. leptostachyus (Flüggé) Hitchc.	FCA	-	-	-
A. marginatus (Triana) Chase	FCA, AFL	-	-	-
A. monticola G.A.Black*	FCA, AFL	-	-	-
A. obtusifolius (Raddi) Chase*	FES, FOD, RST	-	-	-
A. pellitus (Nees *ex* Triana) Hitchc. & Chase	FCA	-	-	-
A. polydactylus (Steud.) Dedecca	RST, AFL, FCA	-	-	-
A. polystachyus G.A.Black	FCA	-	-	-
A. pressus (Nees *ex* Steud.) Parodi	FCA, AFL	-	-	-
A. ramboi G.A.Black	FCA, FOD	-	-	-
A. scoparius (Fluggé) Kuhlm.	FCA, FES	-	-	-
A. siccus (Nees) Kuhlm	FCA	-	-	-
A. sulffutus (Triana) Parodi	FCA	-	-	-
A. uninodis (Hack.) G.A.Black	FCA	-	-	-
Bothriochloa – 6/35				
B. alta (Hitchc.) Henrard.	FCA	-	-	-
B. exaristata (Nash) Henrard	FCA	-	-	-
B. laguroides (DC.) Herter	FCA	-	-	-
B. longipaniculata (Gold) Allred & Gold	FCA	-	-	-
B. saccharoides (Sw.) Rydb.	FCA	-	-	-
B. velutina M.Marchi & Longhi-Wagner*	FCA	-	-	-
Bouteloua – 1/ca. 40				
B. aristidoides (Kunth) Griseb.	FCA, AFL	-	-	-
Bromidium – 3/5				
B. hygrometricum (Nees) Nees & Meyen	FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
B. ramboi (Parodi) Rúgulo	FCA	-	-	-
B. tandilense (Parodi) Rúgulo	FCA	-	-	-
Bromus – 3/ca.100				
B. auleticus Trin. *ex* Nees	FCA	-	-	-
B. brachyanthera Döll*	FCA	-	-	-
B. catharticus Vahl	FCA	-	-	-
Calamagrostis – 4/ca.150				
C. alba (J. Presl.) Steud.	FCA	-	-	-
C. longearistata (Wedd.) Hack. *ex* Sodiro	FCA, AFL	-	-	-
C. reitzii Swallen	FCA	-	-	-
C. viridiflavescens (Poir.) Steud.	FCA	-	-	-
Canastra – 1/2				
C. aristella (Döll) Zuloaga & Morrone*	FCA	-	-	-
Cenchrus – 5/20				
C. brownii Roem. & Schult.	FCA	-	-	-
C. ciliaris L.	FCA	-	-	-
C. echinatus L.	FCA	-	-	-
C. myosuroides Kunth	FCA	-	-	-
C. tribuloides L.	FCA	-	-	-
Chaetium – 1/3				
C. festucoides Nees	FCA, RST	-	-	-
Chascolytrum – 2/6				
C. lamarckianum (Nees) Matthei	FCA	-	-	-
C. subaristatum (Lam.) Matthei	FCA	-	-	-
Chloris – 6/40				
C. barbata Sw.	FCA	-	-	-
C. canterae Arechav.	FCA	-	-	-
C. elata Desv.	FCA	-	-	-
C. gayana Kunth	FCA, AFL	-	-	-
C. orthonoton Döll	FCA	-	-	-
C. pycnothrix Triana	FCA	-	-	-
Chusquea – 37/ca.200				
C. acuminata Döll*	?	-	-	-
C. anelythra Nees*	FOD, FOM, FES	-	-	-
C. anelytroides Rupr. *ex* Döll*	FES	-	-	-
C. attenuata (Döll) L.G.Clark*	FES	-	-	-
C. baculifera Silveira*	FCA	-	-	-
C. bahiana L.G.Clark*	FOD	-	-	-
C. bambusoides (Raddi) Hack.*	FOD, FES	-	-	-
C. bradei L.G.Clark*	FOD	-	-	-
C. caparaoensis L.G.Clark*	FCA	-	-	-
C. capitata Nees*	FOD, FES	-	-	-
C. capituliflora Triana	FOD, FES	-	-	-
C. erecta L.G.Clark*	FCA	-	-	-
C. fasciculata Döll*	FES	-	-	-
C. gracilis McClure & L.B.Sm.*	FOM	-	-	-
C. heterophylla Nees*	FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
C. ibiramae McClure & L.B.Sm.*	FES	-	-	-
C. juergensii Hack.	FOM, FOD, FCA	-	-	-
C. leptophylla Nees*	FOD, FES	-	-	-
C. meyeriana Rupr. *ex* Döll*	FOD, FES	-	-	-
C. microphylla (Döll) L.G.Clark*	FCA	-	-	-
C. mimosa McClure & L.B.Sm.*	FOM, FCA	-	-	-
C. nudiramea L.G.Clark*	FOD, FCA	-	-	-
C. nutans L.G.Clark*	FCA	-	-	-
C. oligophylla Rupr.*	FES	-	-	-
C. oxylepis (Hack.) Ekman*	FES	-	-	-
C. pinifolia (Nees) Nees*	FCA	-	-	-
C. pulchella L.G.Clark*	FES	-	EN	ANEXO I
C. ramosissima Lindm.	FOD, FES	-	-	-
C. riosaltensis L.G.Clark*	FCA	-	-	-
C. sclerophylla Döll*	FCA	-	-	-
C. sellowii Rupr.*	FOD, FES	-	-	-
C. tenella Nees	FES	-	-	-
C. tenuiglumis Döll*	FOD, FOM, FES	-	-	-
C. tenuis Glaz. *ex* E.G.Camus*	FOD	-	-	-
C. urelythra Hack.*	FES	-	-	-
C. wilkesii Munro*	FAC	-	-	-
C. windischii L.G.Clark*	FAC	-	-	-
Coelorachis – 1/21				
C. aurita (Steud.) A.Camus	FCA, FES	-	-	-
*Colanthelia** – 7/7				
C. burchelli (Munro) McClure*	FOD, FES	-	-	-
C. cingulata (McClure & L.B.Sm.) McClure*	FES	-	-	-
C. distans (Triana) McClure*	FCA	-	-	-
C. intermedia (McClure & L.B.Sm.) McClure*	FES	-	-	-
C. lanciflora (McClure & L.B.Sm.) McClure*	FOD, FES	-	-	-
C. macrostachya (Nees) McClure*	FOD	-	-	-
C. rhizantha (Hack.) McClure*	FOD, FES	-	-	-
Cortaderia – 3/24				
C. modesta (Döll) Hack.*	FCA	-	-	-
C. selloana (Schult.) Asch.	FCA	-	-	-
C. vaginata Swallen*	FCA	-	-	-
Cryptochloa – 1/8				
C. capillata (Triana) Soderstr.	FOD, FES	-	-	-
Ctenium – 3/20				
C. brevispicatum G.Lon.Sm.	FCA	-	-	-
C. cirrhosum (Nees) Kunth	FCA, AFL	-	-	-
C. polystachyum Balansa	FCA	-	-	-
Cynodon – 2/8				
C. dactylon (L.) Pers.	FCA	-	-	-
C. maritimus Kunth	FCA, RST	-	-	-
Cyphonanthus – 1/1				
C. discrepans (Döll) Zuloaga & Morrone	FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Danthonia – 3/ca.100				
D. cirrata Hack. & Arechav.	FCA	-	-	-
D. montevidensis Hack. & Arechav.	FCA	-	-	-
D. secundiflora J.Presl	FCA	-	-	-
Deschampsia – 1/40				
D. cespitosa (L.) P. Beauv.	FCA	-	-	-
*Diandrolyra** – 3/3				
D. bicolor Stapf*	FOD	-	-	-
D. tatianae Soderstr. & Zuloaga*	FOD, FES	-	-	-
D. pygmaea Soderstrom & Zuloaga *ex* R.P. Oliveira & L.G. Clark*	FOD	-	-	-
Dichanthelium – 16/ca.60				
D. aequivaginatum (Swallen) Zuloaga	RST, AFL	-	-	-
D. assurgens (Renvoize) Zuloaga*	AFL	-	-	-
D. caparaoense (Zuloaga & Morrone) Zuloaga*	FOD	-	-	-
D. cucaense (Zuloaga & Morrone) Zuloaga*	AFL	-	-	-
D. hebotes (Triana) Zuloaga	FOD, FES	-	-	-
D. heliophilum (Chase *ex* Zuloaga & Morrone) Zuloaga	FES, AFL	-	-	-
D. itatiaiae (Swallen) Zuloaga*	FOD	-	-	-
D. peristypum (Zuloaga & Morrone) Zuloaga*	FOD	-	-	-
D. petropolitanum (Zuloaga & Morrone) Zuloaga*	AFL	-	-	-
D. pycnoclados (Tutin) Davidse	FES	-	-	-
D. sabulorum (Lam.) Gould & C.A.Clark	FOD, FES, AFL, FCA	-	-	-
D. sciurotis (Triana) Davidse*	RST, FOD, FCA	-	-	-
D. sciurotoides (Zuloaga & Morrone) Davidse	FES, FOM	-	-	-
D. stigmosum (Triana) Zuloaga*	FOD, FES	-	-	-
D. superatum (Hack.) Zuloaga*	FCA, AFL	-	-	-
D. surrectum (Chase *ex* Zuloaga & Morrone) Zuloaga*	FES, FOD	-	-	-
Digitaria – 27/ca.300				
D. aequiglumis (Hack. & Arechav.) Parodi	FCA	-	-	-
D. balansae Henrard	FCA	-	-	-
D. bicornis (Lam.) Roem. & Schult.	FCA, RST	-	-	-
D. bonplandii Henrard	FCA	-	-	-
D. ciliaris (Retz.) Koel	FCA, RST	-	-	-
D. connivens (Triana) Henrard*	RST	-	-	-
D. corynotricha (Hack.) Henrard	FCA	-	-	-
D. eriantha Steud.	FCA	-	-	-
D. eriostachya Mez	FCA, AFL	-	-	-
D. filiformis (L.) Koeler	FCA	-	-	-
D. fuscecens (J. Presl) Henrard	FCA	-	-	-
D. gerdesii (Hack.) Parodi	FCA	-	-	-
D. horizontalis Willd.	FCA	-	-	-
D. insularis (L.) Fedde	FCA	-	-	-
D. laxa (Rchb.) Parodi	FCA	-	-	-
D. leiantha (Hack.) Parodi	FCA	-	-	-
D. myriostachya (Hack.) Henrard*	RST	-	-	-
D. phaeothrix (Trin.) Parodi	FCA	-	-	-
D. purpurea Swallen	FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
D. sacchariflora (Nees) Henrard	FCA	-	-	-
D. sanguinalis (L.) Scop.	FCA	-	-	-
D. sejunta (Hack.) Henrard*	FCA	-	-	-
D. sellowiana Henrard	FCA	-	-	-
D. similis Beetle *ex* Gould	FCA	-	-	-
D. singularis Mez	FCA	-	-	-
D. tenuis (Nees) Henrard	AFL	-	-	-
D. violascens Link	FCA	-	-	-
Echinochloa – 5/30				
E. colona (L.) Link	FCA	-	-	-
E. crus-galli (L.) P.Beauv.	FCA	-	-	-
E. crus-pavonis (Kunth) Schult.	FCA	-	-	-
E. polystachya (Kunth) Hitchc.	FCA	-	-	-
E. walteri (Pursh) Heller	FCA	-	-	-
Echinolaena – 2/8				
E. inflexa (Poir.) Chase	FCA	-	-	-
E. minarum (Ness) Pilg.	FES, FOD	-	-	-
Eleusine – 1/9				
E. tristachya (Lam.) Lam.	FCA, RST	-	-	-
Elionurus – 4/15				
E. ciliaris Kunth	FCA	-	-	-
E. lividus Hack.	FCA	-	-	-
E. muticus (Spreng.) Kuntze	FCA	-	-	-
E. tripsacoides Humb. & Bonpl. *ex* Willd.	FCA	-	-	-
Eragrostis – 33/ca.300				
E. airoides Nees	FCA	-	-	-
E. amabilis (L.) Wight & Arn.	FCA	-	-	-
E. apiculata Döll*	FCA	-	-	-
E. articulata (Schrank) Nees	FCA	-	-	-
E. bahiensis Schrad. *ex* Schult.	FCA, AFL	-	-	-
E. cataclasta Nicora	RST, FCA	-	-	-
E. ciliaris (L.) R.Br.	FCA	-	-	-
E. curvula (Schrad.) Nees	FCA	-	-	-
E. japonica (Thunb.) Trin.	FCA	-	-	-
E. glomerata (Walter) L.H.Dewey	FCA	-	-	-
E. hypnoides (Lam.) Britton *et al*.	FCA	-	-	-
E. leucosticta Nees *ex* Döll	FCA, RST	-	-	-
E. lugens Nees	FCA	-	-	-
E. macrothyrsa Hack.	FCA	-	-	-
E. mokensis Pilg.	FCA	-	-	-
E. neesii Triana	FCA, RST	-	-	-
E. perennis Döll	FCA	-	-	-
E. petrensis Renvoize & Longhi-Wagner	AFL, RST	-	-	-
E. pilosa (L.) P.Beauv.	FCA	-	-	-
E. plana Nees	FCA	-	-	-
E. polytricha Nees	FCA	-	-	-
E. prolifera (Sw.) Steud.	FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
E. rojasii Hack.	FCA	-	-	-
E. rufescens Schrad. *ex* Schult.	AFL, FCA, RST	-	-	-
E. scaligera Salzm. *ex* Steud.	RST, FCA	-	-	-
E. secundiflora J.Presl	AFL, FCA, RST	-	-	-
E. seminuda Triana	AFL, FAC	-	-	-
E. solida Nees	AFL	-	-	-
E. tenuifolia (A.Rich) Hochst. *ex* Steud.	FCA, AFL	-	-	-
E. trachicolea Hack. & Arechav.	RST, FCA	-	-	-
E. triangularis Henrard	FCA	-	-	-
E. trichocolea Hack. & Arechav.	FCA	-	-	-
E. vernix Boechat & Longhi-Wagner*	FES, FCA	-	-	-
*Eremitis** – 1/1				
E. parviflora (Triana) Calderón & Soderstr.*	FOD	-	-	-
Eremocaulon – 3/5				
E. asymmetricum (Soderstr. & Londoño) Londoño*	FOD	-	-	-
E. aureofimbriatum Soderstr. & Londoño*	FOD, FES	-	-	-
E. setosum Londoño & L.G.Clark*	FOD, FES	-	-	-
Eriochloa – 4/30				
E. distachya Kunth		-	-	-
E. grandiflora (Trin.) Benth.		-	-	-
E. polystachya Kunth	FES, FCA	-	-	-
E. punctata (L.) Desv. *ex* Ham.	FOD, FES, FCA	-	-	-
Eriochrysis – 4/7				
E. cayennensis P.Beauv.	FCA, AFL	-	-	-
E. filiformis (Hack.) Filg.	FCA	-	-	-
E. holcoides (Nees) Kuhlm.	FCA	-	-	-
E. laxa Swallen	FCA	-	-	-
Eustachys – 5/11				
E. calvescens (Hack.) Caro & E.A. Sánchez	FCA	-	-	-
E. distichophylla (Lag.) Nees	FCA	-	-	-
E. paranensis A.M. Molina	FCA	-	-	-
E. retusa (Lag.) Kunth	FCA	-	-	-
E. uliginosa (Hack.) Herter	FCA	-	-	-
Festuca – 2/ca.400				
F. fimbriata Nees	FCA	-	-	-
F. ulochaeta Nees *ex* Steud.	FCA, FOM	-	-	-
*Glaziophyton** – 1/1				
G. mirable Franch.*	FCA	-	VU	ANEXO I
Glyceria 1/ca.30				
G. multilora Steud.	FCA	-	-	-
Guadua – 7/ca.25				
G. angustifolia Kunth	FES	-	-	-
G. calderoniana Londoño & Judz.*	FOD	-	-	-
G. chacoensis (Rojas) Londoño & P.M.Peterson	FES	-	-	-
G. paniculata Munro	FES	-	-	-
G. paraguayana Döll	FES	-	-	-
G. tagoara (Nees) Kunth*	FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
G. trinii (Nees) Nees *ex* Rupr.	FES	-	-	-
Gymnopogon – 4/14				
G. burchellii (Munro *ex* Döll) Eckman	FCA	-	-	-
G. foliosus (Willd.) Nees	FCA, AFL	-	-	-
G. grandiflorus Roseng., B.R. Arrill & Izag.	FCA	-	-	-
G. spicatus (Spreng.) Kuntze	FCA	-	-	-
Gynerium – 1/1				
G. sagittatum (Aubl.) P.Beauv.	FCA	-	-	-
Holcus – 1/9				
H. lanatus L.	FCA, AFL	-	-	-
Homolepis – 3/5				
H. glutinosa (Sw.) Zuloaga & Soderstr.	FES, FOD, FOM	-	-	-
H. isocalycia (G.Mey.) Chase	FOD, FES, FCA	-	-	-
H. villaricensis (Mez) Zuloaga & Soderstr.	FCA	-	-	-
Hordeum – 1/ca. 40				
H. stenostachys Godr.	FCA	-	-	-
Hymenachne – 4/4				
H. amplexicaulis (Rudge) Nees	FCA	-	-	-
H. donacifolia (Raddi) Chase	FCA	-	-	-
H. grumosa (Nees) Zuloaga	FOD, FOM	-	-	-
H. pernambucensis (Spreng.) Zuloaga	FCA	-	-	-
Hyparrhenia – 1/55				
H. bracteata (Humb. & Bonpl. *ex* Willd.) Stapf.	FCA	-	-	-
Ichnanthus – 15/ca.30				
I. bambusiflorus (Triana) Döll	FES, FOD, AFL	-	-	-
I. calvescens (Nees) Döll	FES, RST	-	-	-
I. dasycoleus Tutin	FOD, RST	-	-	-
I. glaber (Raddi) Hitchc.*	FOD	-	-	-
I. grandifolius (Döll) Zuloaga & Soderstr.*	FOD	-	-	-
I. hirtus (Raddi) Chase*	FOD, FES, FED	-	-	-
I. inconstans (Triana *ex* Nees) Döll	FES, AFL, FCA	-	-	-
I. leiocarpus (Spreng.) Kunth	FOD, FES, AFL	-	-	-
I. longiglumis Mez	AFL	-	-	-
I. nemoralis (Schrad. *ex* Schult.) Hitchc. & Chase	FOD, FES, FED, RST	-	-	-
I. pallens (Sw.) Munro *ex* Benth.	FOD, FES, FED, FOM, RST	-	-	-
I. procurrens (Nees *ex* Triana) Swallen	FES, FED, AFL, FCA	-	-	-
I. riedelii (Triana) Döll	FOD, RST	-	-	-
I. ruprechtii Döll	FOD, FES	-	-	-
I. tenuis (J.Presl) Hitchc. & Chase	FOD, AFL	-	-	-
Imperata – 3/9				
I. brasiliensis Triana	FCA, RST	-	-	-
I. contracta (Kunth) Hitchc.	FCA	-	-	-
I. tenuis Hack.	FCA	-	-	-
Isachne – 2/ca. 100				
I. polygonoides (Lam.) Döll	FCA, RST	-	-	-
I. salzmannii (Trin. *ex* Steud.) Renvoize	FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Ischaemum –1/65				
I. minus J.Presl	RST, FCA	-	-	-
Lasiacis – 3/ca.20				
L. divaricata (L.) Hitchc.	FES, FOD	-	-	-
L. ligulata Hitchc. & Chase	FES, FOD	-	-	-
L. sorghoidea (Desv. *ex* Ham.) Hitchc. & Chase	FES, FOD	-	-	-
Leersia – 3/18				
L. hexandra Sw.	FCA	-	-	-
L. ligularis Triana	FES, FOD	-	-	-
L. virginica Willd.	FCA	-	-	-
Leptochloa – 7/ca.40				
L. barbata (Desv.) Parodi *ex* Nicora	FCA	-	-	-
L. fusca (L.) Kunth	FCA	-	-	-
L. procera Nees	FCA	-	-	-
L. scabra Nees	RST, FCA	-	-	-
L. uninervia (J.Presl) Hitchc. & Chase	FCA	-	-	-
L. virgata (L.) P.Beauv.	FCA	-	-	—
Lithachne – 2/4				
L. horizontalis Chase*	FES	-	-	-
L. pauciflora (Sw.) P. Beauv.	FOD	-	-	-
Loudetiopsis – 1/11				
L. chrysothrix (Nees) Conert	FCA, AFL	-	-	-
Luziola – 3/12				
L. bahiensis (Steud.) Hitchc.	FCA	-	-	-
L. brasiliensis (Triana) Swallen*	FCA	-	-	-
L. peruviana J.F.Gmel.	FCA	-	-	-
Melica – 11/90				
M. argyrea Hack,	FCA	-	-	-
M. arzivencoi Valls & Barcelos*	FCA, AFL	-	-	-
M. brasiliana Ard.	FCA	-	-	-
M. eremophila Torres	FCA	-	-	-
M. hunzikeri Nicora	?	-	-	-
M. hyalina Döll	FCA	-	-	-
M. macra Nees	FCA	-	-	
M. rigida Cav.		-	-	-
M. sarmentosa Nees	FCA, AFL	-	-	-
M. spartinoides L.B.Sm.	FCA	-	-	-
M. tenuis Hack & Arechav.	FCA	-	-	-
Merostachys – 38/ca.60				
M. abadiana Send.*	FES	-	-	-
M. annulifera Send.*	FOD	-	-	-
M. argentea Send.*	FOD	-	-	-
M. argyronema Lindm.*	FES	-	-	-
M. bifurcata Send.*	FOD	-	-	-
M. bradei Pilg.*	FES	-	-	-
M. brevigluma Send.*	FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
M. burmanii Send.*	FOD, FES	-	-	-
M. calderoniana Send.*	FOD	-	-	-
M. caucaiana Send.*	FES	-	-	-
M. ciliata McClure & L.B.Sm.*	FES	-	-	-
M. claussenii Munro	FES	-	-	-
M. fischeriana Rupr. *ex* Döll*	FOD, FES	-	-	-
M. fistulosa Döll*	FOD, FES	-	-	-
M. glauca McClure & L.B.Sm.*	FES	-	-	-
M. kleinii Send.*	FES	-	-	-
M. kunthii Rupr.*	FOD	-	-	-
M. lanata Send.*	FOD	-	-	-
M. leptophylla Send.*	FOD	-	-	-
M. magellanica Send.*	FOD, FES	-	-	-
M. magnispicula Send.*	FOD	-	-	-
M. medullosa Send.*	FOD	-	-	-
M. multiramea Hack.*	FOM, FES	-	-	-
M. neesii Rupr.*	FES	-	-	-
M. petiolata Döll*	FOD, FES	-	-	-
M. pilifera Send.*	FOM	-	-	-
M. pluriflora Munro *ex* E.G.Camus*	FOD, FES	-	-	-
M. polyantha McClure*	FES	-	-	-
M. procerrima Send.*	FOD	-	-	-
M. ramosissima Send.*	FOD	-	-	-
M. riedeliana Rupr. *ex* Döll*	FES	-	-	-
M. scandens Send.*	FES	-	-	-
M. sellovii Munro	?	-	-	-
M. skvortzovii Send.*	FES	-	-	-
M. sparsiflora Rupr.*	FOD	-	-	-
M. speciosa Spreng.*	FES, FOM	-	-	-
M. ternata Nees*	FOD, FES, FOM	-	-	-
M. vestita McClure & L.B.Sm.*	FOM	-		
Mesosetum – 2/25				
M. ferrugineum (Triana) Chase	FCA	-	-	-
M. loliiforme (Hochst. *ex* Steud.) Chase	FCA	-	-	-
Microchloa – 1/3				
M. indica (L.f.) P.Beauv.	FCA	-	-	-
Mnesithea – 3/5				
M. balansae (Hack.) de Koning & Sosef	FCA	-	-	-
M. selloana (Hack.) de Koning & Sosef	FCA	-	-	-
M. subgibbosa (Winkl. *ex* Hack.) de Koning & Sosef	FCA	-	-	-
Muhlenbergia – 1/160				
M. schreberi J.F. Gmel.	FCA	-		
Nassella – 16/ca.80				
N. airoides (Ekman) Barkworth	FCA	-	-	-
N. brasiliensis (A.Zanin & Longhi-Wagner) Barkworth*	FCA	-	-	-
N. filiciculmis Delile	FCA, AFL	-	-	-
N. juergensii Hack.	FCA, AFL	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
N. megapotamica Spreng. *ex* Trin.	FCA, AFL	-	-	-
N. melanosperma J. Presl	FCA, AFL	-	-	-
N. neesiana Trin. & Rupr.	FCA	-	-	-
N. nutans (Hack) Barkworth.	FCA, AFL	-	-	-
N. planaltina (A.Zanin & Longhi-Wagner) Peñailillo*	FCA	-	-	-
N. quiqueciliata (Roseng. & Izag.) A.Zanin & Izag.	FCA	-	-	-
N. rhizomata A.Zanin & Longhi-Wagner*	FCA	-	-	-
N. sellowiana Nees *ex* Triana & Rupr.*	FCA	-	-	-
N. setigera J.Presl	FCA	-	-	-
N. spegazzinii (Arechav.) Barkworth	FCA	-	-	-
N. tenuiculmis (Phil.) Barkworth	FCA	-	-	-
N. vallsii A.Zanin & Longhi-Wagner*	FCA	-	-	-
Neesiochloa – 1/1				
N. barbata (Nees) Pilg.	FCA	-	-	-
Olyra –9/24				
O. bahiensis R.P.Oliveira & Longhi-Wagner*	FOD	-	-	-
O. ciliatifolia Raddi	FOD, FES, FED	-	-	-
O. ecaudata Döll	FOD	-	-	-
O. fasciculata Triana	FOD	-	-	-
O. filiformis Triana*	FOD	-	-	-
O. glaberrima Raddi	FOD, FES	-	-	-
O. humilis Nees	FOD, FES	-	-	-
O. latifolia L.	FOD, FES, FED	-	-	-
O. latispicula Soderstr. & Zuloaga*	FOD	-	VU	ANEXO I
Oplismenus – 1/ca.15				
O. hirtellus (L.) P.Beauv.	FES, FED, FOD, FOM	-	-	-
Orthoclada – 1/1				
O. laxa (Rich.) P.Beauv.	FES, FOD	-	-	-
Oryza – 1/25				
O. latifolia Desv.	FCA	-	-	-
Otachyrium – 1/7				
O. versicolor (Döll) Henrard	FCA	-	-	-
Panicum – 47/ca.400				
P. aquaticum Poir.	FCA	-	-	-
P. bergii Arechav.	FCA	-	-	-
P. bresolini L.B.Sm. & Wassh.*	FOD, RST	-	-	-
P. caaguazuense Henrard	FCA	-	-	-
P. campestre Lam.	FCA	-	-	-
P. cayennense Lam.	FCA	-	-	-
*P. chase*i Roseng.	FCA	-	-	-
P. complanatum Gulglieri *et al.*	FCA	-	-	-
P. consensatum Bertol*	FOD, FES	-	-	-
P. cyanescens Nees *ex* Triana	FCA, AFL	-	-	-
P. dichotomiflorum Michx.	FCA	-	-	-
P. elephantipes Nees *ex* Trin.	FCA	-	-	-
P. exiguum Mez	FCA	-	-	-
P. ghiesbreghtii E. Fourn.	FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
P. glabripes Döll	FCA	-	-	-
P. gouinii E.Fourn.	FCA	-	-	-
P. hylaecium Mez	FOD	-	-	-
P. latissimum Mik. *ex* Triana*	FES, FOD	-	-	-
P. leptachne Döll*	FCA	-	-	-
P. longipedicellatum Swallen	FCA	-	-	-
P. magnispicula Zuloaga *et al.**	FCA	-	-	-
P. mertensii Roth	FCA, RST	-	-	-
P. millegrana Poir.	FES, FOD, FOM, FCA	-	-	-
P. mucronulatum Mez	FCA	-	-	-
P. olyroides Kunth	FCA	-	-	-
P. parvifolium Lam.	FCA, FES, FOD	-	-	-
P. peladoense Henrard	FCA	-	-	-
P. pilosum Sw.	FOD, FES, FOM, AFL, FCA, RST	-	-	-
P. polygonatum Schrad.	FOD, FES, FCA	-	-	-
P. prionitis Nees	FCA	-	-	-
P. pseudisachne Mez	FCA	-	-	-
P. pulchellum Raddi	FES, FOD	-	-	-
P. quadriglume (Döll) Hitchc.	FCA	-	-	-
P. racemosum (P.Beauv.) Spreng.*	RST	-	-	-
P. repens L.	FCA, AFL, FES	-	-	-
P. rude Nees	AFL, FES, FOD	-	-	-
P. rudgei Roem. & Schult.	FCA, RST	-	-	-
P. schwackeanum Mez	FCA, FES, FOD	-	-	-
P. sellowii Nees	FES, FOD	-	-	-
P. stoloniferum Poir.	FES, FOD, FOM	-	-	-
P. stramineum Hitchc. & Chase	FCA	-	-	-
P. subulatum Spreng.	FCA	-	-	-
P. trichanthum Nees	FED, FES, FCA	-	-	-
P. trichidiachne Döll	FCA, FES, FOD	-	-	-
P. tricholaenoides Steud.	FCA	-	-	-
P. thinophilum Renvoize*	RST	-	-	-
P. wettsteinii Hack.	AFL	-	-	-
Pappophorum – 3/8				
P. harsleri Hack.	FCA	-	-	-
P. mucronulatum Nees	FCA	-	-	-
P. pappiferum (Lam.) Kuntze	FCA	-	-	-
Paratheria – 1/2				
P. prostrata Griseb.	FCA, AFL	-	-	-
Pariana – 3/ca.40				
P. carvalhoi R.P.Oliveira & Longhi-Wagner*	FOD	-	EN	ANEXO II
P. lanceolata Triana*	FOD, RST	-	-	-
P. multiflora R.P.Oliveira *et al.**	FOD	-	-	-
Parodiolyra – 2/5				
P. micrantha (Kunth) Davidse & Zuloaga	FOD, FES, FED, FCA, AFL, RST	-	-	-
P. ramosissima (Triana) Soderstr. & Zuloaga*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Parodiophyllochloa – 6/6				
P. cordovensis (E.Fourn.) Zuloaga & Morrone	FES, FOD	-	-	-
P. missiona (Ekman) Zuloaga & Morrone*	FES, FOD	-	-	-
P. ovulifera (Triana) Zuloaga & Morrone	FES, FOD	-	-	-
P. pantricha (Hack.) Zuloaga & Morrone	FES, FOD	-	-	-
P. penicillata (Nees *ex* Triana) Zuloaga & Morrone*	FES, FED	-	-	-
P. rhizogona (Hack.) Zuloaga & Morrone*	FOD	-	-	-
Paspalidium - 1/27				
P. geminatum (Forssk.) Stapf	RST, FCA	-	-	-
Paspalum – 116/ca.400				
P. acuminatum Raddi	FCA	-	-	-
P. almum Chase	FCA	-	-	-
P. ammodes Triana	FCA, AFL	-	-	-
P. arenarium Schrad.	RST	-	-	-
P. arundinellum Mez	FCA	-	-	-
P. atratum Swallen	FCA	-	-	-
P. bahianum R.C.Oliveira & Valls*	RST	-	-	-
P. barretoi Canto-Dorow *et al.**	FCA	-	-	-
P. bertonii Hack.	FCA	-	-	-
P. boscianum Flüggé	FCA	-	-	-
P. brachytrichum Hack.*	AFL	-	-	-
P. calliferum S. Denham	FCA	-	-	-
P. carinatum Humb. & Bonpl. *ex* Flüggé	FCA	-	-	-
P. ceresia (Kuntze) Chase	FCA	-	-	-
P. clavuliferum C.Wright	FCA, AFL	-	-	-
P. commutatum Nees	FCA	-	-	-
P. compressifolium Swallen	FCA	-	-	-
P. conduplicatum Canto-Dorow *et al.**	FCA	-	-	-
P. conjugatum P.J.Bergius	FCA, FES, FOD, FOM	-	-	-
P. conspermum Schrad.	FCA, FES, FOD, FOM	-	-	-
P. convexum Humb. & Bonpl. *ex* Flüggé	FCA	-	-	-
P. corcovadense Raddi*	FES, FOD, FOM	-	-	-
P. cordatum Hack.	FCA	-	-	-
P. coryphaeum Triana	FCA, AFL	-	-	-
P. dasytrichum Dusén *ex* Swallen	FCA	-	-	-
P. decumbens Sw.	FES, FOD, FOM, FCA, AFL	-	-	-
P. dedeccae Quarín	FCA	-	-	-
P. densum Poir.	FCA	-	-	-
P. denticulatum Trin.	FCA	-	-	-
P. dilatatum Poir.	FCA	-	-	-
P. distichum L.	FCA	-	-	-
P. divergens Döll	FCA	-	-	-
P. durifolium Mez	FCA	-	-	-
P. ellipticum Döll	FCA	-	-	-
P. equitans Mez	FCA	-	-	-
P. erianthoides Lindm.	FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
P. erianthum Nees *ex* Triana	FCA, AFL	-	-	-
P. eucomum Nees *ex* Triana	FCA	-	-	-
P. exaltatum J. Presl.	FCA	-	-	-
P. falcatum Nees *ex* Steud.	FCA	-	-	-
P. filifolium Nees *ex* Steud.	FCA	-	-	-
P. fimbriatum Kunth	FCA	-	-	-
P. flaccidum Nees	FCA	-	-	-
P. formosum Swallen	FCA	-	-	-
P. gardnerianum Nees	FCA, AFL	-	-	-
P. geminiflorum Steud.	FCA	-	-	-
P. glabrinode (Hack.) Morrone & Zuloaga		-	-	-
P. glaucescens Hack.	FCA	-	-	-
P. guenoarum Arechav.	FCA	-	-	-
P. guttatum Triana	AFL, FCA	-	-	-
P. haumanii Parodi	FCA	-	-	-
P. hemicryptum Wright	FCA, FES, RST	-	-	-
P. hyalinum Nees *ex* Triana	FCA, AFL	-	-	-
P. indecorum Mez	FCA	-	-	-
P. ineaquivalve Raddi	FCA	-	-	-
P. intermedium Munro *ex* Morong & Britton	FCA	-	-	-
P. ionanthum Chase	FCA	-	-	-
P. jesuiticum Parodi	FCA	-	-	-
P. juergensii Hack.	FES, FOD, FCA	-	-	-
P. lenticulare Kunth	FCA	-	-	-
P. lepton Schult.	FCA	-	-	-
P. lilloi Hack.		-	-	-
P. limbatum Henrard	FCA	-	-	-
P. lineare Triana	FCA	-	-	-
P. lividum Trin.	FCA	-	-	-
P. maculosum Triana	FCA	-	-	-
P. malacophyllum Triana	FCA, FES	-	-	-
P. mandiocanum Triana	FCA	-	-	-
P. maritimum Triana	?	-	-	-
P. melanospermum Desv. *ex* Ham.	FCA	-	-	-
P. millegrana Schrad.	FCA	-	-	-
P. minus E. Fourn.	FCA	-	-	-
P. molle Poir.	FCA	-	-	-
P. multicaule Poir.	FCA	-	-	-
P. nicorae Parodi	FCA	-	-	-
P. notatum Flüggé	FCA	-	-	-
P. nutans Lam.	FCA, FES	-	-	-
P. nummularium Chase *ex* Send. & A.G. Burm.	FCA	-	-	-
P. oligostachyum Salzm. *ex* Steud.	FCA	-	-	-
P. orbiculatum Poir.	FCA	-	-	-
P. ovale Nees *ex* Steud.	FCA	-	-	-
P. pallens Swallen	FCA	-	-	-
P. paniculatum L.	FCA, FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
P. parviflorum Rhode *ex* Fluggé	FCA, AFL, RST	-	-	-
P. pauciciliatum (Parodi) Herter	FCA	-	-	-
P. paucifolium Swallen	FCA	-	-	-
P. pectinatum Nees *ex* Triana	FCA	-	-	-
P. phyllorhachis Hack.	FCA	-	-	-
P. pilosum Lam.	FES, FOD, FOM, FCA	-	-	-
P. plenum Chase	FCA	-	-	-
P. pleostachyum Döll	FCA	-	-	-
P. plicatulum Michx.	FCA	-	-	-
P. polyphyllum Nees	FCA	-	-	-
P. proximum Mez	FCA	-	-	-
P. pumilum Nees	FCA	-	-	-
P. quadrifarium Lam.	FCA	-	-	-
P. quarinii Morrone & Zuloaga	FCA	-	-	-
P. ramboi I.L. Barreto	FCA	-	-	-
P. redondense Swallen	FCA	-	-	-
P. regnellii Mez	FCA, FES	-	-	-
P. repens P.J.Bergius	FCA	-	-	-
P. rhodopedum L.B.Sm. & Wassh.	FCA, FOD	-	-	-
P. riparium Nees	FCA	-	-	-
P. rojasii Hack.	FCA, FES	-	-	-
P. rufum Nees *ex* Steud.	FCA	-	-	-
P. scalare Triana	AFL	-	-	-
P. setiglume Chase	?	-	-	-
P. simplex Morong	FCA	-	-	-
P. stellatum Humb. & Bonpl. *ex* Flüggé	FCA	-	-	-
P. telmatum Swallen	FCA	-	-	-
P. umbrosum Triana*	FES, FOD	-	-	-
P. urvillei Steud.	FCA	-	-	-
P. usterii Hack.	FCA, FOD, FOM, FES	-	-	-
P. vaginatum Sw.	RST, FOD	-	-	-
P. virgatum L.	FCA	-	-	-
P. wrightii Hitchc. & Chase	FCA	-	-	-
Pennisetum – 2/80				
P. latifolium Spreng.	FCA	-	-	-
P. setosum (Sw.) Rich.	FCA	-	-	-
Pereilema – 1/3				
P. beyrichianum (Kunth) Hitchc.	FED, FCA	-	-	-
Phalaris – 1/15				
P. angusta Nees *ex* Triana	FCA	-	-	-
Pharus – 4/7				
P. lappulaceus Aubl.	FOD, FES, FED, AFL, RST	-	-	-
P. latifolius L.	FOD, FES, FED, AFL, RST	-	-	-
P. parvifolius Nash	FOD, FES	-	-	-
P. virescens Döll	FOD	-	-	-
Piptochaetium – 9/35				
P. alpinum L.B.Sm.*	FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
P. bicolor (Vahl) E. Desv.	FCA	-	-	-
P. lasianthum Griseb.	FCA	-	-	-
P. montevidense (Spreng.) Parodi	FCA	-	-	-
P. palustre Mujica & Longhi-Wagner	FCA	-	VU	ANEXO I
P. panicoides (Lam.) E.Desv.	FCA	-	-	-
P. ruprechtianum Desv.	FCA	-	-	-
P. stipoides (Trin. & Rupr.) Hack *ex* Arechav.	FCA	-	-	-
P. uruguense Griseb.	FCA	-	-	-
Piresia – 3/4				
P. leptophylla Soderstr.	FOD	-	-	-
P. macrophylla Soderstr.	FOD	-	-	-
P. sympodica (Döll) Swallen	FOD	-	-	-
Plagiantha – 1/1				
P. tenella Renvoize	FES, FCA	-	-	-
Poa – 6/200				
P. bradei Pilg.*	FCA	-	-	-
P. lanigera Nees	FCA, AFL	-	-	-
P. nemoralis L.	FCA	-	-	-
P. reitzii Swallen*	FCA	-	-	-
P. sellowii Nees	FCA	-	-	-
P. umbrosa Trin.	FCA	-	-	-
Poidium – 10/10				
P. ambiguum (Hack.) Matthei	FCA, AFL	-	-	-
P. brasiliense Nees *ex* Steud.*	FCA	-	-	-
P. brachychaetum (Ekman) Matthei	FCA	-	-	-
P. calotheca (Trin.) Matthei	FCA	-	-	-
P. itatiaiae (Ekman) Nicora & Rúgolo*	FCA, AFL	-	-	-
P. juergensii (Hack) Matthei	FCA	-	-	-
P. monandrum (Hack.) Matthei	FCA	-	-	-
P. poimorphum (J.Presl.) Matthei	FCA	-	-	-
P. rufum (J.Presl.) Matthei	FCA	-	-	-
P. uniolae (Nees) Matthei	FCA, AFL, FOM	-	-	-
Polypogon – 4/ca.15				
P. chilensis (Kunth) Pilg.	FCA	-	-	-
P. elongatus Kunth	FCA	-	-	-
P. exasperatus (Trin.) Renvoize	FCA	-	-	-
P. monspeliensis (L.) Desf.	FCA	-	-	-
Pseudechinolaena – 1/6				
P. polystachya (Kunth) Stapf	FES, FOD, FOM	-	-	-
Raddia – 9/10				
R. angustifolia Soderstr. & Zuloaga*	FOD, FED	-	CR	ANEXO I
R. brasiliensis Bertol.	FOD, FED	-	-	-
R. distichophylla (Schrad. *ex* Nees) Chase*	FOD, FED	-	EN	ANEXO II
R. guianensis (Brongn.) Hitchc.	FOD	-	-	-
R. lancifolia R.P.Oliveira & Longhi-Wagner*	FOD	-	-	-
R. megaphylla R.P.Oliveira & Longhi-Wagner*	FOD	-	-	-
R. portoi Kuhlm.*	FOD, FED	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
R. soderstromii R.P.Oliveira *et al.**	FOD, FES, FED	-	-	-
R. stolonifera R.P.Oliveira & Longhi-Wagner*	FOD, FES	-	-	-
Raddiella – 1/8				
R. esenbeckii (Steud.) Calderón & Soderstr.	FES, RST	-	-	-
*Reitzia** – 1/1				
R. smithii Swallen*	FES, FOM	-	-	-
Renvoizea – 6/10				
R. glaziovii (Hack.) Zuloaga & Morrone*	AFL	-	-	-
R. marauense (Renvoize & Zuloaga) Zuloaga & Morrone*	RST	-	-	-
R. restingae (Renvoize & Zuloaga) Zuloaga & Morrone*	RST	-	-	-
R. sacciolepoides (Renvoize & Zuloaga) Zuloaga & Morrone*	RST	-	-	-
R. teretifolia (Hack.) Zuloaga & Morrone*	RST	-	-	-
R. trinii (Kunth) Zuloaga & Morrone	AFL, RST	-	-	-
Rhipidocladum – 2/17				
R. parviflorum (Triana) McClure	FES, FED	-	-	-
R. racemiflorum (Steud.) McClure	FES	-	-	-
Rhomboelytrum – 1/2				
R. monandrum (Hack.) Nicora & Rúgolo	FCA	-	-	-
Rhytachne – 1/12				
R. rottboellioides Desv. *ex* Ham.	FCA	-	-	-
Saccharum – 4/25				
S. angustifolium (Nees) Trin.	FCA	-	-	-
S. asperum (Nees) Steud.	FCA	-	-	-
S. trinii (Hack.) Renvoize	FCA	-	-	-
S. villosum Steud.	FCA	-	-	-
Sacciolepis – 2/ca.30				
S. myuros (Lam.) Chase	FCA	-	-	-
S. vilvoides (Triana) Chase	FCA	-	-	-
Schizachyrium – 9/ca.60				
S. gracilipes (Hack.) A.Camus	FCA	-	-	-
S. hatschbachii Peichoto	FCA	-	-	-
S. imberbe (Hack.) A. Camus	FCA	-	-	-
S. microstachyum (Desv. *ex* Ham.) Roseng. *et al.*	FCA	-	-	-
S. salzmannii (Triana *ex* Steud.) Nash	FCA, FES	-	-	-
S. sanguineum (Retz.) Alston	FCA, AFL	-	-	-
S. scabriflorum (Rupr. *ex* Hack.) A.Camus	FCA	-	-	-
S. spicatum (Spreng.) Herter	FCA	-	-	-
S. tenerum Nees	FCA	-	-	-
Setaria – 17/ca.125				
S. barbata (Lam.) Kunth	?	-	-	-
S. fiebrigii Herrm.	FCA	-	-	-
S. globulifera (Steud.) Griseb.	FCA	-	-	-
S. lachnea (Nees) Kunth	FCA, FES, FOD, FOM	-	-	-
S. macrostachya Kunth	FCA	-	-	-
S. magna Griseb.	FES, FCA	-	-	-
S. parviflora (Poir.) Kerguélen	FES, FCA, AFL	-	-	-
S. paucifolia (Morong) Lindm.	FOD, FOM	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
S. scabrifolia (Nees) Kunth*	FES, FOD	-	-	-
S. scandens Schrad.	FES, FOD, FCA	-	-	-
S. setosa (Sw.) P.Beauv.	FCA	-	-	-
S. sphacelata (Schumach.) Stapf & C.E.Hubb.	FES, FOD, FOM, FCA	-	-	-
S. sulcata Raddi	FES, FOD, FOM, FCA	-	-	-
S. tenacissima Schrad. *ex* Schult.	FCA	-	-	-
S. tenax (Rich.) Desv.	FCA, AFL, FES	-	-	-
S. vaginata Spreng.	FCA	-	-	-
S. vulpiseta (Lam.) Roem. & Schult.	FES, FCA, AFL	-	-	-
Sorghastrum – 7/17				
S. minarum (Nees) Hitchc.	FCA, AFL	-	-	-
S. nutans (L.) Nash	FCA	-	-	-
S. pellitum (Hack.) Parodi	FCA	-	-	-
S. scaberrimum (Nees) Herter*	FCA	-	-	-
S. setosum (Griseb.) Hitchc.	FCA	-	-	-
S. stipoides (Kunth) Nash	FCA, FES	-	-	-
S. viride Swallen	FCA	-	-	-
Spartina – 3/18				
S. alterniflora Loisel	RST	-	-	-
S. ciliata Brongn.	RST	-	-	-
S. densiflora Brongn.	RST	-	-	-
Sporobolus – 19/ca. 160				
S. acuminatus (Triana) Hack.	FCA, AFL	-	-	-
S. adustus (Triana) Roseng.	FCA	-	-	-
S. aeneus (Triana) Kunth	AFL	-	-	-
S. camporum Swallen	FCA, AFL	-	-	-
S. ciliatus J.Presl	FCA	-	-	-
S. cubensis Hitchc.	FCA	-	-	-
S. eximius (Nees) Ekman	FCA	-	-	-
S. hians G.B.van Schaak*	FCA	-	-	-
S. indicus (L.) R.Br.	FCA	-	-	-
S. linearifolius Nicora	FCA, AFL	-	-	-
S. metallicolus Longhi-Wagner & Boechat	AFL, FCA	-	-	-
S. minarum Boechat & Longhi-Wagner*	FCA	-	-	-
S. nudiramus Boechat & Longhi-Wagner*	FCA	-	-	-
S. pseudairoides Parodi	FCA	-	-	-
S. purpurascens (Sw.) Ham.	FCA	-	-	-
S. pyramidatus (Lam.) Hitchc.	FCA	-	-	-
S. reflexus Boechat & Longhi-Wagner	FCA, AFL	-	-	-
S. tenuissimus (Schrank) Kuntze	AFL, FCA	-	-	-
S. virginicus (L.) Kunth	FCA	-	-	-
Steinchisma – 5/7				
S. decipiens (Nees *ex* Triana) W.V.Br.	FCA	-	-	-
S. hians (Elliott) Nash	FCA	-	-	-
S. laxa (Sw.) Zuloaga	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
S. spathellosa (Döll) Renvoize*	FCA	-	-	-
S. stenophylla (Hack.) Zuloaga & Morrone	FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Stenotaphrum – 1/7				
S. secundatum (Walter) Kuntze	RST	-	-	-
Streptochaeta – 2/3				
S. angustifloia Soderstr.*	FOD, FES	-	-	-
S. spicata Schrad. *ex* Nees	FOD, FES	-	-	-
Streptostachys – 1/6				
S. asperifolia Desv.	FES, FCA	-	-	-
*Sucrea** – 3/3				
S. maculata Soderstr.*	FOD	-	VU	ANEXO II
S. monophylla Soderstr.*	FOD	-	-	-
S. sampaiana Soderstr.*	FOD	-	CR	ANEXO I
Thrasyopsis – 2/2				
T. juergensii (Hack.) Soderstr. & A.G.Burm	FCA	-	VU	ANEXO I
T. repanda (Nees *ex* Triana) Parodi	FCA	-	-	-
Trachypogon – 3/ca.15				
T. macroglossus Triana	FCA, AFL, RST	-	-	-
T. spicatus (L.f.) Kuntze	FCA, AFL, RST	-	-	-
T. vestitus Andersson	FCA	-	-	-
Tripogon – 1/ca. 30				
T. spicatus Nees (Ekman)	FCA, AFL	-	-	-
Trisetum – 1/ca. 85				
T. juergensii Hack.	FCA	-	-	-
Tristachya – 1/22				
T. leiostachya Nees	FCA	-	-	-
Vulpia – 1/23				
V. australis (Nees *ex* Steud.) C.H.Blom	FCA	-	-	-
Zizaniopsis – 1/5				
Z. microstachya (Nees) Döll*	FES, FCA, FOD	-	-	-

Podostemaceae

Cláudia Petean Bove & C. Thomas Philbrick

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
PODOSTEMACEAE – 25/ca. 280				
Apinagia – 6/50				
A. fucoides Tul.	FOD, FOM, FED,	-	-	-
A. glaziovii (Warm.) P.Royen*	FES, FAQ	-	-	-
A. guairaensis Fiebrig-Gertz*	FES, FAQ	-	-	-
A. richardiana (Tul.) P.Royen	FOD, FAQ	-	-	-
A. riedelii Tul.	FOD, FAQ	-	-	-
A. yguazuensis Chodat & Vischer*	FES, FAQ	-	-	-
Castelnavia – 1/5				
C. princeps Tul. & Wedd.	FES, FAQ	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Cipoia – 1/2				
C. inserta C.T.Philbrick *et al.**	FES, FAQ	-	-	-
Lophogyne – 2/2				
L. arculifera Tul. & Wedd.*	FOD, FES, FAQ	-	-	-
L. helicandra Tul.*	FOD, FES, FAQ	-	-	-
Marathrum – 1/25				
M. azarense Tur*	FED, FAQ	-	-	-
Mourera – 1/6				
M. aspera Tul.	FOD, FES, FAQ	-	-	-
Podostemum – 9/11				
P. comatum Hicken	FOM, FES, FED, FAQ	-	-	-
P. distichum (Cham.) Wedd.	FOM, FES, FED, FAQ	-	-	-
P. irgangii C.T.Philbrick & Novelo*	FOM, FAQ	-	-	-
P. muelleri Warm.	FOM, FES, FED, FAQ	-	-	-
P. ovatum C.T.Philbrick & Novelo*	FOD, FAQ	-	-	-
P. rutifolium Warm.	FOM, FES, FED, FAQ	-	-	-
P. saldanhanum (Warm.) C.T.Philbrick & Novelo*	FOD, FAQ	-	EN	ANEXO I
P. scaturiginum (Mart.) C.T.Philbrick & Novelo	FOD, FES, FAQ	-	-	-
P. weddellianum (Tul.) C.T.Philbrick & Novelo	FOD, FES, FAQ	-	-	-
Tristicha – 1/2				
T. trifaria (Bory *ex* Willd.) Spreng.	FOM, FES, FED, FAQ	-	-	-
*Wettsteiniola** – 3/3				
W. accorsii (Toledo) P.Royen*	FOD, FAQ	-	-	-
W. apipensis Tur*	FES, FAQ	-	-	-
W. pinnata Suess.*	FES, FAQ	-	-	-

Polygalaceae

Maria do Carmo Mendes Marques

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
POLYGALACEAE – 105/940				
Bredemeyera – 8/60				
B. autranii Chodat*	FOD	-	-	-
B. brevifolia Klotzsch *ex* A.W.Benn.	FOD	-	-	-
B. floribunda Willd.	FOD	-	-	-
B. isabelliana Barb.Rodr.*	FOD	-	-	-
B. kunthiana A.St.-Hil.	RST, FOD	-	-	-
B. laurifolia A.W.Benn.	FOD	-	-	-
B. martiana A.W.Benn.	FOD	-	-	-
B. velutina A.W.Benn.	FOD	-	-	-
Diclidanthera – 2/4				
D. elliptica Miers*	FOD	-	-	-
D. laurifolia Mart.*	RST, FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Monnina – 8/200				
M. cardiocarpa A.St.-Hil. & Moq.	FOD	-	-	-
M. cuneata A.St.-Hil.	FOD	-	-	-
M. itapoanensis Vianna & Marques	RST	-	-	-
M. oblongifolia Arechav.	FOD	-	-	-
M. resedoides A.St.-Hil.	FOD	-	-	-
M. richardiana A.St.-Hil.	FOD	-	-	-
M. stenophylla A.St.-Hil.	FOM	-	-	-
M. tristaniana A.St.-Hil.	FOD	-	-	-
Polygala – 76/ca.500				
P. acuminata Willd.	FOD, FCA	-	-	-
P. adenophylla A.St.-Hil. & Moq.	FOD, FCA	-	-	-
P. albicans (A.W.Benn.) Grondona	FOD, RST	-	-	-
P. alfredii Chodat	FOD	-	-	-
P. angulata DC.	FOD	-	-	-
P. aphylla A.W.Benn.	FCA	-	-	-
P. appressa Benth.	FOD	-	-	-
P. aspalatha L.	FOD, FCA, RST	-	-	-
P. bocainensis Brade*	FOD	-	-	-
P. bonariensis Grondona	FOD	-	-	-
P. brasiliensis L.*	FOD, FCA	-	-	-
P. campestris Gardner*	FOD, FCA	-	-	-
P. celosioides A.W.Benn.	FOD, FCA	-	-	-
P. cneorum A.St.-Hil.*	FOD, FCA	-	-	-
P. cuspidata DC.	FOD	-	-	-
P. cyparissias A.St.-Hil. & Moq.	RST, FOD	-	-	-
P. decumbens A.W.Benn.	FOD	-	-	-
P. duarteana A.St.-Hil. & Moq.	FED, FCA	-	-	-
P. dusenii Norl.	FCA	-	-	-
P. equisetoides A.St.-Hil. & Moq.	FOD, FCA	-	-	-
P. exigua Hassk.	FOD	-	-	-
P. extraaxillaris Chodat	FOD	-	-	-
P. fimbriata A.W.Benn.	FOD, FCA	-	-	-
P. galioides Poir.	FOM, FCA	-	-	-
P. glaziovii Chodat*	FOD, FCA	-	-	-
P. glochidiata Kunth	FOD, AFL	-	-	-
P. grandifolia A.St.-Hil. & Moq.*	RST, FOD	-	-	-
P. hebeclada DC.	FCA, AFL	-	-	-
P. hirsuta A.St.-Hil. & Moq.	FCA	-	-	-
P. hygrophila Kunth	FOM, FCA	-	-	-
P. ilheotica Wawra	FOD, FCA	-	-	-
P. insignis Klotzsch*	FOD	-	-	-
P. klotzchii Chodat	FOD	-	-	-
P. lancifolia A.St.-Hil. & Moq.*	FOD, FES, FCA	-	-	-
P. laureola A.St.-Hil. & Moq.*	FOD	-	-	-
P. leptocaulis Torr. & A.Gray	RST, FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
P. linoides Poir.	FOD, FCA	-	-	-
P. longicaulis Kunth	FOD, FCA	-	-	-
P. lycopodioides Chodat	FCA, AFL	-	-	-
P. martiana A.W.Benn.	FOD	-	-	-
P. martinellii Marques & E.F.Guim.*	RST, FOD	-	-	-
P. minima Pohl *ex* A.W.Benn.	FOD	-	-	-
P. mollis Kunth	FOD	-	-	-
P. molluginifolia A.St.-Hil. & Moq.	FOD, FCA	-	-	-
P. moquiniana A.St.-Hil. & Moq.*	FOD	-	-	-
P. multiceps A.W.Benn.	FOD	-	-	-
P. obovata A.St.-Hil. & Moq.	FOD, FCA	-	-	-
P. oxyphylla DC.	FOD	-	-	-
P. paniculata L.	FOD, FES, FCA, RST, RUD	-	-	-
P. pulchella A.St.-Hil. & Moq.	FOD, FCA	-	-	-
P. pulcherrima Kuhlm.*	FOD	-	-	-
P. pumila Norl.*	FOD, FCA	-	-	-
P. punctata A.W.Benn.	FOD	-	-	-
P. remota A.W.Benn.	FCA	-	-	-
P. resedoides A.St.-Hil. & Moq.	FOD, FCA	-	-	-
P. revoluta Gardner*	FOD, FCA	-	-	-
P. rhodoptera Mart. *ex* A.W.Benn.	FOM	-	-	-
P. rojasii Chodat	FOD	-	-	-
P. roubienna A.St.-Hil. & Moq.	FOD, FCA	-	-	-
P. sabulosa A.W.Benn.	FCA	-	-	-
P. santosii Wurdack*	FOD	-	-	-
P. sedoides A.W.Benn.	RST, FOD	-	-	-
P. selaginoides A.W.Benn.	FOD	-	-	-
P. selloi (Spreng.) Bernardi*	FOD	-	-	-
P. spectabilis DC.	FOD	-	-	-
P. stricta A.St.-Hil. & Moq.	FOM, FCA	-	-	-
P. subverticillata Chodat*	FOD, FCA	-	-	-
P. tamariscea A.W.Benn.	FOD, FCA	-	-	-
P. tenella Willd.	FCA	-	-	-
P. tenuis DC.	FOD, FOM, FCA	-	-	-
P. timoutoides Chodat	FOD	-	-	-
P. urbani Chodat	FOD	-	-	-
P. variabilis Kunth	RST, FOD	-	-	-
P. violacea Aubl.	FOD	-	-	-
P. violoides A.St.-Hil.*	FOD	-	-	-
P. wettsteinii Chodat*	FOD	-	-	-
Securidaca – 11/80				
S. acrostichoides Cham.*	FES	-	-	-
S. acuminata A.St.-Hil. & Moq.	FOD	-	-	-
S. diversifolia (L.) S.F.Blake	RST, FOD	-	-	-
S. falcata Chodat	FOD, FES	-	-	-
S. lanceolata A.St.-Hil. & Moq.*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
S. leiocarpa S.F.Blake	FOD	-	-	-
S. macrocarpa A.W.Benn.*	FOD	-	-	-
S. ovalifolia A.St.-Hil. & Moq.	FOD	-	-	-
S. revoluta (A.W.Benn.) Marques*	RST, FOD	-	-	-
S. rivinifolia A.St.-Hil.	FOD	-	-	-
S. tomentosa A.St.-Hil.	FOD	-	-	-

Polygonaceae

Efigênia de Melo

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
POLYGONACEAE – 41/538				
Coccoloba – 22/170				
C. alnifolia Casar.	RST, FED, AFL	-	-	-
C. arborescens (Vell.) R.A Howard	FOD, RST	-	-	-
C. cordata Cham.	FOD, FES	-	-	-
C. declinata (Vell.) Mart.	RST, FED	-	-	-
C. fastigiata Meisn.	RST	-	-	-
C. glaziovii Lindau*	FOD	-	-	-
C. laevis Casar.*	RST	-	-	-
C. lucidula Benth.	RST, FES	-	-	-
C. marginata Benth.	FOD, FES	-	-	-
C. mollis Casar.	FOD, RST, FED	-	-	-
C. mosenii Lindau*	FOD, RST	-	-	-
C. oblonga Lindau*	FOD, RST	-	-	-
C. parimensis Benth.	FED, FES, RST	-	-	-
C. peltata Schott*	FOD, RST	-	-	-
C. persicaria Wedd.*	FOD	-	-	-
C. ramosissima Wedd.*	RST	-	-	-
C. rigida Meisn.*	RST	-	-	-
C. rosea Meisn.*	FOD, RST	-	-	-
C. scandens Casar.	FOD	-	-	-
C. striata Benth.	FOD, FED, RST	-	-	-
C. tenuiflora Lindau	FOD	-	-	-
C. warmingii Meisn.	FOD, FES	-	-	-
Polygonum – 12/200				
P. acuminatum Kunth	FOM	-	-	-
P. aviculare L.	FOM	-	-	-
P. diospyrifolium Cham.	FOM	-	-	-
P. ferrugineum Wedd.	FOM	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
P. glabrum Willd.	FOM	-	-	-
P. hispidum Kunth	FOM	-	-	-
P. hydropiperoides Michx.	FOM	-	-	-
P. meisnerianum Cham.	FOM	-	-	-
P. persicaria L.	FOM	-	-	-
P. punctatum Elliott	FOM	-	-	-
P. rubricaule Cham.	FOM	-	-	-
P. stelligerum Cham.	FOM	-	-	-
Rumex – 4/130				
R. acetosella L.	FOM	-	-	-
R. brasiliensis Link	FOD	-	-	-
R. crispus L.	FOM	-	-	-
R. obtusifolius L.	FOM	-	-	-
Ruprechtia – 2/20				
R. laxiflora Meisn.	FES, FED	-	-	-
R. paranensis Pendry*	FOD, FES	-	-	-
Triplaris – 1/18				
T. americana L.	FOD	-	-	-

Pontederiaceae

Marco Otávio Pivari

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
PONTEDERIACEAE – 10/35				
Eichhornia – 3/7				
E. azurea (Sw.) Kunth	FAQ	-	-	-
E. crassipes (Mart.) Solms	FAQ	-	-	-
E. paniculata (Spreng.) Solms	FAQ	-	-	-
Heteranthera – 3/11				
H. limosa Willd.	FAQ	-	-	-
H. reniformis Ruiz & Pav.	FAQ	-	-	-
H. zosterifolia Mart.	FAQ	-	-	-
Pontederia – 4/6				
P. cordata L.	FAQ	-	-	-
P. rotundifolia L.f.	FAQ	-	-	-
P. sagittata C. Presl.	FAQ	-		
P. subovata (Seub.) Lowden	FAQ	-	-	-

Portulacaceae

Alexa Araujo de Oliveira Paes Coelho

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
PORTULACACEAE –15/450-500				
Portulaca – 13/40				
P. amilis Speg.	FCA, RST	-	-	-
P. elatior Mart.	FCA, AFL	-	-	-
P. frieseana Poelln.	FCA	-	-	-
P. grandiflora Hook.	FCA, RST	-	-	-
P. halimoides L.	FCA, AFL	-	-	-
P. hatschbachii D.Legrand*	FCA	-	-	-
P. hirsutissima Cambess.	FCA	-	-	-
P. minensis D.Legrand	FCA, AFL	-	-	-
P. mucronata Link	FCA, FOM, RST	-	-	-
P. oleracea L.	FCA, FOD, FOM, FES, FED, FCA, AFL, RST	-	-	-
P. pilosa L.	FCA, FOM	-	-	-
P. umbraticola Kunth	FCA, RST, AFL, FOM	-	-	-
P. werdermannii Poelln.	FCA	-	-	-
Talinum – 2/14				
T. paniculatum (Jacq.) Gaertn.	FOM, FCA, AFL, RST, FES, FED	-	-	-
T. triangulare (Jacq.) Willd.	FOM, FCA, AFL, RST, FES, FED	-	-	-

Potamogetonaceae

Caetano Troncoso Oliveira

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
POTAMOGETONACEAE – 7/100				
Potamogeton – 7/95				
P. ferrugineus Hagström	FAQ	-	-	-
P. gayi A.Bennett	FAQ	-	-	-
P. illinoensis Morong	FAQ	-	-	-
P. montevidensis A.Bennett	FAQ	-	-	-
P. polygonus Cham. & Schltdl.	FAQ	-	-	-
P. pusillus L.	FAQ	-	-	-
P. spirilliformis Hagström	FAQ	-	-	-

Proteaceae

Ary Teixeira de Oliveira-Filho

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
PROTEACEAE – 23/83				
Euplassa – 11/20				
E. bahiensis (Meisn.) I.M.Johnst.*	FES	-	-	-
E. cantareirae Sleumer*	FOD, FOM	-	-	-
E. hoehnei Sleumer*	FOD	-	-	-
E. inaequalis (Pohl) Engl.	FES, FCA	-	-	-
E. incana (Klotzsch) I.M.Johnst.*	FES	-	-	-
E. itatiaiae Sleumer*	FOM, FES	-	-	-
E. legalis (Vell.) I.M.Johnst.	FOD, FES	-	-	-
E. nebularis Rambo & Sleumer*	FOD	-	VU	ANEXO I
E. organensis (Gardner) I.M.Johnst.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
E. rufa (Loes.) Sleumer*	FOD, FES	-	-	-
E. semicostata Plana*	FES	-	VU	ANEXO II
Panopsis – 2/11				
P. multiflora (Schott) Ducke*	FOD	-	-	-
P. rubescens (Pohl) Rusby	FOD, FES	-	-	-
Roupala – 10/52				
R. asplenioides Sleumer*	FOD, FOM	-	-	-
R. consimilis Mez *ex* Taub.*	FOD	-	-	-
R. cyclocarpa K.S.Edwards & Prance*	FOD	-	-	-
R. gracilis Meisn.*	FOD	-	-	-
R. longepetiolata Pohl*	FOD	-	-	-
R. montana Aubl.	FOD, FOM, FES, FED, FCA, RST	-	-	-
R. pallida K.Schum.*	FOD	-	-	-
R. paulensis Sleumer*	FOD, FES	-	-	-
R. sculpta Sleumer*	FOD	-	-	-
R. thomesiana Moric.*	FES, FCA	-	-	-

Putranjivaceae

Márcio de Souza Werneck

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
PUTRANJIVACEAE – 1/218				
Drypetes – 1/211				
D. sessiliflora Allemão*	FOD, FES	-	-	-

Quiinaceae

Claudio Nicoletti de Fraga & Ary Teixeira de Oliveira-Filho

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
QUIINACEAE – 3/55				
Lacunaria – 1/45				
L. decastyla (Radlk.) Ducke*	FOD, FES	-	-	-
Quiina – 2/10				
Q. glaziovii Engl.*	FOD	-	-	-
Q. magallanogomesii Schwacke*	FES	-	-	-

Quillajaceae

Rafaella Cardoso Ribeiro

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
QUILLAJACEAE – 1/3				
Quillaja – 1/3				
Q. brasiliensis (A.St.-Hil. & Tul.) Mart.	FOD, FOM	-	-	-

Ranunculaceae

Caetano Troncoso Oliveira

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
RANUNCULACEAE – 10/2.000				
Anemone – 2/150				
A. decapetala Arduino	FAC	-	-	-
A. sellowii Pritzel*	FOD, FOM	-	-	-
Clematis – 5/300				
C. affinis A.St.-Hil.	FCA, FOD, FES	-	-	-
C. bonariensis A.Juss.	FOD, FES	-	-	-
C. brasiliana DC.	FES	-	-	-
C. campestris A.St.-Hil.	FCA	-	-	-
C. ulbrichiana Pilg.*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Ranunculus – 3/400				
R. apiifolius Pers.	FCA	-	-	-
R. bonariensis Poir.	FCA	-	-	-
R. flagelliformis Sm.	FCA, FAQ	-	-	-

Rapateaceae

Rafaela Campostrini Forzza

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
RAPATEACEAE – 1/ca.100				
Rapatea – 1/18				
R. paludosa Aubl.	FOD	-	-	-

Rhamnaceae

Luciana H. Yoshino Kamino & Rafaella Cardoso Ribeiro

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
RHAMNACEAE – 25/925				
Alvimiantha – 1/1				
A. tricamerata Grey-Wilson	?	-	-	-
Colletia – 2/5				
C. exserta Klotzsch *ex* Reissek*	FCA, FOM	-	-	-
C. paradoxa (Spreng.) Escal.	FCA, FOM	-	-	-
Colubrina – 2/32				
C. glandulosa Perkins	FES, FOD	-	-	-
C. retusa (Pittier) Cowan	FES, FOD	-	-	-
Condalia – 1/20				
C. buxifolia Reissek	FOD	-	-	-
Crumenaria – 1/6				
C. polygaloides Reissek	FCA	-	-	-
Discaria – 1/8				
D. americana Gill. *ex* Hook.	FCA, AFL	-	-	-
Gouania – 8/50				
G. blanchetiana Miq.	FES, FOD	-	-	-
G. colurnifolia Reissek	FES, FOD, FED	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
G. corylifolia Raddi*	FES, FOD	-	-	-
G. inornata Reissek	FES	-	-	-
G. latifolia Reissek	FES, FED	-	-	-
G. ulmifolia Hook. & Arn.	FES, FOM, FOD	-	-	-
G. velutina Reissek	?	-	-	-
G. virgata Reissek	FES	-	-	-
Reissekia – 1/1				
R. smilacina (Sm.) Steud.	FES, FOD, RST	-	-	-
Rhamnidium – 2/22				
R. elaeocarpum Reissek	FES, FCA	-	-	-
R. glabrum Reissek	FOM, FOD	-	-	-
Rhamnus – 1/100				
R. sphaerosperma Sw.	FOM, FOD	-	-	-
Scutia – 2/5				
S. arenicola (Casar.) Reissek	RST	-	-	-
S. buxifolia Reissek	FOD	-	-	-
Ziziphus – 3/100				
Z. glaziovii Warm.*	RST	-	-	-
Z. platyphylla Reissek	RST, FES, FOD	-	-	-
Z. undulata Reissek	RST, FOD, FES	-	-	-

Rhizophoraceae

Márcio de Souza Werneck

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
RHIZOPHORACEAE – 1/ca. 150				
Rhizophora – 1/9				
R. mangle L.	MAN	-	-	-

Rosaceae

Marcos Sobral

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
ROSACEAE – 17/2.520				
Acaena – 1/100				
A. eupatoria Cham. & Schltdl.	FOM	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Agrimonia – 3/15				
A. hirsuta Bong. *ex* C.A.Mey.	FOM	-	-	-
A. parviflora Soland.	FOM	-	-	-
A. villosa Cham. & Schltdl.	FOM	-	-	-
Aphanes – 2/20				
A. arvensis L.	FOM, FCA	-	-	-
A. parodii (I.M.Johnst.) Rothm.	FOM, FCA	-	-	-
Geum – 2/40				
G. boliviense Focke	FOM	-	-	-
G. parviflorum Sm.	FOM	-	-	-
Margyricarpus – 1/1				
M. setosus Ruiz & Pav.	FCA, FOM, RST	-	-	-
Prunus – 1/200				
P. myrtifolia (L.) Urb.	FOD, FOM, FES	-	-	-
Rubus – 7/250				
R. brasiliensis Mart.	FOD, FOM	-	-	-
R. erythrocladus Mart. *ex* Hook.f.	FOD, FOM	-	-	-
R. imperialis Cham. & Schltdl.	FOD, FOM	-	-	-
R. rosifolius J.E.Sm.	FOD, FOM	-	-	-
R. schottii Pohl *ex* Focke	FOD, FOM	-	-	-
R. sellowii Cham. & Schltdl.	FOD, FOM	-	-	-
R. urticifolius Poir.	FOD, FOM	-	-	-

Rubiaceae

Daniela Zappi, Maria Regina de Vasconcellos Barbosa, Maria Fernanda Calió, Jomar Gomes Jardim, Maria do Socorro Pereira & Elnatan Bezerra de Souza

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
RUBIACEAE – 463/10.700				
Alibertia – 1/5				
A. rotunda (Cham.) K.Schum.*	AFL	-	-	-
Alseis – 3/20				
A. floribunda Schott	FOD	-	-	-
A. involuta K.Schum.*	FOD	-	-	-
A. pickelii Pilg. & Schmale	FES	-	-	-
Amaioua – 3/9				
A. guianensis Aubl.	FOD	-	-	-
A. intermedia Mart. *ex* Schult. & Schult.f.	FES	-	-	-
A. pilosa K.Schum.	FOD	-	-	-
Augusta – 1/1				
A. longifolia (Spreng.) Rehder	FOD, FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Bathysa – 7/13				
B. australis (A.St.-Hil.) K.Schum.	FOD	-	-	-
B. cuspidata (A.St.-Hil.) Hook.f. *ex* K.Schum.*	FOD, FOM	-	-	-
B. gymnocarpa K.Schum.*	FOD	-	-	-
B. mendoncae K.Schum.*	FOD, FES	-	-	-
B. nicholsonii K.Schum.*	FOD, FES	-	-	-
B. stipulata (Vell.) C.Presl*	FOD, FOM	-	-	-
B. sylvestrae Germano-Filho & M.Gomes *	FOD, FOM	-	-	-
*Bradea** – 5/5				
B. anomala Brade*	FOM, AFL	-	-	-
B. bicornuta Brade*	FOM, AFL	-	-	-
B. brasiliensis Standl.*	FOM, AFL	-	-	-
B. kuhlmannii Brade*	FOM, AFL	-	-	-
B. montana Brade*	FOM, AFL	-	-	-
Calycophyllum – 1/11				
C. papillosum J.H.Kirkbr.*	FOD	-	-	-
Carapichea – 2/4				
C. ipecacuanha (Brot.) L.Andersson	FES	-	-	-
C. lucida J.G.Jardim & Zappi*	FOD	-	-	-
Cephalanthus – 1/6				
C. glabratus (Spreng.) K.Schum.	FED	-	-	-
Chiococca – 3/23				
C. alba (L.) Hitchc.	FOD, RST, FED	-	-	-
C. nitida Benth.	RST, FOD, FES	-	-	-
C. plowmanii Delprete*	RST	-	-	-
Chomelia – 16/160				
C. angustifolia Benth.	FOD	-	-	-
C. anisomeris Müll.Arg.	FOD, FES	-	-	-
C. bahiae J.H.Kirkbr.*	FOD	-	-	-
C. brasiliana A.Rich.	FOD	-	-	-
C. estrellana Müll.Arg.*	FES	-	-	-
C. hirsuta Gardner	FOD	-	-	-
C. intercedens Müll.Arg.	FES	-	-	-
C. martiana Müll.Arg.	FES	-	-	-
C. modesta (Standl.) Steyerm.*	FES	-	-	-
C. obtusa Cham. & Schltdl.	FED	-	-	-
C. oligantha Müll.Arg.*	FES	-	-	-
C. parvifolia (Standl.) Govaerts	FOD	-	-	-
C. pedunculosa Benth.	FOD	-	-	-
C. pubescens Cham. & Schltdl.	FOD, FES	-	-	-
C. sessilis Müll.Arg.	FES	-	-	-
C. transiens Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
Coccocypselum – 13/20				
C. aureum (Spreng.) Cham. & Schltdl.	FOD, FES	-	-	-
C. bahiense C.B.Costa*	FOD	-	-	-
C. capitatum (Graham) C.B.Costa & Mamede	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
C. condalia Pers.	FOD	-	-	-
C. cordifolium Nees & Mart.	FOD	-	-	-
C. erythrocephalum Cham. & Schltdl.	FOD	-	-	-
C. geophiloides Wawra	FOD	-	-	-
C. glabrifolium Standl.	FOD	-	-	-
C. hasslerianum Chodat	FOD	-	-	-
C. lanceolatum (Ruiz & Pav.) Pers.	FOD, FOM	-	-	-
C. lymansmithii Standl.	FOD, FOM, FES	-	-	-
C. pedunculare Cham. & Schltdl.*	AFL	-	-	-
C. pulchellum Cham.	FOM	-	-	-
Cordiera – 3/35				
C. concolor (Cham.) Kuntze	FOD, FOM	-	-	-
C. elliptica (Cham.) Kuntze	FES	-	-	-
C. myrciifolia (K.Schum.) C.H.Perss. & Delprete	FOD, FES	-	-	-
Coussarea – 20/115				
C. accedens Müll.Arg.	FOD	-	-	-
C. bocainae M.Gomes*	FOD	-	-	-
C. capitata (Benth.) Müll.Arg.*	FOD, FES	-	-	-
C. coffeoides Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
C. congestiflora Müll.Arg.	FOD, FOM, FES	-	-	-
C. contracta (Walp.) Benth. & Hook.f. *ex* Müll.Arg.	FOD, FOM, FES	-	-	-
C. friburgensis M.Gomes*	FOD	-	-	-
C. graciliflora (Mart.) Müll.Arg.*	FOD, FES	-	-	-
C. hydrangeifolia (Benth.) Benth. & Hook.f. *ex* Müll.Arg.	FOM, FES	-	-	-
C. ilheotica Müll.Arg.*	FOD, FOM	-	-	-
C. leptopus Müll.Arg.*	FES	-	-	-
C. megistophylla Standl.*	FOD, FOM	-	-	-
C. meridionalis (Vell.) Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
C. nodosa (Benth.) Müll.Arg.*	FOD, FES	-	-	-
C. speciosa K.Schum. *ex* Glaz.*	FOD	-	-	-
C. strigosipes Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
C. triflora Müll.Arg.*	FOD, FES	-	-	-
C. verticillata Müll.Arg.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
C. violacea Aubl.*	FOD	-	-	-
C. viridis Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
Coutarea – 1/2				
C. hexandra (Jacq.) K.Schum.	FOD, FED, FES	-	-	-
Declieuxia – 7/27				
D. coerulea Gardner	FCA	-	-	-
D. cordigera Mart. & Zucc. *ex* Schult. & Schult.f.	AFL	-	-	-
D. dusenii Standl.*	FCA	-	-	-
D. fruticosa (Willd. *ex* Roem. & Schult.) Kuntze	FCA	-	-	-
D. lysimachioides Zucc. *ex* Schult. & Schult.f.	AFL, FCA	-	-	-
D. saturejoides Mart. & Zucc. *ex* Schult. & Schult.f.	AFL, FCA	-	-	-
D. tenuiflora (Willd. *ex* Roem. & Schult.) Steyerm.	FCA	-	-	-
*Denscantia** – 4/4				
D. andrei (E.L.Cabral & Bacigalupo) E.L.Cabral & Bacigalupo*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
D. cymosa (Spreng.) E.L.Cabral & Bacigalupo*	FOD, RST	-	-	-
D. macrobracteata (E.L.Cabral & Bacigalupo) E.L.Cabral & Bacigalupo*	FOD, RST	-	-	-
D. monodon (K.Schum.) E.L.Cabral & Bacigalupo *	FOD, RST	-	-	-
Deppea – 1/25				
D. blumenaviensis (K.Schum.) Lorence	FED, FES	-	-	-
Diodella – 3/7				
D. apiculata (Willd. *ex* Roem. & Schult.) Delprete	FOD, FCA	-	-	-
D. radula (Willd. *ex* Roem. & Schult.) Delprete	FOD, RST	-	-	-
D. teres (Walter) Small	FCA	-	-	-
Diodia – 1/5				
D. saponariifolia (Cham. & Schltdl.) K.Schum.	FOD, FCA	-	-	-
Emmeorhiza – 1/1				
E. umbellata (Spreng.) K.Schum.	FOD	-	-	-
Erithalis – 1/10				
E. insularis (Ridley) Zappi & T.Sena*	RST	-	CR	ANEXO I
Faramea – 57/200				
F. affinis Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
F. anisodonta Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
F. aristata Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
F. atlantica J.G.Jardim & Zappi*	FOD	-	-	-
F. axilliflora DC.*	FOD	-	-	-
F. bahiensis Müll.Arg.*	FOD	-	VU	ANEXO I
F. bicolor J.G.Jardim & Zappi*	FOD	-	-	-
F. biflora J.G.Jardim & Zappi*	FOD	-	-	-
F. brachyloba Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
F. calyciflora A.Rich. *ex* DC.*	FOD	-	-	-
F. campanella Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
F. campanularis Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
F. cardiophylla Standl.*	FOD	-	-	-
F. coerulea (Nees & Mart.) DC.*	FOD	-	EN	ANEXO I
F. cordifolia Glaz.*	FOD	-	-	-
F. dichotoma K.Schum. *ex* Glaz.*	FOM	-	-	-
F. eichleri Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
F. fallax Müll.Arg.*	FOM	-	-	-
F. filamentosa Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
F. glaziovii Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
F. heteromera Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
F. hyacinthina Mart.	FOD, FED	-	-	-
F. hymenocalyx M.Gomes*	FOD	-	-	-
F. includens Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
F. intercedens Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
F. involucellata Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
F. latifolia (Cham. & Schltdl.) DC.	FOD	-	-	-
F. leucocalyx Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
F. macrocalyx Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
F. martiana Müll.Arg.*	FOD, FOM	-	-	-
F. megalophylla Müll.Arg.*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
F. micrantha Müll.Arg.	FOD	-	-	-
F. monantha Müll.Arg.*	FOD	-	VU	ANEXO II
F. montevidensis (Cham. & Schltdl.) DC.	FOD	-	-	-
F. morsoniana Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
F. multiflora A.Rich.	FOD	-	-	-
F. nigrescens Mart.	FES	-	-	-
F. nitida Benth.	FES	-	-	-
F. nocturna J.G.Jardim & Zappi*	FOD	-	-	-
F. oligantha Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
F. oxyclada Müll.Arg.	FOD	-	-	-
F. pachyantha Müll.Arg.*	FOD, FOM	-	-	-
F. paratiensis M.Gomes*	FOD	-	-	-
F. picinguabae M.Gomes*	FOD	-	-	-
F. platyclada Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
F. platypoda Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
F. pohliana Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
F. sellowiana Benth.*	FOD	-	-	-
F. stenantha Müll.Arg.	FOD	-	-	-
F. stipulacea (Cham. & Schltdl.) DC.	FOD	-	-	-
F. subbasilaris Müll.Arg.	FES	-	-	-
F. tenuiflora Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
F. tetragona Müll.Arg.	FOD	-	-	-
F. tinguana Müll.Arg.*	FOM	-	-	-
F. truncata (Vell.) Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
F. urophylla Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
F. videnses Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
Ferdinandusa – 3/24				
F. edmundoi Sucre*	FES	-	-	-
F. elliptica (Pohl) Pohl	FOD, RST	-	-	-
F. ovalis (Pohl) Pohl	FOD, RST	-	-	-
Galianthe – 21/49				
G. angustifolia (Cham. & Schltdl.) E.L.Cabral	FCA	-	-	-
G. brasiliensis (Spreng.) E.L.Cabral & Bacigalupo	FOM, FED, FOD	-	-	-
G. centranthoides (Cham. & Schltdl.) E.L.Cabral	FOD	-	-	-
G. cymosa (Cham.) E.L.Cabral & Bacigalupo	FCA	-	-	-
G. elegans E.L.Cabral	FCA	-	-	-
G. equisetoides (Cham. & Schltdl.) E.L.Cabral	FES	-	-	-
G. fastigiata Griseb.	FED	-	-	-
G. gertii E.L.Cabral*	FCA, AFL	-	-	-
G. hispidula (A.Rich. *ex* DC.) E.L.Cabral & Bacigalupo	FED, FOM	-	-	-
G. latistipula E.L.Cabral	FCA	-	-	-
G. laxa (Cham. & Schltdl.) E.L.Cabral	FED, FOD	-	-	-
G. liliifolia (Standl.) E.L.Cabral*	FCA	-	-	-
G. longifolia (Standl.) E.L.Cabral	FCA	-	-	-
G. peruviana (Pers.) E.L.Cabral	FOM	-	-	-
G. polygonoides E.L.Cabral & Bacigalupo*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
G. pseudopeciolata E.L.Cabral	FOD	-	-	-
G. reitzii E.L.Cabral*	FCA	-	-	-
G. souzae E.L.Cabral & Bacigalupo	FCA	-	CR	ANEXO I
G. thalictroides (K.Schum.) E.L.Cabral	FCA	-	-	-
G. vaginata E.L.Cabral & Bacigalupo*	FCA	-	-	-
G. verbenoides (Cham. & Schltdl.) Griseb.	FOD?	-	-	-
Galium – 21/400				
G. atherodes Spreng.	?	-	-	-
G. bigeminum Griseb.	FOD	-	-	-
G. diphyllum (K.Schum.) Dempster	FOD	-	-	-
G. equisetoides (Cham. & Schltdl.) Standl.	FOD	-	-	-
G. ericoides Lam.	FCA	-	-	-
G. espiniacicum Dempster*	AFL	-	-	-
G. hatschbachii Dempster*	FCA	-	-	-
G. hirtum Lam.	?	-	-	-
G. humile Cham. & Schltdl.	FOM, FCA	-	-	-
G. hypocarpium (L.) Endl. *ex* Griseb.	FOD, FOM	-	-	-
G. latoramosum Clos	FOD, FOM	-	-	-
G. megapotamicum Spreng.	FOM	-	-	-
G. muelleri (K.Schum.) Dempster	FOM	-	-	-
G. nigroramosum (Ehrend.) Dempster	FOM	-	-	-
G. noxium (A.St.-Hil.) Dempster	FOD	-	-	-
G. ostenianum (Standl.) Dempster	?	-	-	-
G. ramboi Dempster*	FCA	-	-	-
G. richardianum (Gillespie *ex* Hook. & Arn.) Endl.	FCA	-	-	-
G. rubidiflorum Dempster	FCA	-	-	-
G. sellowianum (Cham.) Walp.	FCA	-	-	-
G. shepherdii Jung-Mend.	FOM	-	-	-
Genipa – 2/3				
G. americana L.	FOD, FOM, FED	-	-	-
G. infundibuliformis Zappi & Semir*	FOD, FOM, FED	-	-	-
Geophila – 2/30				
G. macropoda (Ruiz & Pav.) DC.	FED	-	-	-
G. repens (L.) I.M.Johnst.	FOD	-	-	-
Gonzalagunia – 1/40				
G. dicocca Cham. & Schltdl.	FOD, FES	-	-	-
Guettarda – 5/200				
G. grazielae M.R.Barbosa*	FED, FES	-	-	-
G. platyphylla Müll.Arg.	FOD, FES	-	-	-
G. platypoda DC.	FES, RST	-	-	-
G. uruguensis Cham. & Schltdl.	FES	-	-	-
G. viburnoides Cham. & Schltdl.	FOD, FES	-	-	-
Hamelia – 1/16				
H. patens Jacq.	FED, FES	-	-	-
Hillia – 3/24				
H. illustris (Vell.) K.Schum.	FOD, FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
H. parasitica Jacq.	FOD, FES	-	-	-
H. ulei K.Krause	FOD	-	-	-
Hindsia – 7/11				
H. arianeae Di Maio*	FCA	-	-	-
H. cucullata Di Maio*	FCA	-	-	-
H. glabra K.Schum.*	FCA	-	CR	ANEXO I
H. ibitipocensis Di Maio*	AFL	-	CR	ANEXO I
H. longiflora (Cham.) Benth. *ex* Lindl.*	FCA	-	-	-
H. ramosissima Gardner*	FOM	-	-	-
H. republicana Di Maio*	FCA	-	-	-
Hoffmannia – 2/100				
H. dusenii Standl.*	FOD, FOM	-	-	-
H. peckii K.Schum.	FOD	-	-	-
Ixora – 8/350				
I. bahiensis Benth.*	FOD	-	-	-
I. bracteolaris Müll.Arg.	?	-	-	-
I. brevifolia Benth.	FOD, FES	-	-	-
I. densiflora Müll.Arg.*	?	-	-	-
I. gardneriana Benth.*	FOD, FES	-	-	-
I. heterodoxa Müll.Arg.	FES	-	-	-
I. syringiflora (Schltdl.) Müll.Arg.*	FED	-	-	-
I. venulosa Benth.	FOD, FOM, FES	-	-	-
Ladenbergia – 1/34				
L. hexandra (Pohl) Klotzsch	RST, FES	-	-	-
Machaonia – 1/30				
M. brasiliensis (Hoffmanss. *ex* Humb.) Cham. & Schltdl.	FOD, FOM	-	-	-
Malanea – 4/60				
M. evenosa Müll.Arg.	FOD	-	-	-
M. forsteronioides Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
M. harleyi J.H.Kirkbr.*	FOD, FES	-	-	-
M. martiana Müll.Arg.	FOD	-	-	-
Manettia – 16/120				
M. beyrichiana K.Schum.*	?	-	-	-
M. campanulacea Standl.*	?	-	-	-
M. chrysoderma Sprague*	FOD	-	-	-
M. congesta (Vell.) K.Schum.*	FCA	-	-	-
M. cordifolia Mart.	FOD	-	-	-
M. glazioviana (K.Schum.) Sucre*	FOD	-	-	-
M. glaziovii Wernham*	FOD, FOM	-	-	-
M. gracilis Cham. & Schltdl.	FCA	-	-	-
M. luteorubra (Vell.) Benth.	?	-	-	-
M. mitis (Vell.) K.Schum.	?	-	-	-
M. paraguariensis Chodat	FCA	-	-	-
M. pauciflora Dusén*	FCA	-	-	-
M. pubescens Cham. & Schltdl.*	FOD	-	-	-
M. riedelii Wernham*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
M. tweedieana K.Schum.	FOD	-	-	-
M. verticillata Wernham*	FOD	-	-	-
Margaritopsis – 5/50				
M. astrellantha (Wernham) L.Andersson*	FOD	-	-	-
M. cephalantha (Müll.Arg.) C.M.Taylor	FOD, FES	-	-	-
M. chaenotricha (DC.) C.M.Taylor	FOD, FES	-	-	-
M. cymuligera (Müll.Arg.) C.M.Taylor*	FOD, FES	-	-	-
M. schuechiana (Müll.Arg.) C.M.Taylor*	FOD, FES	-	-	-
*Melanopsidium** – 1/1				
M. nigrum Colla*	FOD, RST	-	VU	ANEXO I
Mitracarpus – 4/30				
M. anthospermoides K.Schum.*	RST	-	VU	ANEXO II
M. eichleri K.Schum.*	RST	-	-	-
M. frigidus (Willd. *ex* Roem. & Schult.) K.Schum.	FOM	-	-	-
M. lhotzkyanus Cham.*	RST	-	-	-
Molopanthera – 1/1				
M. paniculata Turcz.	FOD, FES	-	-	-
Notopleura – 2/80				
N. bahiensis C.M.Taylor*	FOD	-	-	-
N. tapajozensis (Standl.) Bremek.	FOD	-	-	-
Oldenlandia –3/100				
O. corymbosa L.	?	-	-	-
O. dusenii Standl.*	?	-	-	-
O. salzmannii (DC.) Benth. & Hook.f. *ex* B.D.Jacks.	?	-	-	-
Pagamea – 2/20				
P. guianensis Aubl.	RST		-	-
P. harleyi Steyerm.*	RST	-	EN	ANEXO II
Palicourea – 11/200				
P. australis C.M.Taylor	FOM	-	-	-
P. blanchetiana Schltdl.*	FOD	-	-	-
P. croceoides Ham.	FOD, FES	-	-	-
P. fulgens (Müll.Arg.) Standl.*	FOD	-	EN	ANEXO II
P. guianensis Aubl.	FOD, RST	-	-	-
P. macrobotrys (Ruiz & Pav.) Schult.	FED	-	-	-
P. marcgravii A.St.-Hil.	FOD, FES	-	-	-
P. radians (Müll.Arg.) Standl.*	FOD	-	-	-
P. rudgeoides (Müll.Arg.) Standl.	FOD	-	-	-
P. tetraphylla Cham. & Schltdl.*	FOD, FES	-	-	-
P. veterinariorum J.H.Kirkbr.*	FOD	-	-	-
Perama – 1/14				
P. hirsuta Aubl.	RST, FCA	-	-	-
Posoqueria – 5/14				
P. acutifolia Mart.*	FOD	-	-	-
P. bahiensis Macias & Kin.-Gouv.*	FOD	-	-	-
P. latifolia (Rudge) Schult.	FOD, FES	-	-	-
P. macropus Mart.*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
P. palustris Mart.*	FOD	-	-	-
Psychotria – 75/1.000				
P. anceps Kunth	FES	-	-	-
P. appendiculata Müll.Arg.*	FOD, FES	-	-	-
P. ararum C.M.Taylor*	FOD?	-	-	-
P. bahiensis DC.	FOD, FES	-	-	-
P. beyrichiana Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
P. brachyceras Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
P. brachygyne Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
P. brachypoda (Müll.Arg.) Britton*	FOD	-	-	-
P. bracteocardia (DC.) Müll.Arg.	FOD, FES	-	-	-
P. bradei Standl.*	FCA	-	-	-
P. brevicollis Müll.Arg.	FES, FOD	-	-	-
P. capillacea (Müll.Arg.) Standl.	FES	-	-	-
P. carthagenensis Jacq.	FOD, FES	-	-	-
P. colorata (Willd. *ex* Schult.) Müll.Arg.	FOD, FES	-	-	-
P. cupularis (Müll.Arg.) Standl.	FES	-	-	-
P. deflexa DC.	FES	-	-	-
P. dusenii Standl.*	FOD	-	-	-
P. exannulata Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
P. fissistipula Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
P. fluminensis Vell.*	FOD	-	-	-
P. fractistipula L.B.Sm. *et al.**	FOD, FOM, FED	-	-	-
P. friburgensis Standl.*	FOD	-	-	-
P. glaziovii Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
P. gracilenta Müll.Arg.	FES	-	-	-
P. hastisepala Müll.Arg.	FOD, FES	-	-	-
P. hoffmannseggiana (Willd. *ex* Schult.) Müll.Arg.	FES	-	-	-
P. inaequifolia Müll.Arg.	FES	-	-	-
P. insolens Standl.*	FOD	-	-	-
P. intermedia Gardner*	FOD	-	-	-
P. iodotricha Müll.Arg.	FOD, FES	-	-	-
P. jambosioides Schltdl.*	FOD, RST	-	-	-
P. jasminoides Standl.*	FOD	-	-	-
P. laciniata Vell.	FOM	-	-	-
P. leiocarpa Cham. & Schltdl.	FOD, FED, FES	-	-	-
P. leitana C.M.Taylor*	FOD	-	-	-
P. loefgrenii Standl.*	FOD, RST	-	-	-
P. longipedunculata (Gardner) Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
P. lupulina Benth.	FES	-	-	-
P. malaneoides Müll.Arg.	FOD, FES	-	-	-
P. megalocalyx Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
P. microcarpa Müll.Arg.	?	-	-	-
P. mima Standl.*	FES, FOM	-	-	-
P. minutiflora Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
P. myriantha Müll.Arg.*	FED, FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
P. nemorosa Gardner*	FOD, FES	-	-	-
P. niveobarbata (Müll.Arg.) Britton	FED	-	-	-
P. nuda (Cham. & Schltdl.) Wawra*	FOD, FES	-	-	-
P. octocuspis Müll.Arg.*	FOD, FOM	-	-	-
P. opaca Müll.Arg.	FOD	-	-	-
P. pallens Gardner*	FOM, FES	-	-	-
P. paludosa Müll.Arg.*	FES, FOM	-	-	-
P. patentinervia Müll.Arg.	FES	-	-	-
P. phyllocalymma Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
P. platypoda DC.	FOD, FOM	-	-	-
P. pleiocephala Müll.Arg.*	FOD, FOM	-	-	-
P. racemosa Rich.	FES, FOM	-	-	-
P. rhytidocarpa Müll.Arg.*	FES	-	-	-
P. ruelliifolia (Cham. & Schltdl.) Müll.Arg.	FOD	-	-	-
P. rupestris Müll.Arg.*	FES, FOM	-	-	-
P. schlechtendaliana (Müll.Arg.) Müll.Arg.*	FES, FOM,	-	-	-
P. schottiana Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
P. setulifera C.M.Taylor*	FOM	-	-	-
P. spathicalyx Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
P. stachyoides Benth.	FOD	-	-	-
P. stenocalyx Müll.Arg.	FOD	-	-	-
P. strigosa Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
P. subspathacea Müll.Arg.*	FOM, RST	-	-	-
P. subspathulata (Müll.Arg.) C.M.Taylor	?	-	-	-
P. subtriflora Müll.Arg.	FES	-	-	-
P. suterella Müll.Arg.*	FOD, FES	-	-	-
P. tenerior (Cham.) Müll.Arg.	FOD, FOM	-	-	-
P. trichophora Müll.Arg.	FOD	-	-	-
P. ulei Standl.*	FOD, FOM	-	-	-
P. vellosiana Benth.	FOD, FES	-	-	-
P. warmingii Müll.Arg.*	FES	-	-	-
Randia – 4/90				
R. armata (Sw.) DC.	FOD, FES	-	-	-
R. calycina Cham.	FOD	-	-	-
R. ferox (Cham. & Schltdl.) DC.*	FOD, FED	-	-	-
R. itatiaiae Silva-Neto & ÁvilaJr.*	FOD, FES	-	_	_
Richardia – 7/15				
R. brasiliensis Gomes	FOD, FCA	-	-	-
R. grandiflora (Cham. & Schltdl.) Steud.	FOM, FCA, FES	-	-	-
R. humistrata (Cham. & Schltdl.) Steud.	FOD, FCA	-	-	-
R. pedicellata (K.Schum.) Kuntze	FED, FCA	-	-	-
R. scabra L.	FED, FCA	-	-	-
R. schumannii W.H.Lewis & R.L.Oliv.*	FOM	-	-	-
R. stellaris (Cham. & Schltdl.) Steud.	FOD?	-	-	-
*Riodocea** – 1/1				
R. pulcherrima Delprete*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Ronabea – 1/3				
R. latifolia Aubl.	FOD	-	-	-
Rudgea – 26/150				
R. coriacea (Spreng.) K.Schum.*	FOD	-	-	-
R. coronata (Vell.) Müll.Arg.	FOD	-	-	-
R. corymbulosa Benth.	FCA	-	-	-
R. crassifolia Zappi & E.Lucas*	RST, FOD	VU	VU	ANEXO II
R. discolor Benth.*	FCA	-	-	-
R. erythrocarpa Müll.Arg.*	FOD	-	EN	ANEXO II
R. francavillana Müll.Arg.*	FES	-	VU	ANEXO II
R. gardenioides (Cham.) Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
R. insignis Müll.Arg.*	FOD	-	EN	ANEXO II
R. interrupta Benth.	RST	-	EN	ANEXO I
R. jasminoides (Cham.) Müll.Arg.	FOD	-	-	-
R. macrophylla Benth.*	FOD	-	EN	ANEXO I
R. minor (Cham.) Standley*	RST	-	-	-
R. nobilis Müll.Arg.*	FOM	-	EN	ANEXO II
R. nodosa (Cham.) Benth.	FES	-	-	-
R. pachyphylla Müll.Arg.*	RST	-	EN	ANEXO I
R. parquioides (Cham.) Müll.Arg.*	FOM	-	-	-
R. parvifolia (Cham.) Müll.Arg.*	FOM?	-	CR	ANEXO I
R. recurva Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
R. reflexa Zappi	FOD, FOM	-	EN	ANEXO II
R. reticulata Benth.*	FOD, FOM	-	-	-
R. sessilis (Vell.) Müll.Arg.	FOM, FES	-	-	-
R. subcordata Müll.Arg.*	?	-	-	-
R. triflora Benth.*	FOM	-	-	-
R. umbrosa Müll.Arg.*	FOD	-	VU	ANEXO II
R. vellerea Müll.Arg.*	FOD	-	EN	ANEXO II
Rustia – 4/14				
R. angustifolia K.Schum.*	FOD	-	-	-
R. formosa (Cham. & Schltdl.) Klotzsch*	FOD, RST, FES	-	-	-
R. gracilis K.Schum.*	FOD	-	-	-
R. simpsonii Delprete*	FOD	-	-	-
Sabicea – 2/106				
S. grisea Cham. & Schltdl.	FOD, FOM	-	-	-
S. villosa Willd. *ex* Schult.	FOD	-	-	-
*Salzmannia** – 1/1				
S. nitida DC.*	FOD, FES, RST	-	-	-
Schradera – 1/50				
S. polycephala DC.	FOD	-	-	-
*Schwendenera** – 1/1				
S. tetrapyxis K.Schum.*	FOD		-	-
Simira – 9/42				
S. corumbensis (Standl.) Steyerm.	FES	-	-	-
S. eliezeriana Peixoto*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
S. glaziovii (K.Schum.) Steyerm.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
S. grazielae Peixoto*	FOD	-	-	-
S. hatschbachiorum J.H.Kirkbr.*	FOD	-	EN	ANEXO II
S. pikia (K.Schum.) Steyerm.	FOD	-	-	-
S. sampaioana (Standl.) Steyerm.*	FOD, FES	-	-	-
S. viridiflora (Allemão & Saldanha) Steyerm.*	FOD	-	-	-
S. walteri Silva Netto & Callado *	FOD	-	-	-
Sipanea – 2/10				
S. biflora (L.f.) Cham. & Schltdl.	FCA, FOD	-	-	-
S. hispida Benth.	FOD	-	-	-
Spermacoce – 28/300				
S. alata Aubl.	FOD	-	-	-
S. brachystemonoides (Cham. & Schltdl.) Kuntze	FOM?	-	-	-
S. bradei (Standl.) Govaerts*	FOM, FCA	-	-	-
S. brownii Standl.	FOD	-	-	-
S. capitata Ruiz & Pav.	FOM	-	-	-
S. casmae Govaerts*	FOD	-	-	-
S. cupularis (DC.) Kuntze	RST	-	-	-
S. dasycephala (Cham. & Schltdl.) Delprete	FCA	-	-	-
S. eryngioides (Cham. & Schltdl.) Kuntze	FOM?, RST	-	-	-
S. glabra Michx.	FOD	-	-	-
S. humifusa Willd. *ex* Roem. & Schult.	FOD, FES			
S. latifolia Aubl.	FCA	-	-	-
S. marticrovettiana (E.L.Cabral) Govaerts	RST	-	-	-
S. noronhensis (Sucre) Govaerts*	RST	-	-	-
S. ocymifolia Willd. *ex* Roem. & Schult.	FCA	-	-	-
S. ocymoides (Burm.f.) DC.	FOD	-	-	-
S. palustris (Cham. & Schltdl.) Delprete	FOD	-	-	-
S. paranaensis (E.L.Cabral & Bacigalupo) Delprete	FCA	-	-	-
S. quadrifaria (E.L.Cabral) Govaerts	?	-	-	-
S. remota Lam.	FOD	-	-	-
S. schumanniana (Taub. *ex* Ule) Govaerts	FOM	-	-	-
S. schumannii (Standl. *ex* Bacigalupo)	RST	-	-	-
S. suaveolens (G.Mey.) Kuntze	RST	-	-	-
S. tenella Kunth	FCA	-	-	-
S. valens (Standl.) Govaerts	FOM	-	-	-
S. verticillata L.	FOD	-	-	-
S. warmingii (K.Schum.) Kuntze	FCA	-	-	-
S. weygaertii Govaerts*	FOM	-	-	-
Sphinctanthus – 1/8				
S. insignis Steyerm.*	FOD	-	-	-
Stachyarrhena – 2/13				
S. harleyi J.H.Kirkbr.	FOD	-	-	-
S. reflexa Standl.*	FES	-	-	-
Staelia – 2/15				
S. galioides DC.*	RST	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
S. virgata (Link *ex* Roem. & Schult.) K.Schum.	FCA	-	-	-
Standleya * – 4/4				
S. erecta Brade*	FOM, FCA	-	-	-
S. kuhlmannii Brade*	FOD	-	-	-
S. limae Brade*	FOM	-	-	-
S. prostrata (K.Schum.) Brade*	FOM	-	-	-
Tocoyena – 4/24				
T. brasiliensis Mart.	FES	-	-	-
T. bullata (Vell.) Mart.	FES	-	-	-
T. formosa (Cham. & Schltdl.) K.Schum.	FOD, FES	-	-	-
T. sellowiana (Cham. & Schltdl.) K.Schum.*	FOD, FES	-	-	-

Ruppiaceae

Flávio Dayrell Gontijo

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
RUPPIACEAE – 1/15				
Ruppia – 1/15				
R. maritima L.	FAQ	-	-	-

Rutaceae

José Rubens Pirani

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
RUTACEAE – 92/1.815				
Almeidea – 5/5				
A. coerulea (Nees & Mart.) A.St.-Hil.*	FOD	-	EN	ANEXO I
A. lilacina A.St.-Hil.*	FOD, FES, RST	-	-	-
A. limae I.M.Silva*	FOD	-	-	-
A. longifolia A.St.-Hil.*	FOD, FES	-	-	-
A. rubra A.St.-Hil.	FOD, FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
*Andreadoxa** – 1/1				
A. flava Kallunki*	FOD	-	CR	ANEXO II
Angostura – 1/7				
A. bracteata (Nees & Mart.) Kallunki*	FOD	-	-	-
Balfourodendron – 1/2				
B. riedelianum (Engl.) Engl.*	FOD, FES	EN	-	-
Conchocarpus – 37/48				
C. adenantherus (Rizzini) Kallunki*	FOD	-	-	-
C. bellus Kallunki*	FOD	-	CR	ANEXO I
C. cauliflorus Pirani*	FOD	-	EN	ANEXO II
C. concinnus Kallunki*	RST	-	-	-
C. cuneifolius Nees & Mart.*	FOD, FES	-	-	-
C. cyrtanthus Kallunki*	FOD	-	-	-
C. dasyanthus Kallunki*	FOD	-	-	-
C. diadematus Pirani*	FOD, RST	-	-	-
C. elegans (A.St.-Hil.) Kallunki & Pirani*	FOD, RST	-	-	-
C. fissicalyx Pirani*	FOD	-	-	-
C. fontanesianus (A.St.-Hil.) Kallunki & Pirani*	FOD, RST	-	-	-
C. furcatus Kallunki*	FOD	-	-	-
C. gaudichaudianus (A.St.-Hil.) Kallunki & Pirani*	FOD, FES	-	-	-
C. grandiflorus (Engl.) Kallunki & Pirani*	FOD	-	-	-
C. heterophyllus (A.St.-Hil.) Kallunki & Pirani	FOD, FES, RST	-	-	-
C. hirsutus Pirani*	RST	-	-	-
C. inopinatus Pirani*	FOD, FES	-	-	-
C. insignis Pirani*	RST	-	-	-
C. longifolius (A.St.-Hil.) Kallunki & Pirani	FOD, RST	-	-	-
C. longipes Kallunki*	FOD	-	-	-
C. macrocarpus (Engl.) Kallunki & Pirani*	FOD	-	-	-
C. macrophyllus J.C.Mikan*	FOD, FES	-	-	-
C. marginatus (Rizzini) Kallunki & Pirani*	FOD	-	-	-
C. mastigophorus Kallunki*	FOD	-	-	-
C. minutiflorus Groppo & Pirani*	FOD	-	-	-
C. modestus Kallunki*	FOD	-	-	-
C. obovatus (Nees & Mart.) Kallunki & Pirani*	FOD	-	-	-
C. odoratissimus (Lindl.) Kallunki & Pirani*	FOD, FES	-	-	-
C. oppositifolius Kallunki*	FES	-	-	-
C. ovatus (A.St.-Hil.) Kallunki & Pirani*	FOD	-	-	-
C. paniculatus (Engl.) Kallunki & Pirani*	FOD	-	-	-
C. pentandrus (A.St.-Hil.) Kallunki & Pirani	FES	-	-	-
C. punctatus Kallunki*	FES	-	-	-
C. racemosus (A.St.-Hil.) Kallunki & Pirani*	FES	-	-	-
C. santosii Pirani & Kallunki*	FOD	-	-	-
C. silvestris (Nees & Mart.) Kallunki & Pirani*	FOD	-	-	-
C. sordidus Kallunki*	FOD	-	-	-
Dictyoloma – 1/2				
D. vandellianum A.Juss.	FOD, FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Ertela – 2/2				
E. bahiensis (Engl.) Kuntze*	FOD, FES	-	-	-
E. trifolia (L.) Kuntze	FOD, FES	-	-	-
Erythrochiton – 1/6				
E. brasiliensis Nees & Mart.	FOD, FES	-	-	-
Esenbeckia – 6/29				
E. densiflora (Chodat & Hassl.) Hassl.*	FOD, FES	-	-	-
E. febrifuga (A.St.-Hil.) A.Juss. *ex* Mart.*	FOD, FES, RST	-	-	-
E. grandiflora Mart.	FOD, FES, RST	-	-	-
E. hieronymii Engl.*	FES	-	-	-
E. leiocarpa Engl.*	FOD, FES	VU	-	-
E. pilocarpoides Kunth	FOD, FES	-	-	-
Galipea – 4/15				
G. carinata Pirani*	FOD	-	EN	ANEXO II
G. jasminiflora (A.St.-Hil.) Engl.	FOD, FES	-	-	-
G. laxiflora Engl.*	FOD, RST	-	-	-
G. revoluta Pirani*	FOD, RST	-	-	-
Helietta – 1/8				
H. apiculata Benth.	FES	-	-	-
Hortia – 1/10				
H. brasiliana Vand. *ex* DC.	FOD, FES	-	-	-
Metrodorea – 3/5				
M. maracasana Kaastra*	FOD, RST	-	EN	ANEXO I
M. nigra A.St.-Hil.	FOD, FES	-	-	-
M. stipularis Mart.	FES	-	-	-
Neoraputia – 5/6				
N. alba (Nees & Mart.) Emmerich*	FOD, FES	-	-	-
N. calliantha Kallunki*	FOD, FES	-	-	-
N. magnifica (Engl.) Emmerich*	FOD	-	-	-
N. micrantha Kallunki	FOD	-	-	-
N. trifoliata (Engl.) Emmerich*	FOD	-	-	-
Pilocarpus – 7/17				
P. giganteus Engl.*	FOD, FES, RST	-	-	-
P. grandiflorus Engl.*	FOD, RST	-	-	-
P. jaborandi Holmes*	FES	-	VU	ANEXO I
P. pauciflorus A.St.-Hil.*	FOD, FES, RST	-	-	-
P. pennatifolius Lem.	FOD, FOM, FES	-	-	-
P. riedelianus Engl.*	RST	-	-	-
P. spicatus A.St.-Hil.*	FOD, FES, RST	-	-	-
Rauia – 2/7				
R. nodosa (Engl.) Kallunki*	RST	-	-	-
R. resinosa Nees & Mart.	FOD, FES	-	-	-
*Raulinoa** – 1/1				
R. echinata Cowan*	FES	-	EN	ANEXO I
Ravenia – 1/14				
R. infelix Vell.*	FOD, RST	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Spiranthera – 1/4				
S. atlantica Pirani*	FOD	-	-	-
Zanthoxylum – 11/200				
Z. acuminatum (Sw.) Sw.	FOD, FES	-	-	-
Z. caribaeum Lam.	FOD, FES	-	-	-
Z. fagara (L.) Sarg.	FOD, FES, RST	-	-	-
Z. kleinii (R.S.Cowan) P.G.Waterman*	FOM	-	-	-
Z. monogynum A.St.-Hil.	FOD, FES, RST	-	-	-
Z. nemorale Mart.*	FOD	-	-	-
Z. petiolare A.St.-Hil. & Tul.	FOD, FOM, FES	-	-	-
Z. retusum (Albuq.) P.G.Waterman*	FOD	-	-	-
Z. rhoifolium Lam.	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
Z. riedelianum Engl.	FES	-	-	-
Z. tingoassuiba A.St.-Hil.	FOD, FES, RST	-	-	-

Sabiaceae

Julio Antonio Lombardi

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
SABIACEAE – 3/3				
Meliosma – 3/> 50				
M. chartacea Lombardi*	FOD	-	-	-
M. itatiaiae Urb.*	FOD, FOM	-	-	-
M. sellowii Urb.	FES, FOD, FOM	-	-	-

Salicaceae

Ronaldo Marquete

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
SALICACEAE – 43/2.806				
Abatia – 4/21				
A. americana (Gardner) Eichler*	FOD	-	-	-
A. angeliana M.H.Alford	FOD, FOM, FES	-	-	-
A. glabra Sleumer*	FOD	-	-	-
A. microphylla Taub.*	FOD	-	-	-
Azara – 1/30				
A. uruguayensis (Speg.) Sleumer	FOD, FOM	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Banara –5/65				
B. brasiliensis (Schott) Benth.*	FOD	VU	-	-
B. guianensis Aubl.	FOD	-	-	-
B. parviflora (A.Gray) Benth.	FOD	-	-	-
B. serrata (Vell.) Warb.	FOD	-	-	-
B. tomentosa Clos	FOD	-	-	-
Casearia – 23/353				
C. aculeata Jacq.	FOD	-	-	-
C. arborea (L.C.Rich.) Urb.	FOD	-	-	-
C. bahiensis Sleumer*	FOD	-	-	-
C. catharinensis Sleumer*	FOD	-	-	-
C. commersoniana Cambess.	FOD	-	-	-
C. decandra Jacq.	FOD	-	-	-
C. eichleriana Sleumer	FCA	-	-	-
C. gossypiosperma Briq.	FOD	-	-	-
C. grandiflora Cambess.	FOD	-	-	-
C. guianensis (Aubl.) Urb.	FOD	-	-	-
C. javitensis Kunth	FCA	-	-	-
C. lasiophylla Eichler	FOD	-	-	-
C. luetzelburgii Sleumer	FOD	-	-	-
C. mariquitensis Kunth	FOD	-	-	-
C. melliodora Eichler	FOD	-	-	-
C. mestrensis Sleumer	FCA	-	-	-
C. obliqua Spreng.	FOD	-	-	-
C. oblongifolia Cambess.	FOD	-	-	-
C. paranaensis Sleumer*	FOD	-	-	-
C. pauciflora Cambess.	FOD	-	-	-
C. selloana Eichler	FOD	-	-	-
C. sessiliflora Cambess.*	FOD	-	-	-
C. sylvestris Sw.	FOD, FCA	-	-	-
Laetia – 1/32				
L. americana L.	FOD	-	-	-
*Macrothumia** – 1/1				
M. kuhlmannii (Sleumer) M.H.Alford*	FOD	-	-	-
Prockia – 1/33				
P. crucis L.	FOD, FES	-	-	-
Salix – 1/2128				
S. humboldtiana Willd.	FCA	-	-	-
Xylosma – 6/142				
X. ciliatifolium (Clos) Eichler	FOD	-	-	-
X. glaberrimum Sleumer	FOD	-	-	-
X. prockia (Turcz.) Turcz.	FOD	-	-	-
X. pseudosalzmannii Sleumer	FOD	-	-	-
X. tweedianum (Clos) Eichler	FOD	-	-	-
X. venosum N.E.Br.	FOD	-	-	-

Santalaceae

Claudenir Simões Caires

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
SANTALACEAE – 48/484				
Acanthosyris – 1/3				
A. spinescens (Mart. & Eichler) Griseb.	FOD	-	-	-
Antidaphne – 2/9				
A. glaziovii (Tiegh.) Kuijt*	FOD	-	-	-
A. schottii (Eichler) Kuijt*	FOD	-	-	-
Arjona – 1/8				
A. megapotamica Malme	AFL	-	-	-
Dendrophthora – 2/124				
D. elliptica (Gardn.) Krug & Urb.	FOD	-	-	-
D. warmingii (Eichler) Kuijt	FOD	-	-	-
Eubrachion – 1/2				
E. ambiguum (Hook. & Arn.) Engl.	FOD, FCA	-	-	-
Jodina – 1/1				
J. rhombifolia Hook. & Arn.	FOM	-	-	-
Phoradendron – 38/237				
P. affine (Pohl *ex* DC.) Engl. & K.Krause	FES	-	-	-
P. bathyoryctum Eichler	FES	-	-	-
P. berteroanum (DC.) Griseb.	FOD	-	-	-
P. caripense Eichler	FES, AFL	-	-	-
P. chrysocladon A.Gray	FES	-	-	-
P. congestum Trel.	FES	-	-	-
P. coriaceum Mart.	FES	-	-	-
P. craspedophyllum Eichler*	FOD	-	-	-
P. crassifolium (Pohl *ex* DC.) Eichler	FOD	-	-	-
P. dipterum Eichler	FOD, FES	-	-	-
P. ensifolium (Pohl *ex* DC.) Eichler	FOD	-	-	-
P. falcifrons (Hook. & Arn.) Eichler	FOD	-	-	-
P. fragile Urb.	FOD	-	-	-
P. habrostachyum Eichler	FOD	-	-	-
P. hexastichum (DC.) Griseb.	FOD, FOM	-	-	-
P. inaequidentatum Rusby	FOD, FES	-	-	-
P. interruptum (DC.) B.D.Jack.	FOD	-	-	-
P. liga (Gill. *ex* Hook. & Arn.) Eichler	FOD, FED	-	-	-
P. lindemanii Kuijt	FES	-	-	-
P. linearifolium Eichler	FED	-	-	-
P. microphyllum (Pohl *ex* DC.) Trel.	FOD, FED	-	-	-
P. mucronatum (DC.) Krug & Urb.	FES, FOM	-	-	-
P. nigricans Rizzini	FED	-	-	-
P. nitidum (Gardn.) Eichler	FED	-	-	-
P. obtusissimum (Miq.) Eichler	FOD, FOM	-	-	-
P. pachyneuron Kuijt	FOD, FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
P. paraguari Kuijt	FES	-	-	-
P. pellucidulum Eichler	FOD, FOM	-	-	-
P. perrottetii (DC.) Eichler	FOD, FED	-	-	-
P. piperoides (Kunth) Trel.	FOD	-	-	-
P. platycaulon Eichler	FOD	-	-	-
P. pteroneuron Eichler	FOD	-	-	-
P. quadrangulare (Kunth) Griseb.	FES, FED	-	-	-
P. racemosum (Aubl.) Krug & Urb.	FOD, FOM	-	-	-
P. reductum Trel.	FES	-	-	-
P. strongyloclados Eichler	FOD, FED	-	-	-
P. tunaeforme (DC.) Eichler	FOD	-	-	-
P. undulatum (Pohl *ex* DC.) Eichler	FOD, FES	-	-	-
Thesium – 2/100				
T. aphyllum Mart. *ex* A.DC.	FCA	-	-	-
T. brasiliense A.DC.	FCA, AFL	-	-	-

Sapindaceae

Genise Somner & María Silvia Ferrucci

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
SAPINDACEAE – 164/1.021				
Allophylus – 15/217				
A. chrysoneurus Radlk.*	FOD	-	-	-
A. dioicus (Nees & Mart.) Radlk.	FOD	-	-	-
A. edulis (A.St.-Hil. *et al.*) Radlk.	FES, FOD	-	-	-
A. guaraniticus (A.St.-Hil.) Radlk.	FOD, FES	-	-	-
A. heterophyllus (Cambess.) Radlk.*	FOD	-	-	-
A. laevigatus (Turcz.) Radlk.	FOD	-	-	-
A. leucoclados Radlk.*	FOD	-	-	-
A. leucophloeus Radlk.*	FOD	-	-	-
A. melanophloeus Radlk.*	FOD	-	-	-
A. membranifolius Radlk.*	FOD	-	-	-
A. petiolulatus Radlk.	FES, FOD, RST	-	-	-
A. puberulus (Cambess.) Radlk.	FOD, RST	-	-	-
A. quercifolius (Mart.) Radlk.	FES	-	-	-
A. semidentatus (Miq.) Radlk.	FOD, FES	-	-	-
A. sericeus (Cambess.) Radlk.	FOD, FES	-	-	-
Averrhoidium – 1/4				
A. paraguaiense Radlk.	FES	-	-	-
Cardiospermum – 5/14				
C. corindum L.	AFL, FOD, FES, FED, FCA, RST	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
C. grandiflorum Sw.	FOD, FES	-	-	-
C. halicacabum L.	FOD, FES, FCA	-	-	-
C. *heringeri* Ferrucci*	FOD	-	-	-
C. *integerrimum* Radlk.*	FOD, FES	-	-	-
Cupania – 15/77				
C. bracteosa Radlk.	FOD, RST	-	-	-
C. concolor Radlk.	FOD	-	-	-
C. crassifolia Radlk.*	FOD	-	-	-
C. emarginata Cambess.	FOD, RST	-	-	-
C. fluminensis Acev.-Rodr.	FOD, RST	-	-	-
C. furfuracea Radlk.	FOD	-	-	-
C. impressinervia Acev.-Rodr.	FOD	-	-	-
C. ludowigii Somner & Ferrucci	FOD, FES	-	-	-
C. oblongifolia Mart.	FOD, FES	-	-	-
C. platycarpa Radlk.	FOD, FES	-	-	-
C. racemosa (Vell.) Radlk.	FOD, FES	-	-	-
C. schizoneura Radlk.*	FOD	-	-	-
C. tenuivalvis Radlk.	FOD, FES	-	-	-
C. vernalis Cambess.	FOD, FES	-	-	-
C. zanthoxyloides Cambess.	FOD, FES	-	-	-
Diatenopteryx – 1/2				
D. sorbifolia Radlk.	FOD, FES, FOM	-	-	-
Dilodendron – 1/3				
D. bipinnatum Radlk.	FOD, FES, FED	-	-	-
Dodonaea – 1/68				
D. viscosa Jacq.	FES; RST	-	-	-
Magonia – 1/1				
M. pubescens A.St.-Hil.	FES	-	-	-
Matayba – 15/65				
M. cristae Reitz	FOD	-	-	-
M. discolor (Spreng.) Radlk.*	RST	-	-	-
M. elaeagnoides Radlk.	FOD, FES	-	-	-
M. grandis Radlk.	FOD	-	-	-
M. guianensis Aubl.	FOD, FES, RST	-	-	-
M. intermedia Radlk.	FOD, FES, RST	-	-	-
M. juglandifolia (Cambess.) Radlk.	FOD, FES	-	-	-
M. leucodictya Radlk.*	FOD	-	-	-
M. marginata Radlk.	FOD, FES	-	-	-
M. mollis Radlk.	FOD	-	-	-
M. pallens Radlk.*	FOD	-	-	-
M. paucijuga Radlk.*	FOD	-	-	-
M. stenodictya Radlk.*	FOD	-	-	-
M. sylvatica (Casar.) Radlk.	FOD	-	-	-
M. talisioides Radlk.*	FOD	-	-	-
Melicoccus – 2/10				
M. espiritosantensis Acev.-Rodr.	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
M. oliviformis Kunth	FOD	-	-	-
Paullinia – 25/225				
P. bicorniculata Somner	FOD	-	-	-
P. carpopoda Cambess.	FOD, FES	-	-	-
P. castaneifolia Radlk.	FOD	-	-	-
P. coriacea Casar.	RST	-	-	-
P. cristata Radlk.	FOD, RST	-	-	-
P. elegans Cambess.	FOD, FES	-	-	-
P. ferruginea Casar.	FOD, RST	-	-	-
P. fusiformis Radlk.	FOD	-	-	-
P. livescens Radlk.*	FOD	-	-	-
P. marginata Casar.*	FOD	-	-	-
P. meliifolia Radlk.	FOD, RST	-	-	-
P. micrantha Cambess.	FOD	-	-	-
P. pinnata L.	FOD	-	-	-
P. racemosa Wawra	FOD, RST	-	-	-
P. revoluta Radlk.	FOD	-	-	-
P. rhomboidea Radlk.	FOD	-	-	-
P. rubiginosa Cambess.	FOD	-	-	-
P. seminuda Radlk.	FOD	-	-	-
P. spicata Benth.	FOD, FES	-	-	-
P. ternata Radlk.	RST	-	-	-
P. thalictrifolia A.Juss.	FOD	-	-	-
P. trigonia Vell.	FOD, RST	-	-	-
P. uloptera Radlk.	FOD, RST	-	-	-
P. weinmanniifolia Mart.	RST	-	-	-
P. xestophylla Radlk.*	FOD	-	-	-
Pseudima – 1/3				
P. frutescens Radlk.	FOD	-	-	-
Sapindus – 1/8				
S. saponaria L.	FOD, FES	-	-	-
Scyphonychium – 1/1				
S. multiflorum (Mart.) Radlk.	FOD	-	-	-
Serjania – 55/233				
S. acoma Radlk.	FES	-	-	-
S. bradeana Somner	FOD	-	-	-
S. caracasana (Jacq.) Willd.	FOD, FES	-	-	-
S. clematidifolia Cambess.	FOD, RST	-	-	-
S. comata Radlk.	FOD, FES	-	-	-
S. communis Cambess.	FOD, FES	-	-	-
S. confertiflora Radlk.	FOD, RST	-	-	-
S. corrugata Radlk.	FOD, RST	-	-	-
S. cuspidata Cambess.	FOD, RST	-	-	-
S. decemstriata Radlk.*	FOD	-	-	-
S. deflexa Gardner	FOD, FES	-	-	-
S. dentata (Vell.) Radlk.	FES; RST	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
S. divaricocca Somner & Acev.-Rodr.*	FOD	-	-	-
S. dura Radlk.*	RST	-	-	-
S. elegans Cambess.	FOD	-	-	-
S. erecta Radlk.	FCA	-	-	-
S. erythrocaulis Acev.-Rodr. & Somner*	FOD	-	-	-
S. espiritosantensis Somner*	FOD	-	-	-
S. eucardia Radlk.	FOD, RST	-	-	-
S. faveolata Radlk.*	FOD	-	-	-
S. fuscifolia Radlk.	FOD, FES	-	-	-
S. glabrata Kunth	FOD, FES	-	-	-
S. glutinosa Radlk.	FOD, FES	-	-	-
S. gracilis Radlk.	FOD, FES	-	-	-
S. hatschbachii Ferrucci*	FES	-	-	-
S. hebecarpa Benth.	FES	-	-	-
S. ichtyoctona Radlk.	FOD, FES, FED, RST	-	-	-
S. itatiaiensis Somner*	FOD	-	-	-
S. lamprophylla Radlk.	FOD	-	-	-
S. lancistipula Acev.-Rodr.*	FOD	-	-	-
S. laruotteana Cambess.	FOD, FES	-	-	-
S. lethalis A.St.-Hil.	FOD, FES	-	-	-
S. macrostachya Radlk.	FOD	-	-	-
S. magnistipulata Acev.-Rodr.*	FOD	-	-	-
S. mansiana Mart.	FES	-	-	-
S. marginata Casar.	FES	-	-	-
S. meridionalis Cambess.	FOD, FES	-	-	-
S. morii Acev.-Rodr.*	FOD	-	-	-
S. multiflora Cambess.	FOD, FES	-	-	-
S. noxia Cambess.	FOD, FES	-	-	-
S. obtusidentata Radlk.	FES	-	-	-
S. ovalifolia Radlk.	FES	-	-	-
S. oxytoma Radlk.	FOD	-	-	-
S. paradoxa Radlk.	FES	-	-	-
S. paucidentata DC.	FOD	-	-	-
S. pernambucensis Radlk.	FOD, FES, RST	-	-	-
S. perulacea Radlk.	FES	-	-	-
S. pinnatifolia Radlk.	FES	-	-	-
S. piscatoria Radlk.	FOD	-	-	-
S. platycarpa Benth.	FES	-	-	-
S. regnellii Schltdl.	FOD, FES	-	-	-
S. reticulata Cambess.	FOD, FES	-	-	-
S. salzmanniana Schltdl.	FOD, FES, RST	-	-	-
S. scopulifera Radlk.	FOD	-	-	-
S. tenuis Radlk.*	FOD, RST	-	-	-
Talisia – 5/52				
T. angustifolia Radlk.	FES	-	-	-
T. cerasina (Benth.) Radlk.	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
T. coriacea Radlk.	FOD	-	-	-
T. cupularis Radlk.	FOD	-	-	-
T. esculenta (Cambess.) Radlk.	FES, FED	-	-	-
Thinouia – 6/9				
T. mucronata Radlk.	FES	-	-	-
T. paraguayensis (Britton) Radlk.	FOD	-	-	-
T. restingae Ferrucci & Somner	FES; RST	-	-	-
T. scandens (Cambess.) Triana & Planch.	FOD, FES	-	-	-
T. ternata Radlk.	FOD	-	-	-
T. ventricosa Radlk.	FES	-	-	-
Toulicia – 4/14				
T. laevigata Radlk.	FOD	-	-	-
T. stans (Schott) Radlk.*	FOD	-	-	-
T. subsquamulata Radlk.	FOD	-	-	-
T. tomentosa Radlk.	FES	-	-	-
*Tripterodendron** – 1/1				
T. filicifolium (Linden) Radlk.*	FOD	-	-	-
Urvillea – 9/17				
U. glabra Cambess.	RST	-	-	-
U. intermedia Radlk.*	FOD	-	-	-
U. laevis Radlk.	FOD, FES	-	-	-
U. rufescens Cambess.	FES; RST	-	-	-
U. stipitata Radlk.	FOD, RST	-	-	-
U. stipularis Ferrucci*	FOD	-	-	-
U. triphylla (Vell.) Radlk.	FOD	-	-	-
U. ulmacea Kunth	FOD, FES	-	-	-
U. uniloba Radlk.	FOD, FES	-	-	-

Sapotaceae

Eduardo Bezerra de Almeida Jr., Carmen Sílvia Zickel, Cláudia Elena Carneiro & Maria Helena Durães Alves Monteiro

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
SAPOTACEAE – 65/325				
Chrysophyllum – 13/43				
C. flexuosum Mart.	RST, FOM, FOD	-	-	-
C. gonocarpum (Mart. & Eichler *ex* Miq.) Engl.	FES	-	-	-
C. imperiale (Linden *ex* K.Koch & Fintelm.) Benth. & Hook.*	FES	EN	EN	ANEXO II
C. inornatum Mart.	FOD	-	-	-
C. januariense Eichler	RST	EX	-	-
C. lucentifolium Cronquist	FOD, RST	-	-	-
C. marginatum (Hook. & Arn.) Radlk.	FES, FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
C. paranaense T.D.Penn.	FES	VU	-	-
C. rufum Mart.	FOD	-	-	-
C. sparsiflorum Klotzsch *ex* Miq.	FOD	-	-	-
C. splendens Spreng.	FOD	VU	-	-
C. subspinosum Monach.*	FOD	EN	-	-
C. viride Mart. & Eichler	FOD	-	-	-
Diploon – 1/1				
D. cuspidatum (Hoehne) Cronquist	FOD	-	-	-
Ecclinusa – 1/11				
E. ramiflora Mart.	FOD, FES, RST	-	-	-
Manilkara – 11/30				
M. bella Monach.*	FOD	EN	-	-
M. dardanoi Ducke*	FES	EN	EN	ANEXO II
M. decrescens T.D.Penn.*	RST	EN	-	-
M. elata (Allemão *ex* Miq.) Monach.*	FOD	EN	-	-
M. longifolia (A.DC.) Dubard*	FOD	EN	-	-
M. maxima T.D.Penn.*	RST	VU	-	-
M. multifida T.D.Penn.*	RST	EN	-	-
M. rufula (Miq.) Lam.	FOD, FED	-	-	-
M. salzmannii (A.DC.) Lam.	RST, FOD	-	-	-
M. subsericea (Mart.) Dubard*	FOD, RST	-	-	-
M. triflora (Allemão) Monach.*	RST	-	-	-
Micropholis – 6/38				
M. compta Pierre*	FOD	VU	-	-
M. crassipedicellata (Mart. & Eichler *ex* Miq.) Pierre*	FOD	-	-	-
M. emarginata T.D.Penn.*	AFL	EN	-	-
M. gardneriana (A.DC.) Pierre	FOD	-	-	-
M. guyanensis (A.DC.) Pierre	FOD	-	-	-
M. venulosa (Mart. & Eichler) Pierre	FOD	-	-	-
Pouteria – 27/179				
P. andarahiensis T.D.Penn.*	FOM, AFL	EN	-	-
P. bangii (Rusby) T.D.Penn.	FOD	-	-	-
P. bapeba T.D.Penn.*	FOD	VU	-	-
P. beaurepairei (Glaz. & Raunk.) Baehni	FOM, RST	-	-	-
P. bullata (S.Moore) Baehni*	FOD	VU	-	-
P. butyrocarpa (Kuhlm.) T.D.Penn.*	FOD	EN	-	-
P. caimito (Ruiz & Pav.) Radlk.	FOD, FOM, RST	-	-	-
P. coelomatica Rizzini*	FOM	EN	-	-
P. filipes Eyma	RST	-	-	-
P. gardneri (Mart. & Miq.) Baehni	FOM, FES, FCA, AFL	-	-	-
P. gardneriana (A.DC.) Radlk.	FOM	-	-	-
P. glomerata (Miq.) Radlk.	FOD	-	-	-
P. grandiflora (A.DC.) Baehni*	RST	-	-	-
P. guianensis Aubl.	FOD	-	-	-
P. macahensis T.D.Penn.*	FOM, RST	-	-	-
P. macrophylla (Pierre *ex* Dubard) Baehni	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
P. microstrigosa T.D.Penn.*	FOD	VU	-	-
P. oxypetala T.D.Penn.*	FOD	EN	-	-
P. pachycalyx T.D.Penn.*	FOD	CR	-	-
P. peduncularis (Mart. & Eichler *ex* Miq.) Baehni*	FOD	-	-	-
P. procera (Mart.) T.D.Penn.	FOD	-	-	-
P. psammophila (Mart.) Radlk.*	FOD, FOM, RST	EN	-	-
P. reticulata (Engl.) Eyma	FOM, FES	-	-	-
P. salicifolia (Spreng.) Radlk.	FOD, FCA	-	-	-
P. stenophylla Baehni*	FOD	-	-	-
P. torta (Mart.) Radlk.	FOD, FOM, FCA	-	-	-
P. venosa (Mart.) Baehni	FOD, FOM, RST	-	-	-
Pradosia – 6/23				
P. bahiensis Texeira*	FOD	-	-	-
P. brevipes (Pierre) T.D.Penn.	FOD	-	-	-
P. glaziovii (Pierre) T.D.Penn.*	FOD	EX	-	-
P. kuhlmannii Toledo	FOD	EN	-	-
P. lactescens (Vell.) Radlk.	FOD	-	-	-
P. verrucosa (Vell.) Radlk.	FES	CR	-	-

Schlegeliaceae

Márcio de Souza Werneck

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
SCHLEGELIACEAE – 1/ca. 30				
Schlegelia – 1/10				
S. parviflora (Oerst.) Monach.	FOD	-	-	-

Schoepfiaceae

Milton Groppo

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
SCHOEPFIACEAE – 1/50				
Schoepfia – 1/23				
S. brasiliensis A.DC.	FES, FOD, FOM	-	-	-

Scrophulariaceae

Vinícius Castro Souza

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
SCROPHULARIACEAE – 12/100				
Buddleja – 12/100				
B. brachiata Cham. & Schltdl.	FOD, FES	-	-	-
B. cestriflora Cham.*	FOM, FCA	-	-	-
B. cuneata Cham.*	FCA	-	-	-
B. elegans Cham. & Schltdl.	FOD, FOM, FCA	-	-	-
B. grandiflora Cham. & Schltdl.	FCA	-	-	-
B. hatschbachii E.M.Norman & L.B.Sm.*	FCA	-	-	-
B. kleinii E.M.Norman & L.B.Sm.*	FOM	-	-	-
B. longiflora Brade*	FCA	-	EN	ANEXO II
B. oblonga Benth.*	FOM	-	-	-
B. ramboi L.B.Sm.*	FCA	-	-	-
B. speciosissima Taub.*	FCA	-	EN	ANEXO I
B. stachyoides Cham. & Schltdl.	FES, FOD, FOM, FCA	-	-	-

Simaroubaceae

José Rubens Pirani

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
SIMAROUBACEAE – 11/56				
Castela – 1/15				
C. twedii Planch.	FES, FED	-	-	-
Picrasma – 1/9				
P. crenata (Vell.) Engl.*	FOD, FED, FES, RST	-	-	-
Simaba – 8/26				
S. cedron Planch.	RST	-	-	-
S. cuneata A.St.-Hil. & Tul.*	FOD, RST	-	-	-
S. docensis Franceschinelli & K.Yamam.*	FES	-	-	-
S. ferruginea A.St.-Hil.	FOD, RST	-	-	-
S. guianensis Aubl.	FOD	-	-	-
S. insignis A.St.-Hil. & Tul.*	FOD, RST	-	-	-
S. subcymosa A.St.-Hil. & Tul.*	FOD, FES	-	-	-
S. trichilioides A.St.-Hil.	RST	-	-	-
Simarouba – 1/6				
S. amara Aubl.	FOD, RST	-	-	-

Siparunaceae

Ariane Luna Peixoto

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
SIPARUNACEAE – 7/53-60				
Siparuna –7/53-60				
S. bifida (Poepp. & Endl.) A.DC.	FOD, FES	-	-	-
S. brasiliensis (Spreng.) A.DC.	FOD, FES	-	-	-
S. cymosa Tolm.	FOD, FES	-	-	-
S. glycycarpa (Ducke) Renner & Haussner	FOD	-	-	-
S. guianensis Aubl.	FOD, FES	-	-	-
S. poeppigii (Tul.) A.DC.	FOD, FES	-	-	-
S. reginae (Tul.) A.DC.	FOD, FES	-	-	-

Smilacaceae

Regina Helena Potsch Andreata

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
SMILACACEAE – 20/300				
Smilax – 20/300				
S. campestris Griseb.	FOD, RST	-	-	-
S. cissoides Mart. *ex* Griseb.	FOD	-	-	-
S. cognata Kunth	FOD, RST	-	-	-
S. elastica Griseb.	FOD, RST, FCA	-	-	-
S. fluminensis Steud.	FOD	-	-	-
S. hilariana A.DC.	RST	-	-	-
S. japicanga Griseb.*	FOD	-	VU	ANEXO II
S. lappacea Willd.	FOD	-	-	-
S. larvata Griseb.	FOD	-	-	-
S. lutescens Vell.*	FOD	-	VU	ANEXO II
S. muscosa Toledo*	FOD	-	VU	ANEXO II
S. pilosa Andreata & Leoni*	FES, FCA	-	-	-
S. quinquenervia Vell.	FOD, RST	-	-	-
S. remotinervis Hand.-Mazz.*	FOD	-	-	-
S. salicifolia Griseb.*	FOD	-	-	-
S. spicata Vell.*	FOD	-	-	-
S. staminea Griseb.	FOD	-	-	-
S. stenophylla A.DC.*	FOD	-	-	-
S. subsessiliflora Duhamel*	FOD	-	-	-
S. syphilitica Humb. & Bonpl. *ex* Willd.	FOD	-	-	-

Solanaceae

João Renato Stehmann

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
SOLANACEAE – 297/ca.2.400				
Acnistus – 1/1				
A. arborescens (L.) Schltdl.	FOD, FES	-	-	-
*Athenaea** – 7/7				
A. anonacea Sendtn.*	FOD	-	-	-
A. cuspidata Witasek*	FOD	-	-	-
A. martiana Sendtn.*	FOD, FES	-	-	-
A. micrantha Sendtn.*	FOD	-	-	-
A. pereirae Barboza & Hunz.*	FOD, FES, FCA	-	-	-
A. picta (Mart.) Sendtn.*	FOD, FES	-	-	-
A. pogogena (Moric.) Sendtn.*	FOD	-	-	-
Aureliana – 8/8				
A. angustifolia R.C.Almeida-Lafetá*	FOD, FES	-	-	-
A. brasiliana (Hunz.) Barboza & Hunz.*	FOD	-	-	-
A. darcyi Carvalho & Bovini*	FOD	-	-	-
A. fasciculata (Vell.) Sendtn.	FOD, FES	-	-	-
A. glomuliflora Sendtn.*	FOD	-	-	-
A. tomentosa Sendtn.*	FOD	-	-	-
A. velutina Sendtn.*	FES	-	-	-
A. wettsteineana (Witasek) Hunz. & Barboza*	FOD, FOM	-	-	-
Browallia – 1/6				
B. americana L.	FOD, FCA	-	-	-
Brugmansia – 1/6				
B. suaveolens (Willd.) Bercht. & C. Presl	FOD, FES, RUD	-	-	-
Brunfelsia – 12/46				
B. australis Benth.	FOD, FES	-	-	-
B. bonodora (Vell.) J.F.Macbr.*	FOD	-	-	-
B. brasiliensis (Spreng.) L.B.Sm. & Downs	FOD, FES	-	-	-
B. clandestina Plowman*	FOD	-	-	-
B. cuneifolia J.A.Schmidt*	FOD, FOM	-	-	-
B. hydrangeiformis (Pohl) Benth.*	FOD, FES	-	-	-
B. latifolia (Pohl) Benth.*	RST	-	-	-
B. martiana Plowman	FOD	-	-	-
B. obovata Benth.	FOD	-	-	-
B. pauciflora (Cham. & Schltdl.) Benth.*	FOD, FES	-	-	-
B. pilosa Plowman*	FOD, FOM, FED	-	-	-
B. uniflora (Pohl) D.Don	FOD, FES	-	-	-
Calibrachoa – 15/25				
C. caesia (Sendtn.) Wijsman*	FOM, FCA	-	-	-
C. cordifolia Stehmann & L.Aguiar*	FCA	-	-	-
C. dusenii (R.E.Fr.) Stehmann & Semir*	FCA	-	-	-
C. eglandulata Stehmann & Semir*	FOM, FCA, AFL	-	VU	ANEXO II

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
C. ericifolia (R.E.Fr.) Wijsman*	FCA	-	-	-
C. excellens (R.E.Fr.) Wijsman	FCA	-	-	-
C. heterophylla (Sendtn.) Wijsman	RST	-	-	-
C. linoides (Sendtn.) Wijsman*	FCA	-	-	-
C. micrantha (R.E.Fr.) Stehmann & Semir*	FCA	-	-	-
C. missionica Stehmann & Semir*	FED	-	-	-
C. paranensis (Dusén) Wijsman*	FCA, AFL	-	-	-
C. sellowiana (Sendtn.) Wijsman*	FCA, AFL	-	-	-
C. sendtneriana (R.E.Fr.) Stehmann & Semir*	FCA	-	-	-
C. serrulata (L.B.Sm. & Downs) Stehmann & Semir*	AFL	-	VU	ANEXO II
C. spathulata (L.B.Sm. & Downs) Stehmann & Semir*	FCA, AFL	-	-	-
Capsicum – 12/20				
C. baccatum L.	FES, FED	-	-	-
C. campylopodium Sendtn.*	FOD	-	-	-
C. cornutum (Hiern) Hunz.*	FOD	-	-	-
C. flexuosum Sendtn.*	FOD, FOM, FED	-	-	-
C. friburgense Barboza & Bianchetti*	FOD	-	-	-
C. hunzikerianum Barboza & Bianchetti*	FOD	-	-	-
C. mirabile Mart.*	FOD	-	-	-
C. parvifolium Sendtn.	FED	-	-	-
C. pereirae Barboza & Bianchetti*	FOD	-	-	-
C. recurvatum Witasek*	FOD	-	-	-
C. schottianum Sendtn.*	FOD, FES	-	-	-
C. villosum Sendtn.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
Cestrum – 20/150				
C. axillare Vell.	FOD, FES, RST	-	-	-
C. bracteatum Link & Otto*	FOD, FES	-	-	-
C. corcovadense Miers*	FOD	-	-	-
C. corymbosum Schltdl.*	FOD, FOM	-	-	-
C. euanthes Schltdl.	FOM, FED	-	-	-
C. gardneri Sendtn.	FES, FED	-	-	-
C. intermedium Sendtn.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
C. mariquitense Kunth	FOD, FES	-	-	-
C. martii Sendtn.	FED	-	-	-
C. pauciflorum Spreng.*	FOD	-	-	-
C. pedicellatum Sendtn.	FES	-	-	-
C. reflexum Sendtn.	FOD	-	-	-
C. retrofractum Dunal	FOD, FES	-	-	-
C. salzmannii Dunal*	FOD, FES, FED, RST	-	-	-
C. schlechtendalii G.Don	FOD, FES	-	-	-
C. strictum Schott	FOD	-	-	-
C. strigilatum Ruiz & Pav.	FOD, FES, FOM	-	-	-
C. subpulverulentum Mart.*	FOD	-	-	-
C. tenuifolium Francey*	FOD, FES	-	-	-
C. viminale Sendtn.*	FOD	-	-	-
Datura – 1/11				
Datura stramonium L.	RUD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
*Dyssochroma** – 2/2				
D. longipes (Sendtn.) Miers*	FOD, FOM, RST	-	-	-
D. viridiflorum (Sims) Miers*	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
*Heteranthia** – 1/1				
H. decipiens Nees & Mart.*	FOD, FES	-	-	-
Lycianthes – 3/150				
L. pauciflora (Vahl) Bitter	FOD, FES, FED	-	-	-
L. rantonnei (Carrière) Bitter	FES, FED	-	-	-
L. repens (Spreng.) Bitter	FOD, FES	-	-	-
Lycium – 1/80				
L. glomeratum Sendtn.	FES	-	-	-
Melananthus – 2/5				
M. cubensis Urb.	FED	-	-	-
M. fasciculatus (Benth.) Soler.*	FOD	-	-	-
Metternichia – 1/1				
M. principis J.G. Mikan	FOD, FES, FED	-	-	-
Nicotiana – 7/67				
N. alata Link & Otto	FOD, FED, FOM, FCA, AFL	-	-	-
N. azambujae L.B.Sm. & Downs*	FOD	-	-	-
N. bonariensis Lehm.	FOD, FOM, FES, FED, FCA, RST, AFL	-	-	-
N. forgetiana Hemsl.*	FOD, FOM	-	-	-
N. langsdorffii Weinm.	FOD, FOM, FES	-	-	-
N. longiflora Cav.	FCA, RST	-	-	-
N. mutabilis Stehmann & Semir*	FOD	-	EN	ANEXO I
Nierembergia – 4/20				
N. hatschbachii A.A.Cocucci & Hunz.	FCA	-	-	-
N. micrantha Cabrera	FCA	-	-	-
N. repens L.	FCA, FAQ	-	-	-
N. scoparia Sendtn.	FCA	-	-	-
Petunia – 9/14				
P. altiplana T.Ando & Hashim.*	FOM, FCA	-	-	-
P. bonjardinensis T.Ando & Hashim.*	FOM, FCA	-	EN	ANEXO II
P. inflata R.E.Fr.	FED, FCA	-	-	-
P. interior T.Ando & Hashim.	FED, FCA	-	-	-
P. integrifolia (Hook.) Schinz & Thell.	FCA, RST	-	-	-
P. mantiqueirensis T.Ando & Hashim.*	FOD, FOM, FCA	-	VU	ANEXO II
P. reitzii L.B.Sm. & Downs*	FOM, FCA	-	CR	ANEXO I
P. saxicola L.B.Sm. & Downs*	AFL	-	CR	ANEXO I
P. scheideana L.B.Sm. & Downs*	FOM, FCA	-	-	-
Physalis – 5/90				
P. angulata L.	FES, RUD	-	-	-
P. cordata Mill.	FES, RUD	-	-	-
P. peruviana L.	FOD, RUD	-	-	-
P. pubescens L.	FOD, FES, FED, RUD	-	-	-
P. viscosa L.	FOD, RUD	-	-	-
Schwenckia – 8/25				
S. americana L.	RUD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
S. curviflora Benth.	FOD, FES, FOM, FAQ	-	-	-
S. juncoides Chodat	FES	-	-	-
S. lateriflora (Vahl) Carvalho	FOD, RST	-	EN	ANEXO I
S. mollissima Nees & Mart.	FES	-	-	-
S. novaveneciana Carvalho*	FOD, FES	-	EN	ANEXO I
S. paniculata (Raddi) Carvalho	FOD	-	-	-
S. volubilis Benth.	FOD, FES	-	-	-
Sessea – 3/38				
S. brasiliensis Toledo*	FOD, FES	-	-	-
S. regnellii Taub.*	FOD, FES, FOM	-	-	-
S. vestioides (Schltdl.) Hunz.	FES, FED	-	-	-
Solandra – 1/10				
S. grandiflora Sw.	FOD, FES, FED, AFL	-	-	-
Solanum – 171/1.500				
S. acerifolium Dunal	FOD, FES	-	-	-
S. aculeatissimum Jacq.	FOD, FOM, FED	-	-	-
S. adscendens Sendtn.	FES, FED	-	-	-
S. adspersum Witasek*	FOD, RST	-	-	-
S. affine Sendtn.*	FOD	-	-	-
S. agrarium Sendtn.	FED, RST	-	-	-
S. alatirameum Bitter*	FOD	-	-	-
S. alternatopinnatum Steud.	FOD, FOM, FES	-	-	-
S. americanum Mill.	RUD	-	-	-
S. amygdalifolium Steud.	FAQ	-	-	-
S. anoacanthum Sendtn.*	FOD, FES	-	-	-
S. aparadense L.A.Mentz & Nee*	FOM	-	-	-
S. apiahyense Witasek*	FOD	-	-	-
S. arenarium Sendtn.*	FOD, RST	-	VU	ANEXO I
S. argenteum Dunal*	FOD, FOM, FES	-	-	-
S. asperum Rich.	FOD, FES	-	-	-
S. asterophorum Mart.*	FOD, FES	-	-	-
S. atropurpureum Schrank	FOD, FOM, FES, FED, FCA	-	-	-
S. bahianum S.Knapp*	FOD	-	CR	ANEXO I
S. bistellatum L.B.Sm. & Downs*	FOD, FOM, FCA	-	-	-
S. bullatum Vell.*	FOD, FOM	-	-	-
S. caavurana Vell.	FOD, FES, RST	-	-	-
S. caldense Carvalho*	FES	-	-	-
S. calvescens Bitter*	FES	-	-	-
S. campaniforme Roem. & Schult.	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
S. capsicoides All.	FOD, FES, RST	-	-	-
S. carautae Carvalho*	FOD, RST	-	-	-
S. cassioides L.B.Sm. & Downs*	FOD, FOM	-	-	-
S. castaneum Carvalho*	FOD	-	-	-
S. cernuum Vell.*	FOD, FES	-	-	-
S. chacoense Bitter	FOM, FES	-	-	-
S. cinnamomeum Sendtn.*	FOD, FES, FOM	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
S. cladotrichum Dunal*	FOD, FES	-	-	-
S. commersonii Dunal	FOD, FED, FCA	-	-	-
S. compressum L.B.Sm. & Downs*	FOM, FED	-	-	-
S. concinnum Schott *ex* Sendtn.*	FOD, FES, FOM, RST	-	-	-
S. cordifolium Dunal*	FOD, FES	-	-	-
S. cordioides S.Knapp*	FOD, RST	-	-	-
S. corumbense S.Moore	FES	-	-	-
S. corymbiflorum (Sendtn.) Bohs*	FOM	-	-	-
S. crinitum Lam.	FOD	-	-	-
S. decompositiflorum Sendtn.	FES	-	-	-
S. decorum Sendtn.*	FOD, FES	-	-	-
S. delicatulum L.B.Sm. & Downs*	FOD	-	-	-
S. depauperatum Dunal*	FOD	-	-	-
S. didymum Dunal	FOM, FOD, FES	-	-	-
S. diploconos (Mart.) Bohs*	FOD, FES, FOM	-	-	-
S. echidnaeforme Dunal*	FOD, FES	-	-	-
S. enantiophyllanthum Bitter*	FOD, FCA	-	-	-
S. evonymoides Sendtn.*	FOD	-	-	-
S. flaccidum Vell.*	FOD, FOM	-	-	-
S. flagellare Sendtn.*	RST	-	-	-
S. fusiforme L.B.Sm. & Downs*	FOM, FES, FED	-	-	-
S. gardneri Sendtn.	FES, FED	-	-	-
S. gertii S.Knapp*	FOD	-	-	-
S. glaucophyllum Desf.	FOM, FCA, RST	-	-	-
S. glomuliflorum Sendtn.*	FOD, FES	-	-	-
S. gnaphalocarpon Vell.*	FOD, FES, FOM	-	-	-
S. granulosoleprosum Dunal	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
S. graveolens Bunbury*	FOD, FES	-	EN	ANEXO II
S. guaraniticum A.St.-Hil.*	FOD, FOM, FED	-	-	-
S. hasslerianum Chodat	FOM, FED, FCA	-	-	-
S. hexandrum Vell.*	FOD	-	-	-
S. hirtellum (Spreng.) Hassl.*	FOM, FES, FED	-	-	-
S. hoehnei C.V.Morton*	FOD	-	-	-
S. incarceratum Ruiz & Pav.	FES	-	-	-
S. inodorum Vell.*	FOD, FOM	-	-	-
S. inornatum Witasek*	FOD	-	-	-
S. insidiosum Mart.*	FOD, FES	-	-	-
S. intermedium Sendtn.*	FOD, FES	-	-	-
S. ipomoea Sendtn.	FES	-	-	-
S. iraniense L.B.Sm. & Downs*	FOM, FED	-	-	-
S. itatiaiae Dusén*	FOD, FCA	-	-	-
S. jabrense Agra & M.Nee*	FOD	-	EN	ANEXO II
S. jamaicense Mill.	FOD, FES	-	-	-
S. jasminifolium Sendtn.	FES, FED	-	-	-
S. johannae Bitter*	FOM, FED	-	-	-
S. jussiaei Dunal*	FOD, FES, RST	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
S. kleinii L.B.Sm. & Downs*	FOD, FOM	-	-	-
S. lacerdae Dusén*	FOD, FOM	-	-	-
S. lacteum Vell.*	FOD, FES	-	-	-
S. lantana Sendtn.*	FOD	-	-	-
S. latiflorum Bohs*	FOD	-	-	-
S. laxum Spreng.	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
S. leptostachys Dunal*	FOD, FES	-	-	-
S. leucocarpon Dunal	FOD	-	-	-
S. leucodendron Sendtn.*	FOD, FES	-	-	-
S. lhotskyanum Dunal*	FOD	-	-	-
S. luridifuscescens Bitter	FOD, FOM, FES	-	-	-
S. lycocarpum A.St.-Hil.	FES, FCA	-	-	-
S. maranguapense Bitter*	FOD	-	-	-
S. martii Sendtn.*	FOD	-	-	-
S. matadori L.B.Sm. & Downs*	FOD, FOM	-	-	-
S. mauritianum Scop.	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
S. megalochiton Mart.*	FOD, FES, FOM	-	-	-
S. melissarum Bohs*	FOD, FES, FOM	-	-	-
S. murinum Sendtn.*	FOD	-	-	-
S. nigrescens M.Martens & Galeotti	FOD, FOM, FED	-	-	-
S. odoriferum Vell.	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
S. oliveirae Carvalho*	FOD	-	-	-
S. oocarpum Sendtn.	FES	-	-	-
S. pabstii L.B.Sm. & Downs*	FOM, FED	-	-	-
S. pachimatium Dunal*	FOD	-	-	-
S. palinacanthum Dunal	FOD, FES, FOM, FCA	-	-	-
S. paludosum Moric.	FOD, RST	-	-	-
S. paniculatum L.	FOD, FES, FOM, FCA, RST	-	-	-
S. paraibanum Agra*	RST	-	-	-
S. paralum Bohs*	FOD, RST	EN	-	-
S. paranense Dusén*	FOD, FES, FOM	-	-	-
S. pauciflorum Sendtn.	FED	-	-	-
S. pelagicum Bohs*	FOD, RST	-	-	-
S. pensile Sendtn.	FES	-	-	-
S. pereirae Carvalho*	FOD	-	-	-
S. piluliferum Dunal*	FOD	-	-	-
S. pinetorum (L.B.Sm. & Downs) Bohs*	FOM	-	-	-
S. platense Dieckm.	FED, FCA, RST	-	-	-
S. polytrichum Moric.	FOD	-	-	-
S. premnifolium (Miers) Bohs*	FOD	-	-	-
S. pseudocapsicum L.	FOD, FOM, FES, FED, FCA	-	-	-
S. pseudodaphnopsis L.A.Mentz & Stehmann*	RST	-	-	-
S. pseudoquina A.St.-Hil.	FOD, FOM, FES, FED, RST	-	-	-
S. pycnanthemum Mart.*	FES	-	-	-
S. ramulosum Sendtn.*	FOM, FED	-	-	-
S. reflexiflorum Moric.*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
S. reflexum Schrank*	FOD, FOM, FCA	-	-	-
S. reineckii Briq.	RST, AFL	-	-	-
S. reitzii L.B.Sm. & Downs*	FOD, FOM, FED	-	-	-
S. reptans Bunbury*	FOD, FES	-	-	-
S. restingae S.Knapp*	FOD, RST	-	EN	ANEXO II
S. robustum H.L.Wendl.*	FOD, FES	-	-	-
S. rufescens Sendtn.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
S. rugosum Dunal	FOD, FES, FED	-	-	-
S. rupincola Sendtn.*	FOD	-	-	-
S. saldanhaei Glaz.	FES	-	-	-
S. sambuciflorum Sendtn.*	FOD	-	-	-
S. sanctaecatharinae Dunal	FOD, FOM, FES, FED, RST	-	-	-
S. santosii S.Knapp*	FOD	-	VU	ANEXO II
S. schizandrum Sendtn.*	FOD	-	-	-
S. schlechtendalianum Walp.	FOD, FES	-	-	-
S. schwackei Glaz.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
S. sciadostylis (Sendtn.) Bohs*	FOD, FES, FOM	-	-	-
S. scuticum M.Nee	FES	-	-	-
S. sellowianum Sendtn.*	FOD, FES, FOM	-	-	-
S. sellowii Dunal*	FOD, FOM, FES	-	-	-
S. setosissimum Bitter *ex* L.A.Mentz & M.Nee*	FOD, FOM	-	-	-
S. sisymbriifolium Lam.	FOD, FOM, FES, FED, FCA, RST, AFL	-	-	-
S. sooretamum Carvalho*	FOD, FES	-	-	-
S. spissifolium Sendtn.*	FOD	-	EX	ANEXO I
S. stagnale Moric.*	RST	-	-	-
S. stipulaceum Willd. *ex* Roem. & Schult.	FOD, FES, FED, FCA, RST	-	-	-
S. stipulatum Vell.*	FOD, FES	-	-	-
S. stramoniifolium Jacq.	FOD	-	-	-
S. subhastatum L.B.Sm. & Downs*	FOM	-	-	-
S. sublentum Hiern	FOD, FES	-	-	-
S. subsylvestris L.B.Sm. & Downs*	FOM	-	-	-
S. subumbellatum Vell.	FOD, FES	-	-	-
S. swartzianum Roem. & Schult.	FOD, FOM, FES	-	-	-
S. sycocarpum Mart. & Sendtn.*	RST	EN	-	-
S. symmetricum Rusby	FOD, FES	-	-	-
S. tetricum Dunal*	FOD, FES	-	-	-
S. thomasiifolium Sendtn.	FOD, FES	-	-	-
S. torvum Sw.	FOD, FES	-	-	-
S. trachytrichium Bitter*	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
S. vaillantii Dunal*	FOD, FOM, FES	-	-	-
S. variabile Mart.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
S. velleum Thunb.*	FES	-	-	-
S. vellozianum Dunal*	FOD	-	-	-
S. viarum Dunal	FOD, FOM, FES, FED, FCA	-	-	-
S. viscosissimum Sendtn.*	FOM	-	-	-
S. wacketii Witasek*	FOD, FOM	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
S. warmingii Hiern*	FOD, FES	-	-	-
Vassobia – 1/2		-		
V. breviflora (Sendtn.) Hunz.	FOD, FOM, FED	-	-	-

Sphenocleaceae

Márcio de Souza Werneck

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
SPHENOCLEACEAE – 1/2				
Sphenoclea – 1/2				
S. zeylanica Gaertn.	FOD, FAQ	-	-	-

Stemonuraceae

Flávio Dayrell Gontijo

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
STEMONURACEAE – 1/80				
Discophora – 1/4				
D. guianensis Miers	FED, FOD, FOM	-	-	-

Styracaceae

Milton Groppo

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
STYRACACEAE – 3/160				
Styrax – 3/120				
S. ambiguum Seub.	FOD	-	-	-
S. *glabratus* Schott	FOD	-	-	-
S. leprosus Hook. & Arn.	FOD, FOM	-	-	-

Surianaceae

Márcio de Souza Werneck

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
SURIANACEAE – 1/8				
Suriana – 1/1				
S. maritima L.	RST	-	-	-

Symplocaceae

João Luiz Mazza Aranha Filho & Leonardo Dias Meireles

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
SYMPLOCACEAE – 28/320				
Symplocos – 28/318				
S. altissima Brand*	FOD	-	EX	ANEXO I
S. angulata Brand*	AFL	-	-	-
S. bidana Aranha*	FOD, FCA	-	-	-
S. celastrinea Mart.*	FOD, FES	-	-	-
S. corymboclados Brand*	FOD, FCA	-	CR	ANEXO II
S. falcata Brand*	FOD, FOM, FCA	-	-	-
S. glandulosomarginata Hoehne*	FOD, FOM, FES	-	-	-
S. glaziovii Brand*	FOD	-	-	-
S. incrassata Aranha*	FOD, FCA	-	-	-
S. insignis Brand*	FOD	-	-	-
S. itatiaiae Wawra*	FOD, FCA	-	-	-
S. lanceolata A.DC.	FOM, FES	-	-	-
S. laxiflora Benth.*	FOD, RST	-	-	-
S. microstyla Aranha *et al.**	AFL	-	-	-
S. mosenii Brand	FOD, FES	-	-	-
S. neglecta Brand*	FOD	-	EX	ANEXO I
S. nitens (Pohl) Benth.	FES	-	-	-
S. nitidiflora Brand*	FOD	-	-	-
S. organensis Brand*	FOD, FCA	-	EN	ANEXO II
S. platyphylla (Pohl) Benth.	FOD, FES	-	-	-
S. pubescens Klotzsch *ex* Benth.	FOD, FES	-	-	-
S. pycnobotrya Mart. *ex* Miq.*	FOD	-	-	-
S. rizzinii Occhioni*	FOD	-	-	-
S. tenuifolia Brand	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
S. tetrandra Mart.*	FOD, FOM	-	-	-
S. trachycarpos Brand*	FOD	-	-	-
S. uniflora (Pohl) Benth.	FOD, FOM	-	-	-
S. variabilis Mart. *ex* Miq.*	FOD	-	-	-

Theaceae

Marcos Sobral

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
THEACEAE – 4/200				
Laplacea – 4/15-20				
L. acutifolia (Wawra) Kobuski*	FOD	-	-	-
L. fruticosa (Schrad.) Kobuski	FOD	-	-	-
L. obovata (Wawra) Kobuski*	FCA, FOD	-	-	-
L. tomentosa (Mart. & Zucc.) G.Don*	FCA, FOD	-	-	-

Theophrastaceae

Flávio Dayrell Gontijo

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
THEOPHRASTACEAE – 9/108				
Clavija – 6/50				
C. caloneura Mart.*	FOD	-	-	-
C. integrifolia Mart. & Miq.	FED, FOD, FES	-	-	-
C. macrophylla (Link *ex* Roem. & Schult.) Miq.	FOD	-	-	-
C. nutans (Vell.) B.Stahl	FES	-	-	-
C. schwackeana Mez*	FES	-	-	-
C. spinosa (Vell.) Mez*	FOD	-	-	-
Jacquinia – 1/23				
J. armillaris Jacq.*	FOD, RST	-	-	-
Samolus – 2/35				
S. subnudicaulis A.St.-Hil.*	FOM	-	-	-
S. valerandi L.*	FOM	-	-	-

Thismiaceae

Paul J. M. Maas & Hiltje Maas - van de Kamer

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
THISMIACEAE – 8/32				
Thismia – 8/14				
T. caudata H.Maas & Maas*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
T. espirito-santensis Brade*	FOD	-	-	-
T. fungiformis (Taub. *ex* Warm.) H.Maas & Maas*	FOD	-	-	-
T. glaziovii Poulsen	FOD	-	-	-
T. hyalina (Miers) F. Müll.	FOD	-	-	-
T. janeirensis Warm.*	FOD	-	-	-
T. luetzelburgii Goebel & Suess.	FOD	-	-	-
T. macahensis (Miers) F. Müll.*	FOD	-	-	-

Thymelaeaceae

Lucia Rossi

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
THYMELAEACEAE – 13/ca. 500				
Daphnopsis – 10/66				
D. alpestris (Gardner) Benth. & Hook.*	FOD	-	-	-
D. brasiliensis Mart.*	FOD, FES	-	-	-
D. coriacea Taub.*	FOD	-	-	-
D. fasciculata (Meisn.) Nevling	FOD, FES, FOM	-	-	-
D. martii Meisn.*	FOD	-	-	-
D. pseudosalix Domke*	FOD	-	-	-
D. racemosa Griseb.	FOD, FES, FOM	-	-	-
D. schwackeana Taub.*	FOD	-	-	-
D. sellowiana Taub.*	FOD, FOM	-	-	-
D. utilis Warm.	FOD, FES	-	-	-
Funifera – 3/4				
F. brasiliensis (Raddi) Mansf.*	FOD	-	-	-
F. grandifolia Domke*	FOD	-	-	-
F. insulae Nevling*	FOD	-	-	-

Trigoniaceae

Elsie Franklin Guimarães & João Rodrigues Miguel

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
TRIGONIACEAE – 14/57				
Trigonia – 13/24				
T. bahiensis E.F.Guim. & Miguel*	FOD	-	-	-
T. boliviana Warm.	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
T. eriosperma (Lam.) Fromm & Santos*	FOD	-	-	-
T. floccosa Rusby*	FOD	-	-	-
T. laevis Aubl.*	FOD	-	-	-
T. littoralis Miguel & E.F.Guim.*	FOD	-	-	-
T. microcarpa Sagot	FOD	-	-	-
T. nivea Cambess.	FOD	-	-	-
T. paniculata Warm.	FOD	-	-	-
T. rotundifolia Lleras	FOD	-	-	-
T. rytidocarpa Casar.	FOD	-	-	-
T. simplex Warm.	FOD	-	-	-
T. villosa Aubl.	FOD	-	-	-
*Trigoniodendron** – 1/1				
T. spiritusanctense E.F.Guim. & Miguel*	FOD	-	EN	ANEXO I

Triuridaceae

Paul J. M. Maas & Hiltje Maas - van de Kamer

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
TRIURIDACEAE – 6/102				
Peltophyllum – 2/2				
P. caudatum (Poulsen) R.Schmid & M.D.Turner*	FOD	-	-	-
P. luteum Gardner	FOD	-	-	-
Sciaphila – 2/67				
S. purpurea Benth.	FOD	-	-	-
S. schwackeana Johow*	FOD	-	-	-
Triuris – 2/9				
T. alata Brade*	FOD	-	-	-
T. hyalina Miers	FOD	-	-	-

Tropaeolaceae

Caetano Troncoso Oliveira

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
TROPAEOLACEAE – 4/100				
Tropaeolum – 4/97				
T. brasiliense Casar.*	FOD	-	-	-
T. pentaphyllum Lam.	FOD	-	-	-
T. sanctae-catharinae Sparre*	FOD	-	-	-
T. warmingianum Rohrb.	FOD, FES	-	-	-

Turneraceae

María Mercedes Arbo

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
TURNERACEAE – 49/226				
Piriqueta – 13/45				
P. aurea (Cambess.) Urb.	FCA	-	-	-
P. cistoides (L.) Griseb.	RST	-	-	-
P. duarteana (Cambess.) Urb.	AFL	-	-	-
P. guianensis N.E.Br.	RST	-	-	-
P. morongii Rolfe	AFL, FCA	-	-	-
P. nitida Urb.	FCA	-	-	-
P. ochroleuca Urb.*	AFL	-	-	-
P. racemosa Jacq.	RST	-	-	-
P. rosea (Cambess.) Urb.	FCA	-	-	-
P. subsessilis Urb.*	FCA	-	-	-
P. tamberlikii Urb.	FCA	-	-	-
P. taubatensis (Urb.) Arbo	FCA	-	-	-
P. viscosa Griseb.	AFL	-	-	-
Turnera – 36/142				
T. albicans Urb.*	RST	-	-	-
T. annularis Urb.	FES	-	-	-
T. aurelii Arbo	FCA	-	-	-
T. blanchetiana Urb.	Floresta	-	-	-
T. calyptrocarpa Urb.	Floresta	-	-	-
T. candida Arbo	RST	-	-	-
T. capitata Cambess.	Floresta	-	-	-
T. cearensis Urb.	Floresta	-	-	-
T. chamaedrifolia Cambess.	Floresta	-	-	-
T. coerulea DC.	Floresta	-	-	-
T. concinna Arbo	FCA	-	-	-
T. cuneiformis Poir.	RST	-	-	-
T. dasystyla Urb.	Floresta	-	-	-
T. diffusa Willd. *ex* Schult.	Floresta	-	-	-
T. fernandezii Arbo	FCA	-	-	-
T. grandidentata (Urb.) Arbo*	AFL, FCA	-	-	-
T. grandiflora (Urb.) Arbo	FCA	-	-	-
T. hassleriana Urb.	FCA, AFL,	-	-	-
T. hatschbachii Arbo*	Floresta, AFL	-	-	-
T. hermannioides Cambess.	AFL, Floresta	-	-	-
T. hilaireana Urb.	AFL, FCA	-	-	-
T. lanceolata Cambess.	AFL	-	-	-
T. lucida Urb.*	RST	-	-	-
T. luetzelburgii Sleumer	AFL	-	-	-
T. maracasana Arbo*	Floresta	-	-	-
T. marmorata Urb.*	RST	-	-	-
T. melochioides Cambess.	Floresta, FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
T. oblongifolia Cambess.	FCA	-	-	-
T. opifera Mart.	AFL	-	-	-
T. orientalis (Urb.) Arbo	Floresta, FCA	-	-	-
T. pernambucensis Urb.*	FOD	-	-	-
T. pumilea L.	FCA	-	-	-
T. rubrobracteata Arbo*	AFL	-	-	-
T. sancta Arbo*	Floresta	-	-	-
T. scabra Mill.	Floresta, RST	-	-	-
T. serrata Vell.*	FOD, AFL	-	-	-

Typhaceae

Marco Otávio Pivari

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
TYPHACEAE – 2/15				
Typha – 2/15				
T. domingensis Pers.	FAQ	-	-	-
T. latifolia L.	FAQ	-	-	-

Urticaceae

Sergio Romaniuc Neto & André Luiz Gaglioti

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
URTICACEAE – 37/947				
Boehmeria –3/80				
B. caudata Sw.	FOM, FES, FCA	-	-	-
B. cylindrica (L.) Sw.	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
B. ramiflora Jacq.	FOM, FES, FCA	-	-	-
Cecropia – 4/61				
C. glaziovii Snethl.	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
C. hololeuca Miq.*	FOD, FOM, FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
C. pachystachya Trécul	FOD, FOM, FES, FCA, RST	-	-	-
C. palmata Willd.	FOM, FES, FCA	-	-	-
Coussapoa – 4/46				
C. curranii Blake	FOD, FOM, FES	VU	-	-
C. floccosa Akkermans & C.C.Berg	FOD, FOM, FES	VU	-	-
C. microcarpa (Schott) Rizzini	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
C. pachyphylla Akkermans & C.C.Berg	FOD, FOM, FES	-	-	-
Laportea – 1/23				
L. aestuans (L.) Chew	FOM, FES, FCA, RST	-	-	-
Myriocarpa – 2/8				
M. cordifolia Liebm.	FOM, FES, FCA	-	-	-
M. stipitata Benth.	FOM, FES, FCA	-	-	-
Parietaria – 2/14				
P. debilis G.Forst.	FOM, FES, FCA	-	-	-
P. officinalis L.	FOM, FES, FCA	-	-	-
Phenax – 2/15				
P. laevigatus Wedd.	FOD, FOM, FES, FCA	-	-	-
P. sonneratii (Poir.) Wedd.	FOD, FOM, FES, FCA	-	-	-
Pilea – 11/600				
P. aparadensis Brack*	FOM, FES, FCA	-	EN	ANEXO II
P. apiculata Killip	FOM, FES, FCA	-	-	-
P. flammula Brack*	FOM, FES, FCA	-	-	-
P. hilariana Wedd.	FOM, FES, FCA	-	-	-
P. hyalina Fenzl	FOM, FES, FCA	-	-	-
P. hydra Brack*	FOM, FES, FCA	-	EN	ANEXO II
P. microphylla (L.) Liebm.	FOM, FES, FCA	-	-	-
P. parietaria (L.) Blume	FOM, FES, FCA	-	-	-
P. pubescens Liebm.	FOM, FES, FCA	-	-	-
P. rhizobola Miq.	FOM, FES, FCA	-	-	-
Pourouma – 2/25				
P. guianensis Aubl.	FOD, FOM, FES, FCA	-	-	-
P. molis Trécul	FOD, FOM, FES, FCA	-	-	-
Urera – 4/40				
U. aurantiaca Wedd.	FOD, FOM, FES, FCA, RST	-	-	-
U. baccifera (L.) Gaudich. *ex* Wedd.	FOD, FOM, FES, FCA	-	-	-
U. caracasana (Jacq.) Gaudich. *ex* Griseb.	FOD, FOM, FES, FCA	-	-	-
U. nitida (Vell.) Brack	FOD, FOM, FES, FCA, RST	-	-	-
Urtica – 3/35				
U. circularis (Hicken) Soraru	FOM, FES, FCA	-	-	-
U. dioica L.	FOM, FES, FCA	-	-	-
U. urens L.	FOM, FES, FCA	-	-	-

Valerianaceae

Marcos Sobral

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
VALERIANACEAE – 15/300				
Valeriana – 15/200				
V. bornmuelleri Pilg.	FCA	-	-	-
V. catharinensis Graebn.*	FCA	-	-	-
V. chamaedryfolia Cham.	FCA	-	-	-
V. eichleriana (Müll.Arg.) Graebn.*	FCA	-	-	-
V. eupatoria Sobral*	FOM, FCA	-	-	-
V. gilgiana (Müll.Arg.) Graebn.*	FCA	-	-	-
V. glaziovii Taub.*	FCA	-	-	-
V. glechomifolia F.G.Meyer*	FCA	-	-	-
V. organensis Gardner*	FCA	-	-	-
V. polystachya Sm.	FCA	-	-	-
V. reitziana Borsini*	FCA	-	-	-
V. salicariifolia Vahl	FCA	-	-	-
V. scandens L.	FOD, FOM	-	-	-
V. tajuvensis Sobral*	FOD, FCA	-	-	-
V. ulei Graebn.*	FCA	-	-	-

Velloziaceae

Renato de Mello-Silva

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
VELLOZIACEAE – 22/240				
Barbacenia – 15/100				
B. brevifolia Taub.*	AFL	-	-	-
B. burlemarxii L.B.Sm. & Ayensu*	AFL	-	-	-
B. culta L.B.Sm. & Ayensu	AFL	-	-	-
B. fanniae (N.L.Menezes) Mello-Silva*	AFL	-	-	-
B. flava Mart. *ex* Schult. & Schult.f.	FCA	-	-	-
B. gaveensis Goethart & Henrard*	AFL	-	-	-
B. gounelleana Beauverd*	AFL, FCA	-	-	-
B. irwiniana L.B.Sm.*	FCA	-	-	-
B. mantiqueirae Goethart & Henrard*	AFL, FCA	-	-	-
B. pabstiana L.B.Sm. & Ayensu*	AFL	-	-	-
B. purpurea Hook.*	AFL	-	-	-
B. rogieri Hortus *ex* Moore & Ayres	AFL	-	VU	ANEXO II

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
B. seubertiana Goethart & Henrard*	AFL, FCA	-	-	-
B. spectabilis L.B.Sm. & Ayensu*	AFL	-	CR	ANEXO II
B. tomentosa Mart.	FCA	-	-	-
Vellozia – 7/110				
V. albiflora Pohl	AFL, FCA	-	-	-
V. bahiana L.B.Sm. & Ayensu*	AFL	-	-	-
V. candida J.C.Mikan*	AFL	-	-	-
V. dasypus Seub.	RST	-	-	-
V. plicata Mart.	AFL	-	-	-
V. pulchra L.B.Sm.*	AFL	-	-	-
V. variegata Goethart & Henrard*	AFL, FCA	-	-	-

Verbenaceae

Fatima Regina Gonçalves Salimena, Maria Ema Múlgura de Romero, Nataly O' Leary, Paola Peralta & Verônica A. Thode

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
VERBENACEAE – 94/1.200				
Aloysia – 9/30				
A. brasiliensis Moldenke	FOM	-	-	-
A. chamaedryfolia Cham.	FED	-	-	-
A. dusenii Moldenke	FOM, FES	-	-	-
A. gratissima (Gillies & Hook. *ex* Hook.) Tronc.	FOM, FES, FED	-	-	-
A. hatschbachii Moldenke	FOM, AFL	-	-	-
A. polygalifolia Cham.	FOD, FOM, FES	-	-	-
A. pulchra (Briq.) Moldenke	FOM, FES	-	-	-
A. ternifolia Moldenke	FOM	-	-	-
A. virgata (Ruiz & Pav.) Juss.	FES, FED	-	-	-
Bouchea – 1/9				
B. fluminensis (Vell.) Moldenke	FOM, FOD, FCA, FES	-	-	-
Citharexylum – 8/130				
C. glaziovii Moldenke	FOD, FES, FED	-	-	-
C. krukovii Moldenke	FOD, FES, FED	-	-	-
C. laetum Hiern	FOD, FES, FED	-	-	-
C. montevidense (Spreng.) Moldenke	FOD, FOM, FES	-	-	-
C. myrianthum Cham.	FOD, FES, FED	-	-	-
C. obtusifolium Kuhlm.	FOD	-	-	-
C. pernambucense Moldenke	FOD, FES	-	-	-
C. solanaceum Cham.*	FOM, FES, FED	-	-	-
Duranta – 3/20				
D. erecta L.	FES, FED	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
D. parvifolia Moldenke	FES, FED	-	-	-
D. vestita Cham.	FOM, FES	-	-	-
Glandularia – 22/100				
G. aristigera (S.Moore) Tronc.	FCA, AFL	-	-	-
G. balansae (Briq.) O'Leary	FCA	-	-	-
G. catharinae (Moldenke) O'Leary & P.Peralta	FCA, AFL	-	-	-
G. corymbosa (Ruíz & Pav.) O'Leary & P.Peralta	FCA	-	-	-
G. dusenii (Moldenke) O'Leary & P.Peralta*	FCA	-	-	-
G. guaranitica Tronc.	FCA	-	-	-
G. hasslerana (Briq.) Tronc.	FCA, AFL	-	-	-
G. hatschbachii (Moldenke) O'Leary & P.Peralta*	FCA	-	-	-
G. humifusa (Cham.) Botta	FCA	-	-	-
G. jordanensis (Moldenke) O'Leary & P.Peralta	FCA	-	-	-
G. marrubioides (Cham.) Tronc.	FCA, AFL	-	-	-
G. megapotamica (Spreng.) Cabrera & G.Dawson	FCA	-	-	-
G. nana (Moldenke) Tronc.	FCA	-	-	-
G. paulensis (Moldenke) P.Peralta*	FCA	-	-	-
G. peruviana (L.) Small	FCA, AFL	-	-	-
G. phlogiflora (Cham.) Schnack & Covas	FCA	-	-	-
G. pulchra (Moldenke) Botta*	FCA	-	-	-
G. selloi (Spreng.) Tronc.	FCA	-	-	-
G. tessmanii (Moldenke) P.Peralta	FCA	-	-	-
G. thymoides (Cham.) O'Leary	FCA	-	-	-
G. tomophylla (Briq.) P.Peralta	FCA	-	-	-
G. tweedieana (Niven *ex* Hook.) P.Peralta	FCA, AFL	-	-	-
Lantana – 6/ca. 150				
L. camara L.	FOM	-	-	-
L. canescens Kunth	FOM	-	-	-
L. fucata Lindl.	FOM	-	-	-
L. montevidensis (Spreng.) Briq.	FOM	-	-	-
L. trifolia L.	FOM	-	-	-
L. undulata Schrank	FOM	-	-	-
Lippia – 13/200				
L. alba (Mill.) N.E.Br.	AFL, FCA	-	-	-
L. angustifolia Cham.	AFL, FCA	-	-	-
L. arechavaletae Moldenke	AFL, FCA	-	-	-
L. brasiliensis (Link) T.Silva	FOM	-	-	-
L. hirta (Cham.) Schauer	AFL, FCA	-	-	-
L. lasiocalycina Cham.	AFL, FCA	-	-	-
L. lippioides (Cham.) Rusby	FOM	-	-	-
L. lupulina Cham.	AFL, FCA	-	-	-
L. paranensis (Moldenke) T.Silva & Salimena*	?	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
L. pumila Cham.*	AFL, FCA	-	-	-
L. pusilla T.Silva & Salimena	AFL, FCA	-	-	-
L. recolletae Morong	FCA	-	-	-
L. turnerifolia Cham.	AFL, FCA	-	-	-
Petrea – 1/11				
P. volubilis L.	FES	-	-	-
Phyla – 1/15				
P. betulifolia (Kunth) Greene	FES	-	-	-
Priva – 2/20				
P. bahiensis DC. *ex* Schauer*	RST	-	-	-
P. lapullaceae (L.) Pers.	FOD, RST	-	-	-
Stachytarpheta – 11/90				
S. amplexicaule Moldenke*	FES	-	-	-
S. angustifolia (Mill.) Vahl	FOD, FES, RST	-	-	-
S. hirsutissima Link	FOD, FES, RST	-	-	-
S. jamaicensis (L.) Vahl	FOD, FES, RST	-	-	-
S. laevis Moldenke	FOD, FES, RST	-	-	-
S. maximiliani Schauer*	FOD, FES, RST	-	-	-
S. paraguariensis Moldenke	FOD	-	-	-
S. restinguensis Moldenke*	RST	-	-	-
S. scaberrima Cham.*	FES	-	-	-
S. schottiana Schauer*	RST	-	-	-
S. speciosa Pohl *ex* Schauer*	FOD	-	-	-
Verbena – 15/200-250				
V. alata Otto & Sweet*	FCA	-	-	-
V. bonariensis L.	FCA	-	-	-
V. caniuensis Moldenke*	FCA	-	-	-
V. ephedroides Cham.	FCA	-	-	-
V. filicaulis Schauer	FCA	-	-	-
V. hirta Spreng.	FCA	-	-	-
V. lindbergii Moldenke*	FCA	-	-	-
V. litoralis Kunth	FCA	-	-	-
V. lobata Vell.	FCA	-	-	-
V. montevidensis Spreng.	FCA	-	-	-
V. ovata Cham.	FCA	-	-	-
V. paulensis Moldenke*	FOD	-	-	-
V. rigida Spreng.	FCA	-	-	-
V. sagittalis Cham.	FCA	-	-	-
V. subpetiolata N.O'Leary*	FCA	-	-	-
V. tessmanii Moldenke	FCA	-	-	-
*Verbenoxylum** – 1/1				
V. reitzii (Moldenke) Tronc.*	FOD	-	-	-

Violaceae

Juliana de Paula-Souza

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
VIOLACEAE – 26/ca. 800				
Amphirrhox – 1/1				
A. longifolia (A.St.-Hil.) Spreng.	FOD	-	-	-
Anchietea – 3/8				
A. exalata Eichler	FES	-	-	-
A. pyrifolia (Mart.) G.Don	FES, FOD, RST	-	-	-
A. selloviana Cham. & Schltdl.	FED, FOD	-	-	-
Hybanthus – 11/70				
H. atropurpureus (A.St.-Hil.) Taub.	FES, FOD	-	-	-
H. bicolor (A.St.-Hil.) Baill.	FCA	-	-	-
H. bigibbosus (A.St.-Hil.) Hassl.	FES, FOD	-	-	-
H. brevicaulis (Mart.) Baill.*	FES	-	-	-
H. calceolaria (L.) Oken	FOD, RST	-	-	-
H. communis (A.St.-Hil.) Taub.	FES, FOD	-	-	-
H. heterosepalus (Eichler) Hassl.	FED, FOD	-	-	-
H. oppositifolius (L.) Taub.	FOD	-	-	-
H. parviflorus (Mutis *ex* L.f.) Baill.	FCA, FES, FOD, FOM	-	-	-
H. setigerus (A.St.-Hil.) Baill.	FOD	-	-	-
H. velutinus Schulze-Menz	FCA	-	-	-
Noisettia – 1/1				
N. orchidiflora (Rudge) Ging.	FOD	-	-	-
Paypayrola – 1/8				
P. blanchetiana Tul.*	FOD	-	-	-
Rinorea – 5/160				
R. bahiensis (Moric.) Kuntze*	FOD	-	-	-
R. guianensis Aubl.	FOD	-	-	-
R. laevigata (Sol. *ex* Ging.) Hekking	FOD	-	-	-
R. maximiliani (Eichler) Kuntze*	FOD	CR	-	-
R. ramiziana Glaz. *ex* Hekking*	FOD	-	VU	ANEXO II
Schweiggeria – 1/1				
S. fruticosa Spreng.	FES	-	-	-
Viola – 3/525				
V. cerasifolia A.St.-Hil.*	FOD	-	-	-
V. gracillima A.St.-Hil.*	FOD	-	-	-
V. subdimidiata A.St.-Hil.*	FOD	-	-	-

Vitaceae

Julio Antonio Lombardi

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
VITACEAE – 19/850				
Cissus – 19/ca. 350				
C. albida Cambess.	FCA, FES	-	-	-
C. blanchetiana Planch.*	FES, FOD, FOM	-	-	-
C. coccinea (Baker) Planch.*	FES, FOD	-	-	-
C. erosa Rich.	FES, FOD, FOM, FCA	-	-	-
C. gongylodes (Baker) Planch.	FES, FOD, FOM	-	-	-
C. nobilis Kuhlm.*	FOD, FES	-	-	-
C. paucinervia Lombardi*	FOD	-	-	-
C. pauliniifolia Vell.*	FOD, FOM	-	-	-
C. pinnatifolia Lombardi*	RST	-	-	-
C. pulcherrima Vell.*	FOD, FOM	-	-	-
C. serroniana (Glaz.) Lombardi*	FOD, FES, FOM	-	-	-
C. simsiana Schult. & Schult.f.	FOM, FES, AFL	-	-	-
C. stipulata Vell.*	FOD, FOM	-	-	-
C. striata Ruiz & Pav.	FOD, FOM, FES	-	-	-
C. subrhomboidea (Baker) Planch.	FES, FOM	-	-	-
C. sulcicaulis (Baker) Planch.	FES, FOD, FOM, FCA	-	-	-
C. tinctoria Mart.	FES, FOD, FOM	-	-	-
C. trianae Planch.	FOD	-	-	-
C. verticillata (L.) Nicolson & C.E.Jarvis	FES, FOD, FOM, FCA, RST	-	-	-

Vivianiaceae

Marcos Sobral

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
VIVIANIACEAE – 1/6				
Caesarea – 1/1				
C. albiflora Cambess.	FCA, FOM	-	-	-

Vochysiaceae

Ary Teixeira de Oliveira-Filho

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
VOCHYSIACEAE – 47/179				
Callisthene – 6/7				
C. dryadum A.P.Duarte*	FOD	-	-	-
C. fasciculata (Spreng.) Mart.	FES, FED, FCA	-	-	-
C. inundata O.L.Bueno *et al.**	FOM, FES	-	-	-
C. major Mart.	FES, FCA	-	-	-
C. microphylla Warm.	FED, FCA	-	-	-
C. minor Mart.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
Erisma – 1/16				
E. arietinum M.L.Kawas.*	FOD	-	-	-
Qualea – 14/59				
Q. cordata (Mart.) Spreng.	FOD, FOM, FES, FED, FCA	-	-	-
Q. cryptantha (Spreng.) Warm.*	FOD, FES, RST	-	-	-
Q. densiflora Warm.	FES, FCA	-	-	-
Q. dichotoma (Mart.) Warm.	FOD, FES, FED, FCA	-	-	-
Q. gestasiana A.St.-Hil.*	FOD, FES	-	-	-
Q. glaziovii Warm.*	FOD, FOM	-	-	-
Q. grandiflora Mart.	FES, FED, FCA	-	-	-
Q. hannekesaskiarum Marc.-Berti	FES, FCA	-	-	-
Q. jundiahy Warm.*	FOD, FES.	-	-	-
Q. magna Kuhlm.*	FOD	-	-	-
Q. megalocarpa Stafleu*	FOD, FES	-	-	-
Q. multiflora Mart.	FES, FED, FCA	-	-	-
Q. parviflora Mart.	FES, FED, FCA	-	-	-
Q. selloi Warm.	FOD, FES	-	-	-
Vochysia – 26/97				
V. acuminata Bong.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
V. angelica M.C.Vianna & Fontella*	FOD	-	-	-
V. bifalcata Warm.*	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
V. cinnamomea Pohl	FES, FCA	-	-	-
V. dasyantha Warm.*	FOD, FES	-	-	-
V. elliptica (Spreng.) Mart.	FES, FED, FCA	-	-	-
V. emarginata Vahl	FES, FCA	-	-	-
V. gardneri Warm.	FES, FED, FCA	-	-	-
V. glaberrima Warm.	FOD, FES	-	-	-
V. glazioviana Warm.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
V. gummifera Mart. *ex* Warm.*	FOD, FES	-	-	-
V. magnifica Warm.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
V. oblongifolia Warm.*	FOD, FES	-	-	-
V. oppugnata Warm.*	FOD, FES	-	-	-
V. pygmaea Bong.*	FCA	-	-	-
V. pyramidalis Mart.	FOD, FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
V. rectiflora Warm.*	FOD, FOM	-	-	-
V. riedeliana Stafleu*	FOD	-	-	-
V. rotundifolia Mart.*	FES, FCA	-	-	-
V. rufa Mart.	FES, FED, FCA	-	-	-
V. saldanhana Warm.*	FOD, FES	-	-	-
V. schwackeana Warm.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
V. selloi Warm.*	FOD	-	-	-
V. spathulata Warm.*	FOD	-	-	-
V. thyrsoidea Pohl	FOD, FES, FCA	-	-	-
V. tucanorum Mart.	FOD, FOM, FES, FCA	-	-	-

Winteraceae

Caetano Troncoso Oliveira

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
WINTERACEAE – 2/60				
Drimys – 2/4				
D. angustifolia Miers*	FOM, FOD	-	-	-
D. brasiliensis Miers*	FOM, FOD	-	-	-

Xyridaceae

Maria das Graças Lapa Wanderley, Nara Furtado de Oliveira Mota & Gisele Oliveira Silva

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
XYRIDACEAE – 49/ca. 320				
Abolboda – 3/ca. 20				
A. americana (Aubl.) Lanjouw	RST	-	-	-
A. poarchon Seub.	FCA	-	-	-
A. pulchella Humb. & Bonpl.	FCA	-	-	-
Xyris – 46/ca. 300				
X. acrophila Malme	FCA	-	-	-
X. anceps Lam.	FCA	-	-	-
X. asperula Mart.	FCA	-	-	-
X. augusto-coburgii Szyszyl	FCA	-	VU	ANEXO I
X. aurea L.B.Sm.	FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
X. bialata Malme	FCA, RST	-	-	-
X. blanchetiana Malme	FCA	-	-	-
X. brevifolia Michx.	FCA, RST	-	-	-
X. capensis Thunb.	FCA	-	-	-
X. ciliata Thunb.	FCA, RST	-	-	-
X. consanguinea Kunth	FCA	-	-	-
X. fallax Malme	FCA	-	-	-
X. filifolia L.A.Nilsson	FCA	-	-	-
X. fusca L.A.Nilsson*	FCA	-	-	-
X. glandacea L.A.Nilsson	FCA, RST	-	-	-
X. guaranitica Malme	FCA	-	-	-
X. hatschbachii L.B.Sm. & Downs*	FCA	-	-	-
X. hymenachne Mart.	FCA	-	-	-
X. itatyaiensis (Malme) Wand.	FCA	-	-	-
X. jupicai Rich.	FCA, RST	-	-	-
X. laevigata L.A.Nilsson	FCA	-	-	-
X. laxifolia Mart.	FCA	-	-	-
X. longifolia Mart.	FCA	-	VU	ANEXO II
X. lucida Malme*	FCA	-	-	-
X. mertesiana Koern. *ex* Malme*	RST	-	-	-
X. metallica Klotzsch & Seub.	FCA	-	-	-
X. neglecta L.A. Nilsson	FCA	-	-	-
X. obtusiuscula L.A.Nilsson	FCA	-	-	-
X. organensis Malme*	FCA	-	-	-
X. piraquarae L.B.Sm. & Downs*	FCA	-	-	-
X. ramboi L.B.Sm. & Downs	FCA	-	-	-
X. regnellii L.B.Sm. & Downs	FCA, RST	-	-	-
X. reitzii L.B.Sm. & Downs*	FCA	-	-	-
X. rigida Kunth	FCA	-	-	-
X. savanensis Miq.	FCA	-	-	-
X. schizachne Mart.	FCA	-	-	-
X. seubertii L.A.Nilsson	FCA	-	-	-
X. sororia Kunth	FCA	-	-	-
X. stenocephalla Malme	FCA	-	-	-
X. stenophylla L.A.Nilsson*	FCA	-	-	-
X. tenella Kunth	FCA	-	-	-
X. teres L.A.Nilsson	FCA	-	-	-
X. tortula Mart.	FCA	-	-	-
X. trachyphylla Mart.	FCA	-	-	-
X. vacillans Malme	FCA	-	-	-
X. wawrae Heimerl*	FCA	-	-	-

Zingiberaceae

João Marcelo Alvarenga Braga

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA			
		IUCN	Biodiversitas	MMA	
ZINGIBERACEAE –7/ca. 1.300					
Hedychium – 1/ca. 50					
H. coronarium J.König	FOD, FOM, FES, FED, AFL, RST		-	-	-
Renealmia – 6/ca. 75					
R. alpinia (Rottb.) Maas	FOD, FES	-	-	-	
R. brasiliensis K.Schum. *emend*. Maas*	FOD, FES	-	-	-	
R. chrysotricha Petersen*	FOD	-	-	-	
R. guianensis Maas	FOD	-	-	-	
R. petasites Gagnep.*	FOD	-	-	-	
R. reticulata Gagnep.*	FOD	-	-	-	

Lista de Autores

Adriana Quintella Lobão - Universidade Federal do Espírito Santo - adrianalobao@ceunes.ufes.br

Alain Chautems - Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève - alain.chautems@ville-ge.ch

Alessandra dos Santos - Instituto de Botânica - IBt/SP - ale.san.bot@gmail.com

Alessandro Rapini - Universidade Estadual de Feira de Santana - rapinibot@yahoo.com.br

Alexa Araujo de Oliveira Paes Coelho - Universidade do Estado da Bahia - alexabio@yahoo.com.br

Alexandre Quinet - Jardim Botânico do Rio de Janeiro - aquinet@jbrj.gov.br

Alexandre Salino - Universidade Federal de Minas Gerais - salino@icb.ufmg.br

Amauri Cesar Marcato - Universidade de São Paulo - marcato@ib.usp.br

Ana Cláudia Araújo - Royal Botanic Gardens - Kew - anachlaudia@yahoo.com.br

Ana Claudia Pereira de Oliveira - Universidade Federal do Rio Grande do Norte - acpolive@gmail.com

Ana Maria G. Azevedo Tozzi - Universidade Estadual de Campinas - anatozzi@unicamp.br

Ana Maria Giulietti Harley - Universidade Estadual de Feira de Santana - anagiulietti@hotmail.com

Ana Odete Santos Vieira - Universidade Estadual de Londrina - aovieira@uel.br

Ana Paula Fortuna-Perez - Universidade Estadual de Campinas - anaforperez@bol.com.br

André Luiz Gaglioti - Instituto de Botânica - IBt/SP - agaglioti@gmail.com

André Márcio Araujo Amorim - Universidade Estadual de Santa Cruz - aamorimm@terra.com.br

André Olmos Simões - Universidade de São Paulo - aosimoes@usp.br

Andrea Ferreira da Costa - Universidade Federal do Rio de Janeiro - afcosta@acd.ufrj.br

Andréa Pereira Luizi-Ponzo - Universidade Federal de Juiz de Fora - luizi.ponzo@ufjf.edu.br

Andréia Silva Flores - Museu Integrado de Roraima - andreiasflores@gmail.com

Ângela Maria Studart Fonseca Vaz - Instituto Brasileiro de Geografia Estatística - JBRJ- avaz@jbrj.gov.br

Anna Luiza Ilkiu-Borges - Museu Paraense Emílio Goeldi - ilkiuborges@yahoo.com.br

Antoniela Morais Marinho - Universidade Federal do Rio Grande do Norte - antonielamorais@hotmail.com

Ariane Luna Peixoto - Jardim Botânico do Rio de Janeiro - ariane@jbrj.gov.br

Aristônio Magalhães Teles - Universidade Federal de Goiás - aristonio@hotmail.com

Armando Carlos Cervi - Universidade Federal do Paraná - accervi@ufpr.br

Ary Teixeira de Oliveira-Filho - Universidade Federal de Minas Gerais - ary.oliveira.filho@gmail.com

Benoit Loeuille - Universidade de São Paulo - benoit_loeuille@yahoo.fr

Bente B. Klitgaard - Royal Botanic Gardens - Kew - B.Klitgaard@kew.org

C. Thomas Philbrick - Western Connecticut State University - philbrickt@wcsu.edu

Caetano Troncoso Oliveira - Universidade Federal de Minas Gerais - caetano.to@hotmail.com

Caio Amitrano Alencar Imbassahy - Universidade Federal do Rio de Janeiro - caioimba@hotmail.com

Carmen Sílvia Zickel - Universidade Federal Rural de Pernambuco - zickelbr@yahoo.com

Cássia Mônica Sakuragui - Universidade Federal do Rio de Janeiro - cmsakura12@gmail.com

Cecília Carmen Xifreda - Universidad de La Plata - cxifreda@museo.fcnym.unlp.edu.ar

Cid José Passos Bastos - Universidade Federal da Bahia - cid-bastos@uol.com.br

Cíntia Kameyama - Instituto de Botânica - IBt/SP - ckameyama@uol.com.br

Claudenir Simões Caires - Universidade de Brasília - cscaires@hotmail.com

Cláudia Elena Carneiro - Universidade Estadual de Feira de Santana - carneiro@uefs.br

Cláudia Magalhães Vieira – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
Cláudia Petean Bove - Universidade Federal do Rio de Janeiro - cpbove@hotmail.com
Claudine Mynssen - Jardim Botânico do Rio de Janeiro - cmynssen@jbrj.gov.br
Cláudio Nicoletti Fraga - Jardim Botânico do Rio de Janeiro - cnfraga@jbrj.gov.br
Cyl Farney Catarino de Sá - Jardim Botânico do Rio de Janeiro - cfarney@jbrj.gov.br
Daniela Sampaio - Universidade Estadual de Campinas - sampaio.dani@gmail.com
Daniela Zappi - Royal Botanic Gardens - Kew - D.Zappi@kew.org
Dayane Tarabay - Universidade de São Paulo - dayanetarabay@gmail.com
Denise Pinheiro da Costa - Jardim Botânico do Rio de Janeiro - dcosta@jbrj.gov.br
Diego Soares Lara - Universidade Federal de Minas Gerais - diego2513@yahoo.com.br
Dilma Silva Nascimento - Universidade Federal do Paraná - dilmika@hotmail.com
Domingos B. O. S. Cardoso - Universidade Estadual de Feira de Santana - cardosobot@gmail.com
Douglas C. Daly - New York Botanical Garden - ddaly@nybg.org
Douglas Junqueira Lopes - Jardim Botânico do Rio de Janeiro
Eduardo Bezerra de Almeida Jr. - Universidade Federal Rural de Pernambuco - ebaj25@yahoo.com.br
Eduardo da Silva Leal – Jardim Botânico do Rio de Janeiro - eduardoleal@jbrj.gov.br
Eduardo Gomes Gonçalves - Instituto Inhotim - eduardo.goncalves@inhotim.org.br
Efigênia de Melo - Universidade Estadual de Feira de Santana - efidemelo@hotmail.com
Eliane de Lima Jacques - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - ejacques@ufrrj.br
Élide Santos Jimena - Universidade Federal do Paraná - elide@ufpr.br
Elnatan Bezerra de Souza - Universidade Estadual Vale do Acaraú - elbezsouza@yahoo.com.br
Elsie Franklin Guimarães - Jardim Botânico do Rio de Janeiro - eguimar@jbrj.gov.br
Enrique Forero - Universidad Nacional de Colombia - enriqueforero2003@yahoo.com
Eric Hattori - Universidade Federal de Minas Gerais - erichattori@yahoo.com.br
Erika von Sohsten Medeiros - Jardim Botânico do Rio de Janeiro - emedeiro@jbrj.gov.br
Eve J. Lucas - Royal Botanic Gardens – Kew - e.lucas@kew.org
Evelin Andrade Manoel - Jardim Botânico do Rio de Janeiro - evelin@jbrj.gov.br
Fabiana R. Filardi - Jardim Botânico do Rio de Janeiro - ffilardi@jbrj.gov.br
Fábio de Barros - Instituto de Botânica - IBt/SP - fdebarros@pq.cnpq.br
Fabrício Moreira Ferreira - Universidade Estadual de Feira de Santana - fmoreiraf@yahoo.com.br
Fátima Regina Gonçalves Salimena - Universidade Federal de Juiz de Fora - fatima.salimena@ufjf.edu.br
Fernando Alves Ferreira - Universidade Estadual de Maringá - ferreira_bot@yahoo.com.br
Flavia Cristina P. Garcia - Universidade Federal de Viçosa - fcgarcia@ufv.br
Flávio Dayrell Gontijo - Universidade Federal de Minas Gerais - gontijo10@hotmail.com
Flávio França - Universidade Estadual de Feira de Santana - flaviofranca@hotmail.com
Genise Somner - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - somner@ufrrj.br
Gerson Oliveira Romão - Universidade de São Paulo - ESALQ - goromao@esalq.usp.br
Gisela Pelissari - Instituto de Botânica - IBt/SP - pelissari.gi@gmail.com
Gisele Oliveira Silva - Instituto de Botânica - IBt/SP - g.silva_bot@yahoo.com.br
Gustavo Heiden - Jardim Botânico do Rio de Janeiro - gustavo.heiden@gmail.com
Gustavo Heringer - Universidade Federal de Minas Gerais - gustavoheringer@hotmail.com
Gustavo Martinelli - Jardim Botânico do Rio de Janeiro - gmartine@jbrj.gov.br
Gwilym P. Lewis - Royal Botanic Gardens - Kew - g.lewis@kew.org
Haroldo Cavalcante de Lima - Jardim Botânico do Rio de Janeiro - hlima@jbrj.gov.br

Hélio Boudet Fernandes - Museu de Biologia Mello Leitão - hboudet@terra.com.br
Hiltje Maas - van de Kamer - Nationaal Herbarium Nederland - paul.maas@wur.nl
Hortênsia Pousada Bautista - Universidade do Estado da Bahia - bvbautis@hotmail.com
Ingrid Koch - Universidade Federal de São Carlos - ingrid@ufscar.br
Jarênio Rafael Ozeas de Santana - Universidade Federal de Goiás - jarenios@gmail.com
João Aguiar Nogueira Batista - Universidade Federal de Minas Gerais - janb@icb.ufmg.br
João Luiz Mazza Aranha Filho - Universidade Estadual de Campinas - aranhafilho@gmail.com
João Marcelo Alvarenga Braga - Jardim Botânico do Rio de Janeiro - jmabraga@jbrj.gov.br
João Renato Stehmann - Universidade Federal de Minas Gerais - stehmann@ufmg.br
João Ricardo Vieira Iganci - Universidade Federal do Rio Grande do Sul - joaoiganci@gmail.com
João Rodrigues Miguel - Universidade do Grande Rio - jmiguel@unigranrio.com.br
Jomar Gomes Jardim - Universidade Federal do Rio Grande do Norte - j.jardim@yahoo.com.br
Jorge Fontella Pereira - Universidade Federal do Rio de Janeiro- jofope@mn.ufrj.br
José Eduardo Meireles - Duke University/Instituto de Pesquisas Jardim Botânico de Rio de Janeiro - jemeireles@gmail.com
José F. M. Valls - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - CENARGEN - valls@cenargen.embrapa.br
José Rubens Pirani - Universidade de São Paulo - pirani@usp.br
Juliana de Paula Souza - Universidade de São Paulo - jupsouza@esalq.usp.br
Juliana Souza Marques - Instituto Agronômico de Pernambuco - july_cabral@hotmail.com
Julie H. A. Dutilh - Universidade Estadual de Campinas - judutilh@yahoo.com
Julio Antonio Lombardi - Universidade Estadual de São Paulo - UNESP-Rio Claro - cissus@rc.unesp.br
Kátia Cavalcanti Porto - Universidade Federal de Pernambuco - kporto@ufpe.br
Lana da Silva Sylvestre - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - lana@ufrrj.br
Larissa Grokoviski - Universidade Federal do Paraná - leblumen@bol.com.br
Laura Cristina Pires Lima - Universidade Estadual de Feira de Santana - lcplima@yahoo.com.br
Leonardo Dias Meireles - Universidade Estadual de Campinas - ldmeireles@yahoo.com.br
Leslie Landrum - Arizona State University - les.landrum@asu.edu
Lidyanne Yuriko Saleme Aona - Universidade Federal do Recôncavo da Bahia - lidyanne.aona@gmail.com
Lívia Echternacht - Universidade de São Paulo - livia.echter@gmail.com
Lívia Godinho Temponi - Universidade Estadual do Oeste do Paraná - liviatemponi@yahoo.com.br
Lúcia G. Lohmann - Universidade de São Paulo - llohmann@usp.br
Lúcia Helena Soares-Silva - Universidade de Brasília - lsoares@unb.br
Lucia Rossi - Instituto de Botânica - IBt/SP - lrossi@ibot.sp.gov.br
Luciana Cláudia Neves Melo - Universidade Federal de Minas Gerais - cailu.melo@gmail.com
Luciana Hiromi Yoshino Kamino - Universidade Federal de Minas Gerais - lukamino@yahoo.com.br
Luciano Paganucci de Queiroz - Universidade Estadual de Feira de Santana - luciano_paganucci@yahoo.com.br
Luís Carlos Bernacci - Instituto Agronômico de Campinas - bernacci@iac.sp.gov.br
Luiz Carlos da Silva Giordano - Jardim Botânico do Rio de Janeiro - giordano@jbrj.gov.br
Mara Rejane Ritter - Universidade Federal do Rio Grande do Sul - mara.ritter@ufrgs.br
Marccus Alves - Universidade Federal de Pernambuco - sedges@terra.com.br
Marcela Firens da Silveira - Universidade Estadual de Campinas - marcela.firens@gmail.com
Marcela Maia Viana - Universidade Federal de Minas Gerais
Marcelo Ferreira de Vasconcelos - Associação Montanhas do Espinhaço - mfvasconcelos@gmail.com
Marcelo Trovó - Universidade de São Paulo - martrovo@gmail.com
Márcio de Souza Werneck - Universidade Federal do ABC - marciosw@yahoo.com.br

Marco Otávio Pivari - Universidade Federal de Minas Gerais - marcopivari@yahoo.com.br
Marcos José da Silva - Universidade Estadual de Campinas - marcos_agrorural@hotmail.com
Marcos Sobral - Universidade Federal de São João del-Rey - marcos_sobral@hotmail.com
Marcus Alberto Nadruz Coelho - Jardim Botânico do Rio de Janeiro - mnadruz@jbrj.gov.br
Maria Bernadete Costa-e-Silva - Instituto Agronômico de Pernambuco - m.berna@globo.com
Maria Carolina Abreu - Universidade Federal Rural de Pernambuco - mariacarolinabreu@hotmail.com
Maria das Graças Lapa Wanderley - Instituto de Botânica - IBt/SP - gracaw@terra.com.br
Maria de Fátima Freitas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - ffreitas@jbrj.gov.br
Maria do Carmo Estanislau do Amaral - Universidade Estadual de Campinas - volker@unicamp.br
Maria do Carmo Mendes Marques - Jardim Botânico do Rio de Janeiro - mmarques@jbrj.gov.br
Maria do Socorro Pereira - Universidade Federal de Campina Grande - mariaspereirabio@hotmail.com
Maria Ema Múlgura de Romero - Instituto Darwinion - mmulgura@darwin.edu.ar
Maria Fernanda Calió - Universidade de São Paulo - mfernanda_calió@yahoo.com.br
Maria Helena Durães Alves Monteiro - Universidade Santa Úrsula - mhduraes@yahoo.com.br
Maria Iracema Bezerra Loiola - Universidade Federal do Ceará - iloiola@ufc.br
María Mercedes Arbo - Instituto de Botánica del Nordeste - arbo@agr.unne.edu.ar
Maria Regina de Vasconcellos Barbosa - Universidade Federal da Paraíba - mregina@dse.ufpb.br
Maria Salete Marchioretto - Instituto Anchietano de Pesquisas/UNISINOS - herbariopaca@unisinos.br
María Silvia Ferrucci - Universidad Nacional del Nordeste - msferrucci@yahoo.com.ar
Mariana Machado Saavedra - Jardim Botânico do Rio de Janeiro - mariana@jbrj.gov.br
Marli P. Morim - Jardim Botânico do Rio de Janeiro - mpires@jbrj.gov.br
Marta Camargo de Assis - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Meio Ambiente - marta@cnpma.embrapa.br
Massimo Bovini - Jardim Botânico do Rio de Janeiro - mbovini@jbrj.gov.br
Matheus Fortes Santos - Universidade de São Paulo - matheus_fs@yahoo.com.br
Michel J. F. Barros - Jardim Botânico do Rio de Janeiro - michel@jbrj.gov.br
Milton Groppo - Universidade de São Paulo - groppo@ffclrp.usp.br
Mizué Kirizawa - Instituto de Botânica - IBt/SP - mkirizawa@ig.com.br
Nádia Roque - Universidade Federal da Bahia - nroque@ufba.br
Nadia Said Chukr - Prefeitura de Cotia - Parque Teresa Maia - chukravila@gmail.com
Nara Furtado de Oliveira Mota - Universidade Federal de Minas Gerais - bhznara@yahoo.com.br
Nataly O'Leary - Instituto Darwinion - noleary@darwin.edu.ar
Nathan Smith - nathansmit@gmail.com
Nilda Marquete Ferreira da Silva - Instituto de Pesquisas Jardim Botânico de Rio de Janeiro - nmarquete@jbrj.gov.br
Nívea Dias dos Santos - Universidade Estadual de Campinas - nivea.dias@gmail.com
Paola Peralta - Instituto Darwinion - paofperalta@gmail.com
Patrícia Aparecida de São José - Instituto de Botânica - IBt/SP - paparecida31@gmail.com
Paul J. M. Maas - Nationaal Herbarium Nederland - paul.maas@wur.nl
Paula Moraes Leitman - Jardim Botânico do Rio de Janeiro - leitman@jbrj.gov.br
Paulo Eduardo Aguiar Saraiva Câmara - Universidade de Brasília - pcamara@unb.br
Paulo José F. Guimarães - Jardim Botânico do Rio de Janeiro - paulo@jbrj.gov.br
Paulo Takeo Sano - Universidade de São Paulo - ptsano@usp.br
Pedro Fiaschi - Virginia Commonwealth University - pedrofiaschi@hotmail.com
Pedro Lage Viana - Universidade Federal de Minas Gerais - vianapl@yahoo.com.br
Polyana Noronha Soares - Universidade Federal de Uberlândia - polyananoronha@yahoo.com.br

Rafael Augusto Xavier Borges - Jardim Botânico do Rio de Janeiro - borgesrafael@gmail.com
Rafaela Campostrini Forzza - Jardim Botânico do Rio de Janeiro - rafaela@jbrj.gov.br
Rafaella Cardoso Ribeiro - Universidade Federal de Minas Gerais - rafinhabio@yahoo.com.br
Regina Helena Potsch Andreata - Universidade Santa Úrsula - regina.andreata@gmail.com
Renata Moura de Liro - Universidade Federal da Bahia - mouradeliro@gmail.com
Renato de Mello-Silva - Universidade de São Paulo - mellosil@usp.br
Renato Goldenberg - Universidade Federal do Paraná - renato.goldenberg@pq.cnpq.br
Renée H. Fortunato - Instituto de Recursos Biologicos - rhfortunato2002@yahoo.com.ar
Ricardo Kriebel - New York Botanical Garden - kriebelr@gmail.com
Richard Toby Pennington - Royal Botanic Gardens - Edinburgh - t.pennington@rbge.org.uk
Rodrigo Teófilo Valadares - Centro Universitário de Vila Velha - rodrigoteofilo669@hotmail.com
Ronaldo Marquete - Instituto Brasileiro de Geografia Estatística - JBRJ- rmarquet@jbrj.gov.br
Rosana Romero - Universidade Federal de Uberlândia - romero@inbio.ufu.br
Rosângela Simão-Bianchini - Instituto de Botânica - IBt/SP - bianchiniibot@yahoo.com.br
Rubens Teixeira Queiroz - Universidade Estadual de Campinas - rtbio@yahoo.com.br
Scott Mori - New York Botanical Garden - smori@nybg.org
Sergio Romaniuc Neto - Instituto de Botânica - IBt/SP - sromaniuc@gmail.com
Silvana Vilas Bôas-Bastos - Universidade Federal da Bahia - silvana-vbbastos@uol.com.br
Silvia T. Miotto - Universidade Federal do Rio Grande do Sul - stsmiotto@bol.com.br
Taciana Barbosa Cavalcanti - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - CENARGEN - taciana@cenargen.embrapa.br
Tânia Maria Moura - Universidade Estadual de Campinas - tmourabr@yahoo.com.br
Tânia Regina dos Santos Silva - Universidade Estadual de Feira de Santana - tsilva@uefs.br
Tarciso Sousa Filgueiras – Reserva Ecológica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – tfilg@uol.com
Tatiana Tavares Carrijo - Jardim Botânico do Rio de Janeiro - tcarrijo@gmail.com
Thais de Freitas Vaz-Imbassahy - Universidade Federal do Rio de Janeiro - vazimbassahy@gmail.com
Thais Elias Almeida - Universidade Federal de Minas Gerais - blotiella@gmail.com
Valquíria Ferreira Dutra - Universidade Federal de Viçosa - valdutra2@yahoo.com.br
Vera Lúcia Gomes Klein - Universidade Federal de Goiás - vlgomes.ufg@gmail.com
Verônica A. Thode - Universidade Federal do Rio Grande do Sul - veronicathode@hotmail.com
Vidal Freitas Mansano - Jardim Botânico do Rio de Janeiro - Vidal@jbrj.gov.br
Vinicius Antonio de Oliveira Dittrich - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - vinarc@gmail.com
Vinícius Castro Souza - Universidade de São Paulo - ESALQ - vcsouza@esalq.usp.br
Vinícius Trettel Rodrigues - Instituto de Botânica - IBt/SP - rodriguesvt@yahoo.com.br
Viviane Renata Scalon - Universidade Federal de Ouro Preto - vrscalon@yahoo.com.br
Volker Bittrich - Universidade Estadual de Campinas - volker@unicamp.br
William Rodrigues - Universidade Federal do Paraná - william@bio.ufpr.br